

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.


À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com














NOUVEAU MANUEL

DE

NÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

PREMIÈRE PARTIE

MANUEL DE MATIÈRE MÉDICALE

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX EFFETS DES MÉDICAMENTS HOMOGOPATHIQUES

AVEC INDICATIONS DES OBSERVATIONS CLINIQUES

- - - -

LE DOCTEUR G. H. G. JAHR

MUITIÈME ÉDITION REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

TOME PREMIER

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS LIBRAIRES DE L'ACADÉNIE DE MÉDECINE Rue Hautefeuille, 19.

Lesice, Blillèrr, Timbri and Cox. | Hadrid, Blilly-Blillière,
Bruxeller, Henri Manceaux — Gustave Mayolez.

Droits de traduction et de reproduction réservée-4872

47







X1101 A25 1872

AVERTISSEMENT

DE LA HUITIÈME ÉDITION.


Désireux de donner à notre ouvrage la perfection dont il est susceptible, nous avons introduit de nombreuses modifications dans cette huitième édition 1, tout en restant autant que possible dans les limites que nous nous étions imposées et que la bienveillance du public nous obligeait de respecter.

Dans la matière médicale, plus de 20 nouveaux médicaments américains ont été ajoutés au grand nombre de médicaments dont notre précédente édition avait déjà été augmentée; mais, malheureusement, ces Remèdes américains publiés par Hale, sont loin de valoir ceux publiés par Héring; la plupart contiennent presque exclusivement des acis cliniques, sans pathogénésies valables, et les études pathogénésiques que quelques médecins en ont publiées nous ont paru trop fantaisistes pour prendre place dans un livre sérieux. Le lecteur trouvera cependant des indications pratiques des plus précieuses dans les extraits que nous avons donnés

(4) Manuel des médicaments homocopathiques, traduit de l'allemand (par D. D. Roth et Petroz'. Paris, 1834, 1 vol. in-8 de xx-402 pages. — Manuel d'homocopathie, traduit de l'allemand (par L. Noirot et Ph. Mouzin'. Dijon et Paris, 1838, 2 vol. in-18.

Les deux premières éditions de ce Manuel n'étaient que des traductions de notre ouvrage allemand. La troisième édition française, que nous publiames en 1840, avait subi des changements et un rémaniement tellement considérables que nous dûmes la considérer en quelque sorte comme un nouvel ouvrage. Nous avons publié en 1855 la quatrième édition, en 1859 la cinquième et en 1861 la septième.







DE LA HUITIÈME ÉDITION.

VII

LI, DOUS ices, non les quelits n'est int malaucune ilement ne plus ccepter uelques igenceccepter · quelle toutes ment : faire le leur

e table quelle shaque u cont cette

séries, 3-1837, 10moro-hahne-uhique, --- Bul-5-1849, thique, vacopa-Paris, es spé-uhèque 4868-ine ho-

table, nous avons eu surtout en vue les besoins des commençants; mais nous pensons qu'elle pourra aussi être très-utile au praticien; en la détachant du volume, on pourra l'annexer à son agenda et la consulter facilement pendant qu'on écrira ses notes. Ceci évitera l'inconvénient qu'il y aurait à porter un livre volumineux chez ses elients, sans pour cela être privé d'aide-mémoire en cas de besoin.

Enfin, nous avons de nouveau porté toute notre attention sur le Répertoire, qui, depuis la 6e édition déjà, a été littéralement refondu et augmenté d'un grand nombre d'indications précieuses. notamment pour les circollètances aggravantes et les épiphénomènes des maux de tête, des fièvres, des odontalgies, des affections gastriques, etc. Nous l'avons de nouveau rédigé d'une manière absolument indépendante du texte, dont il forme non la table, mais le supplément pour ainsi dire, ne contenant que les indications dont le praticien a besoin, et se rapportant, non-seulement au texte, mais encore aux renseignements contenus dans les avis cliniques. Nous espérons que les praticiens ne tarderont pas à s'en servir avec plus de fruit que jusqu'ici.

Voulant montrer le degré d'importance des médicaments cités dans le Répertoire, nous avons employé pour les distinguer des signes caractéristiques qui les divisent en cinq classes, savoir :

- 1º En majuscules (*ARN. p. ex.), les médicaments les plus importants de tous;
- 20 En caractères italiques avec astérisques (*arn. p. ex.), ceux que la pratique a également confirmés d'une manière assez fréquente;
- 30 En caractères italiques avec un petit rond (oarn. p. ex.), les médicaments pratiques du troisième ordre;
- 4º En caractères italiques, sans signe (arn. p. ex.), les médicaments que leur pathogénésie recommande à l'attention des praticiens;
- 5º En caractères de texte, ceux qui paraissent avoir moins d'importance que tous les autres.

Quant à cette huitième édition, nous pouvons dire que nous l'avons revue et corrigée avec tout le soin possible : le succès qu's




VIII AVERTISSEMENT DE LA HUITIÈME ÉDITION.

obtenu ce Manuel nous y encourageait et nous y obligeait. On remarquera que nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour rendre ce Manuel de plus en plus utile aux praticiens et ponr répondre à l'attention toujours croissante que le public et les médecins accordent à notre art.

Depuis quelques années, de grands efforts ont été faits pour la propagation de l'homœopathie. En Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Espagne, au Brésil, partout enfin, elle compte de nombreux représentants; des têtes couronnées lui ont accordé leur estime et leur confiance. Plusieurs médecins d'un talent reconnu ont daigné s'occuper sérieusement de la doctrine de Hahnemann; de nouveaux journaux et de nouveaux liyres ont été publiés pour la défense de nos principes. En France, l'homœopathie n'es pas en arrière ; à Paris même, siége des facultés et des académifoyer ardent des luttes et des rivalités, elle poursuit sa mare victorieuse : le gouvernement français s'est vu forcé de se rendr l'évidence des faits et de reconnaître, malgré l'opposition de l'/ démie, les avantages que tous pourraient retirer de la propag de l'homœopathie. En même temps, le public se montre av plus en plus sympathique à la réforme de Hahnemann. quelques années, et l'homœopathie tiendra partout le rans mérite.

40 octobre 4871.



		- 4
		1
	TABLE DES MATIÈRES.	PAGES.
	TABLE DES	130 October 1
x	TADLE Jacardium orientale, Fère de Malac natura, Angusture vraie (Ecorce du Bonplandia tri natura (Ecorce du Bonplandia tr	loliata).
. ansac. Att	acardium orientale (Ecorre du crue, Sultur	63
11 ANG. Ang	astura, Roseium cruanin, Antimonium cruanin,	(40
43 ANT-CRU	nacardium orientale, Fève de Malac ustura, Angusture vraic (Écorre du Bouplandia tri ustura, Angusture vraic (Écorre du Bouplandia D. Antimonium crudum, Antimoine crue, Sulfur is mellifera, Abeille mellifère, is mellifera, Abeille mellifère, is mellifera, Abeille mellifère, Apocynum cannabinum, Chanvre américai AN. Apocynum cannabinum, Chanvre foliatum, Argent	(9)
		72
45 APOC-A	AN. Apocynum da Argent d'argent	77
16 APGC A	rgentum jouricum, Altraitort officinal	
48 ARG-N.	NDR. Apocynum annabinum, Chautts AN. Apocynum cannabinum, Chautts rgentum foliatum, Argent Argentum nitricum, Nitrate d'argent Argentum nitricum, Raifort officinal Armoracia rusticana, Raifort officinal Armica montana, Arnica des montagnes Arnica montana, Arsenic	93
		96
21 ARS.	Trenicum album, triphyllum. TR. Arum triphyllum. Asa fætida, Gomme-résine de Europe Asa fætida, Gomme-ronge, Etoile de mer.	98
92 ASA.	Asa farma, uroperum, Asarouge, Etoile de mi	40
24 ABAR	TR. drum tripnyame resine de lerus. Asa fætida, Gomme resine de Europe Asa fætida, Gomme resine de Europe Asarun europkann, Asaret d'Europe Asterias rubens, Astèrie rouge, Etoile de mer. Asterias rubens, Or métallique. Aurum foliatum, Or métallique. Aurum muriaticum, Sulfate d'or. Aurum sulfuricum, poptisie.	10
20 120 -	Aurilli I'm saticuli.	·
27 AUR.	Asterias rubens, Asteria rubens, Asterias rubens, Asterias rubens, Aurum foliatum, Or Meriate d'or. Aurum foliatum, Muriate d'or. M. Aurum sulfuricum, Sulfate d'or. B. Aurum sulfuricum, Baptisie B. Baptisia tinctoria, Baptisie B. Baptisia carbonica, Carbonate de barrie VT. Baryta carbonica, Muriate de barrie VT. Baryta muriatica, Muriate de Beiladone,	. 4
98 AUM	T. Baptisia tinclonica, Carbonate de haryte.	n minin 1
30 BAR	NT. Baryta muriatica, Maladona, Bellatone	njoin, Renjo.u. 1
31 BAR	M. Aurum muratte. 8. Aurum sulfuricum, Baptisie 7. Baptisia tinctoria, Baptisie 7. Baptisia tinctoria, Baptisie 7. Baryta carbonica, Auriate de haryte 7. Baryta muratica, Muriate de haryte 8. Belladona, Airopa belladona, Belladone 8. Belladona, Airopa belladona, Fleurs de Ber 8. Berberis rulgaris, Epine-vinette 8. Berberis rulgaris, Epine-vinette 8. Berberis rulgaris, Epine-vinette	
33 BE	L. Belladona, Aride benzoiques, L. Benzois acidum, Aride Epine-vinette L. Berzois rulgaris, Epine-vinette Bismuthum, Bismuth Bismuthum, Bismuth Borax reneta, Sous-borate de soude RAX. Boras reneta, Sous-borate Bounafa, Racine de Bounafa ROVISIO, BOSSO CONTROL DE SOUSE	
94	Bisham world. Sous marsts	re .
36 BO	RB. Berberis ruddum, Bismuth RB. Bismuthum, Bismuth RAX. Borar reneta, Sous-borate de soude RAX. Borar reneta, Ge Bounafa RAX. Borar reneta, Ge Bounafa ROWIS. Bovista, Roviste, Vesse-de-loup des bouvie ROWI. Bromum, Brome. ROWI. Bromum, Brome.	
37 BO	VIS. Borista, Borista, brome. Fausse Angustu	re
40 B	RAX Borax Hacine de Boundes bouvie Bounda, Raviste, Vessc-de-loup des bouvie VIS Borista, Roviste, Vessc-de-loup des bouvie ROM Brucea antidyssenterica, Fausse Angustu RUC Brucea antidyssenterica, Fausse Angustu RUC Bryonia alba, Bryone RY Bryonia alba, Bryone RY Cacins grandiforus, Carins. ALAD Caladium segninum, Pediveau venicum Carlonate de chaux Calcarea carbonica, Carbonate de chaux Calcarea phosphorica, Phosphate de	S us-Carbo
42 C	ACT. Caladium sequinum Carbonate de chaus	, Lany
43 9	ALC. Calcarea de l'Ecaille a la phosphate de	, chaux
	a mill Lance. From Dille. Jacob	
45	CAMPH. Camphora, tan Chanvre curre.	
47	de chaus Calcared Jumplure. CALC-PH. Camphora, Camplure. CAMPH. Camphora, Cantharide officiuale. CANN. Cantharis, Cantharide officiuale. CANTH. Cantharis, Cantharide officiuale. CAPS. Capsicum annuum, Poivre de Cayenne CAPS. Carbo animalis, Charbon animal. CAPS. Carbo animalis, Charbon végé.	
48	CAPS. Capsicum animalis, Charbon vege	tal
-130 141	CABB-AN. Carbo vegetavata,	
23	LONG A CONTRACTOR OF THE CONTR	
F	3 Cas Canticum,	chamomilla
ì	3 CASS Causticum, 53 CFP. Cepu, Oignon 55 CFP. Cepu, Oignon 56 CHAM. Chamonilla vulgaris, Matricarie 56 Cmille conmune, Matricarie Camonille 66 Cmille conmune, Matricarie Chande Chelido	
,	56 CADS Cepa, Oignou vulgaris, Manille 56 CHAM. Chanonilla vulgaris camounille 56 CHAM. commune, Matricaire camounille commune, Matricaire, Grande Chelidonium majus, Grande Chelidonium majus, Grande Chelidonium officinalis, Quinqu	ina .
	Chelidonian bong officination Sulfat	e de quini
	DO Comment Children Children	gue · · ·
	Cicularia admin	an ar
•	60 CHLOR. Chlorum, Cicutaria aquatica, 50 CHLOR. Chicata virosa, Cicutaria aquatica, 61 CIC. Cicuta virosa, Cicutaria aquatica, 62 CIN. China, Armoise d'Alep. 63 CINIC. Cimicifuga racemona, Christopho 64 CINN. Cimabaria, Sulure rouge de mer 64 CINN. Cimabaria, Sulure is delianthem	tiane en e.
1	63 CIN. Cimicifuga racemona rouge de mer	e · · ·
1	64 CINN Cinnabaris, Ciste Bellautie	• • •
A	61 CIC. Cicuta pirosa d'Alep. 62 CIN. Cina, Armoise d'Alep. 63 CINIC. Cimicifuga racemosa, Christopho 63 CINIC. Cimicifuga Sulture rouge de mer 64 CINN. Cinnabaris, Sulture rouge de mer 65 CIST. Cistus canadensis, Ciste bélianhèm 66 CLEM. Clematis erecta, Clématite droite 67 COCC. Cocculus, Coque du Levant	•
M	67 COCC. Cocculus, Coque	
III	Or Marie	



TABLE DES MATIÈRES.

68 COCC-CAC. Coccus cacti, Cochenille du Nopal ou Mexique.


	COFP Coffea arabica, Coffea cruda, Café cru	. 257
70	COLCH. Colchicum autumnale, Colchique d'antonne, Safran de	·9
	prés, Safran bátard	. 239 . 262
71	COLOC. Colocynthis, Coloquinte	. 262
79	CON. Conium maculatum, Grande cigue	. 265
73	COP. Copairer Balsamum, Baume de Copahu	. 272
	CORALL. Corallium rubrum, Corail rouge	. 272
	CROC. Crocus satirus, Safran cultivé	. 274
76	CROTAL. Crotalus horridus, Venin du serpent à sonnettes	277
	CROTON. Croton tiglium, Huile de croton.	. 2 79
		. 287
10	CLPR. Cuprum metallicum, Cuivre.	. 201
19	CUPR-AC. Cuprum accticum, Acétate de cuivre. Verdet	
	CUPR-C. Cuprum carbonicum, Sous-Carbonate de cuivre	. 29
81	CYCL. Cyclamen europæum, Cyclame d'Europe	. 293
	DAPH. Daphne indica, Daphné des Indes	. 295
	DIG. Digitalis purpurea, Digitale pourprée	. 297
84	DROS. Drosera rotundifolia, Drosere à feuilles rondes, Rosée d	
	soleil	. 301
85	DULC. Dulcamara, Douce-amère.	. 304
86	EUPHORB, Euphorbium officinale, Euphorbe officinal	. 307
87	EUPHR. Euphrasia officinalis, Euphraise officinale	. 310
	FERR. Ferrum metallicum, Fer métallique	. 312
	FERR-M. Ferrum muriaticum, Hydrochlorate de fer	. 316
	FLUOR-AC. Fluoris Acidum, Acide fluorique	. 316
	GELS. Gelseminum sempervirens, Gelsemine.	321
		325
	GINS. Ginseng, Ginseng.	
	GRAN. Granatum. Ecorce de la racine du Grenadier	. 32
	GRAPH. Graphites, Graphite. Plombagine, Mine de Plomb	. 329
95	GRAT. Gratiola officinalis, Gratiole	. 33
86	GUAL Guaiacum officinale, Résine de Gazac	. 33
97	HAMAM, Hamamelis virginica, Hamamelie de Virginie	. 33
98	HELL. Helleborus niger, Ellebore noir	. 339
99	BEP . Hepar sulfuris. Foie de soufre calcaire	. 342
400	HIPP. Hippomanes. Hippomanes	. 347
	HYDRAS. Hydrastis canadensis	. 350
102	HYDR. Hydrocyani acidum, Acide prussique	. 35
	HYOS. Hyoscyamus niger, Jusquiame	. 35
404	IAT. Intropha cureas, Gros pignon d'Inde. Ricin d'Amérique. Figu	
	infernale	. 33
40X	IGN. Ignatia amara, Fève de Saint-Ignace	. 359
ins	IND. Indigo, Indigo, Indigofera tinctoria	. 36
	IOD. Iodium, 1 de	. 383
	IPEC. Ipecacuanha, Ipscacuanha.	. 370
	IRIS. Iris versucolor, Iris d'Amerique	37
		. 37
110	KAL-BI. Kali bichromaticion, Bichroma'e de potasse	
111	KAL. Kali carbonicion, Sous-Carbonate de potasse. Sel de tartre	. 379
112	KAL-CH. Kali chloricum, Chlorure de potasse, Muri te oxygéné (10 00/
	potasse.	. 380
	KAL-H. Kali hydriad even Hydriadate de potasse	. 387
	KALM. Kalmia latifolia, Kalmie a larges feuilles	. 38
415	KREOS Kreosotum, Kreosote	. 39
116	LACH Luchesis, Venin dentaire du Trigenociphale à losanges.	. 39
117	LACHN. Lachmanthes tinctoria, Lachmanthes	. 40
	LACT. Lactuca virosa, Laitue vireuse	. 410
	LAUR. Laurocerasus, Laurier cerise	. 49
	LED. Ledum palustre, Romarin sauvage	. 42
	LEPT. Leptandra Virginica, Leptandre	. 42
450	LYC. Lycopodium claratum, Lycopode, Pied-de-Loup	. 49
	made national interestion, managinary a second profession of	



TABLE DES MATIÈRES.

XH

		PAGES.
	123 MAGN. Magnesia carbonica, Magnésie carbonatée	436
	124 MAGN-M. Magnesia inuriatica, Muriate de magnésie	440
	195 MAJOR, Majorana, Majoran, Mariolaine vulgaire	443
	126 MANC. Mancinella, Mancenillier vénéneux 127 MANG. Manganum, Manganèse. 128 MEN. Menyanthes trifoliata, Trèfle d'eau 129 MEPH. Mephitis putorius, Suc fétide du putois	414
	197 MANG Managanum Manganèse	. 447
	198 MEN Menuanthes trifoliata Trelle d'eau	4350
	400 Ments Manhitis autorius San fátida da antois	484
	120 MEPH. Meranius Maranes	488
	130 MERC. Mercurius, Mercure. 131 MERC-C. Mercurius sublimatus s. corrosivus, Sublimé corr Deuto-chlorure de mercure 132 MEZ. Mezereum, Mézéréon, Bois-gentil	naie 100
	131 MERC-C. Mercurius subtimatus s. corrosteus, Subtime corr	0511,
	Deuto-entorure de mercure	+ . 400
	132 MEZ. Mezereum, Mezereon, Bois-gentil	470
	134 MOSCH. Moschus, Musc. 133 MUR. Murex purpurea, Pourpre antique, Murex à pourpre. 136 MUR-AC. Muriatis acidum, Acide muriatique ou hydrochlorie	476
	135 MUR. Murex purpurea, Pourpre antique, Murex a pourpre.	- 479
	436 MUR-AC. Muriatis acidum, Acide muriatique ou hydrochloric	juc . 484
	137 NATR. Natrum carbonicum, Sous-Carbonate de soude	484
	138 NATR-M. Natrum muriaticum, Muriate de soude, Sel commu	11 - 489
	139 NITGL. Nitroglycerinum, Nitroglycérine, Glonome	496
	140 NITR. Nitrum, Kali nitricum, Nitre, Nitrate de potasse	499
	141 NITR-AC. Nitri acidum, Acide nitrique	503
	142 NUPH, Nuphar luteum	509
	142 NUPH. Nuphar luteum	510
	144 N-MOSCH, Nux moschata, Noix muscade,	84
	145 N. VOM Nur namica Nois vomiane	54
	446 OLEAN Oleander Laurier-rose	53
	147 OP Onium Onium	. 83
	AS ON AC Oralis acidum Acide ovaliane	100
	445 N-VOM. Nux vomica, Noix vomique 446 OLEAN. Oleander, Laurier-rose. 447 OP. Opium, Opium 448 OX-AC. Oxalis acidum, Acide oxalique 449 PAR. Paris quadrifolia, Parisette à quatre feuilles, Raisin de	0 50-
	nand	0 10-
	nard 450 PETR. Petroleum, Huile de pétrole. 451 PHOSPH. Phosphorus, Phosphore 452 PHOS AC. Phosphori acidum, Acide Phosphorique	7
	ANA processes Dhoenhouse Dhoenhouse	201
	AND DELOS AC Discontage acidens Acide Discontage	101
	192 prever Dhutelages friend der Indes	
	153 PHYT. Phytolacca, épinard des Indes	
	454 PLAT. Platina, Platine	1
	155 PLUMB. Plumbum, Plomb	1
	455 PLUMB. Plumbum, Plomb. 456 PODOPH. Podophyllum peltatum. 457 PRUN. Prunus spinosa, Prunier épineux, Prunellier, E	1
	151 PRUN. Prunus spinosa, Prunier epineux, Prunemer, E	*
	noire.	
	458 PULS. Pulsatilla nigricans, Anemone pratensis, Anémone des	
	Pulsatille noirâtre, Coquelourde	
	159 RAN. Ranunculus bulbosus, Renoncule bulbeuse	
	160 RAN-SC. Ranunculus sceleratus, Renoncule scélérate	
	161 RAPH. Raphanus sativus, Rave	
	462 RHAB. Rhabarbarum (Rheum), Rhubarbe	
	163 RHOD. Rhododendron chrysanthum, Rosage à fleurs bland	
	164 RHUS. Rhus toxicodendron, Arbre a poison, Sumac véné	
٠	165 RUMCR. Rumex crispus, Patience crépue	
	166 RUM. Rumex patientia, Patience	
	167 RUT. Ruta graveolens, Rue des jardins	
	468 SABAD. Sabaddilla, Sévadille	
	468 SABAD. Sabaddilla, Sévadille	
	170 SAMB. Sambucus nigra, Sureau	
	474 SANG, Sangunaria canadensis, Salicaire du Canada,	
	472 SARRAC. Sarracinia purpurea	
	173 SASS. Sassaparilla, Salsepareille	
	472 SARRAC. Sarracinia purpurea	
	478 SELEN. Sclenium, Sélénium	
	175 SELEN. Sclenium, Sclenium	
	477 SENEG. Senega, Polygala Senega, Polygale de Vi	
	478 SEP. Sepia, Sepia.	



AVIS ET EXPLICATIONS DIVERSES.

L --- ORDRE

DANS LEQUEL ON POURRA ÉTUDIER LES MÉDICAMENTS.

A.) ORDRE DES MEDICAMENTS A ÉTUDIER.

A.) Polychrestes. — 1) Acon. bell. bry. merc. n-vom. puls. — 2) Arn. ars. cham. lach. rhus. sulf. — 3) Calc. chin. lyc. phos. sep. sil. — 4) Carb-v. dulc. hep. hyos. ipec. veratr. (24). . 24

B.) Demi-Polychrestes. — 1) Caus. cocc. fer. graph. ign. nitr-ac. op. petr. staph. — 2) Aur. baryt. cann. canth. coloc. con. phos-ac. spig. stram. — 3) Ant. cic. coff. kal. magn. magn-m. plat. stann. tart. — 4) Dig. dros. iod. led. natr. natr-m. n-mos. thui. zinc. (36)

C.) Médicaments qui également ont été souvent employés. —

1) Alum. amm. apis. borax. cupr. hell. kreos. mez. mur-ac. spong. sulf-ac. — 2) Amm-m. asa. carb-an. cin. euphr. millef. mosch. sabad. sabin. sass. squill. — 3) Agar. amb. anac. bism. caps. cep. clem. colch. magn. rhab. valer. — 4) Agn. als. ang. asar. bovis. guai. oleand. plumb. prun. rhod. rut. (44) 104

D.) Médicaments dont, jusqu'ici, on a fait un usage moins étendu ou moins fréquent. — 1) Bar-m. calc-ph. camph. chel. croc. cycl. euphorb. fluor-ac. grat. laur. nitr. samb. sec. seneg. tarax. mgs. — 2) Arg. arg-n. aur-m. crotal. men. meph. nitrgl. par. ran. ran-sc. stront. tabac. teucr. verb. viol-od. viol-tr. — 3) Berb. brom. bruc. calc-ph. chlor. cinn. cist. corall. daphn. fluor-ac. kalbi. merc-c. n-jugl. rum. sang. selen. — 4) Ast. aur-s. benz. calacast. cast-eq. croton. kal-ch. kal-h. lact. major. maner. ox-ac. ther. mgs. (64)

B.) ORDRE DES ÉTUDES A FAIRE.

Ier Cours. — Ce qu'il y a de plus important.

- Distinction des cas cliniques les plus importants, pour tous les médicaments des lettres A-D.
- 2. Distinction de ce qu'il y a de plus important dans les symptomes généralex, y compris la peau, le somment, les frèvres et le moral, pour A et B.



AVIS ET EXPLICATIONS DIVERSES.

3. Étude de ce qu'il y a de plus important dans les symptômes des ORGANES PARTICULIERS, seulement pour A.

4. Même étude pour B.

- 5. Même étude que celle du nº 2, pour C et D.
- 6, 7. Mêmes études que 3 et 4, d'abord pour C, puis pour D.

II Cours. - Études détaillées des polychrestes a et B.

8. Étude de tous les cas cliniques, pour A et B.

9. Étude de tous les signes des symptomes généraux jusqu'au moral, pour A seulement.

10-13. Études de tous les signes des organes particuliers, successivement pour chacune des quatre collections contenues dans A. 14. Même étude que celle du nº 9, pour B.

15-17. Mêmes études que celles des nos 10-13, pour les quatre collections de C'.

III. Cours. — Études détaillées des autres médicaments, c et p.

19-29. Mêmes études que celles du IIe cours, et dans le même ordre, pour C et D, et les collections que ces lettres contiennent. Pour la comparaison des médicaments analogues, voir la liste de ces médicaments en tête de la pathogénésie de chaque substance.

II. - DISTRIBUTION DES MATIÈRES

DANS L'EXPOSITION DE LA PATHOGÉNÉSIE DES MÉDICAMENTS.

- A. Abréviation du nom du médicament. Noms français. Noms des auteurs qui ont publié les médicaments. — Doses usitées. Durée d'affection.
- B. Antidotes du médicament, avec les substances dont celui-ci est l'antidote.
- c. Médicaments analogues, avec indication de ceux qui penvent suivre ou précéder.

CLINIQUE, contenant une énumération des affections contre lesquelles le médicament a été employé ou recommandé.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX, contenant les sensations prédominantes, l'état des forces, les phénomènes des systèmes nerreux, sanguin, lymphatique, osseux, etc., les accès de malaise, de conrulsion, etc., les circonstances prédominantes sous lesquelles les symptômes s'aggravent, s'améliorent, etc.


Peau, avec les lésions des organes extérieurs, ulcérations, abcès, etc.

Sommen, avec les réves et les souffrances nocturnes. Fièvre, avec l'état du pouls, la transpiration, etc.

MORAL, avec les symptômes de l'intelligence et de la mémoire.

Tete, avec l'obnubilation, les rertiges et l'état du cuir cherelu.

YEUX, avec les symptômes des paupières et de la rue.



XVI AVIS

Orielles, avec les symptômes de l'ouïe et les parotides. Nez, avec les symptômes de l'odorat et le coryza.

FACE, avec les phénomènes à la peau du front, aux lèrres, aux mâchoires et aux glandes sous-maxillaires.

DENTS, avec les gencires.

BOUCHE, avec la langue, la parole, la salire, etc.

(forge, avec le roile du palais, la luette, les amygdales, etc.

Appetit, avec les défauts du goût, la faim, la soif, les répugnances ou les appétances extraordinaires, les souffrances après les repas ou à la suite de certains aliments, etc.

ESTOMAC, avec les renvois, les nausées, les vomissements et les symptômes de la région précordiale.

VENTRE, avec les symptômes du foie, de la rate, des aines et des glandes inguinales; ainsi qu'avec les flatuosités.

Selles, avec les souffrances de l'anus, du rectum et du périnée.

Unixes, avec les affections des roies urinaires.

Parties viriles, avec les fonctions sexuelles de l'homme.

Règles, avec les symptômes des parties génitales de la femme, les mamelles, etc., ainsi qu'avec les symptômes qui se présentent chez les nourrissons.

LARYNX, avec les symptômes de la toux.

Poitrine, avec les symptômes de la respiration et des souffrances du cœur.

Tronc, contenant les symptômes du dos, des reins, du cou, de la nuque, des aisselles et de la peau du tronc.

Bras, contenant tous les symptômes des extrémités supérieures. Jambes, contenant tous les symptômes des extrémités inférieures.

III. -- EXPLICATION DE QUELQUES EXPRESSIONS


DONT LE SENS DANS LEQUEL NOUS LES AVONS EMPLOYÉES POURRAIT ÊTRE DOUTEUX.

Nota. — Il nous a paru superflu de donner ici l'explication de tous les termes dont nous nous sommes servi : les médicins les connaissent, et les autres personnes qui voudraient se servir de ce manuel peuvent les trouver dans tous les dictionnaires, mais particulièrement dans le Dictionnaire de mideoine, de obirurgie, de pharmaole, des solences accessoires et de l'art vétérinaire, treixième édition, revue et corrigée par E. Littra, de l'Institut France, et Ch. Rober, professeur à la Faculté de médecine de Paris; ouvrage contenant la synonymie grecque, latine, an plaise, allemande, es nagnole et italianne, et le glassaire de ces diverses langues, illustré de 530 figures intercalièrs d'uns le texte. Paris, 1872, un beau volume grand in-8 de 1670 pages à deux colonnes. — C'est un livre de première nécessité.

AGALACTIE. — Minque ou suppression du lait chez les nourrices.

Augreurs. — État morbide, caractérisé par des renvois et des vomissements aigres, goût acide de la bouche, etc., etc.

Anaurose et anblyopie. — Perte plus ou moins complète de la vue.



ET EXPLICATIONS DIVERSES.

XVII


sans lesion organique appréciable. Quelques auteurs allemands distinguent l'Amaurose et l'Amblyopie amaurotique, en ce qu'ils n'emploient ce premier mot que pour désigner la perte de vue qui dépend d'une paralysie complète de la rétine ou du nerf optique. Le premier degré de cette affection reçoit alors le nom d'Amblyopie. Mais, en France, le mot Amblyopie ne désignant souvent que simplement cue faible ou cue trouble, nous avons préféré l'expression d'Amblyopie amaurotique, pour désigner l'amaurose commençante.

Антикорорновіє. — État de celui qui craint et fuit les hommes.

Le Misanthrope, au contraire, les hait.

APOPLEXIE. — On a. dans les derniers temps, voulu employer ce mot pour désigner l'Hémorrhagie cérébrale, mais c'est en forcer l'étymologie au dernier point. Le mot Apoplexie vient du grec, et signifie un état comme si l'on était terrassé par un coup. C'est pourquoi nos ancêtres et bien des médecins allemands entendent par apoplexie, aussi bien la suite d'une forte congestion cérébrule ou d'un coup de sang, que la suite d'un épanchement de sang, ou sculement d'un épanchement séreux, et ajoutent, pour distinguer les différentes causes, les mots : Sanguine, sércuse, etc. Même les médecins français ne sont pas tous d'accord sur la définition du mot Apoplexie, car voici ce que nous lisons : - Nous entendons - par apoplexie, dit M. Cruveilhier (1), un état morbide de l'en-- céphale, caractérisé par l'assoupissement, la diminution de · la sensibilité des mouvements volontaires, et le plus ordinaire- ment par la rareté et la lenteur des inspirations et la vitesse - des expirations, ainsi que par la largeur et la rareté du - pouls... Donnant trop d'attention aux épanchements sanguins, - que l'on trouve si souvent dans le crâne des apoplectiques, - Rochoux voudrait que l'on réservat le nom d'apoplexie pour désigner l'hémorrhagie cérébrale, et qu'on ne s'en servit plus
pour désigner les cas où l'on ne trouve qu'un épanchement
séreux, ou même rien de particulier: si ces opinions étaient
fondées, il vaudrait mieux bannir ce mot du vocabulaire médi-" cal et le remplacer par celui d'hémencéphale. Mais c'est vrai-" ment abuser de l'anatomie pathologique que d'établir les diffé- rentes espèces de maladies, seulement d'après les traces qu'elles · laissent dans les cadavres, d'ériger ainsi en autant d'affections des particularités anatomiques, effet d'un trouble vital uni-- que. 5 Cela en réponse à ceux qui pourraient nous reprocher de n'avoir pas fait attention à la pathologie française, lorsque nous disons que le sens dans lequel nous avons employé le mot

⁽¹ Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, 1 aris, 1830, t. 111, p. 201, article Apoplevie. — Comparez Hartmann, Therapeutique homocopathique des maladies aigués et des maladies chroniques. Paris, 1849, t, 11, p. 340 et suivantes.



xviii AVIS

Apoplexie est entièrement d'accord avec la définition donnée par l'auteur que nous venons de citer.

Asphyxie. — Nous avons employé ce mot comme synonyme de mort apparente.

BLERNORRHÉE.—Nous avons employé ce mot pour désigner tout écoulement de matière muqueuse, sans distinction de l'organe qui en est le siége.

CATARRHE. — Ce mot, employé par nous dans un sens absolu, signi-

fie rhume de poitrine et de cerveau.

COLIQUES. — Nous avons constamment employé ce mot comme synonyme de douleur intestinale en général, avec ou sans diarrhée.

DÉCHIREMENT, DOULEURS DÉCHIRANTES. — A l'exemple des traducteurs de la matière médicale, nous avons employé ce mot pour rendre le mot allemand: Reissen, expression excessivement vague qui veut dire tantôt simplement douleur sans autre distinction, tantôt une douleur rive, encore plus aiguë que la douleur tractire avec laquelle elle a le plus de ressemblance. En général, c'est là une douleur plus particulière aux affections des muscles, des membranes séreuses et du périoste. La douleur appelée rhumatismale, telle que le mercure et surtout le sublimé corrosif la produisent, en causant le rhumatisme mercuriel, est tout à fait celle que le mot Reissen désigne le plus souvent; et si le mot Rhumatismal n'avait pas en même temps un sens vicieux, il n'y aurait pas eu de meilleur mot à substituer constamment au mot allemand.

Dysménie et Dysménorrhée. — Nous avons employé le premier de ces deux mots pour désigner l'établissement laborieux des menstrues à l'époque de la puberté; tandis que le nom de Dysménorrhée a été employé pour désigner l'écoulement menstruel ordinaire, quand il se fait avec difficulté, avec douleur, et le plus ordinairement trop peu abondamment.

Dyspersie. — État morbide de l'estomac, caractérisé par une digestion faible, lente, laborieuse et accompagnée de souffrances.

GASTRITE. — Ce n'est jamais dans le sens de l'école physiologique que nous avons employé ce mot. C'est la gastrite des anciens que nous avons voulu désigner par là.

MIGRAINE. — Bien que ce mot désigne littéralement mal de tête semilatéral, nous l'avons employé pour désigner des céphalalgies caractérisées par des douleurs partielles, venant par accès périodiques, et étant accompagnées, dans leur plus haut degré, de vomissements, besion de se coucher.

MISANTHROPIE. - Voyez Antrophobie.

Morbilles. — Maladie qu'ordinairement on désigne par le nom de rougeole, mais à tort, car ce sont deux maladies bien différentes. Voyez Rougeole.

Mortification. — Nous avons employé ce mot pour désigner les



ET EXPLICATIONS DIVERSES.

XIX

énotions morales qui résultent d'un amour-propre blessé, et qui se caractérisent plutôt par une affliction profonde que par l'emportement et la colère.

NERVEUX (FAIBLESSE, DOULEURS NERVEUSES), etc. — Le mot nerveux, joint aux mots fatigue et faiblesse, désigne un état de fatigue avec grande susceptibilité du système nerveux. — Douleur nerveuse est synonyme de nérralgie (Céphalalgie, Prosopalgie, Odontalgie, etc., nerveuses).

Paralytique. — Ce mot, joint à la dénomination de quelques douleurs, telles que déchirement, tiraillement, etc., paralytiques, veut dire que ces douleurs sont accompagnées d'une sensation de fai-

blesse paralytique dans les parties affectées.

Phthisis. — Lorsque ce mot se trouve sans aucune épithète, c'est toujours la phthisie pulmonaire tuberculeuse que nous avons sous-entendue. Dans tous les autres cas, nous y avons joint des épithètes, telles que phthisie laryngée, muqueuse, intestinale, etc.

Pituites de l'estonac. — Nous avons employé ce mot pour rendre le mot allemand Wurmerbeseigen, mot par lequel Hahnemann a désigné la déjection d'une certaine quantité d'eau de l'estomac, sans effort de vomissement, telle qu'elle accompagne quelquesois l'état morbide appelé pyrosis ou fer chaud. (Voyez ce mot.)

Pyrosis, venant du mot grec pur (le feu), n'a été employé par nous que pour désigner la sensation désagréable d'un brûlement à l'épigastre et l'œsophage, qu'il y ait ou non déjection de sérosités.

REINS, MAUX DE REINS. — C'est par cette expression que nous avons rendu le mot allemand Kreuzschmerzen, vu que, dans le langage familier, ce mot a tout à fait la même signification que le mot français Maux des reins, mal aux reins, etc. Pour désigner les douleurs dans les reins mêmes, nous avons dit ou douleurs dans les reins, ou douleurs néphrétiques.

SOMNAMBULISME. — Mot qui ne veut pas désigner l'état d'une personne magnétisée ou clairvoyante, mais seulement l'état de celui qui, pendant le sommeil. se lève et fait un grand nombre d'actes

qu'on ne fait ordinairement qu'étant éveillé.

STOMAGAGE. — Inflammation de l'intérieur de la bouche, avec ulcé-

ration allant quelquefois jusqu'à la gangrène.

Typhoïdes: Fièrres typhoïdes. — Nous avons compris sous ce nom toutes celles qu'ordinairement on désigne sous le nom de Fièrres malignes, nerveuses, ataxiques, adynamiques, putrides, etc.

IV. -- EXPLICATION DES SIGNES

EMPLOYÉS POUR DÉSIGNER LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE SYMPTÔMES.

Les symptômes qui n'ont aucun signe sont des symptômes purement pathogénétiques, c'est-à-dire symptômes produits par l'expérimentation pure.



AVIS ET EXPLICATIONS DIVERSES.

(*) L'astérisque désigne les symptômes pathogénétiques qui out

été confirmés par des guérisons.

(°) Le zéro indique les symptômes ou les circonstances sous la présence desquels le médicament a agi favorablement, mais qui jusqu'ici n'ont pas encore été observés comme symptômes patho-

genétiques.

22

(-) Le trait supérieur a pour objet d'annuler l'indication du signe précédent. C'est ainsi que là où ce trait ne se trouve pas, le dernier signe d'une phrase en domine constamment tout le reste. Au contraire, tout ce qui vient après ce trait est entièrement équivalent aux symptômes qui n'ont aucun signe, et appartient aux observations purement pathogénétiques.

Souvent on rencontrera dans une seule phrase tous les signes ;

comme, par exemple, dans la suivante :


Prurit, *élancements et pression dans les yeux et aux paupières osurtout la nuit, *ou le soir, -ainsi que le matin.

Dans cette phrase, il y a d'abord : Prurit, élancements et pression qui ont été observés tous les trois comme symptômes pathogénétiques, mais dont les deux derniers, élancements et pression, ont été en même temps enlevés par le médicament dans un cas de guérison, comme l'astérisque (*) l'indique. Mais le trait (-) supérieur devant et aux paupières dit en même temps que la guérison jusqu'ici n'a été observée que pour les yeux et non pour les paupières, pour lesquelles l'observation n'est que pathogénétique. Vient alors le zéro (º) avant surtout la nuit, qui dit que ces sensations, dans le cas gueri, ont eu lieu la nuit, mais qu'à cette heure-là elles n'ont pas encore été observées comme effets pathogénétiques. Mais le deuxième astérisque (*) devant le soir, dit qu'à cette dernière époque, ces symptômes ont eu lieu aussi bien dans le cas de guérison qu'en qualité d'effets pathogénétiques. Le dernier (-) il dique enfin que l'apparition de ces symptômes, le matin, n'a enco. été observée que comme effet pathogénétique.

Les symptômes imprimes en caractères italiques sont ordinair ment ceux qui ont été observés ou enlevés plus fréquemment les autres; mais cette distinction n'a été faite que relativement symptômes du même organe, et souvent même seulement po genre des souffrances, de manière qu'une douleur, par exemple été distinguée que par rapport aux autres douleurs et non par port aux autres symptômes du même organe, et encore moi rapport à tous les symptômes du médicament. C'est ainsi q

exemple, dans la phrase suivante :

Pression, prurit et élancements aux yeux et aux paupièr le passage imprimé en caractères italiques veut dire seulem les élancements ont été observés plus fréquemment que le la pression, et qu'ils ont eu lieu plus fréquemment aux yeu paupières.



NOUVEAU MANUEL

D

MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

INTRODUCTION

L - BUT BY COMPOSITION DE CET OUVRAGE.

Dans les deux premières éditions de cet ouvrage, nous en avons clairement indiqué le but. Il n'est nullement destiné à remplacer la matière médicale, ni à en rendre l'étude superflue; mais, au contraire, à en faciliter l'usage et la connaissance, par des résumés coussi complets et en même temps aussi concis que possible, et à donner toutes les indications pratiques que, jusqu'à ce jour, l'expérience clinique a fait connaître comme importantes pour le choix du médicament. A cet effet, nous avons mis à contribution tout ce que les ouvrages de Hahnemann et ceux de ses disciples, tant en Europe qu'en Amérique, renferment en observations pures et cliniques jusqu'aux temps les plus récents, et nous y avons ajouté le fruit de notre propre expérience et de nos expérimentations, ainsi que tout ce qui nous a été communiqué par des amis et des confrères dignes de notre confiance. Toutes ces observations, nous les avons étudiées et comparées entre elles, afin d'arriver ainsi à con-

l Hahnemann, Exposition de la Doctrine médicale homocopathique, ou Organon de l'art de guérir, traduit de l'allemand par le docteur A. J. L. Jourdan; 4º édition, augmentée de Commentaires, par le docteur Léon Simon. Paris, 1855, in-8º. — Doctrine et traitement homocopathiques des maladies chroniques; 2º édition, augmentée, traduit par A. J. L. Jourdan. Paris, 1846, 3 vol. in-8º. — Traité de matière médicale pure, traduit par A. J. L. Jourdan. Paris, 1834, 3 vol. in-8º. — Etudes de médecine homocopathique. Paris, 1855, 2 vol. in-8º.



clure sur ce qu'il y a d'essentiel dans le caractère des médicaments. C'est ainsi que les tableaux que nous ayons tracés dans ce Manuel, loin de n'étre qu'une compilation de faits isolés et juxtaposés, sont le résultat d'études sérieuses et raisonnées, et l'expression la plus exacte que nous ayons pu donner de ce qu'il importe surtout de connaître en matière médicale.

Comme c'est, avant tout, un résumé et un ouvrage pratique que nous avons voulu faire, nous n'avons pu citer, à chacune de nos indications, l'autorité qui nous déterminait à l'enregistrer.


La nomenclature que nous avons employée pour désigner les médicaments 'est celle qui est usitée dans nos pharmacopées. Nous l'avons préférée en songeant que la plupart des médecins homœopathes y sont déjà accoutumés. Mais à la fin de cet ouvrage, nous avons donné une table de noms français, avec la concordance des noms latins, afin que ceux qui sont encore étrangers à notre terminologie pharmaceutique arrivent ainsi à la connaître. Les médicaments sont constamment rangés par ordre alphabétique, à l'exception de l'aimant, que nous avons placé à la fin, et nous avons préféré mettre constamment les acides à la suite de leur base; c'est pourquoi on trouvera Mur. ac., Nitr. ac., Phosph. ac., Sulf. ac., au lieu de Acid. mur., Acid. nitr., Acid. phosph., etc.

Dans la partie intitulée : Clinique, nous avons employé constamment les termes scientifiques; mais dans le texte courant des symptômes, nous avons évité autant que possible toute expression pathologique, réservant ces noms pour la dénomination des maladies qui se trouvent consignées en tête. Du reste, dans l'explication des termes scientifiques (Table III) ¹, on trouvera aussi celle de quelques mots extraordinaires, ou peu usités, dont nous avons fait usage

pour désigner des symptômes.

Dans l'ordre des symptômes ce ne sont plus les signes de la tête qui sont les premiers, mais les symptômes généraux suivis de ceux de la peau, du sommeil, de la fiècre et du moral, et après lesquels les autres se suivent dans l'ordre accoutumé. Cet ordre est, en général, le même pour tous les médicaments; seulement nous avons quelquefois réuni, sous une même rubrique, deux ou trois articles contenant peu de symptômes; mais alors, nous l'avons indiqué par les titres. Du reste, nous avons encore donné (Table III) un aperçu de l'ordre que nous avons suivi, avec l'indication de ce que contient chaque article.

¹ Ces indications renvoient aux Avis et Explications diverses qu'on troutera en tête de ce volume, après la Table des matières.



IL — SUR LES SYMPTÔMES COMBIGIÉS DANS CHY OUVRAGE.

Les éléments sur lesquels reposent les résumés de l'action des médicaments sont surtout les effets pathogénétiques, c'est-à-dire les effets produits par l'expérience pure, et nous n'y avons ajouté les indications cliniques ou les symptômes guéris, que pour confirmer ou pour compléter les premiers.

Nous avons désigné par un zéro (°) ceux qui, sans avoir été observés comme symptômes pathogénétiques, ont cependant été guéris par un médicament, et par un astérisque (*), ceux quient été. observés en même temps comme effets pathogénétiques et comme indications cliniques, en laissant sans aucun signe ceux qui jusqu'ici ont bien été observés comme effets pathogénétiques, mais n'ont encore contribué à aucun cas de guérison qui nous soit connu. Ainsi, chacun pourra apprécier chaque symptôme à sa juste valeur, et se déterminer suivant la confiance qu'il accorde à chacune des classes que nous venons d'établir. Quant à nous, ce n'est jamais à un seul symptôme que nous nous en tenons : c'est par le caractère général du médicament, tel qu'il résulte de la pathogénésie entière. que nous nous laissons guider dans notre appreciation des symptômes particuliers de toute espèce. C'est ce que nous faisons lorsqu'il s'agit de déterminer le choix d'un médicament; c'est encore ce que nous avons fait en traçant les tableaux de cet ouvrage; et c'est ce que devra faire tout médecin homœopathe qui voudra se mettre à l'abri des déceptions. Car lors même que quelque trait isolé manquerait d'exactitude dans les symptomatologies de la matière médicale de notre école, la physionomic totule, telle qu'elle résulte de l'ensemble des symptômes, n'en serait pas pour cela moins exacte que le meilleur portrait d'après nature; et quiconque sera arrivé par une étude approfondie à en saisir le caractère vraiment essentiel, sera en possession d'une science que la connaissance des traits isolés ne lui aurait jamais donnée.

Pour mieur préciser la sphère d'action des médicaments, nous avons donné un nombre plus considérable de symptômes que dans les éditions précédentes. Par là, il est vrai, le coup d'œil en est devenu moins facile; mais par les observations cliniques qui se trouvent en tête, et les symptômes imprimés en caractères italiques, on aura toujours un résumé plus concis, sans pour cela être privé du reste. Il ne faudrait pas croire pourtant que les symptômes

1 Voy. Beauvais, Effets toxiques et pathogénétiques de plusieurs médicaments sur l'économie animale dans l'étal de santé. Paris, 1845, in-8-.

3




marqués en caractères italiques dussent fixer le choix du médicament à l'exclusion de tous les autres. Tout a une valeur sous ce rapport, mais rien n'en a d'une manière absolue. Tout ce qui est caractéristique, dans la pathogénésie d'un médicament, ne l'est que relativement aux médicaments qui n'ont pas ce symptôme; et le même symptôme qui, dans telle ou telle série de comparaisons, n'a aucune valeur distinctive, parce qu'il se trouve commun à tous, acquiert la plus haute importance dès qu'on compare le médicament avec un autre groupe.

En général, nous avons distingué de cette manière les phénomènes qui paraissent prédominer sur les autres dans un même organe, ou les sensations qui semblent se retrouyer le plus souvent dans les organes les plus différents, etc. Souvent aussi nous avons distingué, entre deux effets alternatifs, celui qui paraît avoir lieu le plus fréquemment, quoique, dans presque tous les cas, l'un et l'autre de ces effets aient une importance égale. C'est ainsi que la diarrhée et la constipation dans la Noix vomique, la soif et l'adypsie dans la Pulsatille, la douleur brûlante et la sensation du froid glacial dans l'Arsenic, sont les unes et les autres également caractéristiques pour le choix du médicament, lorsque le reste des symptômes convient à la maladie. C'est même un phénomène plus constant qu'on ne se l'imagine; tous les médicaments, principalement les polychrestes, qui ont quelque symptôme bien prononcé, ont également le phénomène opposé en qualité de symptôme alternatif; et, en général, on a tort de considérer l'un comme primitif, l'autre comme secondaire ou consécutif : car, en réalité, l'un ou l'autre (selon les individus) peut se manifester le premier. Et ne voyons-nous pas le même fait dans un grand nombre de maladies sui generis? Le typhus, par exemple, ne produit-il pas tantôt l'insomnie la plus complète, tantôt un coma profond, ou bien tantôt l'hébétude, et tantôt le délire, ou encore la constipation la plus opiniatre ou la diarrhée la plus violente, suivant la constitution de l'individu qui en est atteint? La question des semblables et des contraires n'est pas dans le rapport de quelques symptômes isolés, mais bien dans l'ensemble des phénomènes et dans l'aspect général de la maladie et de la pathogénésie du médicament.

III. — SUR LES AVIS CLINIQUES QUI SE TROUVENT EN TÊTE DE CHAQUE MÉDICAMENT.

Dans les éditions précédentes, nous avions mentionné parmi les



avoir recours à tel ou tel médicament. Toutes les citations qui se trouvent à l'article *Clinique, bien qu'elles reposent sur des faits constatés, n'ont d'autre but que de conseiller au médecin homœopathe d'examiner tel ou tel médicament, pour voir si, en l'examinant en détail, il le trouverait peut-être indiqué. Envisager la chose sous un autre point de vue, considérer ces noms comme des indications infaillibles, et les prendre pour guides dans la détermination du choix, ce serait un abus contre lequel nous ne saurions jamais protester avec assez de force.

IV. - SUR LES DOSES HOMEOPATHIQUES USITÉES.

Outre la pathogénésie et le résumé de cas cliniques, on trouver a en tête de chaque médicament quelques mots sur les doses usitées et sur leur durée d'action. Pour les doses usitées, nous avons indiqué celles qui se trouvent chez nos auteurs, quoique, quant à nous, nous ne regardions ces chiffres que comme des citations historiques, et nullement comme des règles absolues. La question de la dilution sera toujours secondaire par rapport à celle du médicament. Hahnemann employait, pendant quelque temps, de préférence la trentième, d'autres celles qui se trouvent dans les pharmacopées, d'autres passent d'une dilution à une autre, surtout en cas de répétition, Le docteur Mure ' a voulu réserver l'emploi des premières (basses) atténuations aux maladies aiguës, et celui des dernières aux maladies chroniques. Nous-même, dans la préface de notre première édition 2, avions exprimé des idées semblables sur l'opportunité desdifférentes dilutions, et aujourd'hui même nous sommes en quelque sorte encore de cet avis, en ce sens que, s'il y avait une distinction à faire pour la pratique, nous penserions qu'en général les premières atténuations conviendraient mieux aux maladies dont la marche est rapide, et les dernières à celles dont les progrès sont plus lents. Mais une autre question serait de savoir si, dans les cas qui semblent exiger des atténuations plus basses (tels que quelques formes primitives de syphilis, de gonorrhée, etc.), on n'obtiendrait pas tout ce qu'on pourrait désirer, en administrant les dernières dilutions en doses réitérées, et surtout en solution dans l'eau à prendre par cuillerées. Car, quel que soit l'accroissement d'énergie qu'éprouvent nos médicaments par le frottement et les secousses, il n'en est pas moins

2 Manuel d'Homwopathie. Dijon, 1835.

¹ Bibliothèque homoropathique de Genève.



tions: en rous abstenant de répéter ces doses jusqu'à ce qu'il survienne une nouvelle indication, vous ne remarquerez pas d'aggravation plus fâcheuse que si vous aviez administré quelques globules des dernières dilutions, et. en tout cas, la différence ne sera nullement en proportion avec le volume relatif de la substance médicale

ingérée.

Changez au contraire votre expérimentation; prenez un seul globule d'une dilution quelconque, soit de la première, soit de la trentième, faites-le dissoudre dans 10, 12, 15 cuillerées d'eau, et donnez à vos malades cette solution par cuillerées : les aggravations qui en résulteront dans certains cas, et surtout dans quelques affections chroniques, seront beaucoup plus fortes et bien moins faciles à combattre que celles qui surviennent à la suite d'une goutte entière même de la première dilution, lorsque celle-ci n'est prise qu'en une seule fois. C'est là du moins ce que nous avons cru remarquer plus de cent fois dans nos observations; et Hahnemann lui-même nous a confié que, suivant son opinion, il n'y avait pas de dose plus faible ni plus douce que 1, 2 globules pris à la fois, tandis que ces mêmes globules, dissous dans une quantité d'eau et pris par cuillerées, avaient bien plus d'action sur l'organisme. Souvent, il est vrai, le malade peut prendre pendant une quinzaine de jours, tous les soirs ou tous les matins, une cuillerée d'une solution semblable, sans qu'il en résulte aucun accident; mais souvent aussi, dès que la solution est finie, il survient une aggravation d'autant plus violente que l'état du malade aura été plus satisfaisant pendant le temps qu'il prenaît son médicament, aggravation qui, dans bien des cas, ne cède à une nouvelle dose en solution que pour revenir ensuite avec une nouvelle intensité, agissant ainsi absolument comme des soulagements par des palliatifs. C'est pourquoi, quelque salutaire et quelque préférable que soit, dans beaucoup de cas, ce mode d'administrer les médicaments à doses réitérées, il n'est cependant pas toujours applicable et demande, pour être employé avec succès, à être basé sur des principes et sur des règles fixes. Ces règles, nous le savons fort bien, ne pourront être établies avec certitude que par la comparaison d'un grand nombre d'observations les plus opposées.

Le principe dont il faut partir, suivant nous, et conformément aux bases de notre science, pour envisager la question sous son véritable aspect, c'est que ce n'est jamais par l'action directe du médicament, mais par la réaction de la nature que s'effectuent les guérisons véritables, durables et radicales; et de là il résulte, comme première conséquence générale, que toute répétition de doses est au moins superflue, sinon tout a fait déplacée, tant que



INTRODUCTION.


10

s'arrêter des qu'on verra survenir les premiers signes d'une aggravation.

Enfin il est encore un autre cas dans lequel on pourra répéter les doses; c'est lorsque, après un temps de mieux plus ou moins prolongé, la maladie commence à se relever, et que les symptômes indiquent encore le même médicament plus que tout autre. Mais ces cas ne se présentent guère que lorsqu'on a donné une seule dose une fois pour toutes, ou bien plusieurs cuillerées jusqu'à aggravation, dont on a ensuite attendu les effets sans rien faire, et encore faut-il qu'on soit bien certain que l'aggravation ne cessera pas bientêt d'elle-même, avant d'avoir recours à la répétition.

VI. - DE LA DURÉE DE L'ACTION DES MÉDICAMENTS.


Ce que nous venons de dire de l'époque où la répétition d'une seule dose pourrait sembler indiquée, s'applique également au choix d'un nouveau médicament. Car toute aggravation, après un temps de mieux, n'est pas toujours une aggravation naturelle de la maladie : souvent, au contraire, elle n'est due qu'à une nouvelle excitation provoquée par le médicament qui agit encore, et, dans ce cas, il n'y a rien de mieux à faire que d'attendre, puisque ordinairement elle cesse sous peu de jours pour faire place à un mieux beaucoup plus prononcé. C'est ce que nous voyons arriver fréquemment, surtout dans les maladies chroniques, après l'administration d'une seule dose, une fois pour toutes. Souvent les deux et trois premiers jours sont bons, puis survient une légère aggravation qui disparaît et se renouvelle alternativement pendant quelque temps; en sorte que généralement dans la première quinzaine, et surtout dans la seconde huitaine, le nombre des jours mauvais dépasse celui des bons, jusqu'à ce qu'enfin, vers la quatrième semaine, la chose change : les jours bons l'emportent sur les mauvais ; un bien-être plus durable ne tarde pas à s'établir, et continue souvent jusqu'à la septième et huitième semaine, époque vers laquelle les restes de maladie, qui n'ont pas été complétement détruits, commencent reparaître. Cependant il est des cas où cette aggravation mêr n'est qu'un dernier effort de l'action du médicament, effort qui manque pas de cesser au bout de quelques jours, laissant la maladi sinon entièrement guérie, du moins dans un état tel, qu'on n' saurait obtenir un meilleur par aucun autre moyen. On n'ad nistrera pas, dans de pareils cas, un médicament nouveau, a



11

d'être sûr de ce qui va arriver; en sachant attendre et comprendre la marche de la réaction vitale, on obtiendra souvent plus en deux mois avec une seule dose d'un seul médicament, que ne pourrait faire en deux ans celui qui, par un changement continuel de ses médicaments ou par une multiplication inopportune de ses doses, voudrait accélérer la guérison. Telle est l'expérience que nous avons faite bien des fois, en suivant les préceptes que Hahkenann a donnés à ce sujet dans son Organon et dans le premier volume de . ses Maladies chroniques; et c'est là ce que nous recommandons sérieusement à l'attention de tout médecin homosopathe. Jamais, dans une maladie chronique, on ne changera de médicament sans avoir observé, au moins pendant cinq ou six jours, l'aggravation qui semble l'exiger, et même celles qui surviennent quelquefois après la cessation d'un médicament administré par cuillerées devraient être traitées de la même manière, c'est-à-dire en laissant agir le médicament aussi longtemps qu'il y a encore quelque bien à en espérer.

Toutefois, quelque indispensable qu'il soit constamment de laisser un médicament salutaire épuiser toute son action, et de ne pas se laisser abuser par des aggravations momentanées, on n'hésitera pas à intervenir lorsque les circonstances le demandent, soit que le médicament donné se produise aucun effet, soit qu'il en produise de fûcheux. Le premier de ces cas se révélera au médecin attentif, lorsqu'il n'observera aucun symptôme propre au médicament, et que l'état de la maladie restera stationnaire ou s'aggrarera progressirement sans s'améliorer sous aucun rapport, ne présentant que des symptômes appartenant à une période peu avancée de la maladie. C'est alors que le médecin fera bien de répéter d'abord la dose du médicament administré, jusqu'à ce que celle-ci produise un changement quelconque. S'il se prononce un mieux, fût-ce même le plus léger, on attendra en observant les alternations de bien et de mal, comme nous l'avons indiqué plus haut; si, au contraire, l'état est empiré après cette répétition, on observera si cette aggravation est salutaire ou si elle est due à un médicament mal choisi de l'action prolongée duquel on n'aurait à attendre que des résultats facheux. Ce dernier cas sera facile à reconnaître, en ce que l'aggravation survenue, bien qu'elle soit mélée de symptômes du médicament, n'est ni précédée, ni interrompue par aucun moment de bien-être, et qu'en même temps la maladie originaire fait des progrès dans le sens de ses symptômes généraux. Dans ce cas, le médecin devra remplacer ce médicament par un autre qui réponde mieux à l'ensemble



ninghausen 4, parce que, dans les faits de pure appréciation, nous ne connaissons point d'autre autorité que la nôtre.

Du reste, le principal avantage que pourrait tirer le médecin de ces indications serait de faire des études comparées de ces médicaments analogues, pour mieux établir leur point de dissemblance, et se mettre ainsi à l'abri d'une foule de déceptions qui ne manqueraient pas d'arriver, si on les confondait, et qu'on administrat l'un pour l'autre, par exemple, Lachesis au lieu de Mercure, Verdirum ou China au lieu d'Arsenic, etc. Un abus déplorable de ces indications serait, au contraire, de les prendre pour guide absolu dans le choix, et de donner des séries de médicaments analogues, sans autre raison que cette analogie, ou même de faire précéder encore le médicament indiqué par un autre qui ne le serait pas, seulement parce qu'il serait réputé plus efficace après l'usage de celuici. La loi fondamentale, pour l'emploi des médicaments, est toujours la similitude des symptômes et la nécessité de laisser tout médicament épuiser son action. Ce n'est qu'après sa cessation que l'on pourra songer à un médicament analogue, et encore faut-il que, par la comparaison des symptômes, on se soit bien convaincu de son opportunité avant de l'employer.

Dans l'article des Antidotes, nous avons indiqué aussi les médicaments, dont celui en question est lui-même l'antidote, persuadé que nous sommes que, dans bien des cas, les rapports antidotaires de deux médicaments sont réciproques, et que par les uns, on pourrait souvent subvenir aux autres. Du reste, il en est du choix des antidotes comme de celui des médicaments en général. Le meilleur antidote sera toujours celui qui répondra le mieux aux symptômes; et, en général, on fera beaucoup mieux de ne pas perdre le temps à la recherche d'un antidote, mais de faire de suite usage du médicament qui répond le mieux à l'ensemble de tous les symptômes que présente le malade. Si ce médicament se trouve faire partie à la fois et des antidotes et des affinités du premier, tant mieux; mais si aucun de ceux-ci ne convient, on s'adressera à un autre qui convienne mieux.

VIII. — SUR LA MANIÈRE DE SE SERVIR DE CE MANUEL.

Plus nous avons entendu les diverses opinions de nos lecteurs,

4 Bonninghausen, Manuel de Thérapeutique homoeopathique pour servir de guide au lit du malaile et à l'étude de la matière médicale pure, traduit de l'allemand par le docteur D. Roth. Paris, 1846, in-18, J.-B. Baillière.

13



14

plus nous nous sommes convaincu que tout ce qu'on pourrait dire à ce sujet ne servirait absolument à rien aux personnes qui n'auraient point des connaissances approfondies en homœopathie. C'est pourquoi nous avons écrit un traité spécial contenant l'exposé détaillé et raisonné de tous les points essentiels de la théorie et de la pratique de cette doctrine et la discussion de tous les théorèmes controversés:

" Principes et règles qui doivent guider dans la pratique de l'homæopathie. Exposition raisonnée de tous les points essentiels de la doctrine de Hahnemann. Paris, 1857, 1 vol. in-8°, xvi, 528 pages. "

C'est dans cet ouvrage que le lecteur trouvera tout ce qu'il pourra désirer, d'une manière beaucoup plus complète que nous ne pouvions la donner ici, dans les précédentes éditions.


AVIS

On trouvera à la tête de chaque substance, après le nom de l'auteur qui a publié et étudié le médicament, les abréviations sulvantes:

Hist, nat. et prép. Pharm, homœop., p. 155. Ceci veut dire :

" Pour ce qui concerne l'histoire naturelle et la préparation de la substance, voy. notre ouvrage ayant pour titre :

"Nouvelle Pharmacopée homotopathique, ou Histoire naturelle et préparation et Posologie ou administration des doses des médicaments homotopathiques, 3° édition, accompagnée de 144 figures intercalées dans le texte, Paris, 1862, p. 153. "



MATIÈRE MÉDICALE HOMŒOPATHIQUE

ACONITUM NAPELLUS.

ACON. — Aconit papel. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmachomosop., p. 155. — Doses usitéet : 3, 24, 30. — Durée d'action : 8, 46, 24, 48 houres, suivant les circonstances.

ANTIDOTES: Acet. vinum, par.? — On l'emploie comme antidote de : Cham. coff. n-vom. petrol. sen. veratr.

con. n-vom. petrol. sun. sep. verair. COMPARER AVEC: Agar. anac. ant-crud. arn. ars. asar. bell. bry. canno. canth. caus. cham. coff. colch. croc. dros. dule. graph. hep. hyos. ipes. merc. nitr. ac. n-vom. op. phos. plat. puls. rut. sabin, sep. spig. spong. stram. sulf. verair. — C'est surtout après arn. et sulf. que l'aconte se trouve quelquefois indiqué comme remède intermédiaire. — Après l'aconit, soit qu'on l'ait donné dès l'abord ou dans le courant du traitement, on trouvers souvent convenable : Arn. ars. bell. bry. eann. ipec. spong. sulf., etc.

CLINIQUE. — Étant indiqué par l'ensemble des symptômes, ce médicament pourra quelquefois être utile dans l'un ou l'autre cas des affections suivantes : - Inflammations locales aiguës; Inflammations rhumatismales et arthritiques avec gonflement; Affections principalement des personnes pléthoriques, d'un caractère rif, constitution bilieuse et nerreuse, yeux et chereux bruns ou noirs, teint fortement coloré, etc.; Congestions sanguines actives, névralgies et accès de spasmes, principalement chez les jeunes gens (et surtout chez les jeunes filles) d'un tempérament sanguin, et menant une vie sédentaire: suites fâcheuses d'un refroidissement duns un froid sec (vent d'est) ou par un courant d'air; affections

4 NOTA. En faisant ci-dessus une énumération des affections dans lesquelles on a employé ou recommandé ce midicament, nous ne voulons ni justificr les noms pathologiques dont les auteurs se sont servis. ni répondre d'aucune manière de l'efficacité absolue du médicament dans ces cas. Tout ce que nous voulons dire, c'est que, dans une affection pareille, le médecin pourrait s'adresser à ce médicament, non pour l'employer comme spécifique, mais seulement pour s'assurer, par la comparaison des symptomes, s'il y a réellement indication suffisante on non pour y aroir recours. Agir autrement, ce serait non-seulement le meilleur moyen de ne jamais obtenir aucune guérison, mais ce serait aussi faire l'abus le plus déplorable de nos citations, abus contre lequel nous protestons ici une fois pour toutes, et pour tous les medicaments où nous arons donné une enunération pareille.



par suite d'une frayeur ou d'une colère; Accès de convulsions; Tétanos?; Trismus?; Accès d'évanouissement; Accès de catalepsie?; Brûlures; Eruptions miliaires; Miliaire pourprée; Roséole; Rougeole; Période éruptive de la petite vérole; Inflammations érysipélateuses; Eruptions urticaires; Fièvres inflammatoires, même avec symptômes bilieux ou nerveux; Fièvre catarrhale avec un caractère inflammatoire; Somnambulisme?; Somnolence comateuse?; Aliénations mentales avec idées fixes d'une mort prochaine; Congestions cérébrales avec vertiges; Apoplexie sanguine; Céphalalgies congestives, catarrhales, nerveuses, etc.; Migraine; Encéphalite; Hydrocéphale aiguë; Ophthalmies aiguës, même celles par l'introduction de corps étrangers; Prosopalgies et odontalgies congestives ou nerveuses; Angines aiguës phlegmoneuses ou catarrhales; Angine scarlatine; Dentition difficile avec fièvre; Souffrances bilieuses; Vomissement des femmes enceintes ou hystériques; Vomissements de vers; Hématémèse; Ictère; Hépatite; Entérite; Péritonite; Orchite, à la suite d'une gonorrhée; Métrorrhagies et règles trop copieuses par suite de pléthore; Péritonite puerpérale; Métrite; Flueurs blanches; Hernies incarcérées; Catarrhe ordinaire et grippe dans la période inflammatoire; Croup, première période; Coqueluche, première période; Accès d'asthme congestif; Asthme de Millar; Laryngite et bronchite aiguës; Pleurésie; Pneumonie; Hémoptysie; Affections de cœur; Palpitations, etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - *Douleurs lancinantes oou rhumatismales qui se renouvellent par le vin ou autres causes échauffantes. - *Souffrances qui, principalement la nuit, paraissent insupportables, et qui, pour la plupart, disparaissent dans la position assise. - *Accès de douleurs avec soif et rougeur des joues. *Sensibilité douloureuse du corps et surtout des parties malades, à tout mouvement et au moindre contact. — Douleur de meurtrissure et sensation de lourdeur dans tous les membres. -Tiraillement avec faiblesse paralytique aux bras et aux jambes. Manque de force et de solidité, douleurs et craquement dans les articulations, principalement des jambes. - Chute rapide et générale des forces. - *Accès d'évanouissement, principalement en se redressant de la position couchée, oet quelquefois avec congestion de sang à la tête, *bourdonnement des oreilles, °pâleur mortelle du visage et frissonnements. - *Malaise comme par suite d'une transpiration suppriméeou par suite d'un refroidissement, avec mal à la tête, bourdonnement des oreilles, coliques et rhume de cerveau. - Sensation de froid et de stagnation du sang dans tous les vaisseaux. — Secousses dans les membres. — Accès cataleptique avec cris, grincement de dents et hoquet. - Gonflement et couleur noirâtre de tout le corps.




17

Pean. — Formication à la peau, avec prurit et desquamation, principalement aux parties malades. — *Peau sèche et brûlante. — *Gonflement et chaleur brûlante des parties blessées. — *Couleur jaunaire de la peau. —Elancements avec sensation d'excoriation par-ci par-là. — Taches semblables aux piqûres de puces, aux mains, à la figure, etc. — *Petits boutons rouges et larges avec prurit brûlant. — *Miliaire pourprée. — *Rougeole. Semmeil. — Grande envie de dormir, parfois en se promenant, et principalement après le dîner. — Somnolence avec rêvasserie

principalement après le diner. — Somnolence avec révasserie anxieuse et respiration rapide. — *Révasseries et idées confuses, ayant les yeux fermés sans dormir. — *Insomnie par anxiété, arec agitation et jactation continuelles. — *Sursauts pendant le sommeil. — Rêves anxieux avec cauchemar. — Rêves avec une sorte de clairvoyance. — Sommeil léger. — *Impossibilité d'être couché sur le côté. — En dormant, on est couché sur le dos, la main sous la tête, ou dans la position assise, la tête penchée en avant.

Flèvre. — *Chaleur sèche, ardente, avec soif extrême précédée quelquefois (principalement au début de la maladie) de frissons avec tremblement. — *Chaleur principalement à la tête et au visage, avec rougeur des joues, horripilation par tout le corps, mal de tête pressif, humeur pleureuse, plaintive et contrariante; ou sensation de chaleur par tout le corps, avec rougeur des joues, mal à la tête en tournant les yeux et gaieté folâtre. — *Frissons pour peu que l'on se découvre pendant la chaleur. — Froid par tout le corps avec chaleur interne, front chaud et lobes d'oreilles chands; ou *avec rougeur des joues et douleurs dans les membres; ou avec roideur de tout le corps, chaleur et rougeur d'une joue et froid et pâleur de l'autre, yeux ouverts et fixes, pupilles contractées et se dilatant difficilement. - Froid et frissons aux doigts, suivis de crampes aux mollets et aux plantes des pieds. - Chaleur du visage avec tristesse, exaspération et envie de vomir, précédée de froid et de frissons aux pieds et aux mains. Chaleur générale arec face pâle. — Horripilations fréquentes avec chaleur ardente et sèche de la peau. — Sueur continuelle, surtout des parties couvertes. — Sueur acide. — Pouls dur, fréquent et accéléré.

Maral. — *Grande agitation et jactation avec angoisse, exaspération inconsolable, cris, pleurs, gémissements, plaintes et reproches. — *Appréhensions et crainte d'une mort prochaine. — Pressentiments comme en état de clairvoyance. — Anthropophobie et misanthropie. — *Grande disposition à se fâcher, à s'effrayer et à se quereller. — Le moindre bruit, même la musique, paraît insupportable. — Humeur changeante : on est tantôt triste, accablé, contrariant et désespéré; tantôt gai, excité, plein d'espoir et disposé à chanter et à danser. — *Accès alternatifs de rires et de pleurs. — *Inquiétude sur sa maladie et désespoir



18

de la guérison. — Peur de spectres. — *Dispositions à s'enfuir de son lit. — Esprit comme paralysé, avec impossibilité de réfléchir, et sensation comme si toutes les fonctions intellectuelles s'accomplissaient dans la région précordiale. — Accès de manie et de folie. — Instabilité des idées. — *Délires principalement la nuit. — Faiblesse de mémoire.

Tôte. — Tête entreprise au front comme si le cerveau était bouché, principalement à la chaleur de la chambre. — Vertiges, surtout en se redressant, ou bien en se relevant de son siège, en se baissant, en remuant la tête, et souvent *avec sensation d'ivresse ou tournoiement à la tête, perte de connaissance, obscurcissement des yeux, nausées et sensation de faiblesse au creux de l'estomac. *Sensation comme si le cerveau ballottait dans le crâne, augmentée par le moindre mouvement, et même en parlant et en buvant. — *Mal à la tête avec envie de vomir et vomissement. · Téte comme brisée avec sensation de brisure dans les membres. — *Douleur stupéfiante à la tête avec sensation de compression et de constriction crampoïdes, principalement au front et . à la racine du nez. — *Pesanteur et plénitude au front et aux tempes, avec pression expansive comme si tout allait sortir par là, principalement en se penchant en avant. — Secousses, *¿lancements et battements dans la tête. - Céphalalgie tractive, quelquefois semi-latérale. - Sensation comme si une boule montait dans la tête en y répandant de la fraîcheur. — *Congestion de sang à la tête, avec chaleur et rougeur du visage, ou avec sensation de chaleur au cerveau, sueur au cuir chevelu et pâleur de la face. — Ardeur et bouillonnement dans la tête, comme s'il y avait de l'eau bouillante dans le cerveau. - Bruissement et craquement dans la tête. — Sensation au vertex, comme si l'on était tiré par les cheveux. — Mal de tête comme par suite d'un refroidissement ou d'une transpiration supprimée, avec bourdonnement des oreilles, rhume de cerveau et coliques. - *Aggravation des maux de tête par le mouvement, en parlant, en se redressant de la position couchée et en buvant; amélioration au grand air.

Youx. — *Yeux rouges, enflammés, avec rougeur foncée des vaisseaux sanguins et douleurs insupportables. — *Larmoiement abondant. — Chaleur et ardeur dans les yeux, avec *douleurs pressives et olancinantes, surtout en remuant les globes. — oGonflement des yeux. — *Pupilles dilatées. — Sécheresse, pesanteur et *gonflement inflammatoire des paupières. — oYeux étincelants, *convulsés et proéminents. — Regard fixe. — *Photophobie excessive, ou grand désir de la lumière. — Taches noires et brouillard devant les yeux. — Accès de cécité subite. — Traction dans les paupières avec somnolence.

Oreilles. — Tintement et *bourdonnement dans les oreilles. — Chatouillement et douleur vive dans les oreilles. — Sensation



20

Sensation de contraction dans l'estomac, comme par des substances âcres.

Ventre. — Constriction, *tension et pression aux hypocondres, quelquefois avec plénitude et sensation de pesanteur. — *Douleur brûlante, élancements, points et *pression dans la région hépatique, avec gêne de la respiration. — *Sensibilité douloureuse de la région du foie au toucher. — *Ictère. — Douleurs tractives au ventre, en s'accroupissant. — Constriction, pincement et *brûlement dans la région ombilicale, quelquéfois avec rétraction du nombril. — Tranchées insupportables, le matin au lit. — Tension et ballonnement douloureux du ventre, principalement à l'épigastre. — *Sensibilité douloureuse du ventre, comme dans l'ascite. — *Sensibilité douloureuse du ventre à tout contact et au moindre mouvement. — Colique flatulente, principalement la nuit, avec pression, tension, borborygmes et grondement dans le ventre.

Selles. — *Suppression des selles. — Petites selles fréquentes, molles, avec ténesme. — *Selles diarrhéiques, aqueuses. — *Selles blanches, avec urines rouges. — Selles involontaires, par paralysie de l'anus. — Avant et après les selles diarrhéiques, nausées et sueur. — Douleurs au rectum. — Pression et picotement à l'anus. — Hémorrhoïdes saignantes. — Diarrhée avec flux d'urines

et coliques.

Urines. — Suppression des urines, avec pression dans la vessie et douleurs aux reins. — Envie fréquente d'uriner avec anxiété et douleurs. — Flux d'urine, avec sueur, diarrhée et coliques. — Émission involontaire des urines, par paralysie du col de la vessie. — *Urines rares, brûlantes, rouge foncé, et avec sédiment couleur de brique. — Dépôt sanguinolent dans les urines. — Ardeur et ténesme au col de la vessie.


Parties viriles. — Appétit vénérien alternativement augmenté et diminué. — Accès érotiques. — Fourmillement aux parties. — Douleurs de contusion aux testicules. — Prurit au prépuce. —

Elancements et pincements au gland en urinant.

Règles. — *Règles trop abondantes. — Fureur à l'apparition des règles. — Perte de sang par la matrice. — Leucorrhée visqueuse et jaunâtre. — Augmentation du lait dans les mamelles.

Larynx. — Sensation d'engourdissement dans la trachée. — Accès de paralysie de l'épiglotte, avec facilité à s'engouer. — *Endolorissement du larynx. — °Voix croassante. — Envie continuelle de tousser, produite par une irritation ou un chatouillement au larynx. — Toux pour avoir bu ou fumé. — *Toux courte et sèche, principalement la nuit. — °Toux convulsive ou rauque et croassante, quelquefois avec péril de suffocation et constriction du larynx. — Expectoration de matières épaisses et blanchâtres ou de mucosités sanguinolentes, *ou crachement de sang par la toux. — *En toussant, élancements et douleurs dans la poitrine.

Poitrine. - *Respiration courte, principalement pendant le som-



21

meil et en se redressant. - *Respiration pénible, anxieuse et gémissante, ou rapide et superficielle, ou forte, bruyante et à bouche ouverte. — Respiration lente pendant le sommeil. — *Haleine fétide. — Constriction et oppression anxieuse de la poitrine avec gêne de la respiration. - Accès de suffocation avéc anxiété. — Sensation de pesanteur et de compression à la poitrine. - *Points douloureux dans la poitrine, principalement en respirant, en toussant et pendant le mouvement (même des bras seuls). - *Points de côté, avec humeur pleureuse et plaintive, agalagés un peu étant couché sur le dos. — Fourmillement dans poitrine. — Douleurs de meurtrissures au sternum et aux côtés. — *Sensation d'angoisse dans la poitrine qui coupe la respiration. — *Battements de cœur avec grande anxiété, chaleur du corps, principalement au visage, et grande lassitude dans les membres. — •Élancements dans la région du cœur pendant le mouvement et en montant l'escalier. — Sensation de compression et coups dans la région du cœur.

Tronc. — Douleurs de meurtrissure au dos, aux reins et à la nuque.
 +Roideur douloureuse de la nuque, des reins et des articulations coxo-fémorales. — Douleur de térébration au dos et aux reins. — Fourmillement et picotement au dos. — Faiblesse et

douleur de meurtrissure dans la nuque.

Bras. — Douleur de meurtrissure et faiblesse dans les bras, principalement dans les épaules, avec gonflement. — Pesanteur des bras, avec engourdissement des doigts. — Faiblesse paralytique du bras et de la main, surtout en écrivant. — Tiraillements aux bras. — Mains mortes. — Gonflement des mains. — Chaleur aux mains avec froid aux pieds. — Sueur fraîche au plat des mains. — Fourmillement aux doigts, principalement en écrivant. — eConflement inflammatoire du coude, avec engourdissement et état

paralytique des doigts.

Jambes. — Douleur de meurtrissure dans les articulations coxofémorales, surtout après avoir dormi ou être resté couché. — Tiraillement avec faiblesse paralytique dans les jambes. — °Douleur
lancinante dans l'articulation coxo-fémorale, jusqu'au genou;
douleur qui force à crier à chaque pas. — Manque de force et de
solidité dans les articulations de la hanche et du genou. —
°Gonflement inflammatoire du genou, avec rougeur luisante, douleura lancinantes, immobilité et grande sensibilité au toucher. —
Sensation de roideur dans les jambes en les remuant. — Endolorissement du cou-de-pied avec désespoir et crainte de la mort.
— Engourdissement des jambes. — Lourdeur des pieds. — Froid
aux pieds, principalement aux orteils, et sueur à la plante des
pieds.



AESCULUS. — AGARICUS.

AESCULUS HIPPOCASTANUM.

AES-HIPP. - Marron d'Inde. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Médicament encore peu étudié, mais employé jusqu'ici avec

succès contre les affectious suivantes :

22

Constipation chronique et hémorrhoïdes, avec sensation de sécheresse dans le rectum, ou comme si l'anus était rempli de petits morceaux de bois; hémorrhoïdes très-douloureuses, mais saignant peu; douleur et sensation paralytique dans les reins, jusque dans les hanches, empiré en se levant de son siège. - Leucorrhée, avec douleurs et sensation paralysante dans les reins et les hanches, s'étendant du ventre au sacrum et ne permettant presque pas de se lever de son siégé. — Paralysie des extrémités inférieures.

AGARICUS MUSCARIUS.

— Agaric. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., . — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 40 jours dans quelques affections chroniques. ANTIDOTES: Camph. coff. puls, vinum.

COMPARER AVEC: Acon. bell. coff. graph. phos. puls.

CLINIQUE. — Les affections dans lesquelles on a jusqu'ici fait usage de ce remède sont : - Amblyopie amaurotique; Odontalgie; Faiblesse par abus du coït; Douleurs ostéocopes aux jambes; Convulsions et tremblements des membres ?; Accès épileptiques, Eruption comme des grains de millet; Engelures.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Douleurs crampoides aux muscles, étant assis. - Tiraillement aux membres, principalement pendant le repos, soit assis, soit debout, et disparaissant par le mouvement. — Symptomes qui se manifestent en croix (par exemple au bras droit et à la jambe gauche), en marchant lentement, amélioration. - Grande sensibilité de tout le corps; la pression la plus douce produit des douleurs continues. - Douleurs de meurtrissures aux membres dans toutes les articulations après un exercice même modéré. - Douleurs térébrantes dans différentes parties du corps, principalement à la tête, avec envie de dormir, et accablement étant assis. — Grande faiblesse et lour-



AGARICUS.

24

nez. — Écoulement d'une eau limpide par le nez, sans coryza. —

Couleur bleuâtre du nez.

Visage. — *Douleurs lancinantes ou tiraillantes aux mâchoires, aux joues et au menton. — Prurit, rougeur et ardeur aux joues comme par des engelures. — Palpitation et pulsation aux joues. — Traits altérés. — Lèvres bleuâtres. — Gerçures brûlantes à la lèvre supérieure. — Tiraillements crampoïdes au menton et à la mâchoire inférieure.

Dents. — Douleurs déchirantes aux dents, aggravées par le froid. — Gencives gonflées, douloureuses et saignant facilement.

Bouche. — Douleurs d'excoriation dans la bouche et au palais. —
Excoriation de la langue. — (Après le repas), langue parsemée
d'aphthes d'un jaune sale, avec sensation, comme si la peau allait
s'enlever. — Ulcère au filet de la langue. — Mauvaise odeur de
la bouche comme si on avait mangé du raifort. — Écume à la
bouche. — Écoulement de salive d'un goût âcre.

Appétit. — Goût fade et fétide dans la bouche. — Inappétence pour le pain. — Faim avec manque d'appétit. — Accès de boulimie, principalement le soir. — Après le repas, pression dans

l'estomac et le ventre, avec plénitude.

Estomac. — Rapports à vide alternant avec hoquet. — Rapports avec le goût des aliments qu'on a pris. — Nausées avec tranchées. — Envie de vomir immédiatement après le repas. — Pression à l'estomac et dans la région précordiale après le repas. —

Douleur crampoïde et pesanteur pressive à l'estomac.

Ventre. — Élancements dans la région hépatique. — Points dans la région splénique pendant et hors le temps de l'inspiration. — Tranchées et pincements dans le ventre comme par une diarrhée. — Mouvements et grondements dans le ventre. — Expulsion abondante de flatuosités d'une odeur fétide comme celle de l'ail. — Tranchées violentes avec diarrhée, angoisses, soif ardente, traits altérés, sueurs froides, pouls petit et irrégulier, selles très-fétides, tremblement et délire.

Selles. — Selles dures d'une couleur foncée, après un temps de constipation. — *Selles diarrhéiques, en forme de bouillie, avec beaucoup de flatuosités et de fortes coliques. — Pendant les selles diarrhéiques, traction doulourense à l'estomac et au ventre.

- Fourmillements à l'anus.

Urines. — Urines rares et peu abondantes. — Urine limpide et d'un jaune citron. — Écoulement d'un mucus visqueux par l'urèthre.

Parties viriles. — Exaltation de l'appétit vénérien avec flaccidité de la verge. — Éjaculation insuffisante dans le coït. — *Après le coït, grande faiblesse avec sueur nocturne. — Prurit aux parties génitales. — Tiraillements dans les testicules.

Larynx. — Expectoration de petits globules de mucosités, presque

sans toux.

Poitrine. - Respiration courte et oppressée, avec difficulté à mar-



AGNUS CASTUS.

CLINIQUE. — Les principales affections dans lesquelles on a employé ou recommandé ce médicament sont : Impuissance, Gonorrhée secondaire, Règles supprimées; Agalactie; Ulcères dans la bouche et aux gencives; Gonflement et indurations de la rate; Ascite; Flatuosités; Excoriation et crevasses à l'anus (application extérieure); Gonflement et induration des testicules; Flueurs blanches; Luxations; Nodosités arthritiques; Gonflement inflammatoire, rhumatismal, des articulations; Stérilité, etc., etc.

Voir la note, page 15.

26

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Démangeaison picotante à différentes parties. — Somnolence. — Sommeil agité avec réveil en sursaut. — Rêves anxieux ou lascifs. — Frissons avec tremblement, quoique le corps soit chaud au toucher. — Frissonnement sans soif, avec froid aux mains. — Le soir, au lit, chaleur passagère au corps avec froid aux genoux.

Moral. — Humeur mélancolique et hypocondriaque, avec apathie, absence d'idées et incapacité de faire quoi que ce soit. — État d'exaltation alternant avec mépris de soi-même. — Découragement complet et désir de la mort. — Grande tristesse arce idéfixe d'une mort prochaine. — Grande distraction, absence d'esprit et étourdissement. — Conception difficile des discours des autres. — Accès d'angoisse avec faiblesse et sensation, comme si

une diarrhée allait s'établir.

Tôte. — Douleur contractive dans la tête, principalement en lisant.

— °Mal de tête comme lorsqu'on est resté longtemps dans une chambre pleine de fumée, avec sensation de pesanteur, améliorée en fixant les yeux sur quelque objet. — Tiraillement pressif principalement au front et aux tempes, augmenté par le mouvement.

— Douleur de contusion comme si on avait reçu un coup à la tempe. — Cuisson lancinante à la tête comme dans les os, principalement le soir, et sensible même pendant le sommeil. — Prurit et démangeaison lancinante au cuir chevelu. — Tension et frissons aux téguments de la tête, qui, cependant, paraissent chauds au toucher.

Yeux et Oreilles. — Sensation brûlante aux yeux, le soir, en lisant. — Prurit et picotement aux paupières et autour des yeux. — Pupilles fortement dilatées. — Tintement et bourdonnement des

oreilles.

Nez. — Odeur de musc ou de hareng, devant le nez. — Pression à

la racine du nez, disparaissant par la compression.

Visage et Dents. — Fourmillement et démangeaison pruriteuse aux joues. — Douleur déchirante dans la mâchoire inférieure. — Mal de dents excité par des boissons ou des aliments chauds. Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche avec salive visqueuse.



ALOËS SOCCOTRINA.

28

Paralysies; jaunisse; anciens ulcères; plaies putrides; gangrène; carie des os; fièvres; cauchemar; état pituiteux; état atrabilaire; affections ædémateuses. - Hypocondries; manies; congestions cérébrales; céphalalgies; chute des cheveux. - Ophthalmies asthéniques; lippitude; taies et autres maladies de la cornée. — Affections des oreilles; surdité. — Épistaxis. — Ulcères aux lèvres. — Carie des dents; ulcères aux gencives. — Névralgie sublinguaire; ulcération de la langue ; hémorrhagies buccales ; stomacace et ulcères dans la bouche. - Gastralgies; dyspepsies chez les personnes de constitution phlegmatique, humorale, avec dégoût; vomissements avec ventre resserré; hématémèse. — Engorgement et induration de la rate; douleurs hépatiques; calculs biliaires; engorgement et induration des glandes du mésentère ; ascite ; phthisie intestinale. - Coliques et diarrhées; excréments gris blanchatre; constipation par suite d'atonie torpide; agglomération de matières fécales par suite de constipation; sécrétion bilieuse insuffisante; dyssenteries; hémorrhoïdes arrêtées; souffrances abdominales en rapport avec des affections spléniques ou hépatiques; accumulations muqueuses dans les intestins; ascarides. - Ulcérations à l'anus, aux parties sexuelles, au prépuce. - Douleurs utérines; rétention des menstrues; aménorrhée; chlorose; stérilité. — Congestions pulmonaires; asthme. Goîtres.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Douleurs comme par une contusion ou une luxation; tiraillement paralysant dans les muscles; élancements dans les articulations; douleur comme de faiblesse, dans les articulations des pieds et des mains; craquement dans les vertèbres du cou, les épaules et les hanches. — Abattement, las situde, paresse. - Dans la matinée : surexcitation, irritation, humeur qui fait qu'on se sent malheureux; nez sec ou saignant; souffrances gastriques, diarrhée, émission de vents, froid et frissons. - Après midi : souffrances des membranes muqueuses; coryza fluent, diarrhées muqueuses, besoins fréquents d'uriner; froid, frissons et pouls lent. - Le soir : aggravation de la plupart des souffrances, émission de vents, pieds froids. - A gauche, puis à droite : élancements dans l'oreille, palpitations de cœur, battement dans la poitrine, rhume de cerveau ; craquement à gauche dans l'articulation de l'épaule, et à droite, dans celle de la hanche. - A droite : souffrance des yeux et du nez; à gauche, ballonnement du côlon, élancement dans la poitrine, douleurs dans la main. - Les acides aggravent les souffrances. - Grande sensibilité au froid, surtout pendant un temps couvert. - Amaigrissement : flaccidité des muscles. - La chaleur aggrave le mal de tête que les compresses froides soulagent; le contact de l'eau aggrave les souffrances de la figure; après la marche au grand air, qui cause cependant de la



ALOËS SOCCOTRINA.

dehors, avec scintillement devant les yeux et chaleur à la face; élancements dans les tempes, à chaque pas. — Sensation d'un poids au vertex. — Mal de tête pendant les souffrances abdominales, ainsi qu'après des garde-robes insuffisantes. — Aggravation des maux de tête dans la chaleur, amélioration par des compresses froides. — *Affluence du sang à la tête; battements, forçant à se redresser de la position couchée. — Sensibilité du cuir chevelu, par plaques circonscrites.

Yeux. — Affluence du sang aux yeux; pression dans les orbites. —

Pendant la douleur frontale, contraction des paupières.

Oreilles. — *Otalgie; élancements qui se dirigent vers l'oreille; élancement tractif, d'abord dans l'oreille gauche, puis dans la droite. — Chaleur en dedans et au dehors des oreilles. — Craquement dans l'oreille en lisant à haute voix; pétillement en remuant la mâchoire. — Surdité avec otalgie violente.

Nez. — Nez douloureux, le matin, pendant le mouvement. — Nez rouge, au grand air. — Pointe du nez froide. — Sécheresse du nez, le matin, au lit. — *Épistaxis, le matin, au lit, après s'être réveillé. — Excoriation de l'aile droite du nez. — Éternument

avorté; *coryza fluent, après midi.

Face. — Face pâle, pendant un temps couvert. — Chaleur de la face, pendant la surexcitation, ainsi que pendant le mal de tête. — Lèvres plus rouges; lèvres sèches, gercées, s'exfoliant, gonflées, avec des plaques exceriées, fongueuses.

Dents. - Sensibilité dans une molaire creuse, puis pustule ulcérée

aux gencives.

30

Bouche. — Sécheresse dans la bouche; plaque enflammée; mauvaise odeur. — Langue douloureuse; élancements sous la langue, vers le devant, en remuant la langue; langue sèche; petits ulcères

à la langue.

Gorge. — Grattement, âpreté, raucité dans la gorge, qui est comme brûlée. — Palais gonflé. — Douleurs en bâillant, ainsi qu'en mâchant des aliments solides; ou bien aggravées le soir ou le matin au réveil. — Accumulation de mucosités tenaces, en morceaux épais.

Goût et Appétit. — Goût amer, acide, comme de l'encre, ou bien fade ou pâteux. — Appétit nul pour la viande, avec désir de fruits et de choses succulentes; faim, comme par ennui; le soir, faim redoublée. — Soif, en mangeant; après avoir mangé; la nuit. — Après avoir bu, souffrances de l'estomac. — La bière amoindrit les souffrances de l'anus. Les acides ne sont pas bien supportés. — Après avoir mangé: flatuosités; pulsations à l'anus; appétit vénérien excité.

Symptômes gastriques. — Rapports: sans goût; amers; acres; acides. — Nausées pendant les douleurs au nombril. — Vomisse-

ment de sang.

Estomac. — Pression dans l'estomac, avec sensation de chaleur; sensation de plénitude, avec douleur dans l'hypocondre gauche.



ALUMINA.

34

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs tiraillantes aux membres. — Sensation de constriction dans plusieurs organes. — Aggravation de souffrances par les pommes de terre, et souvent tous les deux jours. — Plusieurs souffrances se montrent après le diner et durent jusqu'au soir, où elles disparaissent ou sont remplacées par d'autres, qui commencent alors seulement. — Les souffrances qui ont apparu le matin ou le soir, s'améliorent après le repas. — «Souffrances par suite de contrariétés. — *Tremblement et mouvements convulsifs des membres et même de la tête. — Spasmes avec pleurs et rires alternatifs. — Exaltation de tout le système nerveux. — Tremblement de tout le corps, avec envie de se coucher, ce qui cependant augmente la fatigue. — Grande fatigue générale, même après une petite promenade à pied, mais principalement après avoir parlé. — «Pandiculations fréquentes, étant assis. — «Manque de chaleur vitale.

Peau. — Éruption miliaire aux bras et aux jambes, avec beaucoup de prurit, et saignement séreux après avoir gratté. — Les moindres lésions de la peau cuisent et s'enflamment. — 'Tubérosités lépreuses. — 'Croûtes et dartres suintantes, ou pruriteuses, principalement le soir. — Renouvellement des symp-

tômes cutanés à chaque nouvelle ou pleine lune. — *Rhagades.

Sommeil. — *Sommeil tardif et ¬insomnie avant minuit. — *Sommeil nocturne, trop léger, agité, avec sursauts fréquents. — *Sommeil étourdissant, non réparateur, avec envie, le matin, de dormir davantage. — Réveil fréquent la nuit. — *Rêves fréquents, ¬anxieux, avec paroles, rires, pleurs, lamentations, gémissements, somnambulisme. — Rèves de chevaux, de querelles et de vexations, d'incendie, de mariages, de spectres, de morts, de voleurs. — Rêves avec crainte de la mort après s'être réveillé. — Cauchemar. — La nuit, anxiété, agitation; ou chaleur, mal nux dents, mal à la tête, spasmes et oppression de la poitrine, ou diarrhée avec douleur à l'estomac et frissons. — Après le sommeil, le matin, en se réveillant, moral accablé par des idées chagrines, ou nausées avec fadeur dans l'estomac et mouvements fébriles.

Pièvre. — Frissonnement, même à la chaleur du poêle, et la nuit, au point de ne point se réchauffer. — Fièrre vers le soir avec prédominance du froid. — Apparition du froid immédiatement

après avoir mangé la soupe à midi.

Moral. — *Humeur chagrine, -triste, avec désespoir de la guérison, — Pleurs involontaires. — *Angoisse et anxiété, comme si l'on était menacé de quelque accident fâcheux ou qu'on eût commis quelque crime. — *Appréhensions. — Disposition à s'effrayer. — Air triste et morose. — Mauvaise humeur avec *inaptitude au travail. — Disposition à se fâcher. — Entêtement et humeur contrariante. — On prend tout en mal. — Humeur changeante, tantôt courageux, tantôt craintif. — Faiblesse de la mémoire. —



ALUMINA.

Face. — Air sombre, morose. — Alternation rapide de rougeur et de *pâleur du visage. — Rougeur cuivrée des joues, comme chez les ivrognes. — Fourmillement au visage, et tension comme s'il était couvert de blanc d'œuf desséché. — *Sensation de gonflement et de *pesanteur du visage. — Tache rouge douloureus — la joue. — Apreté de la peau du visage, surtout au front. — Prurit et éruption de petits boutons à la face. — °Croûtes suintantes aux tempes. — *Tiraillement lancinant dans la pommette des joues. — Chaleur passagère du visage. — Euroncles aux joues. — °Tubérosités lépreuses au visage. — Lèvres sèches et gercées avec exfoliation de la peau. — Gonflement des lèvres. — Boutons et éruptions croûteuses aux lèvres. — Gonflement des mâchoires avec douleur tensive en ouvrant la bouche et en mâchant. — Raccourcissement de la mâchoire inférieure.

Dents. — Douleurs aux dents en mâchant, ou le soir, au lit. — Déchirement aux dents, jusque dans l'os zygomatique et dans le front et les tempes. — Douleur térébrante dans les dents cariées. — Ulcération des racines des dents. — Ulcère aux gencives. — Gonflement et saignement facile des gencives. — Sensation d'allongement des dents. — Odontalgie avec irritation nerveuse, comme après un refroidissement, ou après l'usage de la camo-

mille.

36

Bouche. — Douleur d'excoriation dans la bouche, au palais, à la langue et aux gencives, qui empêche presque de manger. — Petits ulcères dans la bouche. — *Sécheresse de la bouche "principalement en se réveillant. — Accumulation d'une salive douceâtre ou aigre dans la bouche, comme une véritable salivation. — Odeur putride de la bouche. — Langue chargée d'un enduit blanc ou jaunâtre. — Expectoration de mucosités sanguinolentes.

Gorge. — Mal de gorge qui s'aggrave le soir et la nuit, et qui s'améliore en prenant quelque chose de chaud, ainsi que dans la matinée. — *Douleurs contractives ou lancinantes à la gorge, principalement en avalant. — *Déglutition difficile, comme par rétrécissement de la gorge. — oMal de gorge avec gonflement des gencives et du voile du palais, accompagné de douleur d'érosion dans toute la bouche, empêchant d'avaler jusqu'au moindre liquide. — Pression crampoïde et serrement dans l'œsophage. — Gonflement des amygdales. — Grande sécheresse dans la gorge. — *Accumulation d'un mucus épais et visqueux dans la gorge, avec difficulté de l'expectorer.

Appétit. — Goût douceatre ou goût de sang, dans la bouche. —
Goût âpre, astringent, ou amer et fade. — *Appétit irrégulier;
tantôt trop fort, tantôt trop faible. — Insipidité des aliments,
surtout le soir, et principalement du pain et de la viande. —
Dégoût de la viande. — Faim avec manque d'appétit. — Boulimie. — Désir de légumes, de fruits et d'aliments tendres. —
Après avoir mangé, et principalement le soir, hoquet, pression dans



ALUMINA.

de rêves, bouillonnement de sang, chaleur au visage, mal à la tête et palpitations de cœur. — Avant et *pendant les règles, coliques, mal à la tête et autres souffrances. - Après les règles, grande fatigue. - *Flueurs blanches corrosives, avec cuisson aux parties génitales. - *Flueurs blanches avant ou après les règles, -et souvent avec tremblement, fatigue et coliques. -Flueurs blanches incarnates, ou aqueuses et roidissant le linge.

Larynx. — Toux sèche, principalement le matin, et quelquefois suivie plus tard d'expectoration. — *Toux courte, sèche. — *Toux arec géne de la respiration, ou avec douleur à la tête et à la nuque. - *Catarrhe du larynx et des bronches, avec grattement dans la gorge. - Enrouement subit, avec aphonie, le

matin et le soir.

38

Poitrine. — *Oppression de la poitrine. — *Dyspnée, étant assis. — Pression nocturne à la poitrine. — Sensation de constriction de la poitrine, principalement étant assis dans une position courbée, ou en se baiseant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine et le creux de l'estomac, quelquefois avec toux. — *Palpitations et *secousses au cœur. — Douleur au sternum en y touchant.

Trono. — *Mal aux reins, pendant le repos. — Douleur de brisure aux reins et au dos. — Elancements au dos. — Sensation

au dos, comme si l'on y enfonçait un fer chaud.

Bras. -- Douleurs aux bras tant qu'on les tient pendants ou étendus au lit. - Déchirement dans le bras, depuis l'épaule jusqu'aux doigts.— Douleur de brûlure comme par un fer chaud, dans les coudes et les doigts. - *Pesanteur paralytique aux bras. - Gonflement du bras et des doigts. - Dartres et croûtes suintantes aux avant-bras. — Desquamation farineuse des mains. — *Gerçures aux mains, qui saignent facilement. - Douleur rongeante sous les ongles, quelquefois avec fourmillement dans le bras. - Les ongles se cassent facilement quand on les coupe. - *Panaris.

Jambes. — Roideur, engourdissement et insensibilité des jambes, la nuit. — Déchirement dans presque toutes les parties des membres inférieurs. - *Grande lourdeur et faiblesse des jambes, oprincipalement aux hanches. — Douleur tractive aux genoux en montant l'escalier. - Tension aux mollets en marchant, et crampes en croisant les jambes ou en appuyant les orteils par terre. — Douleur de fatigue aux articulations des pieds, étant assis. — Douleurs aux plantes des pieds en marchant .-- Froid aux pieds. -- Prurit et rougeur aux orteils, comme par des engelures. — Sensation de brulure sous les orteils.



AMBRA.

Sommeil. *Envie de dormir le jour. — Insomnie nocturne. — Sommeil agité à cause du froid au corps et de tressaillement aux membres. — *Sommeil plein de réces anxieux et de récasseries. — En s'endormant, sursauts avec effroi.

Pièvre. — Frissonnement, surtout le matin, avec fatigue et somnolence, amélioré par le diner. — *Frissons fébriles à diverses parties, suivis de chaleur au visage. — *Chaleur passagère, quelquefois avec anxiété au cœur. — *Sueur continuelle le jour, surtout au ventre et aux cuisses (en marchant). — Sueur nocturne après minuit, surtout au côté malade.

Moral. — *Tristesse inconsolable. — Anxiété surtout le soir. — "Timidité. — Désespoir et *dégoût de la vie. — "Répugnance pour le rire et la conversation. — Excitation, agitation, précipitation, principalement pendant des travaux intellectuels. — Imagination occupée de figures à grimaces et d'images lascives. — Absence d'idées. — Conception difficile. — *Embarras en société.

Tête. — Accès de rertiges surtout en marchant au grand air. —
Vertiges qui forcent à se coucher, avec sensation de faiblesse à
l'estomac. — Le matin, mal à la tête comme après une débauche
nocturne. — Sensation de faiblesse dans la tête, avec frissonnement à l'extérieur. — Douleur pressive à la tête, tous les deux
jours, avec chaleur à la tête, ardeur aux yeux et pâleur du visage.
— Pression au front avec crainte de perdre la raison. — Serrement pressif, avec embarras, principalement au front et à l'occiput. — Congestion de sang à la tête, surtout en entendant de la
musique. — Tiraillement aigu dans la tête avec ulcères au cuir
chevelu. — Douleur à la tête comme après s'être donné un tour
de reins. — *Endolorissement du cuir chevelu au toucher, avec
chute des cheveux.

Yeux. — Pression aux yeux avec pesanteur, et sensation comme si les yeux étaient trop enfoncés, avec difficulté de les ouvrir le matin. — Chatouillement insupportable autour des yeux. — Prurit à la paupière, comme si un orgelet allait sortir. — *Rougeur inflammatoire de la sclérotique, avec injection des vaisseaux. — *Trouble de la vue, comme un brouillard et obscurcissement devant les yeux.

devant les yeux.

Oreilles. — Tiraillement aigu dans les oreilles. — Tension aux oreilles. — Fourmillement et chatouillement dans l'intérieur des oreilles. — *Tintement et bourdonnement devant les oreilles. — *Dureté de l'oule d'un seul côté.

Nez. — Spasmes aux ailes du nez. — *Hémorrhagie nasale, principalement le matin. — Croûtes de sang desséché dans le nez. — Éternument fréquent. — Sécheresse et *obturation du nez "avec douleur d'excoriation. — *Coryza sec. — •Suppression chronique d'un rhume de cerveau.

Visage. Rougeur et chaleur (quelquefois passagère) du visage.

- *Face ictérique. — Tremblement et mouvements convulsifs

AMBRA.

des muscles de la face. — Démangeaison fourmillante et pruriante : la face, avec éruption de boutons, même au front et dans la region des favoris. — Taches rouges sur la joue. - Convulsions aux lèvres. — Lèvres chaudes.

Dents. — *Douleurs tractives lancinantes, principalement dans les dents cariées, et surtout au grand air, augmentées en prenant quelque chose de chaud. — Saignement des dents et des gen-

cives. — Gonflement douloureux des gencives.

Bouche. — Le matin, en se réveillant, sécheresse et sensation d'engourdissement à la bouche, à la langue et aux lèvres. — Démangeaison et cuisson dans la bouche. — Vésicules dans la bouche avec douleur brûlante. — Nodosités avec douleur d'écorchure au-dessous de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc ou gris jaunâtre. — Mauvaise odeur de la bouche.

Gorge. — Sensation comme s'il y avait un tampon dans la gorge, avec difficulté d'avaler. — *Étranglement dans la gorge, en avalant les aliments. — *Corrosion, et grattement dans la gorge. — Accumulation de mucosités grisâtres dans la gorge, avec vomiturition et vomissement en renaclant. — *Le matin, renaclement

de mucosités.

Appétit. — *Goût fade ou rance. — *Manque d'appétit. — Aigreur dans la bouche après avoir pris du lait. — Après avoir mangé, * pression à la fossette du cou, comme si un morceau s'y était arrêté.

Estomac. — *Rapports avortés. — Rapports fréquents, et souvent aigres, ou avec le goût de ce que l'on a pris. — Hoquet après avoir fumé du tabac. — Pyrosis, principalement le soir, ou en se promenant au grand air ou après avoir bu du lait. — *Nausées et vomissement. — Pression et douleur crampoïde à l'estomac. —

Sensation de brûlure à l'estomac et à la région précordiale.

Ventre. — *Douleurs hépatiques, le plus souvent pressives. — Douleur pressive dans l'épigastre et dans le bas-ventre. — *Pesanteur dans le ventre. — Tension et *ballonnement du ventre, —principalement après avoir bu et mangé. — Compression dans le ventre, quelquefois le matin. — Tranchées le soir, après minuit, et le matin au lit, avec diarrhée. — *Douleur de blessure dans les muscles abdominaux en toussant et en tournant le corps. — *Sensation de froid dans le ventre, quelquefois d'un seul côté. — Le soir, tressaillement dans les muscles abdominaux. — *Flatuosités incarcérées. — Colique flatulente nocturne.

Selles. — Constipation et selles tardives. — Envie inutile d'aller à la selle, avec anxiété et impossibilité de supporter l'approche de personne. — *Selles irrégulières, intermittentes, souvent seu-lement tous les deux jours. — Selles molles (diarrhéiques) brun

— Après la selle, pression dans le bas-ventre. — Écoulent de sang avec la selle. — *Boutons hémorrhoidaux à l'anus.

Prurit et chatouillement à l'anus et au rectum.



AMBRA.

42

Urines. - Le matin, après s'être levé, envie pressante d'uriner. -Sécrétion d'urine augmentée, principalement la nuit et le matin.

- Urines d'un brun jaunâtre, et troubles, avec sédiment brun. Nuage rougeatre dans l'urine. — Urines sanguinolentes. -*Odeur acide de l'urine. — Brûlement dans l'orifice de l'urêthre.

Parties viriles. - Vive sensation de rolupté et prurit aux parties génitales, sans excitation extérieure. — Brûlure à la région des vésicules spermatiques. - Erection le matin, avec engour-

dissement des parties génitales. Règles. — Règles trop hâtives. — Écoulement de sang hors le temps des règles. - Pendant les règles, gonflement des varices, avec pression dans les jambes. — *Leucorrhée, -épaisse, muqueuse, précédée d'élancements dans le vagin. - Sortie de matières blanches, bleuâtres, par le vagin. — La leucorrhée est plus abondante la nuit. — Brûlement, douleur d'écorchure et prurit aux parties sexuelles de la femme.

Larynx. - Toux avec coryza et expectoration d'un mucus blanchâtre et salé. — Toux nocturne, excitée par un vif chatouillement au gosier. — Toux le soir, avec douleurs sous les côtes gauches, comme si on y arrachait quelque chose. - *Toux convulsire, -avec rapports et enrouement. - *En toussant, mal de tête pressif aux tempes. — Voix rauque, enrouée, et accumulation de beaucoup de mucosités épaisses dans les voies aériennes.

Poitrine. — *Haleine courte. — *Oppression de la respiration. — Thaleine fétide, le matin après s'être réveillé. — Sifflement dans la poitrine. — *Oppression douloureuse à la poitrine et au dos. — Pression à la poitrine, principalement dans la région du cœur. — *Sensation de corrosion dans la poitrine. — *La nuit, tremblement à la poitrine. - Battement de cœur, souvent en se promenant au grand air, avec pâleur du visage, et pression dans la poitrine comme par une masse. — Douleur de brisure, rhumatismale, à la poitrine.

Tronc. — Mal aux reins, lancinant. — *Roideur aux reins après être resté assis. — Pesanteur au dos avec douleur au ventre comme si les intestins étaient comprimés. -- Douleur pressive,

tiraillante à la nuque et au dos.

Bras. — *Les bras s'engourdissent facilement, -soit que l'on s'appuie dessus, *ou que l'on porte quelque chose, ou même la nuit, avec sensation de torpeur. - *Tiraillement paralytique, comme de luxation, aux articulations scapulaires, aux coudes, aux avant-bras et aux mains. — *Tremblement des bras. — *Douleur ostéocope du coude au toucher. — *Crampes aux mains en saisissant quelque chose. — Froid prolongé des mains. — Contraction des doigts. — Le soir, accès de tremblement au pouce. -- Le matin, la peau au bout des doigts est ridée. Faiblesse nocturne des doigts. — Dartre pruriteuse entre les doigts.



44

côté gauche. — La plupart des souffrances apparaissent ou le soir et la nuit, ou le matin. — *Le soir, agitation générale dans le corps. — Besoin d'étendre les bras et les jambes. — En parlant beaucoup et en écoutant parler, on se fatigue beaucoup. — Fatigue, courbature et *grande faiblesse des membres, principalement en se promenant au grand air, ou le soir, et quelque-fois avec besoin de se coucher. — *Répugnance pour la promenade. — Convulsions. — Inflammations locales. — Tétanos. — Dyscrasie scorbutique. — Disposition du sang à se décomposer. Amaigrissement. — Grande sensibilité au froid et au grand air, avec beaucoup de souffrances après la promenade.

Peau. — Fort prurit par-ci par-là, avec des vésicules et des boutons brûlants après avoir gratté. — *Éruptions miliaires, ochroniques. — Rougeur sur toute la partie supérieure du corps, comme de la scarlatine. — *Scarlatine. — *Éphélides. — Brûlement, élancements et tiraillements aigus au corps. — Excoriation de la peau (entre les jambes, à l'anus et aux parties génitales). — Ganglions. — Gonflements de glandes. — Rachitisme.

Sommeil. — *Somnolence diurne. — *Insomnie et "sommeil tardif, surtout lorsqu'on se couche tard. — *Cauchemar en s'endormant. — Réveil fréquent avec effroi, "et difficulté de se rendormir. — Sommeil plein de rêves tant anxieux que romantiques,
historiques et lascifs. — Rêves de spectres, de mort, de vermine
et de querelles. — Sommeil agité et qui ne délasse point. — La
muit, accès d'angoisse, vertiges, congestion de sang à la tête,
céphalalgie, mal aux dents, nausées, gastralgie, coliques, envie
d'uriner, crachement de glaires, douleurs aux gros orteils et aux
ganglions, secousses dans le corps, douleurs aux membres, prurit
et picotement dans la peau, agitation, bouillonnement de sang,
chaleur sèche, sueur, surtout aux james, frissonnement et froid.

Symptômes fébriles. — *Accès de frissons le soir. — Avant de s'endormir, violent frisson avec tremblement. — *Chaleur fébrile à la tête avec froid aux pieds. — Sueurs toutes les nuits et vers le matin.

Moral. — Tristesse avec humeur pleureuse, appréhensions, et angoisse qui disparaît souvent vers le soir. — *Inquiétude le soir. — *Anxiété avec faiblesse, -et cauchemar nocturne. — Caractère craintif. — *Dégoût de la vie. — Mauvaise humeur le matin, et lorsqu'il fait mauvais temps. — Humeur morose et colère. — *Caractère désobéissant et difficile à conduire. — Gaieté excessive. — Inadvertance. — Grande distraction et manque de mémoire. — *On se trompe en parlant, en écrivant, en calculant. — *Diminution des facultés intellectuelles.

Tête. — *Vertiges, oen lisant dans la position assise, ou le matin, ou le soir, quelquefois avec nausées. — *Maux de tête opiniâtres. — *Mal de tête avec nausées. — Les maux de tête apparaissent souvent le soir, après la promenade au grand air, ou le matin, ou



après le repas. — Douleur d'uloération à la tête, principalement en remuant la tête ou en la pressant. — *Martellement, —pression et battements dans la tête, avec *sensation comme si tout allait sortir par le front, —ou que la tête dút éclater. — Élancements au fond du cerveau. — Mal de tête comme par le gas carbonique. — Sensation comme si le cerveau vacillait. — Endolorissement du cuir chevelu et des cheveux. — Prurit à la tête. — *Chute des cheveux.

Youx. — *Brûlement aux yeux, principalement ele soir, ou le matin, avec photophobie. — *Gensation de froid aux yeux. — Orgelet. — Agglutination nocturne des paupières. — *Chassie sèche aux paupières. — Immobilité des yeux. — *Vue trouble avec scintillement devant les yeux. — *Myopie. — *Cataracte. — Diplopie. — *Points noirs et bandes lumineuses devant les yeux. — Larmoiement.

Oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles, particulièrement la nuit. — *Bruissement et tintement aux oreilles. — *Dureté de l'oule, avec suppuration et démangeaison de l'oreille. — *Gonfie-

ment dur des glandes du cou, et des parotides.

Mes. — Pesanteur au bout du nez, en se courbant, comme par congestion de sang. — *Prurit et bouton purulents au nez. — Furoncle au bout du nez. — Gonflement, sensation d'excoriation et sensibilité douloureuse des narines. — Écoulement de pus par le nez. — Excrétion de mucosités sanguinolentes. — *Saignement de nez, particulièrement le matin en se levant, ou "après le repas. — Sécheresse opiniâtre du nez. — *Coryza opiniâtre. — *Coryza sec, "et obturation du nez, principalement la nuit, avec péril de suffocation.

Visage. — *Bouffissure et pâleur de la face, avec nausées et fatigue du corps et de l'esprit. — *Teint maladif. — Chaleur au visage pendant des travaux intellectuels. — Tension et *tiraillement* aigus, avec élancements au côté droit du visage. — Tension dans la peau du visage, comme si la face était gonfiée. — Gonfiement dur des joues. — Contorsion des traits. — *Éruptions au visage eavec prurit. — Furoncles aux joues. — °Éphélides. — Éruptions dartreuses avec desquamation de la peau, aux joues, autour de la bouche et au menton. — Lèvres sèches, gercées, brûlantes et saignantes. — Gonfiement douloureux des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Mal aux dents en les serrant, ou le soir après s'être couché, ou quand l'air y pénètre, ou pendant les règles; les douleurs sont pour la plupart tiraillantes, ou tressaillantes, ou lancinantes; ou comme d'ulcération, et souvent elles se propagent jusque dans les joues et les oreilles. — Douleur lancinante, opiniâtre aux dents. — Pourriture, allongement et *vacillement chronique des dents. — Gonfiement inflammatoire, suppuration et saigne-

ment facile des gencives.

45



46

Bouche. — Rougeur, inflammation, douleur d'excoriation et sensation de gonflement dans l'intérieur de la bouche. — Éruption de bulles dans la bouche et sur la langue. — Parole difficile, comme par faiblesse des organes. — Grande sécheresse dans la bouche, principalement la nuit. — Accumulation de salive dans la bouche et orachement continuel. — Mauvaise odeur de la bouche qu'on sent soi-même.


Gorge. — Mal de gorge comme s'il y avait un corps étranger là dedans, principalement le matin et le soir. — *Douleur d'excoriation et grattement dans la gorge. — Gonfiement des amygdales, avec difficulté d'avaler. — Après avoir bu, les muscles antérieurs du cou se contractent spasmodiquement.

Appétit. — Goût sanguinolent dans la bouche. — *Goût amer, principalement après avoir mangé, ou le matin, après le réveil. — Goût acide des aliments, et après avoir pris du lait. — Goût métallique des aliments. — *Soif continuelle. — Impossibilité de manger sans boire. — Beaucoup de faim et d'appétit. — *Manque d'appétit le matin. — En mangeant, on est bientit rassasié. — Répugnance pour le lait. — *Goût excessif pour le sucre. — *En mangeant, vertiges étourdissants oet chaleur au visage. — *Après le repas, pyrosis avec grattement dans la gorge, oet envie de dormir.

Estomac. — *Renvois aigres -ou à vide, ou avortés. — *Renvois avec le goût des aliments ingérés. — *Pyrosis. — *Renvois et vomissements. — Nuusées et vomissements toutes les fois qu'on a mangé, avec pression au creux de l'estomac. — Vomissement sanguinolent, violent. — Pression à l'estomac, principalement après le repas, avec nausées et sensibilité douloureuse du creux de l'estomac. — *Gastralgie. — *Douleur contractive au creux de l'estomac, en s'étendant. — Chaleur et sensation de brûlure à l'estomac. — °Tout vêtement sur l'estomac est insupportable.

Ventre. — Pression, douleur d'écorchure et obrûlement dans la région hépatique. — o'Élancements térébrants dans le foie, le soir étant assis. — *Mal au ventre avec diarrhée. — *Coliques contractives, spasmodiques, avec nausées et accumulation d'eau dans la bouche. — o'Douleur de commotion dans le bas-ventre en marchant. — *Bruit dans le ventre. — Gonflement élastique dans l'aine, comme une hernie venteuse. — Colique flatulente, douloureuse.

Selles. — *Constipation. — *Selles difficiles. — Selles tardives, dures, en petits morceaux. — Selles molles ou diarrhéiques, muqueuses, suivies ou précédées de tranchées. — Après et *pendant la selle, sortie de sang par l'anus. — *Hémorrhoïdes saignantes, avec douleurs cuisantes. — Sortie des hémorrhoïdes du rectum pendant la selle, avec beaucoup de douleurs après. — Brûlement nocturne et *prurit à l'anus. — Écorchure entre les jambes et à l'anus.



47

Urines. — Envie continuelle d'uriner, même la nuit, avec évacuation peu abondante. — Le soir surtout, pissement fréquent et abondant. — *Pissement nocturne. — *Pissement au lit. — Urines blanches, sablonneuses. — Urines rougeatres, comme de l'eau mélée de sang. — Econlement de sang par l'arrèthes

l'eau mèlée de sang. — Écoulement de sang par l'urèthre.

Organes génitaux. — Violent appétit vénérien, sans idées lascives ni érections; ou *manque d'appétit vénérien et répugnance pour le sexe. — Pollutions fréquentes, et étranglement, tiraillement et pesanteur aux testicules. — Sortie de liqueur prostatique.

après une selle difficile.

Bègles. — Gonflement, prurit et brûlement aux parties génitales de la femme. — *Excoriation de la peau aux parties et à l'anus. — Règles trop hátives et trop fortes, d'un sang noir et acre. — Avant et *pendant les règles, coliques et maux de reins. — *Pendant les règles, mal aux dents, pression sur la matrice, tranchées, tiraillements aigus au dos et aux parties génitales, *besoin de se coucher, "pâleur du visage, frissonnement, coryza et tristesse. — Écoulement sereux de la matrice. — *Leucorrhée àcre, corrosive, "ou brûlante.

Larynx. — Raucité et enrouement avec difficulté de parler. —
Catarrhe avec dureté de l'oule et brûlement à l'estomac. —
*Toux avec enrouement. — Toux sèche, comme par du duvet
dans la gorge. — *Toux avec oppression asthmatique, particulièrement le soir au lit. — *Toux chatouillante avec expectoration. — *Toux seulement la nuit, ou seulement le jour,
ou le soir avant de s'endormir, ou le matin vers les 3 ou
4 heures. — «En toussant, élancements aux reins, —au sternum, ou au creux de l'estomac. — *Toux avec expectoration
muqueuse, sanguinolente, haleine courte, et sensation d'un
poids à la poitrine. — Expectoration de sang pur par la toux.

Poltrine. — *Haleine courte -avec étouffement, principalement en montant un escalier. — Géne asthmatique de la respiration, et dyspnée principalement à la chaleur de la chambre, ainsi qu'après un effort quelconque, parfois avec battement de cœur. — Dyspnée nocturne. —Sensation douloureuse d'asthme spasmodique avec toux courte et sourde. — *Élancements dans la poitrine et dans les côtés, particulièrement en respirant, en chantant, en se baissant, en marchant, ou la nuit, avec impossibilité de rester couché sur le côté malade. — Poitrine comme fatiguée. — Congestion vers la poitrine. — Sensation de pesanteur à la poitrine. — Brûlement dans la poitrine. — Souvent un point douloureux au cœur. — *Battements de cœur, principalement après un effort, et quelquefois avec rétraction de l'épigastre et faiblesse au creux de l'estomac.

Trono. — •Élancements dans les téguments de la poitrine. — Miliaire pourprée et furoncles à la poitrine. — Maux de reins et *douleurs à la nuque, le plus souvent tiraillantes. — *Ten-



48 AMMONIUM CARBONICUM. -- AMMON. MURIATICUM.

sion tractive au dos et aux reins. — Tiraillements aigus depuis le côté jusqu'à l'articulation scapulaire. — *Gonfiement douloureux des glandes du cou et des glandes axillaires. — •Goître.

Bras. — *Bras et doigts morts et roides, la nuit, ainsi que le matin, et en saisissant quelque chose. — Pesanteur et faiblesse paralytique des bras. — Tiraillement aigu dans les articulations des bras, des mains et des doigts, amélioré par la chaleur du lit. — *Douleur de foulure au poignet. — Accès de tremblement des mains. — Veines gonfiées et couleur bleuâtre aux mains, après les avoir lavées à l'eau froide. — *Exfoliation de la peau des mains. — La peau des mains devient dure et gercée. — Crampes aux doigts. — *Engourdissement des doigts. — °Enflure des mains en laissant tomber les bras. — Gonfiement des articulations des doigts.


Jambes. — Tension dans les jambes, comme si les tendons étaient trop courts. — Tressaillement et contraction des jambes. — *Grande fatigue dans les jambes. — Douleur de courbature dans l'articulation coxo-fémorale et les cuisses, particulièrement le matin au lit, améliorée par la marche. — *Crampes aux pieds, —aux mollets et au tibia. — Tressaillements dans les genoux et les jambes. — *Douleur tractive aux jambes, étant assis. — Tiraillement aigu aux articulations des pieds, amélioré par la chaleur du lit. — Douleur d'ulcération et *élancements aux talons. — Sensation de brûlure aux pieds. — *Gonflement des pieds. — *Sueur des pieds. — Froid et frissons aux pieds, principalement le soir en allant au lit. — *Douleur (de luxation) dans le gros orteil, principalement la nuit au lit, en le remuant. — Le soir, rougeur, chaleur et gonflement du gros orteil, comme par des engelures.

AMMONIUM MURIATICUM.

AMM-MUR. — Muriate d'ammoniaque. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 75. — Doses usitées : 12, 30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIBOTES: Camph. hep.?.
COMPARER AVEC: Amm. arn ars. bell. brv. chin. fer. graph. hep. kal. laur. lye. mang. merc. n-vom. phos. puls. rhus. sil. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Mélancolie; Migraine; Amblyopie amaurotique; Hémorrhoïdes; Dysménorrhée; Toux chronique; Douleur de luxation;



AMMONIUM MURIATICUM.

49

Glandes engorgées; État scorbutique des gencives; Podagra?; Panaris?, etc., etc., voir la note, page 15.

SYMPTOMES GEMERAUX. — *Douleur d'ulcération à plusieurs parties du corps. — Tension dans les articulations comme par raccourcissement des tendons. — Le côté droit du corps paraît être plus affecté que le côté gauche. — Les souffrances de la tête et de la poitrine s'aggravent principalement le matin; les souffrances gastriques et abdominales après le dîner, et les douleurs dans les membres, les affections cutanées, ainsi que les symptômes fébriles, le soir et la nuit. — Bouillonnement de sang avec anxiété. — *Faiblesse paralytique et ofatique, principalement aux extrémités inférieures, *quelquefois avec étourdissement, ou avec tension et tiraillements aux jambes. — Cachexie scorbutique. — Disposition du sang à se décomposer. — Douleurs ostéocopes, tiraillantes, nocturnes. — *Déchirement tressaillant dans les membres, surtout dans les doigts et les orteils.

Peau. — Prurit et démangeaison, avec besoin de se gratter, suivis d'éruption de boutons. — Éruption miliaire. — Eruptions vésiculeuses qui forment des croûtes. — Exfoliation de la peau dans

plusieurs endroits.

Senneil. — Somnolence diurne, avec paresse et horreur du travail. — Le soir, de bonne heure, envie de dormir. — Insomnie avant minuit. — Réveil de trop bonne heure. — Beaucoup de rêres anxieux, effrayants ou lascifs. — La nuit, tranchées, éternuments fréquents, fourmillement dans la gorge, pesanteur et pression à la poitrine (cauchemar?), mal aux reins violent et douleurs au tronc et aux membres, froid aux pieds, chaleur à la tête, frisson et prurit à la peau.

Fièvre. — Froid et frissons, le plus souvent le soir vers 6 heures. — Chaleur avec soif et face rouge, bouffie. — *Sueur nocturne,

°après minuit.

Moral. — Grande angoisse et état mélancolique comme par du chagrin ou des soucis, avec *humeur pleureuse. — *Humeur morose, apathique, "avec répugnance pour la conversation. — Irritabilité et disposition à se fâcher. — Antipathie pour cer-

taines personnes.

Tête. — Étourdissement et vertige qui disparaissent le plus souvent au grand air. — Sensation de plénitude dans lu tête et pesanteur au front, principalement le matin en se levant. — — Pression au front, vers la racine du nez, avec sensation comme si le cerveau était meurtri. — Tiraillement aigu semilatéral à la tête et au visage. — Congestion de sang à la tête



AMMONIUM MURIATICUM.

avec chaleur intérieure. - Prurit au cuir chevelu, qui force à se

gratter continuellement.

50

Yeux. — Brûlement aux yeux et dans les angles des yeux le soir au crépuscule, ou le matin avec photophobie. — Palpitation aux paupières. — Vue trouble comme par un brouillard. — *Taches et points voltigeant devant les yeux, ∘le jour et le soir à la lumière des bougies. — Taches jaunes devant les yeux, en regardant fixement quelque objet.

Oreilles. — Élancements aux oreilles de dedans en dehors, surtout au grand air. — Tressaillement térébrant aux oreilles. — Éruption aux oreilles. — Écoulement par les oreilles. — °Dureté de l'ouïe. — *Tintement et bourdonnement devant les oreilles.

Nez. — Gonflement et sensibilité douloureuse du nez au toucher, avec douleur d'ulcération et croûtes sanguinolentes dans les narines. — éternument avec élancements à la nuque et jusque dans les épaules. — Coryza avec obturation du nez et perte de l'odorat. — Écoulement d'eau claire, corrosive, pendant le coryza.

Visage. — Tiraillement aigu, violent dans les os zygomatiques. — Chaleur brûlante de la face. — Éruption au visage. — *Ulcération des coins de la bouche et —de la lèvre supérieure. — Lèvres luisantes, comme par de la graisse. — Lèvres sèches, ridées, gercées, excoriées, avec douleur brûlante. — *Douleur tensive dans l'articulation sous-maxillaire en mâchant et en ouvrant la bouche. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur pulsative.

Dents. - Tiraillement aigu aux dents. - Gonflement des gen-

cives avec douleur lancinante.

Bouche. — Vésicules brûlantes au bout de la langue. — Douleur lancinante à la gorge en avalant. — Mucosités tenaces dans la

gorge, principalement le matin.

Appétit. — Goût amer dans la bouche, principalement le matin, avec renvois amers et anxiété. — Manque de faim et d'appétit. — Beaucoup de soif, surtout le soir. — Après tout repas, nausées, écoulement d'eau par la bouche avec horripilation, diarrhée avec coliques et douleurs aux membres, et quelquefois avec battement dans la poitrine, chaleur au visage et inquiétude.

Estomac. — *Renvois, le plus souvent amers ou à vide. — Régurgitation de ce que l'on a pris ou d'une eau amère et acide. — Hoquet fréquent, violent, souvent avec élancements à la poitrine. — Pituites de l'estomac. — Douleurs tractives ou rongeantes à l'estomac, comme par des vers. — Sensation de brûlure à l'esto-

mac et dans la région précordiale.

Ventre. — *Elancements dans la région splénique, °particulièrement le matin en se réveillant, avec dyspnée qui force à se redresser. — Ballonnement du ventre. — Pincement dans le ventre. — Tension et gonflement aux aines. — *En touchant, sensation de gonflement et douleur d'ulcération aux aines.



51

AMMONIUM MURIATICUM.

Selles. — *Constipation. — Selles dures ou fréquentes et molles. - Diarrhée avec douleur d'excoriation ou de meurtrissure au ventre. — Selles diarrhéiques, muqueuses, verdâtres. — Avant la selle, mal de ventre autour du nombril. -- *Sortie de sang avec la selle. - *Douleur d'excoriation dans le rectum, *tant assis. - Douleur au périnée en marchant.

Urines. — Evacuation d'urine augmentée, principalement la nuit.

- Urines rougeatres, claires, sans dépôt.

Parties viriles. - Elancements et battements au cordon sperma-

tique. — Érections fréquentes.

Règles. — *Règles trop hâtives et trop fortes, *avec mal aux reins et douleurs (compressives et contractives) au dos. - Pendant les règles vomissement et diarrhée, tiraillement aux pieds, ou sortie de sang avec selle. — Flueurs blanches avec ballonnement du ventre, ou comme du blanc d'œuf, précédées de pincement autour du nombril, ou muqueuses, brunes, sortant après avoir urine.

Larynx. — Enrouement avec sensation de brûlure au larynx. *Toux violente, principalement le soir et la muit, étant couché sur le dos. — *Toux sèche le matin, oavec expectoration de matières blanchâtres et épaisses. — •La toux est plus forte après le repas ainsi qu'après avoir bu froid et lorsqu'on est couché la tête basse. — Toux en respirant profondément, surtout étant couché sur le côté droit. — En toussant, élancement dans la poitrine et aux hypocondres. -- Expectoration de sang précédée de démangeaison à la gorge. — Toux opiniatre venant du fond de la poitrine.

Peitrine. - État asthmatique en remuant fortement les bras et en les baissant. - Pesanteur et oppression de la poitrine, avec gêne de la respiration, principalement au grand air ou la weit. - Pression et élancements dans la poitrine. - Pulsations dans

la poitrine, étant debout.

Tronc. — Tension et douleur de courbature à l'extérieur de lapoitrine. - °Éruption et taches rouges, brûlantes et pruriantes à la poitrine. — Douleurs de courbature aux reins, principalement la nuit, étant couché, en marchant et après s'être baissé. — *Roideur douloureuse aux reins qui force à marcher courbé. — *Elancements aux omoplates, osurtout en respirant. — *Tiraillements aigus aux côtés du cou et aux clavicules. — Roideur du cou, avec douleur en le remuant, depuis la nuque jusqu'aux épaules.

Bras. — Bras lourds et roides, comme paralysés. — La nuit, tiraillement aigu aux bras comme si c'était dans les os. - Tiraillement aux épaules. — Gonfiement des poignets avec douleurs tiraillantes. — Vésicules au poignet qui forment des croûtes. — Douleur de luxation au poignet. — Tiraillement tressaillant ou élancements, battement, fourmillement et douleur d'ulcération au bout des doigts. — Exfoliation de la peau entre les doigts.



AMMONIUM MURIATICUM. — ANACARDIUM. 52

Jambes. — Tension dans les hanches et les jarrets. — • Élancements, douleur de luxation et *tiraillement à la hanche. --*Raccourcissement des tendons des jarrets et roideur de l'articulation du genou. — La nuit, tiraillement aigu aux jambes comme dans les os. — Douleur lancinante aux mollets, après avoir marché longtemps. — *Jambes mortes et insensibles. — *Douleur d'ulcération et tiraillement aux talons. — *Froid aux pieds. — Sueur fétide des pieds. — Tiraillement tressaillant ou élancement, battement et fourmillement au bout des orteils.

ANACARDIUM ORIENTALE.

MANAU. — Fove de Malac. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 461. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 30 jours dans quelques affections chroniques.

ANTIDOTES : Camph. n-jugl?.

COMPARER AVEC : Acon. are COMPARER AVEC : Acon. ars. calc oleand.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Aliénation mentale et démence allant jusqu'à la fureur; Mélancolie; Imbécillité?; Hystérie et Hypocondrie?; Céphalalgie par suite de travaux intellectuels trop fatigants; Amblyopie; Dureté de l'oule; Otorrhée; Dyspepsie; Hémorrhoides; Coryza chronique; Faiblesse nerveuse et physique?; Coqueluche?; Souffrances asthmatiques?; Paralysie; Suites fâcheuses de l'abus du coît?; Souffrances par suite de chagrin?, etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs pressives comme par une cheville ou par un tampon, à plusieurs endroits. — Les 'souffrances apparaissent le plus souvent périodiquement. plupart des souffrances disparaissent pendant le diner, mais, peu de temps après, elles se renouvellent et il en apparaît beaucoup d'autres. — Le moindre mouvement fatigue beaucoup. — Grande satigue, *tremblement et faiblesse extrême dans les membres et principalement aux genoux, -augmentant jusqu'à la paralysie. - Grande lassitude en marchant et en montant l'escalier. *Disposition à se refroidir facilement, et grande sensibilité pour le froid et le courant d'air.

Peau. — Prurit brûlant; augmenté par le grattement. — Peau





ANACARDIUM.

difficile à exciter par des irritants. - Douleur d'abcès aux parties malades.

 Sommeil. — Sommolence comateuse jour et nuit. — Envie de dormir de bonne houre, avec sommeil nocturne agité. — *Sommeil tardif. — *Réves anxieux, dégoûtants ou horribles, avec cris; rêves vifs avec méditation et activité de l'esprit, suivis de douleur de meurtrissure à la tête après le réveil. — Rêves de pre-jets, de feu, de maladies, de morts et de périls. — La nuit, mal aux dents, douleurs aux membres et dans les os, diarrhée, crampes aux mollets et tressaillement de la bouche et des doigts pendant le sommeil.

Pièvre. — *Grande disposition au frissonnement, -et frissons continuels, même à la chaleur de la chambre. — Froid et tremblement, avec tiraillement à la tête, mauvaise humeur et agita-tion, tous les deux jours. — Froid intérieur avec chaleur extérieure. — Chaleur du visage, toutes les après-midi vers les 4 heures, avec nausées et fatigue. - * Sueur diurne étant assis.

- Sueur nocturne.

- *Tristesse hypocondriaque, et idées mélancoliques. Anthropophobie. — *Anxiété, appréhensions et crainte d'une mort prochaine. — Crainte et méssance de l'avenir, avec *découragement et désespoir. - Disposition à prendre tout en mal, à contredire et à se mettre en colòre. — Manières ganches, sottes. — Disposition à rire des choses sérieuses et à garder son sérieux où il y aurait à rire. — • État comme si l'on avait deux volontés dont l'une rejette ce que l'autre exige. — • Manque de sentiment moral (scélératesse, impiété, dureté de cœur, cruauté). — *Envie irrésistible de blasphémer et de jurer. — «Sensation comme si l'esprit était séparé du corps. — Faiblesse

de l'esprit et de la mémoire. — Absence d'idées.

Tête. - Tête embarrassée. - Étourdissements. - Vertiges en marchant, comme si tous les objets étaient trop éloignés ou vacillaient. — Vertiges tournoyants avec obscurcissement des yeux en se baissant. — *Mal de tête à l'occiput par le bruit et à chaque (faux) pas. - Mal de tête avec étourdissement et vertiges, aggravé par le mouvement. - Mal de tête à la suite d'un travail intellectuel, avec douleur de meurtrissure au cerveau ou pression tractive dans le front. - * Douleurs pressives, principalement aux tempes. — Douleurs constrictives à la tête. — Tiraillement dans la tête, principalement du côté droit et souvent jusqu'au visage et au cou, suivi de bourdonnement des oreilles. — Le soir, fouillement dans la tête, disparaissant en s'endormant. — Démangeaison au cuir chevelu.

Yeux. — Pression douloureuse sur les yeux. — Photophobie — Contraction des pupilles. — *Faiblesse et trouble de la vue. Myopie. - • Filets et taches noires devant les yeux. - Auréole

autour de la chandelle, le soir.



ANACARDIUM.

54

Oreilles. — Otalgie lancinante et tiraillante. — Pression douloureuse dans les oreilles.—Douleur d'ulcération dans les oreilles,
principalement en serrant les dents et en avalant. — *Écoulement (brunâtre) par les oreilles. — *Démangeaison dans les
oreilles. — *Dureté de l'oute. — *Bourdonnement et bruissement dans les oreilles. — *Gonflement douloureux de l'oreille.

Mes. — *Épistaris. — *Anosmie. — Odeur continuelle devant le nez, comme de la fiente de pigeons, ou de l'amadou brûlé. — *Obturation du nez, avec sensation de sécheresse dans les narines. — *Coryza et écoulement muqueux du nez, chroniques. — Coryza violent avec fièvre catarrhale, tension aux mollets et aux jambes, et agitation au cœur.

Visage. — Face pale, maladive, avec yeux creux, enfoncés et cernés. — Pression sur les pommettes. — Taches rapeuses, dartreuses et farineuses, autour de la bouche et aux joues, avec démangeaison formicante. — Sensation de brûlure autour du menton.

Dents. — Odontalgie tiraillante, tressaillante, principalement en prenant quelque chose de bien chaud dans la bouche. — Douleurs tensives crampoldes, aux dents jusqu'aux oreilles, le plus souvent le soir vers les 10 heures. — Gonflement et saignement facile des genoives.

Bouche. — *Mauvaise odeur de la bouche, sans s'en apercevoir soi-même. — Lourdeur et gonflement de la langue avec parole difficile. — Langue blanche, rude. — *Accumulation d'eau dans

la bouche. — Sécheresse dans la bouche et à la gorge.

Appétit. — Goût fade de tous les aliments. — Goût amer avec sécheresse de la bouche et de la gorge. — Goût fétide de la bouche. — Soif violente, continuelle, avec étouffement en buvant. — Manque d'appétit. — *Faiblesse de la digestion. — Après le repas : humeur hypocondiaque, chaleur du visage, pression et tension dans la région précordiale, à l'estomac et au ventre; envie de vomir ou d'aller à la selle; répugnance pour le travail; grande fatigue et envie de dormir.

Estomac. — Le soir, pituites de l'estomac, et vomissement suivi d'aigreur dans la bouche. — *Nausées matutinales. — Pression à l'estomac, principalement après le repas, ainsi qu'en méditant et en travaillant de tête. — Le matin, en se réveillant, pression dans la région précordiale. — Élancements au creux de l'estomac, principalement en respirant. — Gloussement et fermentation au creux de l'estomac. — Après le repas, commotion

dans la région précordiale à chaque pas.

Ventre. — *Pression dans le foie. — Coliques dans la région ombilicale, le plus souvent pressives, ou lancinantes obtuses, aggravées par la respiration, la toux et la pression extérieure. — *Dureté du ventre. — Colique flatulente avec pincements et borborygmes dans le rentre, et envie d'aller à la selle.

Selles. - Envie inutile d'aller à la selle. - Sortie difficile, même des selles molles, à cause de l'inertie du rectum. — Selles d'une .,., couleur pâle. — Sortie de sang avec la selle. — «Hémorrhoïdes douloureuses à l'anus. - *Prurit à l'anus. - «Suintement du

Urines. - Evacuation frequente d'une urine claire, aqueuse. Pissement nocturne. Pendant et après l'évacuation d'urine. sonsation de brûlure au gland, ... Urines troubles, couleur d'ar-

Parties viriles. - Érections sans cause, le jour. Prurit voluptueux au scrotum. - Appétit vénérien exalté, ou inexcitable. - Manque de jouissance pendant le coît. Econlement de liqueur prostatique pendant les selles, et après avoir uriné.

Règles. — oFlueurs blanches, avec prurit et excoriation aux parties.

Larynx. — Raucité et sensation d'excoriation dans la gorge, principalement après le repas. Toux avec chatouillement dans la gorge et étouffement. — Toux après le repas, avec vomissement de ce que l'on a pris, ou le soir, au lit, avec congestion de sang à la tête. — Toux ébranlante comme la coqueluche, principale-ment la nuit, ou à force de parler. — *Toux (courte) avec expectoration purulente. - Expectoration de sang avec la toux. - En toussant, clancements à la tête. - Après une quinte de toux,

Poitrine. — Haleine courte et respiration asthmatique. — Oppression de poitrine, avec chaleur intérieure et angoisse qui pousse à chercher le grand air. - Pression et sensation d'excoriation dans la poitrine. - Élancements dans la région du cœur. - oRâlement dans la tranchée artère, étant couché sur le côté gauche. Inquiétude au cœur.

Tronc. - Douleurs au dos et entre les omoplates, pour la plupart tractives et lancinantes ou pressives. - Fourmillement entre les omoplates. — Pression sur les épaules comme par un poids. — Roideur de la nuque.

=-

Bras. - *Faiblesse et douleur tensive su bras. - *Tremblement de la main et du bras. — Douleurs pressives dans les muscles et les os des bras, avec fatigue. — Elancement et pesanteur dans l'avant-bras. — Douleurs crampoides dans les os et les articulstions des mains et des doigts. Sensation de sécheresse aux mains et aux doigts. -Sueur visqueuse à la paume des mains.

Jambes. — Roideur des jambes, comme si elles étaient enveloppées, avec agitation en dedans. — Tremblement, teraillement et tressaillement aux genoux et dans les cuisses, comme après avoir fatigué les jambes par la marche. Pression cadencée dans les cuisses. — Semation de paralysie aux genoux. — Éruption pruritense autour du genou jusqu'aux mollets. — Tressaillements et



ANACARDIUM. -- ANGUSTURA.

pression crampoide aux mollets et aux jambes. - Douleur tensive aux mollets, le jour, en marchant, et la nuit, au lit, avec insomnie. — *Brûlement à la plante des pieds, -et aux jambes. - Froid aux pieds en marchant, particulièrement le matin.

ANGUSTURA.

ANG. - Angusture vraie (écorce du Bonplandia trifoliata). - HAHNEMANN. Hist, nat, et prép. Pharmac. homosop., p. 164. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 4 jours quelquefois. Antidotes : Coll.

NOTION TO SOME COMPARED AVEC : Canth. coff. bruc. carb-an. plat.
N. B. — Les symptômes mis entre deux parenthèses, sont regardés par quelques-uns comme appartenant à la fausse Augusture.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensation de faiblesse et de roideur dans tout le corps. — Roideur et extension des membres. Tension dans les muscles en marchant. — Paralysie de différentes parties. — Tressaillements convulsifs. — Accès de tétanos, provoqués le plus souvent par le toucher, en buvant et par le bruit. Convulsions, se terminant par le bleuissement des joues et des lèvres, respiration difficile et haletante, gémissement, et resserrement des paupières. — Commotion du tronc (comme par des secousses électriques). — Accès (hystérique?) avec envie de vomir, sensation spasmodique dans l'estomac et la poitrine, vertige et sensation de gonflement de la matrice. — Craquement dans les articulations. - Carie, et ulcères douloureux qui attaquent les os et les perforent jusqu'à la moelle. - Douleurs en plusieurs endroits comme par des coups.

Sommeil. — Le soir, grande envie de dormir, suivie d'insomnie avant minuit. — Sommeil agité avec rêves fréquents. — Le soir, au lit, sensation anxieuse, comme si tout le côté gauche était

engourdi.

56

Fièvre. - Horripilation à la partie malade. - Le soir et la nuit,

chaleur avec embarras et douleur à la tête.

Moral. — Caractère peureux et disposition à s'effrayer. — Pusillanimité, et manque de confiance en soi-même. — Mauraise humeur et mécontentement avec grande susceptibilité aux offenses. Excitation extréme et gaieté exaltée. — Distraction et rêve-

ries. — Vivacité de l'esprit, principalement après midi. Tête. — Tête entreprise, et hébétude comme après l'ivresse. — Vertiges à l'air libre, ou en passant sur un courant d'eau. -Vertiges comme si le corps était tourné en arrière. — La tête est tirée en arrière, avec des bâillements qui soulagent. - Après le



ANGUSTURA.

58

avec tranchées. — Douleur pressive et contractive à l'anus, avec gonflement des hémorrhoides. — Brûlement à l'anus pendant la selle.

Parties génitales. — Descente de la matrice, avec élancements, le matin, au lever. — Sensation comme si la matrice se gonflait ou se renversait. — Écoulement d'un liquide laiteux du vagin. — Paraît avoir une forte action sur le système utérin. — Pression dans l'ovaire droit. — Sensation comme si quelque chose de rond était dans le vagin et allait s'ensier. — Boutons pruriteux aux lèvres. — Prurit aux parties, avec grande irritation intérieure; après avoir gratté, il s'écoule du sang, ce qui soulage.

Urines. — Envie fréquente d'uriner, avec évacuation peu abondante, ou évacuation fréquente d'urines abondantes, précédée par une pression sur la vessie et suivie de ténesne. — Urine de couleur orange, et qui ne tarde pas à se troubler. — Prurit violent aux parties génitales.

Larynx. — Enrouement par des mucosités dans les voies aériennes. — Voix faible, timide. — *Toux sèche, avec râlement et grattement dans la poitrine. — Toux violente, profonde, avec expectoration de mucosités jaunâtres.

Poitrine. — Respiration convulsive (intermittente). — Oppression de poitrine, en marchant vite et en montant. — Secousses incisives, ou éluncements dans la poitrine, et dans la région du cœur. — Battemement violent de cœur, étant assis et penché en avant, ou le soir, au lit, étant couché sur le côté gauche. — *Battement de cœur avec angoisse. — Sensation de contraction douloureuse du cœur. — Crampes de poitrine, avec spasmes douloureux des muscles de la poitrine. — Élancements dans le poumon droit, avec sensation comme si le poumon se retournait.

Tronc. — Douleur de meurtrissure dans les muscles de la poitrine, en remuant les bras. — Maux de reins, comme brisés, le plus souvent la nuit, et principalement vers les 4 heures du matin. — Roideur douloureuse à la nuque et entre les omoplates, le matin, au lit. — Opisthotomos. — Prurit violent le long du dos.

Bras. — Bras las et lourds, comme paralysés, avec roideur du coude. — Faiblesse paralytique des coudes et des mains. — Tiraillements crampoides dans les avant-bras, les mains et les doigts. — Froid aux doigts.

doigts. — Froid aux doigts.

Jambes. — Douleur de luxation, ou de crampe à l'articulation coxo-fémorale, aux jambes et aux pieds. — Douleur de courbature aux cuisses et aux jambes, en marchant, comme si elles allaient se briser. — Tension au sacrum et dans la hanche jusqu'au genou, comme si ces parties étaient trop courtes. — Tiraillement pressif dans toutes les parties des extrémités inférieures. — **En posant le pied, douleur à l'articulation du pied qui force à boiter. — Paralysie des articulations des pieds.



ANTIMONIUM.

60

— Éphélides. — Taches hépatiques. — *Ulcères fistuleux.* — *Corps aux pieds et excroissances calleuses. — Ongles décolorés et difformes. — Gonflements rouges et chauds. — Dégénérescence de la peau.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, et *somnolence comateuse principalement le soir ou le matin. — Coma avec délire. — Réveil avec effroi la nuit. — Rêves anxieux, horribles, volup-

tueux, ou pénibles et pleins de querelles.

Fièrre. — *Fièrres intermittentes, avec affections gastriques ou bilieuses, principalement avec dégoût, nausées, romissements, renvois, langue chargée, amertume de la bouche, et soif modérée, diarrhée: tension et pression au creux de l'estomac avec tranchées. - - *Fièrre tierce. -- Sueur chaude. le matin de bonne heure tous les deux jours. -- Pouls irrégulier, tantôt accéléré, tantôt lent. -- °Forte chaleur sous le soleil.

Moral. -- Réflexions tristes sur son sort. — Dégoût de la vie avec tendance à se brûler la cervelle, ou à se noyer. — Disposition à s'effrayer. — *Humeur chagrine, mauvaise humeur. — Les regards et le toucher sont insupportables (à un enfant). — Désirs et amour exaltés. — Esprit obtus, imbécillité. — Manie. —

Démence.

Tôte. — Embarras de la tête, comme après un long travail au froid. — Ivresse. — Vertige arec nausées. — Attaque d'apoplexie avec salivation écumeuse. — Céphalalgie après s'être baigné dans l'eau courante. — Céphalalgie avec étourdissement, par la fumée du tabac. — Sensation comme si le front allait éclater. — Douleur sourde dans le sinciput et le vertex, augmentée en montant un escalier. — Douleur crampoide dans la tête, améliorée par la marche au grand air. — Douleur térébrante dans le front et dans les tempes. — *Congestion à la tête, douloureuse et suivie d'épistaxis. — Douleur ostéocope au vertex comme par un gonfiement du périoste. — *Démangeaison incommode à la tête, avec chute des cheveux.

Youx. — Élancement dans les yeux. — *Paupières rouges, enflammées. — Inflammation des yeux, avec démangeaison et agglutination nocturne des paupières. — Léger suintement de la peau près de l'angle externe de l'œil. — Chassie dans les angles des yeux. — Agrandissement des yeux. — Sensibilité des yeux

à la lumière du jour. — Cécité.

Oreilles. — Élancement dans les oreilles. — Rougeur, gonfiement et chaleur de l'oreille. — Fouillement et bruissement dans les oreilles. — Surdité, comme si on avait un bandeau sur l'oreille.

-- Bourdonnement dans les oreilles.

Hes. — Éruption au nez. — *Excoriation des narines et des coins du nez. — Narines gercées et croûteuses. — *Obturation du nez. — Saignement de nez, surtout le soir. — Sécheresse du nez, principalement en se promenant au grand air. — Accumula-



ANTIMONIUM.

62

Selles. — Évacuation difficile de selles dures. — Envie pressante d'aller à la selle. — Selles de consistance de bouillie. — *Diarrhées avec tranchées, généralement aqueuses. — *Sécrétion continuelle de nucosités blanc jaunâtre par l'anus. — Écoulement d'un sang noir par l'anus. — Boutons hémorrhoïdaux aveugles et fluents, avec brûlement et fourmillement. — Démangeaison brûlante et gerçures à l'anus. — Pression expansive dans le rectum et l'anus. — Furoncle brûlant au périnée.

Urines. — Envie fréquente d'uriner, avec émission peu abondante. — *Émission fréquente et abondante d'urine, °avec écoulement abondant de mucosités, brûlement dans l'urèthre, et maux de reins. — En toussant, émission involontaire des urines. — Urines aqueuses, ou de couleur dorée, ou brun rougeatre et quelquefois mêlées de petits corpuscules rouges. — Douleur incisive dans l'urèthre, en urinant. — °Gravelle.

Parties viriles. — Excitation de l'appétit vénérien et grande lascivité. — Pollutions. — *Atrophie des testicules; douleurs dans

les testicules.

Règles. - Métrorrhagies. - Écoulement acre et corrosif par le

vacin

Larynx. — Forte chaleur dans la gorge, pendant le mouvement au grand air. — Grande faiblesse ou perte entière de la voix, principalement en s'échauffant. — Sensation d'un corps étranger dans le larynx, avec impossibilité de l'expectorer. — Spasme violent au larynx, avec sensation d'excoriation. — Toux avec brûlement dans la poitrine. — Toux matutinale, sèche et ébranlante.

Poitrine. — Oppression étouffante, et orthopnée paralytique. — Respiration profonde et suspirieuse. — Élancement dans la poitrine, pendant le temps et hors de la respiration. — Douleur de contusion dans le grand pectoral, en levant les bras et en pressant

dessus.

Tronc. — Traction crampoïde dans les muscles du cou et de la nuque. — Douleurs rhumatismales à la nuque. — Miliaire à

la nuque, aux omoplates, et derrière les oreilles.

Bras. — Douleurs rhumatismales dans les bras. — Vésicules rougeatres au bras avec démangeaison. — Inflammation douloureuse des tendons du coude, avec forte rougeur et courbure du bras. — *Gonflement chaud et rouge de l'avant-bras, avec tension lancinante. — Traction dans l'avant-bras, les doigts et les articulations des doigts. — Douleurs arthritiques dans les articulations des doigts. — Sensibilité douloureuse de la peau sous les ongles, et croissance lente de ceux-ci.

Jambes. — Tiraillement dans les membres inférieurs, surtout dans l'articulation coxo-fémorale. — Bosses avec auréole rouge, aux fesses et aux jambes. — °Douleurs violentes aux extrémités inférieures. — *Engourdissement des jambes après être resté assis. — Douleur lancinante au genou et au tibia. — Roideur



APIS MELLIFERA.

Dysurie; Strangurie; Cystite; Albuminurie; Diabète sucré; Gonorrhée. — Affections des oraires, telles que douleurs, inflammations, hypertrophies, tumeurs, hydropisie de ces organes; Hypertrophie de la matrice; Hydropisie de l'utérus; Souffrances menstruelles; Tumeurs et Névralgies de la vulve; Avortements imminents; Métrorrhagie; Hystérie; Squirre des seins. — Edème du larynx; Pleurésies; Hydrothorax; Péricardite; Hydropisie du péricarde. — Panaris; Gonstement du genou; Podagre.

Voir la note, page 15.

64

SYMPTOMES GENERAUX. — Nodosités pruriteuses dans les articulations. — *Sensibilité extrême des parties musculaires à la moindre pression. — *Irritabilité et inquiétude. — Faiblesse avec tremblement. — *Lassitude pénible, débilité et grande fatique; débilité et faiblesse ayant leur siège dans les centres ganglionnaires. — Epuisement, surtout dans le dos, comme après des travaux pénibles. — Prostration qui force à se coucher à plat par terre. — Faiblesse, surtout dans le dos. — Accès de faiblesse avec vertiges. — Défaillance avec pâleur, froid, vomissement et diarrhée. — Sensibilité excessire au toucher et à la pression extérieure. — La chaleur, surtout celle de la chambre fermée, aggrave les souffrances; l'eau froide soulage les douleurs, les tuméfactions et les sensations brûlantes; horreur de l'air froid. -La position couchée aggrave plusieurs souffrances, qui s'améliorent dans la position redressée; la marche et le mouvement améliorent beaucoup de souffrances, voire même les accidents les plus graves. — Le soir, s'aggravent ou apparaissent principalement : la toux, les frissons, la cludeur, les vertiges, la céphalalgie, les douleurs oculaires, les maux de dents, les coliques et l'enrouement. - La nuit, souffrances aux yeux et dans la poitrine; vers le matin, diarrhée avec ténesme, coliques, mucosités dans la bouche, maux de tête, frissons, agitation plus grande. --- *Etat convulsif pendant les couches.

Peau et Phénomènes extérieurs. — Prurit violent, lancinant, comme par des épingles ou des insectes, revenant après le mouvement; prurit sur de petites places circonscrites; prurit nocturne, empêchant de dormir; prurit brûlant, lancinant, insupportable, et qui met en colère. — *Tuméfactions arec violentes douleurs lancinantes; *enflures d'un rouge vif.avec stries rouges le long des membres; gonflement de la peau, rouge pâle, comme avec bouffissure, se répandant plus loin en surface; oummeures plates, brûlantes, lancinantes, dures, rouges ou blanches, ou l'un et l'autre à la fois; opetits boutons très-sensibles, avec douleurs brûlantes et lancinantes; célancements dans les éruptions. — oFu-



APIS MELLIFERA.

66

chaude, amélioration en comprimant la tête des deux mains; *douleurs de tête jusqu'à travers les yeux, autour et au-dessous des yeux; ºaccès de migraine dans le front, les tempes et au-dessus des yeux. - Tiraillements, tension, clancements brûlants, prurit et picotement au cuir chevelu. - Hydrocephale immi-

nente.

Yeux. - *Frémissement et palpitation du globe de l'ail (gauche), surtout la nuit; pesanteur, plénitude, pression, dans les yeux et les paupières; *térébration, élancements et douleurs comme des coups dans les yeux; *douleur incisive, brûlement et rougeur des yeux; prurit lancinant dans les yeux, les paupières et les alentours des yeux; prurit et cuisson dans les yeux et autour, aux paupières et dans les angles. - *Larmoiement, rougeur et brûlement des yeux; larmoiement, pendant l'inquiétude morale, la nuit, pendant le mal de tête, et avec la photophobie, le brûlement et la rougeur des yeux; sensation comme s'il y avait des mucosités dans l'œil. - *Agglutination des paupières; *paupières enflammées, rouges et gonflées ; *inflammation violente des yeux, avec rougeur et fortes douleurs; *gonflements œdémateux, érysipélateux et autres, autour des yeux. - *Excoriations des bords des paupières et des angles des yeux; orgeolets; oinflammation, épaississement et obscurcissement de la cornée; ostaphylome. - *Photophobie, surtout pendant les souffrances des yeux ou les maux de tête. - Vue incertaine.

Oreilles. - Oreilles brûlantes, avec tension autour; ogonflement

rouge des oreilles. - Grande sensibilité au bruit,

Nez. — Nez rouge et gonflé; prurit et endolorissement du nez. Coryza, avec sensation de gonflement du nez, sécheresse de la bouche et lèvres brûlantes; éternument suivi de pression dans le

synciput et de vertiges.

Face. - *Face pâle; *couleur livide, bleu rougeatre. - Chaleur et rougeur de la face, avec sensation de plénitude, désir de lotions froides et élancements brûlants; *gonflement de la face avec tension et rougeur; *érysipèle de la face. - Picotement et fourmillement à la figure. - Lèvres douloureuses, jusqu'aux gencives et à la tête; lèvres comme contusionnées, ou comme gonflées; picotement, tension, douleur brûlante et gerçures aux lèvres; gonflement et renversement des lèvres; ocancer aux lèvres?. Serrement saccadé de la machoire inférieure.

Dents. — Maux de dents jusque dans la tête; secousses et tres-

saillements dans les molaires supérieures gauches.

Bouche. - *Cavité buccale sensible, comme si elle était brûlée; *sécheresse de la bouche et de la gorge, ofétidité de la bouche. Salivation; salive visqueuse, écumeuse. — *Langue comme brûlée, surtout au bord ; vésicules au bord de la langue, surtout à gauche, avec excoriation, élancements et brûlement; *sécheresse, rougeur ardente, élancement brûlant, gonflement et in-



APIS MELLIFERA.

portable et gonfiement à l'anus; odouleurs insupportables, lancinantes, térébrantes, dans les boutons hémorrhoïdaux; suinte-

ment sanguinolent de l'anus, qui est gonfié.

Urines. — Miction plus abondante, jour et nuit; envie fréquente d'uriner. — Impossibilité d'uriner, ou très-peu d'urine à la fois, avec fortes douleurs; *urines rares, fortement coloriées. — Brûlement et cuisson dans l'urèthre, comme à la suite d'une brûlure.

Parties viriles. - Inquiétude dans les cordons spermatiques. -

Appetit vénérien exalté.

68

Parties de la femme. — Règles intermittentes, cessant et reparaissant alternativement; *menstrues douloureuses. — Métrorrhagie avec avortement; avortement très-facile. — *Gonflement des lèvres de la vulve. — *Pression vers le bas, dans la région de la matrice, comme pour les règles. — *Douleur sécante, élancement dans les ovaires, particulièrement comme après avoir leve une charge trop lourde; agonflement, induration et hypertrophie des ovaires. — Douleurs brûlantes et lancinantes dans les mamelles squirreuses.

Larynx et Toux. — Enrouement, avec sensibilité douloureuse du larynx; grattement dans la gorge et sécheresse. — Toux, avec chatouillement derrière la fossette du cou, le soir; toux avec céphalalgie, avant minuit, au lit, après avoir dormi; toux qui cesse dès qu'il se détache la moindre mucosité; *toux rauque, ocomme dans le croup, avec respiration pénible et fièvre.

Poitrine et Respiration. — *Respiration pénible, avec constriction de la gorge; *respiration accélérée, surtout pendant le mouvement, en montant les escaliers et en marchant, parfois avec chaleur et mal à la tête, ou avec envie de dormir; sensation comme si l'haleine allait faire défaut. — *Les chambres chauffées sont insupportables. — *Plénitude dans la poitrine, forçant à se mettre sur son séant; douleurs de poitrine à gauche, près du sternum; élancements, surtout dans le côté gauche; *douleurs d'excoriation et de meurtrissure, comme après une contusion, surtout aux dernières côtes et le plus souvent à gauche; froid dans la poitrine; *chaleur dans la poitrine. — "Hydrothorax, dans beaucoup de cas. — *Douleurs dans la région du cœur, lancinantes et empêchant la respiration.

Tronc. — Roideur dans les reins. — Douleurs au dos, sous les omoplates, plus fortes pendant le mouvement; oéruption au dos comme des piqures de cousins. — Douleur tensive à la nuque, depuis l'épaule jusqu'à la tête; odartre annulaire à la nuque. — Elancements à la nuque, à droite, en tournant la tête de ce côte.

- *Glandes engorgées au cou.

Membres thoraciques. — Douleurs tiraillantes depuis l'épaule jusque dans le bout des doigts. — Engourdissement surtout du bras gauche; *gonflement œdémateux du bras droit. — Brûlement et élancements aux mains; rougeur, chaleur et gonflement des



ARGENTUM FOLIATUM.

70

avocats, des prédicateurs et en général des personnes qui sont obligées de parler longtemps sans discontinuer. Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Pression crampoïde, tiraillante, principalement dans les membres et les os. — Douleur de brisement, principalement dans le sacrum et les articulations des membres inférieurs. — Abattement et sensation de brisure, surtout le matin et particulièrement après le réveil. — Sensation d'excoriation de la peau et des organes internes. — Sensation d'engourdissement et de roideur dans les membres. — Attaques d'épilepsie. — Sensation de commotions électriques surtout dans les membres du côté gauche. — Exacerbation des symptômes tous les jours après midi. — Démangeaison brûlante à diverses parties de la peau, et prurit ou picotement, comme par des puces ou des étincelles électriques. — Éruption boutonneuse, avec douleur brûlante d'excoriation. — Sommeil agité avec rêves anxieux et terribles. — Horripilation et froid, surtout après midi et la nuit. — Sueur nocturne. — Inquiétude qui force à marcher vite. — Mauvaise humeur et aversion pour la parole. — Idée fixe que l'on allait être frappé d'apoplexie.

Tête. — Hébétude et sensation de vacuité dans la tête. — Obscurcissement comme par de la fumée, et sensation d'ivresse avec fourmillement dans la tête. — Vertige avec obscurcissement de la vue ou avec assoupissement et chute des paupières. — Douleur tractive et pressive à l'occiput, comme causée par un corps étranger, avec sensation de roideur dans la nuque. — Douleurs tractives semi-latérales, comme dans le fond du cerveau. — Pression engourdissante au sinciput. — Accès de compression dans le cerveau, avec nausées et brûlement à l'épigastre en lisant et en se tenant debout. — *Douleurs crampoïdes et élancements dans la tête. — Douleur d'excoriation au cuir chevelu, à la plus légère pression. — Douleur ostéocope, crampoïde et pressive, dans la tête. — Tressaillement douloureux dans les muscles des tempes et du front. — Boutons aux tempes, avec douleur d'ulcération.

Yeux. — Prurit aux yeux et principalement dans les angles. —

Gonflement et rougeur du bord des paupières.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, avec douleur incisive qui s'étend jusqu'au fond du cerveau. — Prurit rongeant à l'oreille extérieure, lequel porte à se gratter jusqu'au sang. — Sensation d'obturation des oreilles. — Violents élancements et tiraillements dans la fossette derrière le lope de l'oreille.

Nez. — Epistaxis après s'être mouché, ou précédée de fourmillement et de chatouillement dans le nez. — Obturation du nez, avec démangeaison dans les narines. — Violent coryza fluent,



petite place répandant une sensation de froid. — ⁶Sensation comme d'une petite écorchure dans le larynx, aux environs de la fossette du cou, plus forte en parlant et en chantant. — Accumulation de mucosités dans la tranchée-artère, qui se détachent lorsqu'on se baisse, qu'on rit, ou qu'on monte un escalier, et qui s'expectorent facilement. — Accumulation abondante de mucosités dans la poitrine. — Toux excitée par une douleur incisive dans la trachée-artère, avec expectoration de matières séreuses. — Accès de toux courte et râlante, le jour, avec expectoration facile de matières épaisses et blanchâtres. — Toux excitée par le rire; ⁶pendant la toux, sensation comme si la gorge était au vif.

Poitrine. — Pression à la poitrine. — Pression et élancements dans le sternum et aux côtés. — Douleurs incisives dans les côtés de la poitrine, en inspirant et en se penchant en avant. — Douleurs crampoïdes dans les muscles de la poitrine et dans les côtés. — Palpitations spasmodiques fréquentes, surtout étant couché

sur le dos.

72

Tronc. — Douleurs de brisement, ou de tiraillement aux reins. —

Douleurs crampoïdes dans les épaules et les omoplates.

Bras. — Tension et tiraillements aigus, crampoïdes et pressifs, dans les bras et les mains. — Douleurs crampoïdes et pressives, dans les os et dans les articulations des mains et des doigts. —

Contraction des doigts.

Jambes. — En marchant, douleur lancinante, pressive et comme paralytique, à l'articulation coxo-fémorale. — Tressaillement des muscles des cuisses. — Douleurs crampoïdes, aiguës et incisives, dans les genoux et les malléoles. — Crampes dans les mollets, avec sensation de raccourcissement des muscles, en descendant un escalier. — Douleur de brisement et pulsation dans les articulations du pied. — Douleurs crampoïdes dans les os et dans les articulations des pieds et des orteils. — Sensation d'engourdissement dans le talon et au tendon d'Achille.

ARGENTUM NITRICUM.

ARG-N. — Nitrate d'argent. — Journal de Vienne. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 79. — Durée d'action?.

ANTIDOTES: Ars, nair-m.

COMPARER AVEC : Ars. aur. chin. iod. merc. natr-m. phosph. puls. rhus. stann. zinc.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on a principalement employé ou recommandé ce médicament contre les affections suivantes : Tremblement nerveux; Épilepsies; Catalepsie; Danse de Saint-Guy;



Intellect et Cerveau. — Vertiges tournoyants, comme dans un cercle. — Vertigés avec céphalalgie, nausées, cécité et bourdonnement d'oreille. — Ivresse vertigineuse et étourdissement. — Vertige avec défaillance. — Stupidité et incapacité de méditer, avec manque d'expressions convenables. — Démence avec sourires niais, manières imbéciles et visions de grimaces en fermant les yeux pendant le jour. — Embarras confus de la tête, avec

endolorissement, surtout après avoir pris du café.

Tôte. — Pesanteur et plénitude douloureuses dans la tête, particulièrement aussi le matin, en s'éveillant. — Céphalalgie comme si la tête allait se fendre, à la suite d'efforts intellectuels. — Senation d'un souffle frais qui paraît traverser le cerveau. — Déchirement semi-latéral dans la tête, depuis le front jusqu'à la face, et lœil gauche, avec larmoiement, rougeur et brillement de l'œil. — La plupart des maux de tête se manifestent d'un seul côté et principalement à droite. — Congestion forte à la tête, avec pulsation des carotides, mélancolie, stupeur et inaptitude à la méditation. — *Céphalalgie continuelle. — Le grand air augmente les maux de tête; la compression de la tête par un bandeau les soulage. — La plupart des maux de tête, sont accompagnés de frilosité.

Cuir chevelu. — Beaucoup de prurit au cuir chevelu, avec démangeaison et fourmillement, comme par des poux. — Papules enfiammées et suintantes à la tête, avec prurit violent et douleurs d'exceriation. — Élevures comme des bosses au cuir chevelu et à .

la nuque, avec prurit.

74

Yeux. — Inflammation des yeux, avec pression, mucosités qui forcent à s'essuyer les yeux, rougeur écarlate, ramollissement de la conjonctive, vue trouble et rétrécissement de la fente des paupières. — Agglutination nocturne des yeux. — Accumulation abondante de mucosités dans les yeux. — Angles des yeux couleur rouge de sang, avec gonflement de la glande lacrymale, comme un morceau de chair rouge, et formation d'un faisceau de veines procédant des angles. — Conjonctive rouge, et boursoufiée. — Amélioration de l'ophthalmie à l'air libre et frais; douleurs insupportables à la chaleur de la chambre. — Lippitude. — Accès de cécité subite, au crépuscule, avec plaintes à haute voix. — Scotomie fréquente et confusion des lettres en lisant et en écrivant. — Presbyopie en lisant. — Cornée trouble, avec une tache blanche dessus.

Oreilles. — Otalgie. — Son de cloches, tintement et bourdonnement dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe et occlusion fréquents des oreilles.

Nez. — Douleur de meurtrissure aux os du nez. — Prurit violent, continuel, dans les narines, forçant à se gratter jusqu'au sang. — Mouchement de sang et de mucosités sanguinolentes, purulentes. — Croûtes douloureuses, saignantes, dans le nez. —

Odorat émoussé. - Obturation du nez avec beaucoup de l - Eternument frequent, - Coryza avec frissons, manyaise larmoiement, éternument et cephalalgie stupéfiante forçan coucher.

· dan hours =

men-

m- :--

T÷. 、

3.

Visage. - Face creuse, pale, bleuatre. - Air maladif, vieill Déchirement et tiraillement d'un côté de la face. — Convuldes muscles de la face, avec serrement de la machoire. Gor ment de la levre superieure, au-dessous du nez. — Nodos enflammées et pustules aux levres et aux coins de la bouche. Lèvres bleuâtres.

Dents. - Grande sensibilité des dents à l'eau froide. - Maux dents surtout pendant la mastication et au contact des clus froides ou acides. Exfediation des dents. — Gencives déce

Bouche. - Sécheresse de la langue, surtout le matin. - Langu chargee d'un enduit bleuatre ou jaune grisatre. Langue ra peuse, par érection des papilles. — Gonflement de la langue avec douleur d'excoriation. — Fétidité de la bouche, le matin.

Beaucoup de salive visqueuse dans la bouche. — Parole difficile Gorge. - Rougeur foncée de l'arrière-bouche et de la luette. Excoriation, sécheresse râpeuse et douleur d'excoriation dans la gorge. — Douleur comme une écharde dans la gorge, en avalant. Accumulation abondante, dans la bouche et la gorge, d'un mucus épais et visqueux, avec renaclement continuel. — Crampe et étranglement dans la gorge. - Crampe dans l'asophage,

avec envie douloureuse de rendre des rapports, douleur d'esto-mac, nausées, défaillance et accumulation d'eau dans la bouche. mac, nausees, defantance et accumulation d'eau dans la bouche.

Appétit et Goût. — Goût amer de la bouche, quelquefois astringent ou métallique, ou pâteux et fade. — Perte de l'appétit; le manger n'a pas plus de saveur que la paille. — Désir de fromage fort ou de sucre. — Grande faiblesse de digestion avec sensation

Gastroses. - Rapports d'air fréquents et violents, accompagnant presque toutes les autres souffrances. — Nausées et dégoût continuels, jusqu'à la défaillance. — Vomissements qui teignent le linge en noir. — Vomissements avec angoisse, diarrhée et coliques

Estomac, — Pression douloureuse à l'estomac, particulièrement la nuit aussi, comme par une pierre, et suivie de vomissement. Sensation de plénitude comme si l'estomac allait crever. — Gastralgie, parfois avec frissonnement interne et manvaise mine, on dérangeant surtout le sommeil de nuit. — Brûlement et cramponnement dans l'estomac, ou rongement et douleur d'excoriation. Inflammation, ulcération et ramollissement de la muqueuse de l'estomac. Ventre. — Pression et plénitude dans la région du foie. — Élance-



76

ments dans le foie et la région splénique. — Tiraillements pressifs dans le ventre, comme par une ascite. — Douleur d'excoriation et d'ulcération dans le ventre. — Sensation d'une boule montante. — Coliques crampoïdes. — Sortie fréquente de vents, minimale en le company de tous les expunsions.

suivie de soulagement de tous les symptômes.

Anus et Selles. — Selles diarriéiques muqueuses, verdâtres et très-fétides. — Diarrhées jaunâtres, d'odeur putride. — Après avoir mangé du sucre, diarrhée nocturne, aqueuse, avec beaucoup de borborygmes et de gargouillements. — Diarrhées muqueuses et sanguinolentes, avec grande débilité. — Ulcération des intestins, phthisie intestinale. — Beaucoup de prurit à l'anus, forçant à se gratter jusqu'au sang. — Sortie d'ascarides et de morceaux de ver solitaire.

Urines. — Envie fréquente avec émission abondante d'une urine d'un jaune pâle. — Pissement nocturne fréquent. — Sensation comme si l'urèthre était bouché par gonfiement, avec émission de quelques gouttes après avoir uriné. — Sensation de rétrécissement du méat urinaire, en urinant. — Douleur d'excoriation en urinant, et en dehors du temps de la miction. — Inflammation et gonfiement de l'urèthre avec écoulement muqueux, priapisme, miction sanguinolente et fièvre. — Hématurie.

Parties viriles. — Ulcères semblables au chancre, au prépuce. — Hypertrophie et dureté du testicule droit. — Pollutions fréquentes. — Manque de désirs sexuels et parties génitales racornies.

Parties de la femme. — Règles plus abondantes, avec meux de reins et douleurs dans les aines. — Métrorrhagies. — Avortement. — Engorgement vultueux des glandes mammaires, avec douleur d'excoriation.

Larynx. — Sifflement dans le rhythme du pouls, dans le larynx, après le repas, dans la position couchée. — Enrouement nocturne, avec expectoration de mucosités sanguinolentes, après quelques coups d'une toux sèche. — Toux excitée par un chatouillement dans la gorge. — La fumée de tabac est insupportable pendant la toux. — Toux avec vomissements la nuit. — Toux suffocante, après midi. — Excitation persistante à la toux, avec hémoptysie et oppression.

Poitrine. — Oppression avec soupirs. — Dyspnée avec angoisse. — Accès de suffocation. — Pression et pesanteur dans la poitrine. — Palpitations violentes, particulièrement la nuit ansi, ou avec nausées et défaillance.

Tronc. — Douleurs dorsales, nocturnes, avec tension et serrement. — Maux de reins violents, comme par luxation, le matin, soulagés par la station et la marche. — Pesanteur paralytique dans la région lombaire jusqu'à l'articulation coxo-fémorale. — Endolorissement des glandes axillaires.

Extrémités supérieures. — Douleur ostéocope nocturne dans le



ARNICA MONTANA.

ANTIDOTES: Camph. ign. — On l'emploie comme antidote de : Amm. chin. cic. fer. ipec. seneg. — Le vin en aggrave les effets.

COMPARER AVEC: Acon. amm. ars. bell. bry. cann. caps. cham. chin. cic. cin. coloc. euphras. fer. hep. ign. ipec. merc. natr. n-vom. puls. rhus. rut. samb. sabin. seneg. staph. sulf-ac. veratr. — C'est surtout après acon. ipec. veratr. que l'arnica sera souvent d'une grande utilité, lorsqu'il est indiqué. — Après l'arnica, conviennent quelquefois: Acon. ipec. rhus. sulf-ac.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas ou l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections surtout des personnes pléthoriques à fuce rouge; ou bien des personnes lymphatiques ou épuisées, à face pale, jaunatre, terreuse; Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement inflammatoire et érysipélateux des parties affectées; Atrophie des ensants?; Affections par suite de lésions mécaniques (chute, commotion, coups, etc.); Blessures, principalement par des instruments obtus; Morsures; Excoriations; Ecorchure des malades alités; Contusions; Luxations; Entorses et fractures; Accidents par suite d'un tour de reins; Épilepsie par suite de lésions mécaniques?; Trismus; Tétanos; Convulsions traumatiques; Sugillations; Piqures d'insectes; Furoncles; Cors (par application extérieure après les avoir extirpés); Cachexie par l'abus du quinquina; Paralysie apoplectique; Fièvre intermit-tente; Fièvre traumatique; Fièvre typhoide?; Alienation mentale; Congestion cérébrale, avec vertiges et perte de connaissance; Apoplexie sanguine; Céphalalgie congestive; Céphalalgie nerveuse; Migraine?; Commotion du cerveau et de la moelle épinière; Hydrocephale aigue?; Ophthalmie traumatique; Hémor-rhagies du nez et de la bouche; Odontalgie avec gonflement de la joue; Hématémèse; Splénalgie; Coliques, surtout celles provenant d'un tour de reins; Péritonite puerpérale?; Diarrhée; Lientérie?; Gonflement inflammatoire des testicules; Hématocèle; Douleurs après l'accouchement; Inflammation des parties génitales, par suite d'un accouchement laborieux; Inflammation érysipélateuse des mamelles, et excoriation des mamelons; Coqueluche?; Grippe?; Pleurodynie; Pleurésie?; Hémoptysie; Gonflement inflammatoire des articulations, principalement des genoux et des pieds; Tumeur blanche?; Podagra, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tiraillement aigu, ou picotement formicant, ou douleurs paralytiques et sensation de meurtrissure dans les membres et les articulations, ainsi que dans les parties lésées. — *Douleurs de luxation. — *Douleurs rhumatismales et arthritiques, — Inquiétude dans les parties malades,



ARNICA MONTANA.

80

chant. — *Vertiges avec nausées. — *Maux de tête pressifs, principalement au front. — *Compression crampoïde au front, comme si le cerveau était contracté en masse dure, principalement près du feu. — Douleur comme si un clou était enfoncé dans le cerveau. — *Tiraillements tressaillants et élancements dans la tête, principalement aux tempes. — Douleur incisive à travers la tête. — *Douleur à la tête au-dessus d'un œil, avec vomissement verdâtre (après un tour de reins). — *Chaleur et ardeur à la tête, avec absence de chaleur au corps. — Pesanteur et faiblesse de la tête. — Aggravation et apparition des douleurs de tête principalement en marchant, en montant, en méditant et en lisant, *ainsi qu'après le repas. — Fourmillement au vertex. — Fixité et immobilité du cuir chevelu.

Yeux. — *Douleur d'excoriation aux yeux et aux paupières, avec difficulté de les remuer. — °Yeux rouges, enflammés. — Brûlement aux yeux et écoulement de larmes brûlantes. — °Paupières gonflées, ecchymosées. — *Pupilles contractées. — *Yeux ternes, troubles et abattus. — *Yeux proéminents, ou °à moitié fermés. — Regard fixe, anxieux. — °Obscurcissement de la vue.

Oreilles. — Douleur de contusion aux oreilles. — Tiraillement aigu dans les oreilles. — Élancement dans et derrière les oreilles. — Dureté de l'ouïe et bourdonnément devant les oreilles.

Nez. — Douleur de contusion au nez. — Fourmillement dans le nez. — *Nez gonflé °et ecchymosé. — *Hémorrhagie nasale. —

Narines ulcérées. - Coryza avec brûlement au nez.

Visage. — *Face pâle, creuse, cou jaune et bouffie. — Chaleur au visage suns chaleur du corps. — *Gonflement dur, rougeur luisante et chaleur d'une joue avec douleur pulsative. — Four-millement autour des yeux, aux joues et aux lèvres. — Éruption pustuleuse au visage, principalement autour des yeux. — *Sécheresse, chaleur brûlante, gonflement et gerçure des lèvres. — Ulcération des coins de la bouche. — État paralytique de la mâchoire inférieure. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires et de celles du cou. — Trismus avec bouche fermée.

Dents. — Mal aux dents avec gonflement de la joue et fourmillement aux gencives. — Tiraillement aux dents en mangeant. —

Vacillement et allongement des dents.

Bouche. — Sécheresse de la bouche avec soif. — Salive sanguinolente. — Sensation d'excoriation et démangeaison à la langue, — *Langue sèche ou charqée d'un enduit blanc. — *Le matin.

odeur putride de la bouche.

Gorge. — Sensation comme s'il y avait quelque chose de dur dans la gorge. — Déglutition empêchée par une espèce de nausée. — Bruit pendant la déglutition. — Brûlement dans la gorge, avec anxiété comme par une chaleur intérieure. — Mucosités amères dans la gorge.

Appétit. - *Goût putride ou amer ou glaireux. - Soif d'eau, ou



ARNICA MONTANA. - ARSENICUM ALBUM.

ં ચ્યુ

tion au larynx. — Toux la nuit pendant le sommeil. — Accès de toux s'annonçant par des pleurs, et *toux chez les enfants après avoir pleuré et sangloté par caprice et méchanceté. — Même les bàillements provoquent la toux. — *Toux avec expectoration sanguinolente; ele sang est clair, écumeux, mêlé de masses coagulées et de mucosités. — eMême sans toux, expectoration d'un sang noir coagulé, après chaque effort corporel. — *Impossibilité d'expectorer les mucosités; il faut avaler ce que la toux a détaché. — En toussant, élancement à la tête, ou douleur de meurtrissure à la poitrine.

Poitrine. — *Respiration courle, haletante, *difficile et anxieuse.

— Ralement dans la poitrine. — *Oppression de la poitrine et gêne de la respiration. — Souvent respiration lente et profonde.

— *Haleine d'une odeur putride. — *Elancements dans la poitrine et les côtés, avec gêne de la respiration, aggravés en toussant, en respirant profondément et par le mouvement. — *Douleurs de meurtrissures et compression de la poitrine. — Battement et palpitations de cœur. — *Points douloureux au cœur avec accès de défaillance.

Tronc. — Douleurs de meurtrissure et de luxution au dos, à la poitrine et aux reins. — Fourmillement au dos. -- Faiblesse des muscles du cou; la tête tombe en arrière. -- Gonfiement douloureux des glandes du cou.

Bras. — Douleur de courbature et fourmillement aux bras et aux mains. — Douleurs de luxation dans les articulations des bras et des mains. — Tressaillement dans les bras. — Veines gonfiées aux mains, avec pouls plein et fort. — Manque de force dans les mains en saisissant quelque chose. — Crampes aux doigts.

Jambes. — Douleur de courbature ou de luxation, ou tiraillement aigu dans les différentes parties des membres inférieurs. — *Faiblesse douloureuse, paralytique, dans les articulations, principalement de la hanche et du genou. — Manque de force au genou, avec fléchissement en marchant. — Tension au genou, comme par raccourcissement des tendons. — Gonflement pâle du genou. — *Gonflement inflummatoire, érysipélateux des pieds, avec endolorissement et aggravation des douleurs par le mouvement. — *Gonflement chaud, douloureux, dur et luisant des gros orteils. — Fourmillement aux pieds.

ARSENICUM ALBUM.

ARS. — Arsenic. — HAMNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 80. — Doses usitées: 50, 40. — Durée d'action : 36 à 40 jours, dans quelques affections chroniques.

Antidotes : Chin. fer. hep. ipec. n-vom, samb, veratr. — Contre l'empai-




glaces, des acides, etc.; Mal de mer; Souffrances par suite d'un bain de mer; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Hématémèse; Vomissement des ivrognes et des femmes enceintes; Affections gastriques et bilieuses; Melæna; Gastrite aiguë; Squirre de l'estomuc?; Cholérine; Choléra asiatique; Souffrances à la suite du choléra; Coliques; Coliques spasmodiques; Carreau des enfants; Ascite: Bubons scrofuleux; Diarrhées, même celle des cufants pendant la dentition, et celles à la suite de la petite vérole; Dyssenterie; Lientérie?; Souffrances hémorrhoïdales; Inflamma-tion du rectum; Ischurie; Paralysie de la vessie; Dysurie; Inflammation et gonflement des parties génitales; Erysipèle au scrotum?; Papules au scrotum; Aménorrhée; Flueurs blanches; Cancer et squirre de l'utérus?; Nausées et vomissement des femmes enceintes: Grippe; Laryngites aiguës et chroniques; Coqueluche?; Hémoptysie?; Symptômes phthisiques; Hydrothorax; Affections asthmatiques, Asthme spasmodique. Asthme de Millar?; Angine de poitrine : Affections organiques du cœur ; Notalgie: Sciatique? ; Ulcères aux jambes; Tumeur blanche?; Inflammation phlegmoneuse des pieds; Coxalgie; Ongles décolorés; Goutte aux pieds; Rhagades aux mains.

Voy. la note, page 15.

84

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Accès de souffrances avec anxiété, froid, chute rapide des forces, et besoin de se coucher. - *Brdlement principalement dans l'intérieur des parties affectées, ou douleurs vives et tractives. - *Douleurs nocturnes qui sont ressenties même pendant le sommeil, et qui sont tellement insupportables qu'elles portent au désespoir et à la fureur. - *Ag-. gravation des souffrances en entendant parler, ainsi qu'après le repas, le matin en se levant, le soir au lit, en se couchant sur la partie affectée, ou pendant le repos, après les exercices prolongés; soulagement par la chaleur extérieure, ainsi qu'en restant debout, ou par la marche et le mouvement du corps. — *Apparition des souffrances par intermittence ou accès périodiques. -*Gonflement œdémateux, avec douleur brûlante aux parties affectées. — Grande paresse et horreur de tout mouvement. *Manque de force, faiblesse excessive et asthénie complète jusqu'à la prostration, quelquefois eavec paralysie de la machoire inférieure, yeux ternes et enfoncés, et bouche ouverte. - *Chute rapide des forces, et sensation de faiblesse comme par manque de nourriture. - *Impossibilité de marcher, et besoin de rester couché. — *Étant couché, on se sent plus fort, mais dès qu'on se lève, on tombe de faiblesse. - *Amaigrissement et atrophie de tout le corps avec sueurs colliquatives, grande faiblesse, face terreuse et yeux enfoncés et cernés. - *Accès de convulsions vio-



85

lentes; "spasmes et tétanos. — *Accès d'épilepsie, précédé de brûlement à l'estomac, pression et chaleur au dos qui remontent jusqu'à la nuque et au cerveau, avec vertiges. — *Enflure cedémateuse et gonflement de tout le corps, principalement de la tête et du visage, avec grosseur du ventre et engorgement des glandes. — *Tremblement des membres, principalement des bras et des jambes. — Roideur et immobilité des membres, quelquefois avec douleurs vives, rhumatismales. — Paralysie et contraction des membres. — Accès d'évanouissement, quelquefois avec vertiges et enflure du visage. — Sensation de torpeur dans les membres, comme s'ils étaient morts.

Peau. — Desquamation de la peau du corps. — *Peau sèche comme du parchemin, froide et bleuâtre. - *Couleur jaunatre de la peau. — Élancements, prurit brûlant, et brûlement violent à la peau. — *Taches rougeatres ou bleuatres à la peau. — *Pétéchies. — Taches enflammées, comme des morbilles, principalement à la tête, au visage et au cou. - Eruptions miliaires, rouges et blanches. — Boutons conoïdes, blanchatres ou rougeatres, avec prurit brûlant. — *Eruptions urticaires. — Eruption de pustules noires, douloureuses. - Éruption de boutons galeux, petits et pruriteux. — Eruption de petits boutons rouges, qui crèvent et passent en ulcères rongeants se couvrant d'une croûte. -- Pustules remplies de sang et de pus. — Taches dartreuses couvertes de phlyctènes et de furfures, avec douleurs brûlantes nocturnes. *Ülcères à bords élerés et calleux, entourés d'une auréole rouge et luisante, à fond lardacé ou d'un bleu noirâtre, et arec douleurs brûlantes ou lancinantes, principalement lorsque les parties affectées se refroidissent. — *Odeur fétide, suppuration ichoreuse, saignement facile, putridité et couleur bleuâtre ou verdâtre des ulcères. — Charbon malin. — *Croûtes minces ou chairs luxuriantes aux ulcères. — Manque de sécrétion dans les ulcères. — Tumeurs inflammatoires avec douleurs brûlantes. -Verrues. — OUlcères en forme de verrue. — Engelures. — *Varices. - Ongles décolorés. - oTumeurs froides.

Sommeil. — Envie de dormir continuelle, avec bâillements forts et fréquents. — *Insomnie nocturne, avec agitation et jactation continuelles. — Somnolence le soir. — *Coma vigil, souvent interrompu par des gémissements et des grincements de dents. — Sommeil non réparateur; le matin, il semble qu'on n'ait pas assez dormi. — Pendant le sommeil, sursauts arec effroi, gémissements, paroles et querelles, grincements de dents, mouvements convulsifs des mains et des doigts, sensation d'un malaise général et jactation. — En dormant, on est couché sur le dos, la main sous la tête. — Sommeil léger; on entend le moindre bruit, quoique l'on rève continuellement. — Réves fréquents, pleins de menaces, de soucis, d'appréhensions, de repentir et d'inquiétude; réves anxieux, horribles, fantastiques, vifs et facheux; rêves




d'orage, d'incendie, d'eaux noires et d'obscurité; rêves avec méditation. — *La nuit, tressaillement des membres, chaleur et agitation, brûlement sous la peau, comme s'il y avait de l'eau bouillante dans les veines, ou froid avec impossibilité de se réchausser, étoussement au larynx, accès asthmatiques, grande agitation et angoisse au cœur. — °Réveil fréquent, la nuit, avec difficulté de se rendormir.

Fièvres. — Froid de tout le corps, quelquesois avec sueur froide, visqueuse. — *Frissons et horripilation, principalement le soir, au lit, ou en se promenant au grand air, ou après avoir bu ou mangé, et souvent avec apparition d'autres souffrances, telles que douleurs vives dans les membres, pendiculations, mal à la tête, oppression de la poitrine et géne de la respiration, tiraillement dans les membres, anxiété et inquiétude. — Chaleur unirerselle, principalement la nuit, et souvent avec anxiété, inquiétude, délires, pesanteur et embarras à la tête, étourdissements, vertiges, oppression et points dans la poitrine, rougeur de la peau, etc. — *Accès fébriles, principalement le matin ou le soir, souvent avec frissons et chaleur peu développés, soif ardente, ou adypsie complète, type quarte ou tierce, ou, quelquesois, quotidien; souffrances avant l'accès et sueurs après, en s'endormant; apyrexie (ou frissons ou chaleur) avec grande faiblesse, affections hydropiques, endolorissement des régions du foie et de la rate, mal à la tête, étourdissant ou lancinant, douleurs rives et tractives aux membres, au dos et à la tête, pression, plénitude, tension et brûlement à l'estomac et à l'épigastre, points dans la poitrine et dans les côtés, gêne de la respiration, anxiété, face bouffie, terreuse, etc. — *Pouls irrégulier, on accéléré, faible, petit et fréquent, ou supprimé et tremblant. - *Sueurs fréquentes, colliquatives, ou froides et visqueuses; *sueur la nuit. ou le soir en s'endormant, ou le matin en s'éveillant; sueurs partielles, principalement au visage et aux jambes. — Transpiration qui colore le linge et la peau en jaune. — Pendant la sueur, pe-santeur à la tête, bourdonnement des oreilles, et tremblement des membres.

Moral. — *Mélancolie, quelquesois avec des idées religieuses, tristesse, soucis, chagrin, cris et plaintes. — *Anxiété, inquiétude et angoisses excessives qui ne permettent de rester nulle part, principalement le soir au lit, ou le matin en s'éveillant, et souvent avec tremblement, sueur froide, oppression de la poitrine, gêne de la respiration et accès d'évanouissement. — *Anxiété de conscience, comme si l'on avait commis un crime. — Angoisse inconsolable, avec plaintes et lamentations. — Humeur hypocondriaque, avec inquiétude et anxiété. — *Peur de la solitude, despectres et de voleurs, avec envie de se cacher. — Indécision et humeur changeante, qui demande tantôt ceci, tantôt cela, et rebute tout après l'avoir obtenu. — *Découragement, désespoir, dégoût

86



87

de la vie, penchant au suicide ou *crainte excessive de la mort. qu'on croit quelquefois très-prochaine. — Trop grande sensibilité et scrupules de conscience, avec idées tristes comme si l'on avait offensé tout le monde. - Mauvaise humeur, impatience, dépit, disposition à se fâcher, répugnance pour la conversation, envie de critiquer, et grande susceptibilité. — Esprit caustique et mo-queur. — Sur-impressionnabilité de tous les organes ; tout bruit, toute conversation, toute lumière vive, sont insupportables. Grande apathie et indifférence. — Grande faiblesse de més Stupidité et hébétude. —* Délires avec grande affluence d'idées. -Perte de connaissance et de sens; radotage, actions maniaques

et fureur.

Tête. — *Pesanteur, sensation de faiblesse et embarras dans la tête, principalement dans la chambre, amélioration au grand air. Stupeur et étourdissement. — Vertiges, principalement le soir, en fermant les yeux, en marchant ou au grand air, et quelquefois avec chancellement et péril de tomber, ivresse, perte des sens, obscurcissement des yeux, envie de vomir, et mal à la tête. --*Douleurs pulsatives, oppressives, étourdissantes, ou tractives, lancinantes et brûlantes, à la tête, souvent seulement d'un côté, et principalement au-dessus d'un œil, ou à la racine du nez, ou à l'occiput, et quelquefois avec envie de vomir, et bourdonnement des oreilles. — Tension, serrement et douleur de meurtrissure dans la tête. — *Les maux de tête apparaissent souvent périodiquement, et surtout après chaque repas, le matin, la nuit, et le soir au lit, et quelquefois ils sont insupportables, exvec pleurs et gémissements, -étant soulagés momentanément par l'eau froide, et se renouvelant d'autant plus fortement après. — Sensation, en remuant la tête, comme si le cerveau frappait contre le crâne. Craquement ou bruissement dans la tête. — *Endolorissement du cuir chevelu et des téguments de la tête, comme s'ils étaient ulcérés ou meurtris, augmenté fortement par le moindre contact. - Gonslement excessif de la tête et du visage. - Prurit rongeant ou brûlant, *éruptions croûteuses, pustules et ulcères rongeants au cuir chevelu.

Yeux. — Douleurs pressives, brûlantes et lancinantes dans les yeux, oaggrarées par la lumière, *ainsi que par le mouvement des yeux, et quelquefois avec besoin de se coucher ou avec angoisse qui ne permet pas de rester au lit. - *Yeux enflammés, rouges, avec rougeur de la conjonctive ou de la sclérotique, et injection des veines de la conjonctive. — Gonflement des yeux. — *Gonflement inflammatoire, ou ædémateux des paupières. -Grunde sécheresse des paupières, principalement aux bords, et en lisant à la lumière (des bougies). — *Larmes corrosives. — *Agglutination des paupières. — *Occlusion spasmodique des paupières, quelquesois par l'effet de la lumière. — *Photophobie excessive. — Taches et ulcères de la cornée. — *Yeux convulsés,



prosminents; regard fixe et furieux. — Pupilles contractées. — Couleur jaunâtre de la sclérotique. — Couleur jaune, taches ou points blancs et étincelles devant les yeux. — Faiblesse, obscurcissement et perte de la vue. — Yeux ternes et enfoncés.

Oreilles. — Serrement, douleurs vives, élancements, fourmillement voluptueux et brûlement aux oreilles. — Tintement, bruissement, bourdonnement et son de cloches dans les oreilles. — Sensation comme si les oreilles étaient bouchées, et dureté de l'oule, surtout

pour la parole humaine.


88

Nes. — Douleurs ostéocopes au nez. — Gonflement du nez. — Saignement de nez violent. — Desquamation de la peau du nez, en furfures. — °Tumeurs noueuses dans les narines. — Ulcération au haut des narines, avec écoulement d'une humeur ichoreuse, fétide et d'un goût amer. — Odeur de poix ou de soufre devant le nez. — Éternument violent. — Grande sécheresse des narines. — *Coryzu fluent avec obturation du nez, brûlement aux narines et sécrétion d'un mucus séreux et corrosif.

Visage. - *Face pâle, creuse et cadavéreuse. - *Couleur jaunatre, bleuatre ou verdatre du visage. - *Teint plombé et terreux, avec taches et stries verdatres et bleuatres. — *Face décomposée, avec distorsion des traits, ou avec yeux cernés et enfoncés et nez pointu. — *Rougeur et bouffissure du visage. Gonflement dur et élastique du risage, principalement au-dessus des paupières, et surtout le matin. — Enflure du visage, avec accès d'évanouissement et vertiges. — Papules, boutons, *ulcères croûteux, occuperose et dartres farineuses au visage. — Teint noirâtre autour de la bouche. - *Lèvres bleuâtres ou noirâtres, osèches et gercées. — Fourmillement dans la lèvre excoriée, comme s'il y rampait quelque chose de vivant. — Bande brunâtre à la partie rouge des lèvres. — Peau rude, dartreuse autour de la bouche. — *Eruption à la bouche et aux lèvres, au bord de la partie rouge. — *Nodosités dures et ulcères carcinomateux, avec croûte épaisse et fond lardacé, aux lèvres. — Lèvres excoriées, avec sensation de fourmillement. — Enflure et saignement des lèvres. — *Gonslement des glandes sous-maxillaires, avec douleurs de contusion, et endolorissement au toucher. - Paralysie de la machoire inférieure.

Dents.—Douleurs vives, pressives, ou tiraillements successifs dans les dents et les gencives, principalement la nuit, se propageant quelques jusqu'à la joue, à l'oreille et aux tempes, avec gonflement de la joue et douleurs insupportables qui portent à un désespoir furieux, ou qui s'aggravent lorsqu'on se couche sur le côté malade, et qui s'améliorent par la chaleur du feu. — Grincement convulsif des dents.—Sensation d'allongement et vacillement douloureux des dents, avec gonflement et «saignement des gencives. Bouche. — *Mauvaise odeur de la bouche. — *Grande sécheresse

de la bouche, ou accumulation d'une salive quelquefois amère ou



89

sanguinolente. — *Langue bleuâtre ou blanche, — Torpeur et insensibilité de la langue, comme si elle était brûlée. — *Langue brunûtre, ou noirâtre, sèche, gercée et tremblante. — *Langue d'un rouge vif. — Ulcération de la langue au bord antérieur. — *Aphthes dans la bouche. — Parole rapide, précipitée.

Garge. — *Grattement, douleur vive et brûlement dans la gorge. — Inflammation et gangrène de la gorge. — Constriction spasmodique de la gorge et de l'asophage, avec impossibilité d'acaler. — Déglutition douloureuse et difficile, comme par paralyse de l'asophage. — Sensation de grande sécheresse dans la gorge et la bouche, qui force à boire constamment. — *Accumulation de mucosités grisàtres ou verdâtres d'un goût salé ou amer, dans

la gorge.

Appetit.—*Goût amer de la bouche, principalement après avoir bu ou mangé, ou bien le matin. — Goût astringent, putride, ou acide, dans la bouche. — Goût acide des aliments. — Goût fade ou trop salé des aliments. — o'Insipidité des aliments. — Goût amer des aliments, principalement du pain et de la bière.—

*Adypsie complète, ou soif violente, ardente, étouffante et inextinguible, avec besoin de boire continuellement, mais peu à la fois. — *Désir de l'eau froide, des acides, de l'eau-de-vie, du café et du lait. — Manque d'appétit et de faim, souvent avec soif ardente. — Dégoût insurmontable de tous les aliments, principalement de la viande et du beurre. — *Tout ce qu'on avale cause une pression dans l'œsophage comme si cela y était arrêté. — *Faim continuelle, avec manque d'appétit et prompte satiété. — *Après le repas, nausées, tomissements, rapports, douleurs à l'estomac, coliques et beaucoup d'autres souffrances. — *Après avoir bu, frissons ou horripilation, renouvellements des vomissements et de la diarrhée, rapports et coliques.

Estemac. — Rapports fréquents, principalement après avoir bu ou mangé, le plus souvent à vide, acides, ou amers. — Régurgitation de matières acres, ou de mucosités amères, verdatres. — Hoquet fréquent et convulsif, principalement la nuit. — Nausées fréquentes et excessives, quelquefois remontant jusqu'au con, avec envie de dormir, besoin de se coucher, sommeil, accès de défaillance, tremblement, horripilation ou chaleur, douleurs aux pieds, etc. — Écoulement d'eau de l'estomac, omme des pituites. *Vomissements quelquefois très-riolents, et principalement après avoir bu ou mangé, ou la nuit, vers le matin; *vomissements des aliments et des boissons, ou des matières muqueuses, bilieuses ou séreuses, de couleur juunâtre, verdâtre, brunâtre ou noirâtre; *vomissement de matières sanguinolentes. - *En vomissant, douleurs violentes à l'estomac, sensation d'excoriation dans le ventre, cris, chaleur intérieure ardente, diarrhée et crainte de la mort. - *Ballonnement et tension de la région précordiale et de l'estomac. — Endolorissement excessif de l'épi-



gastre et de l'estomac, principalement au toucher. — *Pression dans l'estomac comme par une pierre, ou comme si le cœur devait éclater, et angoisse excessive dans la région précordiale, avec plaintes et lamentations. — *Sensation de constriction, douleurs crampoïdes, "tiraillement, térébration et rongement dans l'estomac. — *Sensation de froid, ou chaleur et brûlement insupportables dans l'estomac et la région précordiale. — *Les douleurs à l'estomac se manifestent principalement après le repas, ou la

nuit. - Dartres au creux de l'estomac.

90

Ventre. - Compression dans la région du foie. -- Gonflement de la rate. - *Maux de ventre excessifs, principalement du côté gauche, et souvent avec grande angoisse dans le ventre. - *Ballonnement du ventre. - *Gonflement du ventre comme dans l'ascite. - *Tranchées violentes, douleurs crampoïdes, fouillement, tiraillement, déchirement et rongement dans le ventre. *Les coliques se manifestent principalement après avoir bu ou mangé, ou la nuit, et sont souvent accompagnées de vomissement, ou de diarrhée, avec froid, chaleur interne ou sueur froide. *Sensation de froid, ou brûlement insupportable dans le ventre. - Douleur de plaie dans le ventre, principalement en toussant et en riant. - Gonflement et induration des glandes du mésentère. - Beaucoup de flatuosités, avec borborygmes et grondement dans le ventre. - Flatuosités d'une odeur putride. -Gonflement douloureux des glandes inguinales. - OUlcère audessus du nombril.

Selles. — Constipation, avec envie fréquente, mais sans effet, d'aller à la selle. — Ténesme, avec brûlement à l'anus. — Sortie involontaire et inaperçue des selles. —*Diarrhées violentes, avec selles fréquentes, nausées, vomissement, soif, grande faiblesse, coliques et ténesme. — *Diarrhées nocturnes, et renouvellement de la diarrhée après avoir bu ou mangé. — *Selles brûlantes et corrosives; *selles muqueuses, bilieuses, sanguinolentes, séreuses, etc., de couleur verdâtre, jaunâtre, oblanchâtre, ou *brunâtre et noirâtre; *selles fétides et putrides; oselles avec matières non digérées. — Sortie de mucosités par l'anus, avec ténesme. — Chute du rectum, avec beaucoup de douleurs. — *Prurit, douleur d'excoriation et brûlement au rectum et à l'anus, ainsi qu'aux boutons hémorrhoïdaux, principalement la nuit. — Élancements dans les boutons hémorrhoïdaux.

Urines. — *Rétention d'urine, comme par paralysie de la vessie. — Envie fréquente d'uriner, même la nuit, avec évacuation abondante. — Incontinence d'urine et évacuations involontaires, même la nuit, au lit. — 'Émission difficile et douloureuse des urines. — 'Urines rares, couleur jaune foncé. — Urines aqueuses, verdâtres, brunâtres ou troubles, 'avec sédiment muqueux. — 'Urines sanguinolentes. — *Brûlement dans l'urêthre, en uri-

nant.



ARUM TRIPHYLLUM. — ASA FŒTIDA.

92

Tronc. — Taches jaunâtres à la poitrine. — Douleur violente et brûlante au dos, fortement aggravée par le contact. — Douleurs tractives aiguës, dans le dos et entre les omoplates, avec besoin d'être couché. — Gonflement cedémateux et non douloureux du cou et de la mâchoire inférieure. — Dartres entre les omoplates.

Bras. — Douleurs tractives aiguës dans les bras et les mains. —

•Gonflement du bras, avec pustules noirâtres d'odeur putride.

— *Douleurs tractives, aiguës, la nuit, partant du coude et répondant jusqu'à l'aisselle. — Tiraillement aigu et lancinant dans les poignets. — Crampes dans les doigts. — •La nuit, sensation de plénitude et de gonflement dans la paume des mains. —

•Excoriation entre les doigts. — Gonflement dur des doigts, avec douleurs ostéocopes. — •Ulcères au bout des doigts avec douleur brûlante. — Ongles décolorés.

Jambes. — Crampes dans les jambes. — Douleurs tractives aiguës dans les hanches, jusque dans les aines, les cuisses, et s'étendant quelquefois jusqu'aux malléoles, avec inquiétude qui oblige à remuer constamment le membre. — Douleur rhumatismale aux jambes et surtout au tibia. — Faiblesse paralytique de la cuisse. — *Douleur de brisement dans l'articulation du genou. — Raccourcissement des tendons du jarret. — *Dartres au jarret. — Crampes aux mollets. — °Ulcères brûlants et lancinants à la jambe. — °Fatigue des jambes et des pieds. — °Gonstement du pied, brûlant, dur et luisant, avec vésicules brûlantes couleur bleu noirâtre, sur le cou-de-pied. — °Vésicules rongeantes et ulcérées à la plante des pieds et aux orteils. — Douleurs à la partie charnue des orteils, comme s'ils étaient usés par la marche.


ARUM TRIPHYLLUM.

ARUM-TR? - Voy. HALE, Remèdes américains.

Cette substance est souvent d'un secours inappréciable dans les Affections du larynx et de la trachée, à la suite de la fatigue de la voix, chez les chanteurs, les avocats, les prédicateurs, etc., surtout lorsqu'il y a forte accumulation de glaires, voix enrouée et incertaine, tantôt basse, tantôt haute, etc.

ASA FETIDA.

ASA. — Gomme résine de Férula. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 172. — Doses usitées: 3, 6, 9. — Durée d'action; 4 à 6 semaines dans quelques cap de maladies chroniques. Antidotes: Caus. chin. électric. — On l'emploie comme antidote de: Merc. puls?.



ASA PETIDA.

98

COMPARER AVEC: Ant. htt. caus. chin. coff. coff. mere. n-vom. phos. plat. puls. rhus. rut. thui. lart. — C'est surtout après thui. et puls. que l'asa mérite la préférence lorsqu'il est indiqué. — Après l'asa, conviennent quelquefois: puls. et caus.

CLIMQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où ce médicament pourra être consulté contre : — Affections scrofuleuses et rachitiques; Inflammations, ramollissement, dévistion, suppuration et carie des os; Suppurations ichoreuses; Engorgement des glandes; Souffrances hystériques et hypocondriaques; Hémorrhagies?; Suites facheuses de l'abus du mercure; Danse de Saint-Guy; Otorrhée et dureté de l'ouie après l'abus du mercure; Ophthalmie, ozène et phlegmon du nex des enfants scrofuleux; Souffrances gastriques et bilisuses; Gastrite?; Œsophagite?; Carreau?; Ascite avec hydropisie générale, dépendant d'affections organiques dans le ventre; Affections asthmatiques des personnes scrofuleuses, provoquées par des efforts, le coît ou des repas trop abondants; Affections organiques et battements du cœur, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SHYPTONIES GÉNÉRAUX. — Douleurs saccadées, rhythmiques, le plus souvent tractives, aiguës, avec tiraillements successifs, ou bien pressives avec élancements sourds, ou bien encore douleurs vives qui se manifestent du dedans au dehors, améliorées ou changeant de nature par le toucher, et accompagnées de sensation d'engourdissement. — Douleurs dans les muscles fléchisseurs. — Les symptômes apparaissent étant assis et s'améliorent par le mouvement au grand air. — Palpitations et frémissements de quelques muscles et fibres musculaires. — Grattement et térébration dans le périoste. — Inflammation douloureuse et ulcération des os. — °Carie. — Gonfiement chaud et rouge des parties affectées. — *Gonfiement des glandes. — Sensation de lourdeur dans tout le corps.

Peau. — Ulcères avec bords durs, bleuâtres et très-sensibles au toucher. — *Pus séreux, fétide et sanieux.

Sommeil. — Forte disposition à dormir. — Affluence de rêves généralement gais. — Sommeil non réparateur avec jactation et réveil fréquent.

Fièvre. — Sensation de chaleur au visage après le repas, sans soif, avec angoisse et envie de dormir. — Horripilation passagère. — Pouls accéléré.

Moral. — Inquistude et angoissel hystériques et hypocondriaques. — Versatilité. — Mauvaise humeur et peu de goût pour le



ASA FŒTIDA.

travail. — Grande irritabilité avec indifférence pour teutes choses.

Tête. — Confusion et tournoiement dans la tête. — Embarras de la tête avec forte pression et difficulté de penser. — Émoussement des sens sans perte de connaissance. — Maux de tête qui changent de nature ou se dissipent au toucher. — Tension étourdissante dans la tête. — Élancements obtus ou pression dans les côtés de la tête, les tempes et le front, comme celle d'un tampon qui presserait du dehors en dedans. — Douleurs constrictives dans la tête. — Congestion à la tête avec battements. — Douleurs crampoïdes dans le front au-dessus des sourcils.

Yeux. — Douleurs aux yeux comme s'il y avait du sable dedans, avec sensation de froid. — Brûlement dans les yeux, avec traction des paupières comme par le sommeil. — Sensation pénible de sécheresse ou sécheresse réelle des yeux. — Frémissement des paupières. — Obscurcissement de la vue en écrivant.

Oreilles. — Douleurs pressives dans l'oreille. — Dureté de l'ouïe,

avec écoulement purulent.

94

Nos. — Douleurs pressives dans le nez et principalement dans les ailes du nez. — Tension avec sensation d'engourdissement dans les os du nez. — • Écoulement purulent par le nez, de matières fétides, verdâtres.

Visage. — Douleurs à la face, généralement tensives, avec sensation d'engourdissement dans les os de la face, principalement à la pommette. — Sensation de plénitude pressive dans le visage. — Pression engourdissante au menton. — Douleurs tractives aiguës à la mâchoire inférieure.

Bouche. — Lèvres gonfiées avec lancination brûlante. — Sécheresse de la bouche avec sensation de brûlure et douleur d'excoriation. — Sensation de sécheresse quoique la bouche soit humide.

tion. — Sensation de sécheresse quoique la bouche soit humide. Gorge. — Maux de gorge, comme si un corps étranger montait dans l'æsophage avec pression. — Sensation de brûlure, de sécheresse et d'excoriation dans la gorge avec tension pendant la déglutition.

Appétit. — Goût généralement amer ou rance comme de la graisse. — Goût fade et dégoût comme après une indigestion causée par des aliments trop gras. — Aversion pour la bière, qui semble avoir

un goût muqueux.

Estomac. — Renvois comme après avoir mangé de l'ail, ou bien avec goût âcre et rance. — Pression à l'estomac avec tension et sensation comme si quelque chose montait dans l'œsophage, même après le repas. — Douleurs crampoides, contractives, à l'estomac. — Douleur de brisement et sensation de plénitude à l'arégion de l'estomac. — Sensation de brûlure à l'estomac et au diaphragme. — *Pulsation visible et sensible à l'épigastre. — Dérangement de l'estomac par des aliments gras.

Ventre. — Douleurs hépatiques généralement pressives ou lan-



ASARUM.

CLINIQUE. - En étudiant les symptômes, on verra si l'on peut consulter ce médicament contre quelques cas de : Migraine ; Ophthalmie; Affections gastriques et bilieuses; Helminthiasis; Lientérie, etc., etc.

Voyez la note, page 15.

96

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - *Susceptibilité excessive de tout le système nerveux. - *Douleurs tractives, aiguës, tiraillements successifs et traction crampoide, principalement dans les membres, avec vomissement et lientérie, après des opérations. Grand abattement, principalement après le dîner, avec nonchalance et aversion pour le travail. — Faiblesse le soir et envie de vomir avec désir de se coucher. — Grande agilité de tous les membres; il semble qu'on vole au lieu de marcher. - Les souffrances se dissipent en se lavant le visage avec de l'eau froide. - Envie de dormir le jour. - On ne peut s'endormir le soir à cause d'un bouillonnement de sang. - Rêves fâcheux, désagréables. - Froid, frissons et frémissements. - Alternation de froid et de chaleur brûlante. - Humeur chagrine, mélancolique. Tristesse avec disposition à pleurer. — *Grande surexcitation morale.

Tête. - Embarras pressif avec tension et hébétude de la tête et incapacité de travailler. — Les idées se perdent. — Vertige comme par ivresse en se levant de son siège ou en marchant. Douleurs à la tête provoquées ou aggravées par la fatigue intellectuelle. - Traction étourdissante ou pression dans la tête et principalement aux tempes, au front et au-dessus de la racine du nez. - Compression dans les parties latérales de la tête. *Accès de céphalalgie au côté gauche de la tête, tous les jours vers 5 heures du soir. - Pulsations et battements dans la tête, et surtout dans le front en se baissant. - Tension du cuir che-

velu avec endolorissement des cheveux.

Yeux. — Douleurs dans les yeux comme si on écartait fortement les paupières en lisant. - Douleurs vives, pulsatives dans les yeux. - Ŝensation du froid dans les yeux. — *Sensation de sécheresse aux yeux ou brûlement et larmoiement, surtout le soir dans l'appartement. - *Yeux enflammés avec larmoiement abondant. *L'air froid fait du bien aux yeux, mais le vent et la lumière du soleil sont insupportables. — Fixité des yeux. — °Yeux ternes, abattus. — Tressaillement des paupières. — Obscurcissement de la vue. - Rougeur de la conjonctive avec élancements dans les angles des yeux.

Oreilles. — Tension douloureuse, pressée à l'orifice du conduit au-- Chaleur de l'oreille à l'extérieur. - Dureté de l'oule comme par obstruction ou resserrement du conduit auditif.



ASTERIAS RUBENS.

98

muant le bras. — Tiraillement avec sensation de faiblesse paralytique dans les articulations de la main et des doigts.

Jambes. — Douleur pressive, obtuse à l'articulation coxo-fémorale et à la cuisse, principalement en s'appuyant sur le pied et en marchant. — Crampes dans les cuisses. — Tiraillement au genou et dans les tendons du jarret. — °Lassitude des cuisses et des genoux avec marche chancelante. — Tressaillements successifs dans les mollets. — °Élancements au cou-de-pied.

ASTERIAS RUBENS.

AST. — Astérie rouge, Étoile de mer. — Roth. Mat. med., t. III, 246. — Observateur : Petroz. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 317. ANTIDOTES?.

SYMPTOMES PARTICULIERS. — Augmentation des symptômes après midi, surtout vers le soir; °paraît agir favorablement contre quelques cas d'épilepsie; besoin de grand air, avec anxiété et impatience dans la chambre; °Ulcères scrofuleux; Éruption de taches rouges, furfuracées, sèches et circulaires.

Sommeil plein de rêves d'une vivacité extraordinaire, comme si l'on voyait et touchait réellement les personnes dont on rêve.

voyait et touchait réellement les personnes dont on rêve. Calorification augmentée pendant toute la durée d'action; grand

désir de lotions froides et de boire froid.

Moral extraordinairement gai le soir; tristesse alternant avec excitation morale qui porte à vouloir travailler et agir beaucoup; sensation d'angoisse, comme par appréhension d'un malheur; irritation, colère et besoin de se quereller; envie de mordre; sen-

sibilité morale avec grande disposition aux pleurs.

Tête pesante; congestion de sang, sensation de plénitude et chaleur à la tête; douleurs pressives au front; au-dessus de l'œil gauche, douleur délirante qui force à froncer le sourcil; au vertex sensation de gêne surtout pendant un effort intellectuel; sensation au sommet de la tête comme si le crâne se brisait ou qu'on écrasat la tête; à la fin de la journée les douleurs de tête augmentent et forcent à se coucher; endolorissement de toute la boite osseuse du crâne.

Yeux facilement fatigués par la lumière; yeux tirés en arrière.

Oreilles: bruit de vagues, avec oule obtuse.

Nez saignant à plusieurs reprises.

Langue gonflée; embarras de la langue, et répugnance à parler; salive plus abondante; sensation d'irritation et d'adstriction à la gorge.



ASTERIAS. - AURUM FOLIATUM.

99

Appétit seulement pour les choses piquantes, les mets épicés, les liqueurs, le casé, le thé, le fromage sort, etc.

Ventre alternativement goullé et diminué de volume; coliques avec frissons et boullées de chaleur, ou suivies de diarrhée.
Selles difficiles; constipation; selle liquide partant comme un jet

violent; fine hémorrhoidal (pendant deux jours). Urines plus abondantes et plus fréquentes; uring épaisse, vis-

queuse. — Appétit vénérien exalté, obsession de désirs sexuels. gles en retard; sensation de pression sur les organes inférieurs du ventre; sensation d'angoisse sur la matrice, comme quelque chose qui pousse en dehors; douleurs tractives dans les seins; oparaît agir très-favorablement contre les affections squir-

reuses ou cancéreuses surtout du sein gauche. Cœur : anxiété causée par des battements onduleux dans la poitrine; sensation de plénitude dans la poitrine qui fait craindre la syncope; palpitations fréquentes; battements de cœur peu

perceptibles et sourds, comme si le cœur avait cessé de battre. Membres inférieurs faibles, avec diminution de la sensibilité; oparalysie incomplète des membres inférieurs améliorée; douleur lancinante, comme de la goutte, aux orteils, avec chaleur et rougeur de la peau, augmentation par la chaleur et sensibilité excessive au moindre contact.

AURUM FOLIATUM.

AUR. — Or métallique. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 82. — Doses usitées: 3, 9, 12, 30. — Durée d'action : jushomosop., p. 82. — Doses usitées: 3, 9, 12, 30. — Durée d'action: jusqu'à 40 jours, dans quelques ess.
NIDOTES: Bell. chin. cupr. merc. — On l'emploie comme antidote de :

ANTIDOTES

Merc spig.

COMPARER AVEC: Asa. bell. chin. cupr. merc. nitr-ac. puls. spig. — C'est surtout après l'usage de bell. chin. puls. que l'or convient de préserence, si toutesois il est indiqué.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Ictère; Souffrances mercurielles (et syphilitiques); Convulsions et spasmes hystériques; Goutte noueuse?; Affections scrofuleuses; Affections hydropiques?; Inflammation et carie des os, principalement par l'abus du mercure; Rhagades; Mélancolie religieuse; Mélancolie par abus du mercure; Hypocondrie; Hystérie; Maux de tête hystériques; Fatigue de la tête par des travaux intellec-tuels; Migraine; Exostoses au crâne; Ophthalmies; Abcès et fistule lacrymale; Taches de la cornée?; Amblyopie amaurotique;



AURUM FOLIATUM.

Otorrhée par carie des os de l'appareil auditif; Osène avec carie des os du nez; Affection carcinomateuse du nez; Gonflement et ulcération du nez et des lèvres, principalement par des sujets scrofuleux; Prosopalgie inflammatoire par l'abus du mercure; Ulcération et carie du palais; Odontalgie congestive; Maladie des gencives; Boutons de mauvaise nature aux lèvres; Gastrite et gastralgie; Entérite et entéralgie; Hépatite; Induration du foie; Affections hémorrholdales; Engorgement de la prostate; Maladies de l'utérus; Vaginite; Hernie des enfants; Luchurie; Orchite; Induration des testicules; Chute et induration de la matrice; Asthme congestif; Hydrothorax et affections organiques du cœur, principalement celles par l'abus du mercure, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

100


SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs de meurtrissure avec tiraillements aigus et faiblesse paralytique dans les membres en général, et principalement dans les articulations, surtout en découvrant la partie affectée, le matin en se réveillant, et dans le repos, se dissipant lorsqu'on se lève. — Douleurs lancinantes dans les membres avec grand abattement. — *Inflammation des os avec douleurs nocturnes. — *Exostoses à la tête, aux bras et aux jambes. — Grande acuité et finesse des sensations avec sensibilité excessive à la moindre douleur. — Spasmes hystériques, parfois avec pleurs et rire alternatifs. — Grande sensibilité au froid, ou grand désir d'aller au grand air, même lorsqu'il fait mauvais temps, parce qu'on s'y trouve soulagé.

Sommeil. — Envie de dormir après le repas. — Somnolence continuelle. — Sommeil nocturne jusqu'à 4 heures du matin seulement. — Le matin, en se réveillant, fatigue et faiblesse. — Sommeil inquiet, réves anxieux, pénibles, fatigants. — Radote-

ries nocturnes en forme de questions.

Fièvre. — Frissons fébriles par tout le corps, le soir au lit, non suivis de chaleur ni de soif. — Froid de tout le corps avec couleur bleuâtre des ongles, goût nauséabond et envie de vomir suivi parfois d'un accroissement de chaleur. — Chaleur de la face avec froid aux mains et aux pieds. — Forte sueur générale, le matin de bonne heure.

Moral. — *Mélancolie avec inquiétude et désir de la mort. —
Désir de la solitude. — Envie irrésistible de pleurer. — Désir
de revoir les siens, comme une sorte de nostalgie. — Besoin de
changer de place, d'aller et de venir. — *Grande angoisse qui va
jusqu'à porter au suicide, avec contraction crampoide dans l'abdomen. — Scrupules de conscience excessifs. — On désespère de
soi et des autres. — Mauvaise humeur et aversion pour la conversation. — Humeur grondeuse, querelleuse. — Colère et em-



AURUM FOLIATUM.

101

portement.—Alternation de gaieté, d'irritabilité et de mélancolie. — °Humeur hypocondrisque. — Faiblesse des facultés intellectuelles. — Faiblesse de la mémoire. — Exaltation religieuse.

Tôte. — *Fatique de la tête par des travaux intellectuels. — Étourdissement subit avec perte des sens. — Violents étourdissements en se baissant. — Migraine tous les 3, 4 jours, avec élancements, battements dans un côté du front, nausées et vomissement de bile. — *Douleur de meurtrissure au cerveau, sur tout le matin, ou pendant un travail intellectuel, en allant quelquefois jusqu'à rendre les idées confuses. — *Douleur dans la tête, comme si l'air traversait le cerveau, lorsqu'on ne la tient pas très-chaudement. — Brûlement dans toute la tête, plus fort à l'occiput. — Douleurs tractives aiguës dans la tête. — Douleur battante et martelante dans un seul côté de la tête. — *Congestion de song à la tête. — *Bourdonnement dans la tête. — Douleur ostéocope dans le crâne, surtout étant couché. — *Exostoses à la tête. — Chute des cheveux. — Éruption de petits boutons blancs sur tout le cuir chevelu, avec chaleur et prurit. — Fort brûlement continuel au sommet de la tête.

Yeux. — Douleur aux yeux aggravée par le toucher, comme si le globe de l'œil était pressé en dedans. — Tension dans les yeux, avec diminution de la vue. — Douleur brûlante et rougeur aux yeux. — *Obscurcissements de la vue. — Taches noires devant les yeux. — Yeux très-proéminents. — Brûlement, élancements, tiraillements et prurit aux paupières et dans l'angle interne des yeux. — Rougeur de la sclérotique. — Rougeur des paupières à l'approche des règles. — Agglutination des paupières le matin. — Ulcération des paupières, avec grande difficulté de les séparer le matin. — Sensation continuelle de sable dans les yeux. — Larmoiement continuel. — Flammes et étincelles devant les yeux. — Hémiopie; on voit les objets coupés en ligne horizontale.

Oreilles. — Douleurs aux oreilles, comme une tension intérieure. — Brûlement, picotement, prurit et suintement derrière les oreilles. — Brûlement et élancements dans les oreilles. — Carie des apophyses mastoïdes. — °Écoulement d'un pus étide par les oreilles. — *Dureté de l'ouïe °par hypertrophie des anygdales avec parole embarrassée. — *Bruissement dans les oreilles, sifflement, bourdonnement et bruit de cloches. — Gonflement des parotides.

Mez. — Douleur ostéocope du nez au toucher. — Picotements rongeants dans le nez; prurit et brûlement à l'extérieur. — Boutons rouges sur le nez. — Gonflement inflammatoire et rougeur du nez, suivis de desquamation. — Taches foncées, rouge brun, sur le nez. — *Carie des os au nes. — *Fosses nasales ulcérées et couvertes de croûtes épaisses. — *Écoulement par le nes, d'un pus fétide jaune rerdâtre. — *Obturation du nez. —



AURUM FOLIATUM.

102

Coryza fluent, épais comme du blanc d'œuf. - Éternument fréquent. — Desquamation furfuracée de l'épiderme du nez. Exaltation ou absence de l'odorat. — Odeur douceâtre putride, ou odeur d'eau-de-vie, devant le nez. - Prurit, brûlement,

élancements et cuisson dans le nez.

Visage. - Face bouffie, luisante comme par la sueur. - Rougeur de la figure. - Figure marbrée de plaques rouges et violettes. Figure vultueuse. - Inflammation des os de la face. *Enflure de joue. — Gonflement des os du front, de la mâchoire supérieure et du nez. - *Éruption rouge, oqui s'écaille, au front et au nez. - Gros boutons rouges sur la figure. - Traction dans les machoires avec enflure des joues. - Douleur tensive à la mâchoire supérieure. - Boutons aux lèvres, avec brûlement, élancement, picotement et forte démangeaison. - *Engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires.

Dents. - Odontalgie avec chaleur et congestion à la tête. - Dents vacillantes. - *Ulcère aux gencives avec enflure des joues. -

Gencives rouges, gonflées et saignant facilement.

Bouche. — Odeur de la bouche fétide, comme du fromage fort. —
Chaleur, cuisson et aphthes dans la bouche. — Gêne pour manger. — (Salivation abondante.) — Douleur térébrante au voile du palais. — Carie au palais, avec ulcères couleur bleuâtre. — *Tonsilles gonflées oet ulcérées. — Les boissons sortent par les narines. - Prurit, elancements, brûlement, tiraillement, et grattement dans la gorge.

Appétit. - Goût laiteux ou douceâtre. - Dégoût pour les aliments, et surtout pour la viande. - Grand désir de café. -*Faim et soif excessives ; désir de boissons froides, ou bien de boissons alcooliques. — Envie de vomir après avoir mangé, ou même en mangeant. — Hoquets. — Rapports aqueux.

Estomac. — Douleur à l'estomac, comme provenant de la faim. -Sensation d'un malaise indicible dans l'épigastre. - Gonflement de l'épigastre et des hypocondres, avec douleurs lancinantes au toucher. - Brûlement, tiraillement et douleurs sécantes à l'es-

tomac. - Étouffements bientôt après le repas.

Ventre. — Coliques avec sensation d'un grand malaise dans le ventre et besoin d'aller à la selle.—Pression tensive et plénitude dans le ventre. - Ventre ballonné. - Exostoses dans le bassin. - *Disposition des hernies à sortir, -quelquefois avec douleurs crampoïdes et incarcération de flatuosités. - Coliques venteuses nocturnes, avec pincements, grondements, et borborygmes. — Emission fréquente de vents très-fétides. — Chaleur et tiraillements dans le ventre. — Sensibilité du ventre au tou-cher. — Pesanteur sur le pubis. — Douleur de tension dans le ventre pendant et avant les selles. - Brûlement et douleurs sécantes à l'hypocondre droit. - Point douloureux dans l'hypocondre gauche. - Chaleur et sensibilité à l'hypogastre. -



AURUM MURIATICUM.

104

Tronc. — Douleurs généralement pressives ou tractives aiguês, au dos, principalement le matin, et parfois tellement violentes qu'on ne peut remuer aucun membre. — Engorgement inflammatoire sous les aisselles. — Gêne pour tourner le cou, comme par le torticolis. — Chaleur dans les aisselles, douleur de brisure et chaleur dans les reins; brûlement depuis les reins jusqu'à la vessie.

Bras. — Douleurs pressives dans les bras et les avant-bras. —
Douleurs crampoïdes et tractives aiguës dans les os du carpe et
du métacarpe. — Douleurs tractires aiguës, avec faiblesse paralytique, dans les os et les articulations des doigts. — Brûlement, élancements, picotements et fatigue dans les bras.

Jambes. — Douleurs vives dans les cuisses, surtout le matin et le soir. — Faiblesse paralytique et douloureuse des genoux, comme s'il y avait un lien serré au-dessus; ils sont faibles et fléchissent. — Douleurs tractives et tiraillements aigus, avec faiblesse paralytique, dans les os et les articulations des orteils. — Enflure des pieds. — Rougeur et enflure des orteils.

AURUM MURIATICUM.


AUR-M. — Muriate d'or. — Journal de Méd. homæop. du docteur Molin. — Hist. nat. et prép. Pharmec. homœop., p. 83.

AVIS CLINIQUES, ou cas pour lesquels on pourra consulter ce médicament : Hypocondrie; Affections hydropiques; Coryza; Eczema; Couperose; Lupus des ailes du nez; Boutons cancéreux aux lèvres; Rougeur et gonflement des paupières; Ophthalmie aiguë; Ophthalmies scrofuleuses: Carie des os du nez; Gonflement des lèvres; Inflammation des gencives; Gastrite, gastralgie; Affections chroniques du foie; Gonflement scrofuleux des glandes du mésentère; Métrite; Leucorrhée; Hémorrhoides; Flux hémorrhoidal; Vaginite; Gonflement des testicules; Catarrhe pulmonaire; Irritation chronique des voies respiratoires; Maladies du cœur; Maladies des os; Carie; Affections mercurielles; Laryngite chronique chez les personnes syphilitiques, ou après l'abus du mercure.

Ce médicament remédie aux effets produits par le chagrin.

Sommeil. — Envie de dormir pendant le jour, même en travaillant; insomnie la nuit; rêves pénibles; réveil en sursaut.

Moral. — Tristesse; pleurs fréquents. — Paresse; dégoût pour toute espèce de travail. — Gaieté excessive, insouciance. — Caractère capricieux. — Ennui, contrariété sans motifs. — Dégoût de la vie, penchant au suicide.



AURUM MURIATICUM.

105

Tête. — Brûlement dans le front. — [Brûlement presque continuel dans toute la tête, mais plus fort à gauche, tiraillements dans le côté gauche de la tête; par instants la tête est comme insensible]. — Étourdissements fréquents. — Sensation de fraîcheur sur le sommet de la tête; battèments dans le côté gauche du front; tête lourde, pesante; la tête remue souvent. — Brûlements et élancements dans le derrière de la tête. — Douleurs, tiraillements et prurit chatouillant au front.

Yeux. — Rougeur et gonflement des paupières; brûlement, élancements, picotement et cuisson aux paupières; agglutination des paupières le matin; larmoiement; [rougeur de la sclérotique avec chaleur brûlante et picotements;] brûlement, picotements et démangeaison aux yeux; difficulté à tenir les yeux fermés. — Dé-

chirements dans l'œil gauche.

Oreilles. — Croûtes derrière les oreilles; brûlement et prurit derrière les oreilles, surtout la nuit. — Tintement dans les oreilles, suivi de surdité, comme si l'intérieur des oreilles était

large et vide.

Nez. — Rougeur et gonfiement du nez; brûlement et prurit au nes; coryza jaune, épais; croûtes dans le nez, besoin continuel d'y porter les doigts. — Écoulement aqueux irritant fortement la lèvre et ayant une mauvaise odeur. — Rougeur et inflammation du nes avec prurit et desquamation; gonfiement rouge avec narines ulcérées, croûtes sèches, jaunâtres, et sensation d'obturation dans le nez. — Ozène *avec écoulement de pus jaune et mouchement de sang.

Visage. — Figure rouge. — Figure pâle, marbrée de rouge. — Gonflement des lèvres, brûlement et prurit aux lèvres. — Bouche pâteuse, mauvaise. — °Lèvres ulcérées et gonflées. — Douleurs

tressaillantes aux dents.

Bouche. — Aphthes dans toute la bouche, brûlement, prurit et cuisson dans la bouche. — Rougeur et gonflement des gencives, surtout pendant la nuit. — Boutons sur les lèvres; ils s'accompagnent de cuisson et de démangeaison. — Soif; inappétence.

Gerge. — Grattement et picotement dans la gorge; difficulté à avaler. — Engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires.
 Estomac. — Malaise et embarras à l'estomac après avoir mangé.

— Envie de vomir après avoir mangé. — Renvois ayant le goût de pourri. — Brûlement, élancements et douleurs rongeantes et sécantes à l'estomac. — Digestions longues. — Bâillements fréquents après avoir mangé.

Ventre. — Sensibilité du ventre au toucher. — Coliques sourdes.
 — Tiraillements dans tout le ventre, — Brûlement dans l'hypocondre droit. — Chaleur et picotement à l'hypogastre. —
 Point dans l'hypocondre gauche, comme si l'on avait trop couru.
 Étouffements, pour peu qu'on soit serré. — Sensation continuelle de gêne dans l'hypocondre droit. — Rougeur, chaleur,



AURUM MURIATICUM.

prurit et cuisson au nombril. — Éruptions de petits boutons rouges au-dessus du pubis. — Gonflement et ballonnement du ventre.

Belles. — Diarrhée, surtout la nuit; selles grises, blanchâtres. —
 Hémorrhoïdes, avec écoulement de sang, quand on va à la selle.
 Urines. — [Urines trop fréquentes.] — Urines peu abondantes; urines rouges, épaisses et contenant du sable. — Brûlement et cuisson dans le canal de l'urèthre, en urinant.

Parties génitales. — Suintement continuel à la vulve; rougeur et gonflement des lèvres. — Brûlement et prurit à la vulve; sensibilité excessive de la vulve; forte cuisson continuelle à la vulve; chaleur et prurit dans le vagin. — Gonflement et tension dans les testicules. — Tiraillements le long des cordons spermatiques. — ('haleur et démangeaison dans le canal de l'urèthre. — Leucorrhée jaune clair coulant surtout le matin. — Quelques jours avant les règles, sortie de gros boutons rouges aux grandes lèvres. — Roideur dans les aines.

Larynx. — Toux criarde, fréquente; toux fréquente surtout la nuit; petite toux sèche, par quintes, surtout la nuit, suivie de chaleur à la gorge. — Toux forte, fréquente, avec expectoration blanche, mèlée de quelques filets de sang; toux continuelle, grasse, avec expectoration jaune, épaisse. — Parole difficile; voix rauque, criarde. — Sensation d'obturation dans le larynx. avec dyspnée.

Poitrine. — Respiration gênée. — [Douleur dans le côté gauche de la poitrine; elle est semblable à un point, change de place et ne dure pas continuellement.] — Palpitations; tiraillements et douleurs sécantes au cœur; brûlement et picotements au cœur. — Suffocations la nuit. — Elancements au-dessus du cœur.


Tronc. — Picotements dans les reins; fatigue douloureuse dans les reins. — Brûlement, picotements, douleurs sécantes et roideur dans le dos.

Extrémités supérieures. — Brûlement et élancements dans les bras et les avant-bras; roideur dans les bras; sensation pénible dans les épaules et les bras. — Brûlement et prurit dans les mains; difficulté à fermer les mains; roideur des articulations des doigts; secousses involontaires dans les bras. — Mouvements convulsifs dans les bras. — Gonflement du poignet, avec tension en renversant la main, et élancements en saisissant un objet. — Déchirement dans le doigt du milieu, après le repas.

Extrémités inférieures. — Clous aux fesses et aux cuisses; roideur dans les cuisses et les jambes; gonflement des genoux; chaleur, picotements et élancements dans les genoux; enflure des pieds, — Brûlement dans les pieds; douleurs sécantes dans les orteils en marchant; rougeur des orteils; rougeur et gonflement des orteils, avec brûlement, élancements et difficulté à poser les pieds

par terre.

106



AURUM SULFURICUM.

107

AURUM SULFURICUM.

AUR-SULF. — Sulfate d'or. — Journal de Méd. homozop. du docteur Molin. — Hist. mat. et prép. Pharmac. homozop., p. 84.

AVIS CLINIQUES, ou cas contre lesquels on pourra consulter ce médicament: — L'hypocondrie, les névralgies faciales et dentaires, les ophthalmies, les inflammations aiguës ou chroniques du nez, les maladies de la bouche, la couperose, l'érysipèle, les maladies des lèvres, les maladies du tube digestif, les affections hémorrhoïdales, l'incontinence d'urine, les maladies de l'utérus et de ses annexes, la chlorose, les maladies du cœur, les affections des seins, le goître, le catarrhe pulmonaire, l'engorgement des testicules, soit aigu, soit chronique, les maladies des os, les affections scrofuleuses, les suites de l'abus du mercure; il remédie, ainsi que les deux autres préparations d'or, aux indispositions causées par le chagrin.

SYMPTONIES. — Sommeil. — Somnolence pendant le jour, avec insomnie la nuit; agitation nocturne; rêves pénibles, effrayants; on rêve de voleurs, d'assassins, etc.

Moral. — Désir de la solitude; caractère sombre, soucieux, méchant; humeur désagréable; malhonnête; [pleurs continuels;]

chagrin, dégoût de la vie.

Tôte. — Brûlement et cuisson au cuir chevelu; forte démangeaison à la tête, surtout la nuit; afflux continuel du sang à la tête; étourdissements; chute des cheveux; la tête remue continuellement; élancements dans le derrière de la tête.

Youx. — Rougeur des paupières; élancements, picotements et démangeaisons aux paupières; les paupières sont collées le matin; [ulcération aux paupières;] la lumière fait mal; orgelet vers l'angle externe de l'œil; battements dans les yeux. — Chute des cils. — Yeux brillants.

Oreilles. — Brûlement et élancements dans les oreilles. — [Bourdonnement continuel dans les oreilles.] — Douleurs sécantes et

fouillantes dans les oreilles. — Dureté de l'oule.

Mes. — Rougeur et gonflement du nez; élancements et démangeaisons au nez; [dartres aux ailes du nez;] coryza sec; éternuments fréquents; croûtes dans le nez; sensibilité vive du nez au moindre contact; battements et douleurs sécantes au nez.

Visage. — Boutons rouges à la figure; figure couverte de plaques rouges; pâleur de la face; prurit à la face; [visage fatigué, tiré].



AURUM SULFURICUM.

Bouche. — Aphthes à la partie interne des joues seulement, avec cuisson et élancements; rougeur, saignement et gonfiement des gencives; boutons sur les lèvres, avec chaleur et petits élancements; langue et gencives décolorées; soif vive, inappétence; lèvres crevassées; élancements, tiraillements et douleurs sécantes dans les dents; sensation d'engourdissement dans les dents; douleurs sourdes qui partent des molaires supérieures, montent dans toute la tête, puis redescendent dans les dents.

Gorge. — Élancements et tiraillements dans la gorge; difficulté

d'avaler.

108

Estomac. — Nausées. — Envies de vomir peu de temps après avoir mangé. — Hoquet fréquent. — Rapports aqueux, sans goût. — Digestions excessivement longues; renvois aqueux, ayant le goût des aliments. — Chaleur et élancements à l'estomac.

Ventre. — Ballonnement du ventre et sensibilité au toucher, sensation d'une boule qui roule dans le ventre. — Élancements dans différents points du ventre vers la ceinture. — Sensation comme si quelque chose se déchirait dans le ventre. — Élancements et tiraillements à l'hypocondre droit. — Douleurs sourdes à l'hypogastre. — Élancements à l'hypogastre. — Sensibilité de l'utérus au toucher.

Selles. — Constipation. — Selles semblables à des crottes de lapin. — Élancements, tiraillements, déchirement, prurit et douleurs sécantes à l'anus.

Urines. — Urines jaunes, épaisses, ou rouges et sableuses. — Incontinence d'urines la nuit.

Parties génitales. — Chaleur, cuisson et élancements dans la verge; suintement à la vulve et autour du gland. — Rougeur et gonflement de la vulve. — Chaleur, élancements et prurit à la vulve. — Leucorrhée jaunâtre, épaisse, coulant surtout le matin. — Gonflement douloureux des testicules. — Suppression des règles. — Règles irrégulières, tantôt avançant, d'autres fois retardant. — Impuissance. — Érections fréquentes avec désir de coît, mais cessant de suite. — Pesanteur sur les parties chez les femmes; quand on est debout, il semble que quelque chose va sortir du corps. — Courbature, maux de cœur, nausées la veille de l'apparition des règles.

Larynx. — Toux seche. — Toux criarde par quintes, la nuit. —
Toux forte, avec expectoration d'un peu de sang pur. — Toux
grasse, avec expectoration jaunâtre. — Enrouement. — Toux
grasse, fréquente, surtout quand le temps est mauvais. — Toux
grasse jour et nuit, avec expectoration jaunâtre, fade.

Poitrine. — Respiration génée. — Élancements et picotements dans les clavicules. — Palpitations en montant, en courant; et après tous les mouvements violents. — Élancements au cœur. — Douleurs sourdes au cœur. — Suffocations la nuit.

Tronc. — Douleurs dans les parotides. — Douleurs en tournant le



BARYTA CARBONICA.

c up de succès avant et après baryt., si toutefois les symptômes de la maladie l'indiquent.

• CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Faiblesse physique et nerveuse, et autres souffrances des enfants et des vieillards; Souffrances à la suite d'un refroidissement; Affections scrofuleuses; Engorgement et induration des glandes; Atrophie des enfants scrofuleux; Tumeurs enkystées; Stéatome; Somnolence comateuse; Apoplexie, principalement chez les vieillards, mais aussi chez les ivrognes; Teigne; Alopécie; Ophthalmie et blépharite des personnes scrofuleuses; Prosopalgie inflammatoire; Dartres faciales; Croûte de lait?; Odontalgies, principalement celles par suite d'un refroidissement; Angines phlegmoneuses; Angine tonsillaire avec suppuration; Angine à la suite d'un refroidissement; Angine pendant la petite vérole; Angine couenneuse; Oyspepsie; Squirre de l'estomac?; Catarrhe des voies aériennes; Orthopnée paralytique des vieillards (après avoir administré tart.), etc., etc.

Voy. la note, page 15.

110

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Douleurs dans les articulations et dans les os creux. - Pression crampoïde, ou tiraillement avec faiblesse paralytique, ou bien tension comme par raccourcissement des tendons, dans différentes parties. — Douleurs tractives, aigues, dans les membres, avec horripilation. — La nuit, tressaillement des muscles. — Secousses et tressaillements de quelques membres et de tout le corps, le jour. -- Les symptômes se montrent surtout au côté gauche et lorsqu'on est assis; ils se dissipent par le mouvement, ou au grand air. — *Gonflement et induration des glandes. — Lourdeur dans tout le corps. — Grand malaise et surexcitation de tous les sens. - Grande faiblesse qui ne permet pas de se tenir debout. — Besoin d'être conché ou assis. - *Faiblesse intellectuelle, nerveuse et physique. - *Amaigrissement, ou obouffissure du corps et de la face, avec ballonnement du ventre. - *Forte disposition à éprouver des refroidissements, qui occasionnent principalement des inflammations de la gorge.

Peau. — Sensation à diverses parties, comme des piqures d'épingles brûlantes, démangeantes et formicantes. — La nuit, démangeaison et fourmillement insupportables par tout le corps. — Excoriation et suintement à plusieurs parties de la peau. — *Les lésions de la peau ne se guérissent que difficilement. —

oVerrues. -- Panaris.

Sommeil. - Grande envie de dormir le jour. - *Somnolence so-



BARYTA CARBONICA.

111

poreuse jour et muit. — Sommeil nocturne agité, avec réveil fréquent et rèves anxieux. — La nuit, bouillonnement du sang, forts battements de cœur et sensation au cœur comme s'il était excorié, avec grande anxiété et impossibilité d'être couché sur le côté gauche. — *Sommeil avec rêvasserie.

Fièvre. — Forte disposition frileuse. — Horripilation avec chair de poule et hérissement des cheveux, ou avec tension dans la face. — Horripilation qui parcourt le corps, partant de la face ou de l'épigastre, suivie d'une chaleur passagère par tout le corps. —

*Sucurs nocturnes.

Moral. — 'Humeur pleureuse. — Répugnance pour les personnes étrangères ou la société. — *Inquiétude anxieuse sur ses affaires domestiques. — Esprit scrupuleux, irrésolu, soupçonneux, avec méfiance de soi-même. — Peur et poltronnerie. — Éloignement pour le jeu (chez les enfants). — Accès de colère subit, à propos de bagatelles. — Activité incessante. — *Grande faiblesse de la mémoire de manière à oublier facilement. — *Les enfants sont inattentifs à leurs études.

Tôte. — *Vertige avec nausées, -et mal à la tête *en se baissant. — Douleurs pressives à la tête, principalement dans le front, *au-dessus des yeux et de la racine du nez, ou avec tension à l'occiput, vers la nuque. — Douleurs lancinantes dans la tête, surtout à la chaleur du poêle. — Fouillement dans la tête avec sensation de vacillement du cerveau. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu. — °Disposition à se refroidir la tête. — Démangeaison et rongement au -cuir chevelu. — *Eruptions et croûtes humides ou sèches à la tête. — Tension du cuir chevelu, et chute des cheveux. — °Calvitie.

Yeux. — *Pression et douleur brûlante dans les yeux, surtout en se fatigant la vue, — *Inflammation du globe de l'œil et des paupières avec douleur d'excoriation, sensation de séche-

des paupières avec douleur d'excoriation, sensation de sécheresse et photophobie. — Gonflement des yeux le matin. — *Agglutination des paupières. — Trouble de la vue qui empêche de lire. — Points voltigeants et taches noires devant les yeux.

— Étincelles devant les yeux dans l'obscurité. — °Éblouisse-

ment des yeux par la lumière.

Oreilles. — Démangeaison aux oreilles. — Pulsation nocturne dans les oreilles, en étant couché dessus. — *Éruption aux oreilles et derrière les oreilles. — Parotides gonfiées, douloureuses. — Dureté de l'ouïe. — *Tintement et bruissement dans les oreilles. — Craquement dans les oreilles en avalant, en éternuant, et en marchant vite.

Nes. — Épistaxis, surtout après s'être mouché. — Croûtes audessous du nez. — Odorat très-fin. — *Coryza fluent avec sécrétion abondante de mucosités épaisses. — *Sécheresse pénible

_du nez.

Visage. - Face rouge foncé, avec lèvres pourpres, et fort bouil-



BARYTA CARBONICA.

lonnement de sang. — Sensation de gonflement et tension dans la face, comme si elle était recouverte de toiles d'araignée. — *Douleurs à la face arec gonflement tensif. — *Eruption à la face. — Lèvres sèches, gercées. — En serrant les machoires, douleur aigue dans l'articulation. — *Gonflement des glandes sous-maxillaires et de la lèvre supérieure.

Dents. — Maux de dents seulement le soir, au lit. — Tiraillements, battements et *secousses dans les dents, -allant jusqu'à l'oreille et la tempe. — *Élancements brûlants dans les dents cariées, oexcités par le contact des choses chaudes. — oMaux de dents, avec les règles, avec gonflement rouge pâle des gencives et de la joue. — Saignement des dents et des gencives.

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Accumulation de salive dans la bouche. — Mauvaise odeur de la bouche. — Vésicules entlammées dans la bouche et sur la langue. — Gerçures à la

langue, avec douleur brûlante d'excoriation.

Gorge. — *Maux de gorge avec gonflement du palais et des amygdales, qui suppurent. — Sensation comme si on avait un tampon dans la gorge. — Étranglement et contraction dans la gorge. — Élancements et douleur d'excoriation dans la gorge, surtout pendant la déglutition.

Appétit. — Goût désagréable, ou amer, généralement le matin, avec langue fortement chargée. — Goût aigre, surtout arant et non après le repas. — Soif continuelle. — Appétit faible et prompte satiété, bien que les aliments plaisent au goût. — *Après le diner, douleurs à l'estomac, malaise, paresse et éloignement pour le travail. — *Fuiblesse de la digestion. —

Grande gourmandise.

112

Estomac. — *Renvois après le repas. — Renvois fréquents à vide ou *aigres. — *Écoulement pituiteux de l'estomac. — Vomissement muqueux. — *Nausées, principalement le matin à jeun, et quelquefois comme par suite d'une indigestion. — *Douleurs à l'estomac, à jeun, après le repas, et en appuyant sur l'épigastre. — Sensibilité et douleur à l'épigastre à chaque pas que l'on fait. — *Pesanteur. plénitude et pression dans l'estomac et l'épigastre, même après avoir peu mangé. — *Douleur d'excoriation à la région de l'estomac, avec sensation, en mangeant, comme si les parties par lesquelles passent les aliments étaient toutes à vif.

Ventre. — Maux de ventre soulagés par des renvois, ou par la chaleur extérieure. — Tension et ballonnement douloureux du ventre. — Coliques avec rétraction du nombril. — Pincements et tranchées dans le ventre, avec envie d'aller à la selle, comme pour une diarrhée. — Accumulation de flatuosités dans le ventre.

Selles. — *Selles difficiles oet noucuses, *ou dures et oinsuffisantes. — Selles dyssentériques, avec envie fréquente d'aller à la selle, sensation de malaise anxieux dans la région des lombes, et



114 BARYTA CARBONICA. — BARYTA MURIATICA.

les jambes, comme dans les os. — Démangeaison aux cuisses, même la nuit. — Élancements dans les articulations du genou. — Tension dans le tibia et les mollets. — Crampes dans les mollets et les orteils en étendant les membres. — Inquiétude et tremblement dans les jambes et les pieds. — Douleur dans l'articulation du pied, comme par une foulure. — °Sueur fétide des pieds. — o'Ulcères aux pieds. — o'Gonfiement lymphatique, douloureux, à la partie charnue du gros orteil. — Douleur pareille à celle d'un cor, à la partie calleuse de la plante des pieds, surtout en marchant. — Cors avec élancements brûlants et pincements.

BARYTA MURIATICA.

BAR-M. — Muriate de baryte. — Héring. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 86. — Dose usitée: 30?.

CLINIQUE. — En étudiant les symptômes suivants, le médecin verra s'il peut employer ce médicament contre l'un ou l'autre cas des affections suivantes : — Affections des glandes; Scrofules; Éruptions croûteuses; Gastrite; Entérite; Diabète?; Gonorrhée chronique; Asthme humide; Hydropisie à la suite de la scarlatine, etc., etc.; Blennorrhée des poumons; Petite vérole et varioloïdes; Angines malignes; Inflammations arthritiques des articulations des mains et des pieds.

Voy. la note, page 15.


SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande faiblesse qui force à se coucher. — Faiblesse et prostration, allant presque jusqu'à la paralysie. — Syncope. — Roideur et insensibilité du corps, avec convulsions périodiques. — Lourdeur générale. — Tremblement des membres. — Tremblement convulsif. — Tressaillement à la face, ou dans quelques membres, ou dans tout le corps. — Accès périodiques de convulsions avec tressaillements et jactations excessives.

Peau. — Picotement à la peau. — Brûlement et picotement aux endroits excoriés. — Petites éruptions galeuses à la tête, à la nuque, à l'abdomen et aux cuisses. — Glandes enflammées et ulcérées. — Hémorrhagies.

Fièvre. — Chaleur sèche générale, la nuit et le jour. — Rougeur et chaleur de la face. — Pouls fréquent et plein. — Fièvre tierce.

- Transpiration augmentée. - Sueur froide.

Moral. — Forte anxiété avec gastralgie, nausées et vomiturition.



BARYTA MURIATICA. — BELLADONA.

Tête. — Vertiges, tournoiement devant les yeux. -- Tête embarrassée et lourde. — Céphalalgie avec vomissement. — Eruptions très-purulentes au cuir chevelu. - Eruptions croûteuses à la tête et au cou. — Éruption à la nuque.

Youx et Oreilles. — Yeux fixes et immobiles. - Pupilles dilatées et insensibles, avec regard fixe. — Blennorrhée des yeux, des

oreilles et du nez. — Surdité en vomissant.

Visage et Dents. — Douleurs tractives dans les muscles de la face. - Nodosité douloureuse au bout du nez avec un léger picotement. — Douleurs lancinantes, pulsatives, aux dents, surtout en se réveillant, après minuit. — Vacillement des dents.

Bouche et Gorge. — Gonflement des glandes salivaires et du palais. - Langue chargée. — Langue et bouche sèches. — Fétidité de

la bouche comme par le mercure. — Goût putride de la bouche et des aliments. — Perte d'appétit. — Soif. — Déglutition difficile. Estomac et Ventre. — Envie de vomir. — Vomiturition. — Vomissement le matin avec anxiété. — Vomissement d'une petite quantité d'eau avec nausées. — Mal au cœur. — Pression à l'estomac, avec spasme. - Sensation de chaleur, montant de l'estomac vers la poitrine et la tête. — Douleur brûlante dans l'estomac avec vomissement. — Les membranes de l'estomac sont bleu rouge, avec taches rouges à la partie musculaire. — Le fond de l'estomac est enflammé avec ecchymoses isolées. — Malaise comme par des vers. - Douleurs brûlantes à l'abdomen. - Tuméfaction du foie.

Selles et Urines. - Selles muqueuses. -- Selles faciles. -- Diarrhée lente sans douleurs. — Urines fréquentes, involontaires et douloureuses. - Flux d'urines. - Sédiment blanchâtre de

l'urine. — Gonflement des testicules.

Parties génitales. — Émission fréquente de sperme. — Règles trop

hâtives. — Douleurs de meurtrissure dans la cavité pelvienne. Poitrine. — Catarrhe avec chaleur. — Chaleur dans la partie supérieure de la poitrine. — Oppression. — Toux. — Battements de cœur accelérés. — Palpitations de cœur. — Le cœur bat même après la mort et pendant longtemps. - La cavité du cœur est remplie de sang coagulé.

Tronc et Membres. — Douleurs au dos. — Crampes dans les orteils. — Douleurs tractives dans les cuisses. — Tuméfaction des

mains et des pieds.

BELLADONA.

ELL. — Belladone. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 474. — Doses usitées: 12, 30. — Durée d'action: 4 et 5 jours dans les affections aiguës, et jusqu'à 8 semaines dans quelques affections BELL. chroniques.




BEŁLADONA.

116

ANTIDOTES: Coff. hyos. hep. vinum. (Contre des empoisonnements per de fortes doses: Coffea tosta). — L'application du vinaigre aggrave les souf-frances. — Ce sont: Acon. cup. fer. hyos. merc. plat. plumb. qui trouvent leur antidote en belladona.

COMPARER AYEC: Acon, agar, alum, amm, arn, ars, aur, bar, calc. canth, caus, chum, chin, ciu, coff. coloc, con, eupr, dig, dulc, fer, hep, hyas, lach, merc, nitr-uc, op, phos, phos-ac, plat, plumb, puls, rhus, seneg, sep, sil, stram sulf, raler, — C'est surtout après hep, lach, merc, et nitr-ac,, que belladona est souvent convenable. Après belladona, conviennent quelquefois: Chin, con, dulc, hep, lach, rhus, seneg, stram, valer.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas particuliers dans lesquels on pourra consulter ce médicament contre : - Affections principalement des personnes de constitution lymphatique ou pléthorique, avec disposition à l'engorgement des glandes ou à des inflammations phlegmoneuses; maladies des enfants et des femmes, ainsi que des personnes à tempérament doux, yeux bleus, cheveux blonds, teint coloré et peau delicate, etc., etc.; Souffrances par suite d'un refroidissement; Affections à la suite d'une peur, d'une frayeur, ou d'un chagrin; Suites facheuses de l'abus de la valériane, du mercure, de la camomille ou de l'opium; Affections rhumatismales et arthritiques, avec ou sans fièvre inflammatoire et gonflement; ('ongestions sanguines; Engorgement des glandes avec suppurations; Affections scrofuleuses et rachitiques; Atrophie des enfants scrofuleux; Cachexie par l'abus du quinquina; Ictère; Ergotisme; Crampes, convulsions, tétanos, spasmes hystériques, éclampsie, épilepsie, danse de Saint-Guy et autres affections spasmodiques; Paralysies; Affections squirreuses et carcinomateuses; Ulcères scrofuleux et mercuriels; Charbons; Furoncles; Engelures; Piqures d'insectes; Pemphigus?: Erysipèles simples et phlegmoneux; Erysipèle vésiculeux (avant rhus); Scarlatine; Miliaire pourprée (après aconit); Rougeole; Métastase de la petite vérole sur les membranes du cerveau: Lethargie; Insomnie; Fièrres inflammatoires, avec affections nerveuses, gastriques, ou rhumatismales; Fièvres intermittentes; Fièvres lentes; Fièvres typhoides; Imbécillité, delirium tremens, alienations mentales, mélancolie, manie et autres affections morales, soit par suite d'une frayeur, d'un chagrin ou autres causes; Hydrophobie; Congestions cérébrales, avec rertiges; Apoplexie sanguine: Encéphalite, première période; Hydrocéphale aiguë; Céphalalgie, aussi celle par suite d'un refroidissement; Migraine; Ophthalmies, aussi chez les personnes scrofuleuses ou arthritiques; Hémorrhagie oculaire; Ophthalmo-spasme; Strabisme?; Taches et ulcères de la cornée; Fongus médullaire aux yeux; Amblyopie amaurotique, aussi à la suite de travaux fins; Otite; Parotite; Dureté de l'oule, aussi par suite d'un refroidissement: Inflammation phlegmoneuse du nez: Hémorrhagie nasale: Prosopalgie nerveuse;




BELLADONA.

117

Éruptions faciales boutonneuses chez les enfants et les adultes; Érysipèle de la face; Croûte de lait?; Induration squirreuse des lèvres; Odontalgie, principalement chez les femmes, et surtout les femmes enceintes; Dentition difficile des enfants; Salivation par suite de l'abus du mercure; Trismus; Glossite; Balbutiement; Angines phlegmeneuses; Angines tonsillaire, pharyngée et uvulaire; Angine commence; Anorexie, dyspepsie, vominement et autres affections gastriques; Hoquet convulsif; Hématémèse?; Gastralgie; Hépatite; Ictère; Coliques spasmodiques et flatulentes; Entérite ?; Péritonite?; Diarrhée, sans ou avec vomissement, par suite d'un refroidissement; Dyssenterie; Hémorrholdes; Néphrite; Métrite; Dysménorrhée; Métrorrhagie; Chute, induration squirreuse et affection carcinomateuse (?) de l'utérus; Souffrances à la suite d'un avortement; Affections morales, odontalgie, gastralgie et coliques des femmes enceintes; Douleurs spasmodiques, mais impuissantes pour accoucher, avec crainte et tremblement chez les femmes d'une fibre rigide; Spasmes des femmes en couche; Adhérence du placenta; Tumeur blanche, nymphomanie et autres affections des femmes en couche; Péritonite puerpérale, principalement celle à la suite d'émotions morales, ou de suppression du lait; Fièvre de lait; Galactorrhée et souffrances à la suite du sevrage; Erysipèle aux mamelles, principalement à la suite du sevrage; Gonflement, induration (et cancer?) des glandes mammaires; Ophthalmie, cris, convulsions et autres souffrances des nouveau-nés; Affections catarrhales des voies aériennes; Aphonie; Grippe; Toux, surtout la toux nerveuse et convulsive; Coqueluche; Croup?; Pneumonie; Asthme spasmodique, hystérique, congestif, etc., etc.; Hémoptysie; roideur rhumatismale de la nuque; Coxalgie, etc., etc.; Luxation spontanée chez les enfants.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs lancinantes, ou déchirantes, pressives, dans les membres. — Douleurs de meurtris-- Les douleurs s'aggravent sure dans les articulations et les os. principalement la nuit, ou après midi, vers les 3 ou 4 heures. Le moindre contact, et quelquesois aussi le mouvement, aggravent les souffrances. - Quelques-unes des souffrances s'aggravent ou apparaissent aussi après avoir dormi. - Tressaillement dans les membres, palpitations musculaires et soubresauts des tendons. — Sensations dans les muscles, comme si une souris les parcourait. — *Crampes, spasmes et mouvements convulsifs et contorsion violente des membres; *accès de convulsions, avec cris et perte de connaissance; *conrulsions épileptiques, avec orétraction des pouces. — *Accès d'immobilité et de roideur spasmodique du corps ou de quelques membres, -quelquefois avec insensibilité, gonflement des veines, bouffissure et rou-



BELLADONA.

118

geur du visage, pouls plein et accéléré, avec sueur abondante. *Accès de tétanos, aussi avec renversement de la tête. *Accès de spasmes, avec rires involontaires. — Avant les accès de convulsions, formication, avec sensation de gonflement et de torpeur dans les membres; ou coliques et pression dans le ventre, s'étendant jusqu'à la tête; après les accès, oppression de poitrine, comme par un poids lourd. — Les accès se renouvellent par le moindre contact, ainsi que par la contrariété la plus légère. Grande inquiétude dans la tête et les membres, principalement les mains. - *Tremblement des membres, avec fatigue et lassitude. - *Lourdeur dans les membres, avec lassitude, grande paresse et -horreur de tout mouvement et de tout travail. -*Chute des forces, faiblesse paralytique et paralysie des membres. — *Paralysie et insensibilité de tout un côté du corps. — Accès d'évanouissement et de syncope, avec perte de tout sentiment et de tout mouvement, comme dans la mort. — Bouillonnement de sang, avec congestion à la tête et fatigue jusqu'à s'évanouir. — Surexcitation et trop grande impressionnabilité de tous les organes. — Disposition à se refroidir facilement, avec grande sensibilité à l'air froid. — *Formication dans les membres. — *Congestions diverses, avec sensation comme si la partie affectée allait éclater.

Peau. — *Gonflement avec chaleur et rougeur écarlate de tout le corps ou de *plusieurs parties*, principalement du visage, du cou, de la poitrine, du ventre et des mains. — *Inflammation érysipélateuse, avec phlegmon, qui, quelquefois, passe à la gangrène. — Gangrène et sphacèle de plusieurs parties. — *Plaques rouges, enflammées, et taches écarlates sur plusieurs parties du corps, quelquesois avec pouls petit, acceléré, gêne de la respiration, toux violente, délire, mémoire plus vive, besoin de se frotter le nez, et pupilles dilatées. — Taches rouges couleur de sang, par tout le corps, principalement au visage, au cou et à la poitrine. - *Éruption semblable aux morbilles. Éruption de pétéchies, avec prurit et rougeur de tout le corps. Vésicules qui suintent des sérosités abondantes, et qui sont tellement douloureuses qu'elles forcent à crier et à gémir. oEruption de pustules à bords blanchâtres, avec des escarres noires, et gonflement œdémateux de la partie malade. — Éruption rouge, squameuse à la partie inférieure du corps. — Tumeurs et nodosités froides et douloureuses. — Douleurs d'excoriation, brûlement et tiraillement dans les ulcères, principalement au toucher, pendant le mouvement et la nuit. - *Gonflement rouge, chaud et luisant des parties malades. - Les ulcères sécrètent un pus sanieux et sanguinolent. — *Furoncles. - oEngelures. - *Gonflement douloureux des glandes.

Sommeil. — *Envie de dormir continuelle, quelquefois avec obnubilation de la tête, pendiculations et bâillement, et principale-



120

tion à s'effrayer facilement. - Radoteries, délires et manie, avec gémissements, disposition à danser, à rire, à chanter et à siffler; *manie avec gémissements ou avec rires involontaires; *délires nocturnes; *delires avec murmures; délires où l'on voit des loups, des chiens; delires furibonds; des incendies, etc., etc.; délires par acrès, et quelquefois avec fixité du regard. — Grande apathic et indifférence, désir de la solitude, horreur de la société et de tout bruit. - Répugnance pour la conversation. - Mauvaise humeur, caractère irritable, susceptible, avec disposition à se facher, à se quereller et à offenser. - *Folie, avec farces plaisantes et ridicules, gesticulations, actes de démence, manières impudentes. - *Fureur et rage, avec envie de frapper, de cracher, de mordre et de tout déchirer, et quelquefois avec grondements et aboiements, comme ceux d'un chien. — Accablement et faiblesse de l'esprit et du corps. - Horreur de tout travail et de tout mouvement. - *Démence, jusqu'à ne plus connaître les siens, illusions des sens et visions effrayantes. - *Perte complète de la raison, stupidité, inadvertance et distraction, inaptitude à la méditation et grande faiblesse de la mémoire.

Tête. - Embarras de la tête, obnubilation et état d'ivresse, principalement après avoir bu et mangé, ou bien le matin. — *Accès de rertiges, avec chancellement, tournoiement dans la tête, hébétude, étourdissement, nausées, tremblement des mains, anxiété, et scintillement devant les yeux, principalement le matin en se levant, ou en se redressant, et en se baissant. - Vertiges urec angoisse, chute et perte de connaissance, -ou avec lassitude et satigue avant et après l'accès. - *Stupeur et perte de connaissance, ede manière à ne reconnaître les siens que tout au plus par l'ouïe, quelquefois avec pupilles dilatées et bouche et yeux à demi ouverts. - *Plénitude, pesanteur et pression violente dans la tête, principalement au front, au-dessus des yeux et du nez, ou dans un côté de la tête, *et quelquesois avec étourdissement, stupeur et sensation, comme si le crâne allait éclater, ou avec mauvaise humeur et gémissements, traction des paupières et besoin de se coucher. - *Sensation de ballonnement et d'expansion pressire dans le cerveau. — *Douleurs vives, tractives et lancinantes dans la tête. — *Élancements dans la tête comme par des conteaux. - *Battements violents dans la tête. - *Forte pulsation des artères de la tête. - *Bouillonnement et congestion de sang à la tête, -principalement en se buissant. - *Sensation de froid ou de chaleur à la tête. - . *Sensation de fluctuation dans le cerveau, comme s'il y avait de l'eau dedans. — Sensation, pendant les douleurs, comme si le crâne était trop mince. — *Sensation d'un balancement lourd dans le cerceau, et secousses dans la tête, principalement en mar-chant vite et en montant. - Maux de tête quotidiens, depuis 4 heures après midi environ jusqu'au lendemain matin vers les



quelquesois avec brûlement. — *Élancements nocturnes au nez. — •Gonstement, *rougeur et brûlement au bout du nez. — *Ulcération douloureuse des narines. — Nez très-froid. — *Saignement de nez, -principalement la nuit et le matin. — •Hémorrhagie nasale et buccale. — •Grande sécheresse du nez. — *Odorat ou trop sensible, -surtout pour la sumée du tabac, •ou diminué. — *Odeur putride du nez. — Coryza fluent d'une seule narine ou alternant avec obturation du nez. — Odeur de hareng dans le

nez, pendant le coryza.

Visage. -- *Fuce pâle, alternant quelquefois subitement avec rougeur. - *Face creuse avec traits inquiets et air égaré. - *Chaleur brûlante du visage, quelquefois sans rougeur. — *Rougeur ardente et bouffissure du visage, comme après avoir bu du vin. -*Rougeur foncée, ou écarlate, ou bleuûtre du visage. — *Gonflement dur et rougeur bleuatre du visage, principalement (de l'une) des joues, et quelquefois avec brûlement, élancements, térébration et pulsations. - Taches écarlates ou couleur rouge foncé à la face. — *Éruption de boutons rouges aux tempes, aux coins de la bouche et au menton. - *Boutons purulents et croûteux, principalement aux joues et au nez. — Epaississement de la peau du visage. — Pression crampoïde, douleurs vives et tractives aux pommettes. — Douleur névralgique, violente, incisive, au visage, suivant le cours du nerf sous-orbitaire. - *Palpitations musculaires et mouvements convulsifs au visage, principalement à la bouche qui est tirée vers l'oreille. — Induration et *gonflement des lèvres, oavec élancements par un temps rude. — •Rougeur foncée et sécheresse des lèrres. — *Boutons, croûtes et ulcères (avec auréole rouge) aux lèvres et aux coins de la bouche. — *Serrement convulsif des mâchoires avec impossibilité d'ouvrir la bouche. — Sensation comme si la mâchoire intérieure s'était rétractée. — Douleurs vives aux mâchoires; *élancements et tension aux articulations sous-maxillaires. - *Gonflement des glandes sous-maxillaires et de celles du cou -avec douleurs (lancinantes) nocturnes.

Dents. -- Grincement violent des dents. — *Douleurs vives et tractives ou tiraillements successifs aux dents, quelquefois avec douleurs aux oreilles, et principalement la nuit ou le soir, pendant un travail intellectuel, ou bien après avoir mangé. — *Le contact et le grand air aggravent les maux de dents. — *Maux de dents avec fluxion à la joue. — Térébration dans les dents cariées et écoulement de sang en y suçant. — Gonfement douloureux des gencives avec chaleur, prurit et pulsations, ou avec douleur d'ulcération au toucher. — Saignement des gencives. —

Vésicules aux gencives avec douleur de brûlure.

Bouche. - * Sensation d'une grande sécheresse, ou sécheresse réelle, excessive. étouffante dans la bouche. - *Écume devant la bouche. quelquefois de couleur rougeâtre, -ou d'une odeur d'œus

122



plète de romir; vomissement des aliments ou de matières muqueuses ou bilieuses, ou acides et séreuses; ovomissement avec diarrhée ou avec vertiges, chaleur et sueur. - *Hoquet spasmodique, quelquefois avec sueurs et convulsions. - *Pression, douleurs crampoides et contractives, sensation de plénitude et ballonnement, à l'estomuc et dans l'épigastre, principalement après avoir mangé, ou en mangeant. — Elancements, battements, pulsations et brûlement dans l'estomac et dans la région précordiale.

- Inflammation de l'estomac et du duodénum.

Ventre. — Coliques avec constipation, flux abondant d'urine, rapports et envie de vomir. -- Douleur violente dans le ventre, qui ne laisse reposer nulle part. — Élancements dans le côté gauche du ventre, en toussant, en éternuant et au toucher. -- Douleurs et brulement aux hypocondres. -- *Pression dans l'abdomen comme par une pierre, "principalement au bas-ventre et aux aines.

*Ballonnement et tension du ventre, "principalement aux hypocondres. - *Douleurs crampoides contractives et constrictires, et pincement dans le ventre, surtout autour du nombril ou à l'hypogastre, avec sensation comme si l'une ou l'autre des parties était serrée ou saisie par des ongles; les douleurs forcent à se plier, et sont quelquefois accompagnées de vomissement ou de ballonnement et saillie du colon en forme de bourrelet. oFouillement dans le ventre. — Tranchées et élancements dans le ventre comme par des couteaux. — Chaleur et grande angoisse dans le ventre. - Borborygmes dans le ventre avec sortie fréquente de flatuosités sans odeur. - *Endolorissement de tout le rentre comme si tout y était excorié et au vif, et sensibilité douloureuse des téguments du ventre au toucher. — Élancements aux aines. - Prurit au ventre.

Selles. — *Selles supprimées et constipation, -quelquefois avec ballonnement du ventre, chaleur à la tête et sueurs abondantes. - Selles dures, insuffisantes. - Envie fréquente d'aller à la selle arec ténesme et sans résultat. — Petites selles fréquentes, souvent avec ténesme. — Selles blanchatres comme de la craie, ou verdatres; selles aqueuses *ou muqueuses. - Selles diarrhéiques, avec envie de vomir et douleurs pressives à l'estomac. -- *Selles involontaires, -par paralysie du sphincter de l'anus.

Envie frequente d'uriner. — *Émission fréquente Urines. d'urines abondantes, pâles et aqueuses, -quelquefois avec *sueurs abondantes, soif. appétit augmente, diarrhée et obscurcissement de la vue. - *Incontinence et émission involontaire d'urine, même la nuit et pendant le sommeil. — Paralysie du col de la vessic. - *Urines troubles, couleur jaune, ou limpides, couleur d'or ou de citron, ou rares et couleur rouge brunâtre ou couleur de sang, ou couleur rouge vif. - Dépôt rouge ou blanchâtre et épais dans les urines. -- Sensation d'un mouvement dans la

124



126

manque d'haleine, amélioré au grand air. — En marchant, oppression crampolde de la poitrine, avec besoin de respirer profondément. — *Pression dans la poitrine, avec douleur dans les omoplates et haleine courte. — Tension dans la poitrine. — *Élancements dans la poitrine, quelquesois comme par des conteaux. et principalement en toussant et en bâillant. — Grande inquiétude et battements dans la poitrine. — *Battements de cœur ciolents, qui répondent quelquesois jusqu'à la tête. — Palpitations de cœur en montant. — oTremblement du cœur, *avec anyoisse, oet douleur pressive.

Tronc. — Vésicules douloureuses, remplies d'eau, ou petites taches couleur rouge foncé à la poitrine. — Douleur de luxation, douleurs rhumatismales et tractives, au dos et entre les omoplates. — Furoncle à l'épaule. — Élancements comme par des couteaux, dans les os de la colonne vertébrale. — Rongement dans l'épine dorsale, avec toux. — Roideur douloureuse et douleurs crampoïdes aux reins et au dos. — *Gonflement douloureux et roideur du cou et de la nuque. — Gonflement douloureux et glandes du cou et de celles de la nuque. — Douleurs vives aux aisselles. — Boutens rouges et purulents au dos et à la nuque. — Veines gonflées au cou. — Sueur acide, seulement au cou.

Bras. — Bras engourdis et douloureux. — *Pression tractive avec sensation de torpeur et douleurs vives aux bras. — Envie d'étendre les bras. — Torpeur et pesanteur des bras. — *Gonflement et rougeur écarlate des bras et des mains. — *A l'épaule, douleur tractive et pressive, parcourant rapidement depuis le haut jusqu'au bas du bras, et se manifestant surtout la nuit, diminuée par la pression extérieure, provoquée par le mouvement. — *Tressaillements douloureux, crampes et convulsions aux bras et aux mains. — Tremblement des mains. — Pression avec douleurs vives dans les os du carpe et du métacarpe. — Roideur arthritique des articulations de la main. — Luxation fréquente des articulations des doigts. — Rétraction des pouces. Jambes. — °Élancement et douleurs brûlantes, s'aggravant par

fréquente des articulations des doigts. — Rétraction des pouces. Jambes. — °Élancement et douleurs brûlantes, s'aggravant par accès, à l'articulation coxo-fémorale, plus insupportables la nuit et augmentées par le moindre contact. — Roideur à la hanche, après être resté assis, avec difficulté de se relever. — Douleurs à la hanche qui forcent à boiter. — Tremblement des genoux. — Douleurs tractives dans les jambes, surtout aux genoux. — *Pesanteur et paralysie des jambes et des pieds. — Fléchissement des genoux et des pieds en marchant. — Tension des tendons du jarret. — Gonflement des pieds. — Fourmillement aux pieds.



128 BENZOIS ACIDUM. -- BERBERIS VULGARIS.

Gorge comme rétrécie ou gonflée; Déglutition dissicile.

Goût amer du café et du lait; goût savonneux de l'eau; Hoquet; Vomissement de matières amères ou salées; nausées pendant la grossesse. — *Aigreurs d'estomac; *renvois et vomissements acides. — *Manque d'appétit alternant arec boulimie; *soif continuelle.

Selles diarrhéiques, putrides et sanguinolentes; Selles diarrhéiques, chez les enfants, fétides, blanchatres, aqueuses, très-copieuses

et débilitantes, avec urine d'un rouge très-foncé.

Urines épaisses, sanguinolentes : envie fréquente d'uriner, avec grande irritabilité de la vessie; odeur aromatique et goût salé des urines; eUrine fortement colorée, couleur d'eau-de-vie, avec très-forte oleur; eUrine d'une pesanteur spécifique augmentée, descendant, sans mélange, au fond d'un vase où il y avait déjà d'autres urines; eUrine brûlante, corrosive, d'une forte odeur et d'un rouge très-foncé, causant une douleur insupportable à son passage.

Bègles suivies de faiblesse; Lochies de trop longue durée.

oToux courte et sèche, fatigante et presque constante; toux avec

expectoration de mucosités verdâtres.

Poitrine comme gonfiée à l'intérieur; Accumulation de mucosités dans les bronches; Palpitations, dans la position assise ou après avoir bu; Géne des vétements à la poitrine; Battements onduleux du cœur. -- *Asthme arec dysurie.

Doigts couverts de taches rouges; Douleurs paralytiques dans les

articulations.

Membres inférieurs comme serrés par un bandeau; °Sciatique périodique, nocturne; Sensation de sécheresse dans l'articulation du genou; Affection goutteuse des tarses; Douleurs dans les articulations des orteils, avec gonflement léger et rougeur.

BERBERIS VULGARIS.

BERB. — Épine-vinette. — HESSE. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 478. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : Plusieurs semaines.

Antidote : Camph.

CLINIQUE. ... Guidé par l'ensemble des symptômes, on verra si l'on pourra consulter ce médicament contre: ... Affections rhumatismales des extrémités et d'autres parties; Céphalalgie et ophthalmie par sulte de désordre dans les fonctions abdominales, ou en rapport avec des affections arthritiques et rhumatismales; Souffrances gastriques; Diarrhées; Affections du foie et souffrances hémorrhoulales; Affections des voies urinaires et des parties géni-



BERBERIS VULGARIS.

frissons, commençant le matin, après le réveil. — Tête embarrassée comme avant un coryza. — Sensation comme si la tête avait augmenté de volume. — Sensation de gonflement à la tête. — Douleurs pressives, tensives, au front, aux tempes et aux yeux. — Céphalalgie au front et aux tempes, comme une pression de dedans en dehors. — Douleurs aiguës, lancinantes, au front et aux tempes. — Téguments de la tête comme tendus et gonflés. — Chaleur dans la tête après le dîner et le matin. — Sueur après des efforts, en se baissant ou en restant debout. — Petites taches rouges au front et aux joues. — Démangeaison ou élancements rongeants dans les téguments de la tête et du visage. — Pustules

aux téguments de la tête et au visage.

130

Yeux. — Yeux enfoncés, avec cercle bleu ou gris sale. — *Pression et sensation de brûlure dans les yeux. — Sensibilité douloureuse des yeux en lisant à la lumière des bougies. — Sensation de roideur avec pression dans les yeux. — Élancements aux yeux, venant d'autres parties (par exemple, du front), et se propageant vers les yeux, et de là au front. — Brûlement et sécheresse aux yeux, qui sont ternes. — Rougeur de la conjonctive avec vue trouble, comme s'il y avait un voile devant les yeux, le matin après le lever. — Vue indistincte, meilleure de près qu'à distance. — Sensibilité des yeux à la clarté du soleil. — Douleurs vives dans le globe de l'œil et aux paupières. — Pesanteur aux paupières pendant le mouvement. — Douleurs brûlantes ou rongeantes dans les paupières. — Mouvements convulsifs des paupières en lisant à la lumière des hongies.

Oreilles. — Démangeaison, tantôt rongeante, tantôt brûlante, tantôt lancinante, quelquefois avec petites pustules, à l'oreille extérieure. — Petites tumeurs sous et derrière l'oreille (glandes sous-cutanées?). — Douleurs aiguës et lancinantes dans l'intérieur de

l'oreille et à d'autres parties.

Nez. — Sécheresse du nez. — Coryza avec sécrétion, d'abord de sérosités jaunâtres, ensuite de mucosités purulentes, blanchâtres, jaunâtres ou verdâtres, surtout le matin. — Douleurs fourmillantes

ou rongeantes dans les narines.

Visage. — Chaleur bleuâtre de la partie interne de la lèvre inférieure. — Sécheresse des lèvres, et exfoliation de l'épiderme, avec croûte plate, brunâtre, sur les bords. — Sensation de brûlure à l'extérieur des lèvres. — Sensation de fourmillement aux lèvres. — Petites pustules aux lèvres. — Douleurs aiguës pressives, ou aiguës lancinantes aux pommettes et à la mâchoire. — Grande pâleur du visage, teint gris sale, avec joues creuses et yeux enfoncés, entourés d'un cercle bleuâtre ou gris noir. — Aspect très-abattu, pendant longtemps.

Dents. — Douleurs tractives aiguës et élancements aux dents, avec sensation comme si les dents étaient agacées ou trop grosses, ainsi qu'avec grande sensibilité des dents à l'air frais, surtout



BERBERIS VULGARIS.

132

— Urines épaisses, jaunâtres comme du petit lait ou de l'eau argileuse. — Urines d'un jaune foncé, avec sédiment abondant. — Urines rougeâtres, comme enflammées, avec sédiment abondant. — Urines rougeâtres, sanguinolentes, avec sédiment muqueux et farineux abondant, couleur rouge vif. — L'émission des urines est sourent accompagnée de douleur dans les cuisses et les reins.

Parties génitales. — Douleurs brûlantes, cuisantes au gland. —
Sensation de froid au gland et au prépuce, quelquefois avec sensation de torpeur. — Sensation de faiblesse et d'insensibilité des
parties génitales extérieures. La verge semble être racornie et
rétractée. — Douleurs pressives, tractives, contractives, aux testicules et aux cordons spermatiques, avec contraction du scrotum,
qui parait froid et racorni. — Douleurs d'excoriation au scrotum.

Le mouvement excite ou aggrave la plupart des affections des
parties génitales. — Douleurs cuisantes, brûlantes, lancinantes,
tractives ou serrantes aux cordons spermatiques, s'étendant jusque

vers les testicules. — Gonflement du cordon spermatique, avec douleurs se dirigeant vers les testicules. — Après le coît, sensation de grande faiblesse dans les parties génitales. — Diminution de l'appétit vénérien. — Éjaculation trop prompte dans le coît.

Règles. — Jouissance tardive chez les femmes pendant le sett, et souvent accompagnée de douleurs incisives ou même lancinantes. — Sensation de brûlure et d'excoriation dans le vagin, jusque dans les lèvres. — Règles pâles, d'un sang séreux. — Pendan les règles, douleurs dans les parties génitales et les reins, ou douleurs violentes à la tête, avec sensation d'évanouissement. — Règles peu abondantes, avec douleurs aiguës, tractives, dans tout le corps, ballonnement douloureux du ventre, mal aux reins, élancements dans la poitrine, air abattu et douleurs violentes à la tête; ou avec mauvaise humeur, dégoût de la vie, abattements, douleurs cuisantes dans le vagin, sensation de brûlure et d'excoriation à l'anus, et douleurs dans les bras jusque dans les épanles et la nuque.

Larynx et Poitrine. — Enrouement avec endolorissement ou inflammation des glandes du cou. — Sensation d'excoriation dans la poitrine. — Oppression de la poitrine, surtout la nuit, avec coryza fluent violent. — Douleurs laucinantes au centre de la poitrine, augmentées, en respirant profondément, avec toux sèche, courte. — Elancements douloureux dans le côté gauche de la poitrine. — Serrement avec élancements dans la région du cœur. — lettements du cœur.

Battements de cœur.

Tronc. — Douleurs lancinantes entre les omoplates, augmentées par la respiration. — Douleurs tractives, aiguës, dans l'épine dorsale. — Pustules au dos. — Sensation de tension, de roideur et de torpeur dans les reins, comme s'ils étaient gonfiés ou engourdis. — Douleurs pressives, tensives, tractives, aiguës ou lancinantes, aux reins. — Sensation de pression tensive dans les reins,



BISMUTHUM.

134

BISMUTHUM.

BIS.—Bismuth (Bismuthum nitricum). — HAHNEHANN.—Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 87. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 4 à 5 semaines.
ANTIDOTES : Calc. caps. (nux-vom.)

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a employé ce médicament puissant que contre quelques cas de Gastralgie et de Prosopalgie.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Contractions crampoldes de tous les muscles. — Douleurs pressives ou pressives et tractives à la fois. — Grande somnolence le matin après s'être levé. — Sommeil avec réveil en sursaut avec effroi. — Rêves voluptueux. — Lassitude quand on s'éveille la nuit. — Cuisson brûlante à la peau. — Froid glacial de tout le corps. — Forte chaleur. — Pouls petit, intermittent. — Mécontentement, humeur morose et plaintes. — Inconstance. — Aversion pour la solitude. — Délire. Delirium tremens. — Perte de connaissance. — Apathie et insensibilité morale.

Tôte et Yeux. — Étourdissements le matin. — Vertiges comme si le cerveau tournoyait. — Vertiges violents, avec pression au front, rougeur de la conjonctive, avec trouble, pression dans l'estomac, pouls spasmodique, et bourdonnement des oreilles. — Stupeur avec brouillard devant les yeux. — Mal de tête, principalement au sinciput, s'étendant même jusqu'aux yeux. — Pesanteur pressive à la tête, surtout au front, au-dessus de la racine du nez et aux tempes. — Fouillement continuel et térébration au front, qui se propage jusqu'aux yeux et au bout du nez. — Contraction brûlante dans la tête, surtout au front et aux yeux. — Pression aux prunelles. — Chassie dans les angles des yeux.

Visage. — Face terreuse, maladive et défaite, avec yeux cernés. —
*Douleur pressive aux pommettes. — Visage pâle, froid.

Dents. — Odontalgie pressive, tractive. — Gencives gonfiées, avec douleurs d'excoriation. — Sensibilité douloureuse de l'intérieur de la bouche comme par excoriation. — Sécrétion continuelle d'une salive brunâtre, épaisse, d'un goût métallique. — Inflammation de toute la gorge. — Douleur brûlante dans la gorge, quelquefois insupportable. — Le matin, goût de sang dans la bouche, avec expuition de mucosités sanguinolentes. — Le soir,



BORAX VENETA.

136

sons; Ophthalmies; Hémorrhoïdes muqueuses; Otite; Otorrhée purulente; Affections scrofuleuses. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs lancinantes et tractives. — *Apparition et aggravation des souffrances par un temps maurais et humide, ou pendant et après le repas. — Souffrances pour avoir été en voiture ou pour avoir mangé des fruits. — Inquiétude dans tout le corps qui ne permet pas qu'on reste long-temps à la même place. — Inquiétude, tremblement, nausées, étourdissement et vertiges après une conversation animée ou pendant la méditation. — Manque de force, surtout dans les articulations. — Accès d'évanouissement, avec fourmillement, tremblement des pieds et nausées.


Peau. — Peau maladire; toute lésion tend à s'ulcérer. — Inflammations érysipélateuses, avec gonflement et tension de la partie affectée, et fièvre. — *Tendance des anciennes blessures à suppurer. — Boutons blanchâtres, avec auréole rouge. — Éruptions herpétiques. — Vésicules purulentes et phagédéniques.

Sommeil. — Envie de dormir bien avant l'heure ordinaire, et sommeil du matin trop prolongé. — Sommeil inquiet à cause d'un bouillonnement de sang, de colique et de diarrhée. — Réveil de trop bonne heure, avec difficulté de se rendormir, par chalcur et trop grande affluence d'idées. — *Cris anxieux des enfants pendant le sommeil avec mouvements convulsifs des mains.

Fièvre. — Frissonnement, horripilation, et froid avec tremblement, assoupissement et faiblesse, ou avec céphalalgie et douleurs ostéocopes au fémur, suivies de chaleur. — Froid, le plus souvent après midi; ensuite chaleur, avec mal de tête ou douleur aux hypocondres, quelquefois suivie de sueur. — Soif arant ou pendant le froid, ou bien après la sueur. — Chaleur le soir, au lit, avec frisson pour peu qu'on se découvre. — Moiteur du corps la nuit.

Moral. — Grande anxiété, surtout quand on est en voiture ou qu'on descend une montagne. — Peur d'être infecté de quelque maladie contagieuse. — Grande disposition à s'effrayer. — Irritabilité. — Disposition à se facher, avec mauvaise humeur et emportement. — Horreur du travail.

Tôte. — Acces de vertige, avec évanouissement. — Vertige avec plénitude dans la tête, surtout en montant un escalier, ou gravissant une élévation quelconque. — Mal à la tête, avec élancements dans les oreilles. — Mal à la tête, avec nausées et enviée de vomir, le plus souvent le matin à 10 heures. — Plénitude dans la tête, avec pression au-dessus des yeux. — Douleus pressives et tractives au front et jusque dans la racine du nez et



BORAX VENETA.

Peau du palais racornie et ridée. — Sécheresse dans la gorge. — Mucosités tenaces dans la gorge avec expectoration difficile.

Appétit. — Goût amer dans la bouche en mangeant ou en avalant la salive. — Perte du goût. — Soif le matin. — Désir de boissons acides. — Faim et appétit médiocres, surtout au souper. — Nausées et inquiétudes pendant le repus. — Après chaque repas, ballonnement du ventre avec diarrhée et coliques. — Plénitude et pression à l'estomac avec malaise et mauvaise humeur, après avoir mangé des fruits (des poires et des pommes). — Colique avec disposition à la diarrhée, après avoir fumé du tabac.

Estomac. — Nausées arec envie de vomir, en allant en voiture. —
Vomissement de mucosités aigres le matin à jeun, ou après le
déjeuner. — Pression à l'estomac après chaque repas. — Douleurs contractives à l'estomac, ou sensation comme si l'on s'était
donné un tour de reins, avec élancements dans la colonne vertébrale et les reins.

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres, le plus souvent pressives et au côté gauche, et surtout pendant une promenade en voiture. — Pression et élancements dans la région des reins. — Douleurs dans les hypocondres et le bas-ventre, comme si des corps durs et tranchants s'y remuaient. — Pincement dans le rentre avec diarrhée. — Accumulation de flatuosités dans le ventre et sortie fréquente de vents.

Selles. -- Selles fréquentes, molles ou diarrhéiques, avec pincements et borborygmes dans le ventre. -- *Selles verdâtres (chez les enfants). -- *Diarrhée muqueuse. -- Écoulement abondant de glaires pâles, jaunâtres ou brunâtres, et de sang par l'anus, avec maux de reins. -- Démangeaison, contraction et élancements à l'anus et au rectum.


Urines. — Envie inutile d'uriner avec douleurs incisives à l'urèthre, et ballonnement dans la région des reins. — Envie pressante d'uriner. — Émission fréquente d'urines, même la nuit. — Fétidité âcre de l'urine. — Cuisson dans l'urethre après avoir uriné et surtout au toucher, même hors le temps de l'émission des urines.

Partios viriles. -- Absence de l'appétit vénérien. -- Érections e avec tension douloureuse, le matin en s'éveillant.

Bègles. — Règles trop hatives et trop fortes, de couleur rouge pâle. — Pendant les règles, douleurs pulsatives à la tête, bourdonnement dans les oreilles, nausées avec douleurs à l'estomac et aux reins, ou élancements et pression dans les aines. —*Flueurs blanches, corrosives et épaisses comme de l'amidon. —*Stérilité. — Douleurs aux mamelles en allaitant. — Écoulement du lait qui se caille promptement.

Larynx. — Douleurs tractives aiguës au larynx jusque dans la poitrine avec envie de tousser. — Raucité dans la gorge avec élancements tractifs en toussant et en éternuant. — Toux sèche,

138



140

BOUNAFA.

BOUNAFA.

BOUN. — Radix bounafos, Badix ferulos glaucos? racine de bounafa. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 476. Antidotes ?.

COMPARER AVEC : Bell. bry. puls.

CLINIQUE. — Quoique ce médicament n'ait encore reçu qu'un petit commencement d'études, les symptômes connus contiennent cependant des indications importantes qui justifient l'emploi qu'on en a fait jusqu'ici en pratique et d'après lequel on l'a trouvé efficace contre : — Ophthalmies chroniques; Gencivites; Gastrites; Catarrhes bronchiques chroniques; Vaginite chronique.

SYMPTOMES. — Ulcères indolents, chroniques.

Moral triste, abattu; grande disposition aux pleurs; crainte de la mort; impatience et colère; désir de la solitude; grande instabilité des pensées; répugnance pour toute occupation.

Tête entreprise; accès fréquents de vertige; chaleur brûlante dans la tête, surtout au front; accès de migraine; sensation de froid glacial à l'occiput.

Yeux collés, le matin : oinflammation des yeux.

Nez rouge et sensible au toucher; ulcère dans le nez; croûtes brûlantes et démangeantes dans les narines.

Face couverte de petites papules rouges à pointes blanches, dans les favoris et la barbe du menton.

Dents attaquées de différentes douleurs, avec exacerbation nocturne; oinflammation des gencives.

Bouche pleine d'aphthes; sensation comme si l'on s'était brûlé la langue; mauvaise haleine; salive d'un goût amer.


Digestion lente avec renvois amers; forte soif.

Dans l'Estomac, sensation constante de chaleur avec tranchées; crampes d'estomac.

Ventre tendu et gonfié; ardeur brûlante dans le ventre; sensation de chaleur et de pesanteur dans l'hypogastre.

Selles diarrhéiques, jour et nuit, mais plus fortes la nuit; évacuations jaunâtres, liquides, aqueuses, avec brûlement et rongement dans l'anus; hémorrhoïdes avec brûlements, élancements, rongement et picotement; coliques pendant et après les selles.

Règles trop hâtives et plus abondantes; leucorrhée d'un mucus blanc ou jaune, clair ou épais, avec sensation de chaleur et ron-



BOVISTA.

douce avec inquiétude et pensées sombres. — Grande susceptibilité. — Grande loquacité et caractère trop communicatif. — Faiblesse de la mémoire. — Distractions. — Gaucherie; on laisse tomber tout ce qu'on tient. — On se trompe en parlant et

en écrivant.

142

Tôte. — Ivresse après avoir bu, même très-peu de vin. — Vertige étourdissant avec perte des sens. — Douleurs au centre du cerveau avec sensation comme si la tête avait augmenté de volume. — Mal de tête en s'éveillant, comme après un sommeil trop prolongé. — Mal de tête étourdissant avec chaleur dans les yeux. — Céphalalgie nocturne avec douleurs insupportables quand on lève la tête. — Douleurs pressives à la tête avec battements comme dans un abcès. — Céphalalgie compressive. — Douleurs vives dans la tête avec pesanteur et sensation de meurtrissure. — Sensibilité excessive du cuir chevelu au toucher. — Chute des cheveux. — Plaques excoriées au cuir chevelu.

Yeux. — Tournoiement douloureux dans les yeux, avec pression sensible dans les orbites. — Agglutination nocturne des paupières. — Yeux ternes, sans éclat et sans feu. — Les objets

semblent être plus proches qu'ils ne le sont réellement.

Oreilles. — Ulcères dans l'oreille avec douleur en avalant. — Éruption croûteuse et humide aux oreilles. — Écoulement de pus fétide par les oreilles. — Diminution et dureté de l'oule avec malentendus fréquents.

Nez. — Excoriation dans les narines. — Narines croûteuses avec douleurs brûlantes. — Obturation du nez qui gêne la respiration. — Coryza fluent avec sécrétion de mucosités séreuses et

embarras à la tête.

Visage. — Chaleur aux joues comme si elles allaient éclater. — Visage alternativement pâle et rouge. — Extrême pâleur le matin au lever. — Térébration et fouillement dans les pommettes. — Gonflement fort pâle de la lèvre supérieure, du nez et des joues. — Lèvres gerées. — Coins de la bouche ulcérés. — Douleurs rhumatismales de la mâchoire inférieure, avec gonflement et douleurs pulsatives dans les glandes sous-maxillaires.

Dents. — Douleurs dans les dents incisives supérieures, suivies de gonflement de la lèvre supérieure. — Odontalgie tractive, surtout dans les dents creuses, le soir et la nuit, soulagée par la chaleur et la promenade au grand air. — Térébration et fouillement dans les dents. — Les gencives saignent facilement, la nuit, ou en les suçant.

Bouche. — Accumulation de salive dans la bouche. — Sensation de torpeur dans la cavité buccale. — Bégayement. — Douleurs incisives à la langue. — Ulcères aux bords de la langue, avec douleurs d'excoriation. — Odeur putride de la bouche. — Mal à

la gorge avec grattement et douleurs brûlantes.



BOVISTA. - BROMUM.

144

de force dans les mains, de sorte qu'elles laissent tomber les objets les plus légers. — Dartres humides au des de la main.

Jambes. — Fourmillement et engourdissement dans les jambes avec impossibilité de se tenir debout. — Elancements dans les articulations des genoux et des pieds. — Forte tension aux mollets et aux jambes, comme si les tendons étaient trop courts. — Crampes aux mollets le matin au lit. — Miliaire aux jambes.

BROMUM.

BROM. — Brome. — HERING, Archives de Stapf. — Hist. nat. et prép. Pharmae homœop., p. 88.

Antidotes: Gaz ammoniac, ammoniac liquide, vapeurs alcooliques; contre

Antipotes: Gas ammoniac, ammoniac liquide, vapeurs alcooliques; contribes fortes doses allopathiques de cette substance: Op. magn. camph.

GÉNERALITES. — Les souffrances paraissent plus prononcées à la chaleur de la chambre, ainsi que dans la position couchée ou assise, et dans le repos en général; le mouvement les fait moins apercevoir; le grand air paraît les améliorer. — Plusieurs symptômes, surtout ceux du poumon, semblent plus prononcés du côté droit; d'autres symptômes affectent au contraire plutôt le côté gauche. — Roideur paralytique des membres supérieurs et inférieurs. — Fourmillement dans les doigts, avec tressaillements convulsifs dans les muscles du pied et autour des genoux. — Faiblesse, lassitude et grande fatigue, continuant même après la cessation des autres symptômes. — Tremblement général et impossibilité de rester debout.

Peau. — Couleur jaune de la peau. — L'application extérieure détruit promptement la peau, avec sensation d'un brûlement violent et inflammation après; appliqué sur des plaies, celles-ci prennent un mauvais aspect, et s'entourent de putréfaction verdâtre, d'odeur cadavérique. — Sensation de quelque chose de vivant dans la peau, surtout aux bras et aux jambes. — Furoncles aux bras et à la face. — Augmentation de l'embonpoint. — ∘Engorgements scrofuleux.

Sommeil. — Baillements toute la journée, avec gêne de la respiration. — Grande envie de dormir le jour, surtout le soir, en lisant ou en écrivant, et parfois avec la sensation comme si la tête était serrée dans un cercle. — Difficulté de s'endormir le soir. — Sommeil agité avec sursauts et beaucoup de rêves. — Rêves de morts de cercueils, de meurtre, de querelles et de voyages. — Bouche ouverte pendant le sommeil. — Sommeil du matin très-prolongé, non réparateur et étourdissant.

Fièvre. — Frisson grelottant avec baillement, pendiculations et



BROMUM.

146

Nez. — Boutons au nez et au fond de la langue. — Gonflement douloureux au côté gauche du nez, comme s'il allait se former une pustule. - Croûtes et écorchure dans les narines, avec gonflement des ailes. - Epistaxis, avec soulagement des souffrances de la poitrine et des yeux. - Sensation de plaie dans la narine comme si des poils étaient arrachés, et qu'un rhume allat se déclarer. — Eternument ébranlant, suivi d'obturation du nez. - Coryza fluent, avec obturation et excoriation surtout de la narine droite, et éternument fréquent. - Coryza opiniatre avec excoriation des bords des narines et de la peau au-dessous du nez. - Écoulement de mucosités jaunâtres, tenaces.

Visage. - Sensation de chaleur, surtout au-dessous du nez, avec chatouillement, comme si une toile d'araignée couvrait cet en-droit. — Couleur pâle de la face. — Tressaillements convulsifs à la face, par suite du grattement et du brûlement à la gorge. -Chatouillement et fourmillement aux joues et aux pommettes. -Brûlement à la lèvre supérieure, qui en même temps paraît très-

lisse. — Desquamation de la lèvre exceriée.

Dents. - Battement dans les dents. - Douleurs dans les dents cariées, avec sensation en les serrant comme si elles étaient trop

Bouche. — Boutons à la partie postérieure de la langue. — Sécrétion de salive augmentée. - Salivation. - Inflammation des

glandes salivaires (chez les animaux).

Gorge. - Brûlement et douleur d'excoriation dans la gorge; brûlement jusque dans l'œsophage et l'estomac. - État inflammatoire chronique de l'arrière-gorge. - Inflammation des membranes de la gorge, avec exsudation de lymphe plastique. — oMal à la gorge avec gonflement rouge rosé des amygdales, engorgement dur et chaud de la parotide droite; renâclement de mucosités; élancements et pression dans la gorge pendant et hors le temps de la déglutition; déglutition difficile et augmentation des douleurs en avalant des liquides, - Rougeur rétiforme de la membrane muqueuse dans la gorge, avec de nombreuses exceriations.

Appétit et Goût. -- Goût âcre ou acide dans la bouche. - L'eau a une saveur salée, le matin à jeun. - Répugnance pour l'eau froide. - Appétit augmenté et bonne digestion. - Désir de choses acides, après l'ingestion desquelles les symptomes s'aggravent cependant, suivis de diarrhée. - Répugnance pour le tabac à

fumer, lequel produit des nausées et des vertiges.

Estomac. — Nausées et envie de vomir, parfois avec brûlement dans la gorge, depuis la langue jusqu'à l'estomac. — Rapports fréquents, avec vomituritions répétées qui font remonter beaucoup de glaires. - Augmentation de la sécrétion muqueuse, avec dégoût et rapports fréquents. - Rapports d'un goût d'œufs pourris. — Vomissement de mucosités sanguinolentes ou de matières



BROMUM.

Métrorrhagie passive. — Règles trop hâtives et trop fortes.
 Suppression des règles. — Avant l'époque, maux de reins, sensation de faiblesse et manque d'appétit, ou bien élancements

dans le bas-ventre, améliorés étant couché dans une position courbée. — A l'entrée des règles, céphalalgie, particulièrement au front, avec sensation en se baissant, comme si les yeux allaient sortir de la tête. — Douleurs spasmodiques contractives à chaque époque, suivies de douleurs d'excoriation dans le ventre.

- Engorgement des mamelles.

148

Larynx et Toux. - Inflammation du larynx, de la trachée-artère et des bronches, avec des stries rougeatres ou des rougeurs foncées, surtout là où la membrane du larynx entoure la glotte. Exsudation de lymphe plastique dans le larynx et la trachéeartère. - Enrouement et aphonie, avec forte sensation d'excoriation et de raucité dans la gorge. - Sensation de froid au larynx, surtout en inspirant, après le déjeuner, et améliorée après s'être rasé. - Sensation de contraction dans le larynx, autour de la fossette, comme si l'on pressait sur cet endroit. -Chatouillement dans le larynx, excitant la toux. — Toux rauque, sèche, creuse. - Toux fatigante, ne permettant point de parler. Toux excitée par un chatouillement continuel dans le larynx, ou bien en inspirant profondément. - Toux avec accès de suffocation, comme par les vapeurs du soufre, avec céphalalgie sourde, pressive. — Toux spasmodique, d'un son croupal, sibilant, rauque, avec dyspnée et éternument. — Toux avec vomiturition. - Dans les expérimentations faites sur les mammifères rongeurs, la toux ne s'étant jamais déclarée, le docteur Hering conclut de là qu'il ne faudra administrer le brôme ni contre le croup, ni contre la toux des personnes dont la position des dents aurait de la similitude avec celle des mammiferes rongeurs.

Poitrine et Respiration. - Oppression violente de la poitrine, parfois avec toux, mal de tête et vertiges. - Respiration difficile, avec besoin continuel de respirer l'air, plus forte le matin, améliorée en marchant, ainsi que le soir et la nuit. — Bâillement continuel pendant la gêne de la respiration. — Sensation comme si la respiration était arrêtée par un obstacle au milieu de la poitrine. - Sensation de plénitude dans la poitrine et la gorge, comme si un corps mou était entre les poumons et le sternum. oGêne asthmatique par suite de la rougeole, chez une jeune fille, ne permettant ni de marcher vite, ni de monter l'escalier, sans produire un grand épuisement. - Respiration très-difficile, avec bouche et nez pleins de salive et d'écume, larmoiement, toux, envie de vomir, vomiturition et vomissement écumeux, hurlement rauque (chez des chiens), battements de cœur irréguliers, grande faiblesse jusqu'à la prostration, tremblement et froid par tout le corps, selles liquides, pouls très-fréquent. -



150 BROMUM. — BRUCEA ANTIDYSENTERICA.

la plante du pied gauche, avec sensation de paralysie dans le genou et la hanche, et suivie immédiatement de mai de gorge pressif à côté du cartilage thyroïde. — Chaleur dans les pieds. — Sensation de froid dans le gros orteil gauche, la nuit aussi, au réveil, avec fourmillement. — Douleurs dans les orteils du pied droit. — Les cors au petit orteil gauche deviennent douloureux et croissent rapidement.

BRUCEA ANTIDYSENTERICA.

BRUG. — Brucée. — Hering. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 477. — Médicament peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensation de courbature dans les extrémités. — Pincement à plusieurs endroits des membres. — Le soir, roideur aux articulations et douleurs tractives aiguës dans les membres, avèc élancement dans la tête, aux oreilles et dans la poitrine. — Abattement. — Disposition à étendre les membres et à bâiller. — Grande lassitude en marchant. — Le soir, surexcitation nerveuse, tremblement et chancellement en marchant. — Irritabilité augmentant le soir.

Fièvre. — Disposition frileuse et aversion pour l'air frais. — Frissons et froid excessif. — Sueur en marchant, malgré les frissons

qui apparaissent principalement pendant le repos.

Sommeil. — Somnolence toute la journée, surtout étant assis, le matin, après le dîner, et au plus haut degré après midi. — Somnolence le soir de bonne heure. — Sommeil plein de rêves avec bouillonnement de sang. — Sommeil troublé par des rêves confus ou affreux, effrayants. — Somnolence alternant avec manque d'appétit.

Moral. — Esprit abattu avec besoin de dormir. — Taciturnité et hypocondrie. — Humeur sombre, mélancolique, avec paresse et lassitude. — Humeur triste et sombre en s'éveillant le matin.

Tête et Yeux. — Pesanteur et embarras à la tête, avec somnolence disparaissant le soir. — Vertiges à faire tomber, le soir. — Four-millement fouillant au sommet. — Le soir, mal à la tête après avoir marché longtemps au soleil. — Céphalalgie derrière les sourcils qui semblent être gonfiés. — Elancements dans la tête, empirés en marchant, surtout au soleil. — Mal à la tête empiré étant assis, ainsi qu'après avoir mangé. — Yeux ternes, gonfiés. — Yeux rouges aux angles, le soir. — Démangeaison aux paupières. — Le matin, yeux rouges, brûlants. — Sensation douloureuse aux yeux, comme par du sable, obligeant à les frotter.



152

BRYONIA ALBA.

BRY. — Bryone blanche. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 478. — Doses usitées : 42, 30. — Durée d'action : 4 à 5 jours dans les affections aiguës; 30 jours dans quelques maladies chroniques. ANTIDOTES : Acon. cham. ign. n-vom. — La bryone est l'antidote de : Alum. clem. rhus. mur-ac. seneg.

ANTHORES; Acon. Cham. Ign. Involv. — La D'yone est turtable ac. Alum. clem. rhus. mur-ac. seneg.

COMPARER AVEC: Acon. alum. arn. ars. cham. chin. clem. ign. led. lyc. merc. mur-ac. nux-rom. op. phos. puls. rhus. squil. sen. — C'est surtout après acon. nux-rom. op. et rhus. que la bryone fait du bien. lorsqu'elle se trouve indiquée. — Après la bryone, on trouvera quelquefois convenables: Alum. rhus.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas particuliers dans lesquels on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des hommes adultes d'une constitution nerveuse, ou sèche, maigre et bilieuse; au tempérament colérique, teint brun, cheveux et yeux noirs ou bruns, caractère irritable, avec disposition à des inflamilations membraneuses, etc., etc. - Affections rhumatismales et arthritiques, avec ou sans fièvre inflammatoire et gonflement; Nodosités arthritiques; Affections hydropiques; Inflammations locales aigues (et chroniques); Souffrances par suite d'un refroidissement par un froid sec (vent d'est); Suites facheuses d'une colère, d'efforts physiques (d'un tour de reins, etc.), et d'une vie sédentaire; Luxations spontanées; Convulsions et spasmes hystériques?; Tétanos et trismus?; Congestions actives; Paralysie; Tumeurs inflammatoires; Affections scrofuleuses; Engorgement et induration des glandes?; Ictère; Affections hydropiques; Eruptions phlycténoïdes; Dartres furfuracées; Pétéchies (morb. maculos.); Morbilles et affections à la suite de cette maladie; Symptômes précurseurs de la petite vérole et des varioloïdes; Suites fâcheuses de la suppression de la scarlatine; Inflammations érysipélateuses aux articulations; Éruptions miliaires des enfants et des femmes en couches; Somnambulisme; Fièvres inflammatoires, avec affections nerveuses, gastriques ou bilieuses, et forte excitation des systèmes sanguin et nerveux; Fièvres intermittentes; Fièvres typhoïdes, période inflammatoire; Céphalalgie à la suite d'émotions morales, ou après un refroidissement; Migraine; Encéphalite (et méningite?), aussi quand elles proviennent de la congélation; Affection cérébrale à la suite du choléra; Hydrocéphale aiguë; Coryza et obturation chronique du nez; Epistaxis, aussi celle par suite de ménostasie; Prosopalgie inflammatoire; Fluxion à la joue; Gonflement scrofuleux des lèvres; Angine couenneuse; Hoquet convulsif; Anorexie et dyspepsie



— *Grande lassitude et faiblesse, surtout le matin ou en se promenant au grand air. — *Besoin de rester couché. — Accès d'évanouissement. — Sensation de faiblesse, surtout en se promenant à l'air.

Peau. — *Couleur jaune de la peau. — Peau moite, visqueuse. —
Brûlement et picotement par tout le corps, comme par des orties, après de légères émotions. — Inflammations *érysipélateuses, surtout aux articulations. — *Éruptions urticaires. — •Miliaire, surtout chez les enfants et les femmes en couches. — Nodosités dures dans la peau. — *Éruptions phlycténoïdes, avec démangeaison rongeante ou brûlante. — *Dartres furfuracées, avec démangeaison brûlante. — *Pétéchies. — Ulcères, avec sensation de froid, ou avec douleurs pulsatives ou cuisantes. — Engelures. — Cors, avec pression ou élancements brûlants, ou douleurs d'excoriations au toucher.

Sommeil. — Grand besoin de bâiller. — Grande somnolence le jour, surtout après le dîner. — Somnolence comateuse, interrompue par des délires anxieux. — *Insomnie, surtout avant minuit, causée par la chaleur; bouillonnement de sang et anxiété, surtout à la poitrine. — *Sommeil troublé par la soif, avec goût amer dans la bouche au réveil. — Impossibilité de rester couché sur le côté droit. — Sursauts, avec effroi en s'endormant et pendant le sommeil. — Sommeil inquiet, avec rêves confus et affluence d'idées. — *En s'endormant, cris et délires dès qu'on a fermé les yeux, — *Rêves désagréubles, chagrinants. — Rêves vifs des affaires de la journée. — *Délires nocturnes et rêvasseries, avec yeux ouverts. — Gémissements, surtout vers minuit, — *Somnambulisme. — Cauchemar.

Fièvre. — *Froid et frissons au corps, même au lit, le soir, ou accompagnés de douleurs dans tous les membres et de sueur froide au front. - *Frissons avec tremblement, souvent avec chaleur à la tête, rougeur du risage, et soif; ou suivis de chaleur avec sueur et soif. - Avant les frissons, vertiges et céphalalgie; puis frissonnement avec tension et traction dans les membres. Dégoût pour les aliments et les boissons pendant les frissons. - °Chaleur d'abord alternant avec frissons, puis chaleur brûlante et soif; ensuite forte sueur. - *Chaleur universelle, sèche, extérieure et intérieure, presque toujours avec grand désir de boissons froides. - Pendant la chaleur, vertiges et céphalalgie. - Accès febriles avec froid et frissons prédominants, type tierce, nausées et besoin de rester couché, ou avec douleurs lancinantes dans le côté et dans le ventre, et soif pendant les frissons et la chaleur. — Au début de la fièvre, toux sèche avec vomissement, clancements et oppression à la poitrine. — Sueur froide au front ct à la tête. — Sueur abondante pendant qu'on se promène à l'air froid. — Sueur huileuse le jour et la nuit. — Sueur avec anxiété et inquiétude, respiration suspirieuse, toux courte et

154



Oreilles. — Douleurs contractives aux oreilles, avec diminution de l'ouie. — Élancements dans les oreilles, pendant et après la promenade au grand air. -- Tumeur comme une bosse devant et derrière l'oreille. — Saignement par les oreilles. — Sensation aux oreilles comme si elles étaient bouchées. donnement aux oreilles. - o Tout bruit est insupportable aux

Nez. - *Gonflement du nez avec sensibilité douloureuse au toucher et obturation du nez. - *Inflammation et ulcération des narines. — Ulcère dans les narines avec douleurs rongeantes. — *Saignement fréquent de nez, quelquesois le matin, ou lorsque les règles sont supprimées, ou même en dormant. — *Sécheresse et obturation du nez, parfois opiniâtres. — Coryza fluent avec pression lancinante au front. — *Coryza sec, parfois opiniâtre. — Mucosités dures, séchant en croûtes.

Visage. — *Couleur du visage pâle, jaune, terreuse. — *Visage rouge, brûlant. — Taches rouges au visage. — Gonflement chaud, bleuatre et brunatre du visage. - Douleurs au visage, le plus souvent pressives, soulagées par la pression extérieure. *Gonstement du visage, -parsois d'un seul côté, ou sous les yeux et à la racine du nez. — Gonstement de la joue, tout près de l'oreille. - Petites nodosités et indurations au visage, comme des glandes sous-cutanées. — *Lèvres gonflées et gercées, avec saignement et sensation de brûlure au toucher. sèches. — Éruption aux lèvres avec cuisson brûlante.

Dents. - Maux de dents avec besoin de se coucher, augmentés la nuit par des choses chaudes; aggravés en restant couché sur le côté sain, soulagés en se couchant sur la partie affectée. — Odontalgie tressaillante et tiraillante, avec sensation comme si les dents étaient trop longues ou qu'elles branlassent, surtout pendant et après le repas. — Douleurs d'excoriation aux gencives

avec vacillement des dents. — Gencives fongueuses.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche, avec soif ardente. — Accumulation d'une salive savonneuse et écumeuse dans la bouche. — Salivation. — Odeur putride de la bouche. — Langue °sèche, *chargée d'un enduit blanc, ou sale, ou °jaune. — °Couleur foncée et rugosité de la langue. — Vésicules brûlantes au bord de la langue. — Parole indistincte par sécheresse

de la gorge.

156

Gorge. — Mal à la gorge avec enrouement et déglutition difficile. Douleurs d'excoriation dans la gorge en avalant à vide. — *Sensation de sécheresse et grande sécheresse dans la gorge. Pression dans le pharynx, comme par un corps dur et pointu. *Elancements dans la gorge au contact, ainsi qu'en tournant la tête et en avalant. — Mucosités tenaces dans la gorge, ne se détachant que par des efforts.

Appétit. — *Perte du goût. — *Goût fade, pâteux, -putride. —



— *Coliques avec tension du ventre et écoulement d'eau comme des pituites. — *Ballonnement du ventre avec pression à l'épigastre, surtout après le diner. — Déchirement dans le ventre depuis les hanches jusqu'au creux de l'estomac. — Douleurs *crampoldes, pincement, ou tranchées et élancements dans le ventre, principalement après avoir mangé ou bu (surtout du lait chaud), quelquefois avec selles diarrhéiques. — Gonflement dur autour du nombril. — *Gonflement hydropique du ventre. — Gargouillement et borborygmes dans le ventre, avec sortie de vents; quelquefois seulement le soir, au lit.

Selles. — *Constination opiniâtre. — *Excréments gros avec évacuation difficile. — *Selles peu abondantes, mais dures et comme brûlées. — *Diarrhées arec coliques, —alternant quelquefois avec constination et gastralgie. — Selles diarrhéiques d'une odeur putride, comme du fromage trop fait, ou avec évacuation de matières non digérées. — *Diarrhée le matin. — Diarrhées nocturnes, jaunâtres, avec douleur brûlante à l'anus. — Diarrhées colliquatives. — Colique constrictive pendant les selles. — Selles diarrhéiques fréquentes, de couleur brunâtre (ches les nourrissons).

Urines. — o'Urines rares, rougeâtres, brunâtres et *chaudes. — Envie pressante d'uriner, avec incontinence. — Émission fréquente d'urines aqueuses. — Envie d'uriner, avec suspension de la respiration en levant des fardeaux. — Besoin d'uriner la nuit. — Émission involontaire d'urines chaudes quand on fait des mouvements. — Sensation de brûlure et douleurs incisives dans l'urèthre, avant d'uriner. — Sensation de rétrécissement de l'urèthre. — Élancements et douleurs brûlantes dans l'urèthre.

Parties viriles. — Miliaire rouge, pruriante, au gland. — Élancements dans les testicules.

Règles. — •Règles supprimées. — Règles trop hâtives. — •Douleurs tractives, aiguës, dans les membres, pendant les règles. — Écoulement de sang hors le temps des règles. — •Métrorrhagie d'un sang rouge foncé, avec mal aux reins et à la tête. — •Douleurs brûlantes au fond de la matrice, pendant la grossesse, augmentées par le mouvement, diminuées par la pression et le repos. — Gonflement de la lèvre, avec pustule noire et dure. Larynx. — *Enrouement avec disposition à transpirer, toux et

Larynx. — *Enrouement avec disposition à transpirer, toux et râlement dans la poitrine. — Envie de tousser, comme par des glaires; après, douleurs d'excoriation au larynx, augmentées en parlant ou en fumant du tabac. — *Toux, le plus souvent sèche, excitée par un chatouillement dans la gorge, —ou comme causée par de la vapeur dans le larynx, avec besoin de respirer souvent. — Toux, comme par irritation de l'estomac. — *Toux crampoïde, suffocante, surtout après minuit, ou après avois du ou mangé, et souvent arec romissement des aliments. — Toux le matin avec écoulement d'eau comme des pituites. — *Toux qui

158



160 BRYONIA ALBA. — CACTUS GRANDIFLORUS.


la main, avec douleur brûlante. — Gonflement des mains. — Sensation de torpeur dans la paume des mains. — Douleurs lancinantes aux doigts en écrivant. — Gonflement chaud et pâle des articulations des doigts. — Tressaillement des doigts en remuant les mains.

Jambes. — °Craquement et déboîtement du col du fémur, en mar-chant. — Douleurs tractives aux cuisses. — °Élancements dans la cuisse, depuis la fesse jusqu'à la cheville du pied, avec douleurs insupportables au toucher et pendant le mouvement, ainsi qu'avec sueur par tout le corps. - Lassitude et manque de solidité dans les jambes, surtout en montant un escalier. — Paralysie des jambes. — *Roideur tensive et douloureuse des genoux. — Gonflement rouge et luisant des genoux, avec élancements violents, surtout en marchant. - Chancellement et fléchissement des genoux pendant la marche. — • Élancements tensifs et douleurs crampoides dans les genoux, avec *tension jusque dans les mollets. — Douleurs vives dans les genoux, s'étendant jusqu'aux tibias. — Elancements tensifs et tractifs dans les mollets jusque dans la cheville des pieds, avec gonflement rouge luisant des parties affectées. — Crampes aux mollets, la nuit et le matin. - Lassitude des jambes en marchant et en restant debout. - *Gonslement des jambes, s'étendant jusqu'aux pieds. — °Ulcères putrides aux jambes. — *Dou-leur de luxation à l'articulation du pied, en marchant. — *Gonflement des pieds, avec rougeur et chaleur, douleur de meurtrissure en étendant les pieds, tension en les remuant, et douleur d'ulcération au contact. — Élancements dans les pieds, la plante des pieds et les orteils, surtout en appuyant le pied. Cors avec pression, ou avec élancements brûlants, ou avec douleur d'excoriation au toucher.

CACTUS GRANDIFLORUS.

CACT. - Cactus. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé, jusqu'ici, avec succès contre les affections suivantes: Prosopalgie du côté droit, pire après le moindre effort, supportable seulement en étant couché tranquillement au lit, et renouvelée par le vin, la musique, une forte lumière et le retard apporté à l'heure habituelle du repas. — Migraine, dans les mêmes circonstances, commençant le matin et arrivant, dans le courant du jour, à un degré insupportable, avec vomissement. — Péricardite, avec sensation de constriction au cœur comme par une main de



CACTUS. — CALADIUM SEGUINEM.

161

fer, respiration difficile, accès de suffocation avec défaillance, sueur froide à la face et pouls insensible. — Pulpitations de cœur, en marchant, ou la nuit, en étant couché sur le côté gauche. — Dysménorrhée, avec douleurs constrictives au cœur, coliques violentes venant surtout le soir, et forçant à crier et à pleurer; règles rares et s'arrêtant dans la position couchée. — Rhematisme musculaire, avec métastase au cœur. — Fièvre intermittente, débutant à 11 heures du soir ou du matin, avec frisson suivi de chaleur brâlante avec mal de fife, étourdissement, coma, insensibilité, soif, respiration courte, impossibilité de rester couché; puis sueur abondante, avec soif inextinguible; enfin, apyrexie complète.

CALADIUM SEGUINUM.

CALAD. — Pédiveaux vénéneux. — Héring. — Hist. nat. et prép. Pharm. homesop., p. 480. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 50 jours. ARTINOTES : Les mêmes. COMPARER AVEC : Caps. earb-veg. chin. graph. ign. merc. nitr-ac. phosph.

SYMPTOMES GÉMÉRAUX. — Aversion pour tout mouvement, avec envie continuelle de rester couché. — Légères attaques d'évanouissement, après avoir écrit ou médité, ainsi qu'en se levant de la position couchée. — Diminution de tous les symptômes après un court sommeil le jour, et disparition du mal pendant la transpiration. — Chaleur brûlante sur de petites parties de la peau, avec besoin de les toucher du doigt. — Sensibilité douloureuse des piqûres de cousin. — A l'avant-bras ou à la poitrine, miliaire à gros grains avec prurit, et chaleur alternant avec oppression. — Souvent, sensation comme si des mouches couraient sur la peau, surtout à la face.

Semmeil. — Envie de dormir, avec besoin de se coucher le jour, sans pouvoir dormir, et avec horripilation et embarras de la tête. — Assoupissement, et sommeil durant lequel on se souvient de tout ce qu'on avait oublié pendant la veille. — Sommeil trop léger pendant la nuit. — Gémissements et sanglots anxieux pendant le sommeil, avec violents mouvements convulsifs dans les

membres.

Fièvre. — Fièvre avec douleur dans les oreilles et gonflement des glandes sous-maxillaires. — Fièvre avec froid et soif, respiration haletante, rhume de cerveau et pulsations dans la poitrine. — Le soir, fièvre avec sommeil qui cesse régulièrement à la disparition de la fièvre. — Après la chaleur, sueur qui attire fortement les mouches.



CALADIUM SEGUINUM.

162

Moral. - Craintes et inquiétudes, surtout sur sa santé. - Angoisse avant de s'endormir le soir. - En se rasant, angoisse et peur de se couper. - Cris et pleurs comme ceux d'un enfant.

Tête, Yeux, etc. - Tête embarrassée avec tournoiement et nausées. - Quand on se couche ou qu'on ferme les yeux, vertige, comme si l'on était bercé. - Après avoir été couché, céphalalgie au côté sur lequel on a reposé. - Chaleur à la tête, qui monte du bas vers le haut. - Cuisson brûlante dans les yeux. - Ouie extrêmement sensible, surtout quand on s'endort. - Aceès de surdité légère et passagère. - Bruissement dans les oreilles. -Rhume de cerveau le soir, avec douleur brûlante dans le nez et - Maux de dents térébrants, avec élancement éternument. jusque dans l'oreille.

Appétit. — Goût pâteux, herbacé, dans la bouche. — Grand désir de fumer du tabac. — Manque de soif avec aversion pour l'eau froide, et sécheresse du pharynx et de l'esophage. - Sensation de vide dans l'estomac, sans faim, mais qui force à manger vite. -

Après le déjeuner, humeur maussade et tête entreprise.


Estomac. — Renvois à vide. — En fumant, envie de vomir, et d'aller à la selle, ou bien vomissement aigre, émoussant les dents qui paraissent trop longues. - Renvois empêchés par des douleurs à l'estomac. - Nausées le matin avec vertige et élancements au creux de l'estomac. - Sensation de vacuité à l'estomac. -Cuisson brûlante dans l'estomac. - Pression et rongement au cardia. - Tranchées à travers l'épigastre. - Élancements à l'épigastre et rétraction du creux de l'estomac, avec faiblesse et nausées. - Douleurs pulsatives et fatigantes à l'épigastre, après avoir marché.

Ventre. — Urines. — Tranchées crampoïdes dans la région ombilicale. - Battement et pulsations ou douleurs brûlantes à l'épigastre. — Sortie de petites flatuosités d'odeur putride. — Selles de la consistance de la bouillie, et peu abondantes. — Après la selle, sortie de mucosités, et écoulement d'une humeur séreuse de l'anus. — Après la selle, élancements au rectum. — Souvent envie d'aller à la selle; les selles sont jaunâtres, en forme de bouillie. -Térébration et fouillement dans l'anus et le sacrum. - Après les selles, sortie de sang par l'anus. - Sensation douloureuse de plé-

nitude dans la vessie, sans envie d'uriner.

Parties viriles. — Faiblesse des fonctions génitales. — Forte sueur au sacrum. — «Impuissance avec lascivité. — Parties génitales bouffies, flasques, suintantes. - Gonflement et exceriation du prépuce, avec rétraction après le coît. - Sécheresse et rougeur du gland, qui est comme parsemé de petits points rouges. — Manque de jouissance et d'éjaculation pendant le coït, ou éjacutation trop prompte et sans érection. — Érections nocturnes. — Boutons au mont vénérien et à l'oreille.

Larynx. - Trachée-artère et larynx comme contractés, avec siffle-



CALADIUM. - CALCAREA CARBONICA.

168

ment en respirant profondément. — Toux, qui paraît avoir son siège au-dessous du larynx. — Toux avec respiration gênée, causée par une pression à l'épigastre, ou empêchée par une sensation de pesanteur à cette partie. — Toux nocturne, courde et faible, qui empêche de dormir, même le matin.

Peitrine. — Oppression, surtout pendant les douleurs brûlantes à l'estomac. — Poitrine comme vide, surtout après l'expectoration des glaires. — Pulsation au-dessous du cœur. — Le matin, en se levant, douleur de brisement dans les côtes et les reins.

Des et Extrémités. — Maux de reins, comme par faiblesse. — Elancements dans les cors.

CALCAREA CARBONICA.

CALC. — Chaux carbonatée, sous-carbonate de chaux provenant de l'écaille d'haitre. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Pharmae. homesop., p. 90. — Durée d'action: 50 jours dans des affections chroniques.

ANTIDOTAS: Camph. nitr-ac. nitr. spir. sulph. — Ce sont: Bis. chin. chinsulf. nitr-ac., dont calcarea est l'antidote à son tour.

COMPARRA AVEC: Anac. alum. arn. ars. bar. bell. bis. chin. cupr. graph. kal. lye. magn. merc. nitr-ac. nux-vom. phos. puls. sep. sil. sulf. veratr. — C'est surfout après chin. cupr. nitr-ac. et sulf. que calcarea fera du bien, lorsqu'il est indiqué. Après calcarea, on trouvera le plus souvent convenables: Lye. nitr ac. phos. et sil.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas particuliers dans lesquels on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des personnes à constitution plethorique ou lymphatique avec disposition à des blennorrhagies, des rhumes de cerveau et des diarrhées; ou bien d'individus de constitution faible, à nutrition maladive. — Souffrances à la suite d'un refroidissement dans l'eau; Différentes affections des enfante et des femmes qui ont les règles abondantes; Suites fâcheuses d'un tour de reins; Souffrances après avoir fait abus du quinquina Souffrances des irrognes; Nodosités goutteuses et autres souffrances arthritiques; Danse de Saint-Guy?; Conculsions épileptiques (après l'action de cuprum); Spasmes hystériques; Obésité des jeunes gens; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de mastur bation; Faiblesse musculaire, difficulté d'apprendre à marcher atrophie et autres souffrances des enfants scrofuleux; engorge ment et suppuration des glandes; Carie, ramollissement, déviation et autres affections des os; Affections rachitiques; Luxation spontanées; Arthrocace?; Polypes; Tumeurs enkystées; Eruption chroniques; Dartres croûteuses et humides; Éruptions scrofu leuses; Ulcères fistuleux; Verrues; Rhagades, surtout chez le ouvriers travaillant dans l'eau; Varices; Éruptions urticuire




CALCAREA CARBONICA.

164

chroniques; Fièvres intermittentes, et suites fâcheuses de la suppression de ces fièvres par le quinine; Fièvres lentes; Mélancolie; Hypocondrie et hystérie; Delirium tremens; Ivrognerie; Migraine; Céphalalgie, par refroidissement, ou à la suite d'un tour de reins; Fatigue de la tête à la suite de travaux intellectuels; Teigne; Chute des cheveux, surtout chez les femmes en couches, ou à la suite de graves maladies aiguës; Fontanelles des enfants trop longtemps ouvertes; Ophthalmies, même celles par l'introduction d'un corps étranger, ou chez des personnes scrofuleuses, ou chez les nouveau-nés; Blépharophthalmie; Taches, ulcères et obscurcissement de la cornée?; Fongus hématode dans l'œil?; Amblyopie amaurotique; Fistule lacrymale; Hémorrhagie des geux?; Otite?; Otorrhée purulente, aussi celle qui provient de la carie de l'appareil auditif; Polype dans l'oreille; Dureté de l'ouïe, aussi celle par suite de la suppression d'une fièvre intermittente par le quinine; Parotite; Gonflement scrofuleux du nez; Polype nasal; Anosmie; Cancer au nez?; Coryza avec établissement tardif du flux catarrhal; Coryza et obturation chronique du nez; Prosopalgie; Dartres et autres éruptions faciales: Croûte de lait; Odontalgies, aussi celles des femmes enceintes, ou qui ont les règles trop abondantes; Dentition difficile chez les enfants, avec ou sans convulsions; Ulcères fistuleux aux gencives?; Grenouillette; Amygdalite et autres angines phlegmoneuses; Goître; Anorexie; Dyspepsie, vomissements, aigreurs, pyrosis et autres affections gastriques; Induration et autres affections du foie; Affections abdominales chroniques; Carreau; Ténia; Coliques; Spasmes abdominaux; Bubons scrofuleux; Constipation opiniâtre; Diarrhées des enfants scrofuleux, ou bien pendant la dentition; Diarrhée des individus phthisiques; Disposition chronique à avoir plusieurs selles par jour; Affections vermineuses; Souffrances hémorrhoïdales, et suites fâcheuses de la suppression du flux hémorrhoïdal; Catarrhe de la vessie; Hématurie?; Polype de la vessie; Calculs urinaires; Faiblesse des fonctions génitales, dysménorrhée et aménorrhée des personnes pléthoriques; Flueurs blanches; Métrorrhagie; Chlorose; Stérilité; Abortus; Tranchées trop prolongées, après l'accouchement; Fai-blesse, chute des cheveux et autres souffrances des femmes en couches; Odontalgie des femmes enceintes; Fièvre de lait; Excoriation des mamelles; Galactorrhée ou agalactie; Ophthalmie, fai-blesse musculaire, et aigreur des nourrissons; Laryngite chronique avec ulcération; Catarrhe chronique et blennorrhée des poumons; Symptômes phthisiques (phthisie tuberculeuse); Déviation de la colonne vertébrale; Coxalgie; Luxation spontanée; Goutte aux mains et aux pieds, etc., etc.


Voy. la note, page 15.



165

bres, surtout des doigts et des orteils. — Douleurs de luxation. - Douleurs pulsatives. — *Lancinations et douleurs tractives dans les membres, principalement la nuit ou en été et au changement du temps. - Accès de torpeur et pâlissement de quelques parties du corps qui paraissent comme mortes. — Grande facilité à se donner des tours de reins, qui souvent sont suivis de maux de gorge ou de roideur et gonflement de la nuque avec mal à la tête. — Engourdissement facile des membres. — Bouillonnement de sang, principalement ches les individus pléthoriques, et souvent avec congestion à la tête et à la poitrine. — Tremail-lements dans différents membres. — *Convulsions épileptiques, parfois la nuit, avec cris. — Tétanos partiel, précédé d'une espèce d'aura tetanica. - *Les symptômes s'aggravent ou se renouvellent par le travail dans l'eau, ainsi que le soir, la nuit, le matin, après le repas et tous les deux jours.-Souffrances périodiques et intermittentes. — *Grande agitation qui force à se mouvoir constamment et à beaucoup marcher. — Tremblement fréquent de tout le corps, augmenté au grand air. - *Douleur de meurtrissure aux bras et aux jambes, ainsi qu'aux reins, surtout en se remuant et en montant un escalier. -- Malaise général le soir, comme avant-coureur d'un accès de fièvre intermittente. - *Manque de force, abattement, principalement le matin de bonne heure. — Fatigue et faiblesse nerveuses, souvent avec paleur du visage, battement de cœur, vertige, frissons, maux de reins, etc. — Évanouissement, surtout le soir, arec obscurcissement des yeux, sueur au visage et froid au corps. - *Grande fatigue après avoir parlé ou après une marche modérée au grand air, ainsi qu'après le moindre effort, et souvent avec transpiration facile et abondante. — Vif désir de se faire magnétiser. — Abattement excessif, quelquefois avec violents accès de rires spasmodiques. — Bouffissure du corps et du visage avec ventre gros chez les enfants. — Amaigrissement, quoiqu'on mange de bon appétit. — Grand embonpoint et forte obesité. — *Disposition à se refroidir et grande sensibilité à Pair froid et humide. — En se promenant au grand air, tristesse avec pleurs, mal à la tête, ballonnement du ventre, battements de cœur, sueur, grande fatigue et beaucoup d'autres souf-

Pean. — Frémissement visible de la peau depuis les pieds jusqu'à la tête, suivi d'étourdissement. — Démangeaison brûlante, mordicante. — Éphélides. — Éruption urticaire, le plus souvent disparaissant à l'air frais. — Eruption de taches lenticulaires, rouges et élevées, avec forte chaleur, beaucoup de soif et manque d'appétit. — Peau chaude et sèche pendant le mouvement. — oPeau du corps rude, *sèche et comme couverte d'une espèce de miliaire.—oEnduit furfuracé de la peau.— Éruptions et dartres humides, croûteuses, ou en forme de grappes avec douleurs de



velu. — Sensibilité douloureuse de la racine des cheveux. — Chute des cheveux. — *Tumeurs au cuir chevelu oqui entrent

en suppuration.

168


Yeux. - *Pression dans les yeux. - *Prurit et élancements dans les yeux. - *Cuisson, brûlement et douleurs incisives dans les yeux et les paupières, surtout en lisant le jour ou à la lumière des bougies. - Sensation de froid dans les yeux. - Yeux enflammés avec rougeur de la sclérotique et sécrétion abondante de mucosités. — Ulcères, taches et obscurcissement de la cornée. - *Cornée trouble et bleuâtre. - Suintement de sang par les yeux. — Inflammation et gonflement des angles des yeux. oFistule lacrymale, suppurante. — Les yeux pleurent, surtout au grand air ou de bon matin. — *Frémissement des paupières. — *Gonstement rouge et épais des paupières, avec sécrétion abondante de chassie et agglutination nocturne. - Occlusion des paupières le matin. - *Pupilles fortement dilatées. - *Trouble de la vue, comme s'il y avait un brouillard, un voile ou du duvet devant les yeux, principalement en lisant ou en fixant attentivement un objet. - Obscurcissement de la vue en lisant ou après le repas. - En lisant, on voit un point noir qui semble accompagner les caractères. - *Grande photophobie et éblouissement par une lumière trop vive. - *Presbyopie.

Oreilles. — Élancements dans le oreilles. — *Pulsation, battements et chaleur dans les oreilles. — Inflammation et gonflement de l'oreille interne et externe. — *Écoulement purulent
par les oreilles. — Éruption humide sur et derrière les oreilles.
— *Pollype aux oreilles. — *Bruissement, bourdonnement, tintement ou roulement, quelquefois alternant avec musique dans
les oreilles. — *Craquement et *détonation dans les oreilles en
avalant et en mâchant. — Accès de sensation d'occlusion de
l'oreille et de dureté de l'ouïe. — *Gonflement inflammatoire

des parotides.

Nez. — Inflammation du nez avec rougeur et enflure, principalement au bout. — *Narines ulcérées et croûteuses. — Epistaxis, principalement le matin et la nuit, et quelquefois jusqu'à la défaillance. — *Odeur fétide du nez. — *Odorat émoussé ou excessivement sensible. — *Sécheresse pénible dans le nez. — *Obturation du nez par un pus jaunâtre et fétide. — *Coryza sec, même le matin, avec éternument fréquent. — Coryza fluent excessif. — Coryza alternant avec tranchées. — Odeur fétide devant le nez comme du fumier, des œufs pourris ou de la poudre à canon.

Visage. — Couleur jaune de la face. — *Face pâle, creuse, avec yeux enfoncés et cernés. — Plaques rouges sur les joues. — Chaleur, rougeur et bouffissure de la face. — Érysipèle à la joue. — Éphélides sur les joues. — *Prurit et éruption au visage, principalement au front, aux joues et dans la région des favoris,



quelquefois humide et croûteuse, avec chaleur brûlante. Croûte de lait. — Douleurs aiguës dans la face et les os de la face. — Gonflement de la face sans chaleur. — Éruptions et croûtes aux lèvres et autour de la bouche. — Lèvres gercées. *Gonslement de la lèvre supérieure. — Commissures des lèvres ulcérées. — Accès de torpeur et de pâlissement des lèvres qui paraissent comme mortes. - *Gonflement douloureux des

glandes sous-maxillaires.

nts. — *Maux de dents aggravés ou excités par le courant d'air, ou par l'air froid, ou en prenant quelque chose de chaud ou de froid, ou par le bruit, on bien pendant et après les règles; les douleurs sont pour la plupart lancinantes, térébrantes, contractives, pulsatives, ou rongeantes et fouillantes avec sensation d'excoriation. — Maux de dents la nuit, comme par congestion de sang. — Sensation d'allongement et de vacillement des dents. — Odeur fétide des dents. — *Sensibilité douloureuse des gencives avec elancements. - Saignement facile et gonflement des gencives, avec battements et pulsations. — Ulcère fistuleux aux gencives de la mâchoire inférieure.

nche. — Accumulation de mucosités dans la bouche. — Crachement continuel d'une salive acide. - Vésicules dans la bouche et sur la langue. — Contraction crampoide de la bouche. - Sécheresse de la langue et de la bouche, principalement la nuit et le matin au réveil. - Gonflement de la langue, quelquefois d'un seul côté. — Langue chargée d'un enduit blanc. Brûlement et douleur d'excoriation sur la langue et dans la bouche. — Langue difficile à remuer, avec parole embarrassée

et indistincte. - *Grenouillette sous la langue.

Gerge. — Maux de gorge, comme par un tampon ou un gonflement dans le gosier. — Constriction dans la gorge et rétrécissement crampoide du gosier. — Excoriation du gosier-avec douleur lancinante, et pression en avalant. — Gonflement inflammatoire du gosier et de la luette, qui sont d'un rouge foncé et couverts de vésicules. — Gonflement des amygdales, avec sensation de rétrécissement de la gorge en avalant. — Mal à la gorge après s'être donné un tour de reins. - *Renaclement de mucosités.

Appétit. — *Mauvais goût dans la bouche, le plus souvent amer ; ou aigre ou métallique, surtout le matin. — Insipidité ou goût fade ou aigre des aliments. - Soif ardente ou continuelle, surtout pour les boissons froides, et souvent avec absence totale dappétit. — *Faim peu après avoir mangé. — Boulimie, généralement le matin. — Dégoût prolongé pour la viande et les aliments chauds. — *Répugnance pour la fumée du tabac; désir de choses salées, de vin et de friandises. - Faiblesse de la digestion. — Après avoir pris du lait, nausées ou régurgitations acides. — Après le repas, chaleur ou ballonnement du ventre, avec nausées ou mal à la tête, au ventre et à l'estomac, ou bien

169



renvois et écoulement d'eau comme des pituites, ou abattement et envie de dormir. — Renvois avec goût des aliments ingérés,

ou amers, ou acides.

170

Estomac. — Pyrosis après chaque repas, et renvois bruyants et continus. — Régurgitation de matières aigres. — *Nausées fréquentes, surtout le matin, le soir, ou la nuit, quelquefois avec horripilation, obscurcissement de la vue et défaillance. — Vomissements acides. — *Vomissement des aliments, ou de mucosités amères, souvent avec tranchées et douleurs crampoïdes dans le ventre. — Vomissement noir, ou de sang. — *Ecoulement pituiteux de l'estomac, parfois après le repas. — Les vomissements se manifestent principalement le matin, la nuit ou après le repas. — *Douleur pressive ou pincements à l'estomac, ou douleurs crampoïdes et contractives, principalement après le repas, et souvent avec vomissement des aliments. — Crampes d'estomac, la nuit. — *Pression à l'estomac même étant à jeun, ou en toussant, ou avec pression aux hypocondres, ou bien encore avec serrement comme par une griffe, en marchant. — Pincements, tranchées et pression nocturne à l'épigastre. — Ballonnement et gonfiement de l'épigastre et de la région de l'estomac, avec sensibilité douloureuse de ces parties au toucher. — Douleur d'excoriation et brûlement à l'estomac.

Ventre. - Douleurs généralement lancinantes, ou tensives, ou pressives, avec gonflement et induration de la région hépatique. - Tiraillement douloureux depuis les hypocondres jusqu'au dos, avec vertige et obscurcissement de la vue. - Tension dans les deux hypocondres.-Impossibilité de supporter des vêtements serrés autour des hypocondres. - Tension et ballonnement du ventre. — Tranchées fréquentes et élancements dans les côtés du ventre, chez les enfants. - Coliques avec douleurs crampoïdes et rongeantes, surtout après midi, et quelquefois avec vo-missements des aliments. — *Accès fréquents de tranchées, principalement dans l'épigastre. — *Élancements ou pincements et pression dans le ventre, même sans diarrhée. - Les maux de ventre se manifestent principalement le matin, le soir ou la nuit, ainsi qu'après le repas. - Sensation de froid dans le ventre. Douleur d'excoriation et brûlement au ventre. - Gonflement et induration des glandes du mésentère. - *Grosseur et dureté du ventre. - *Incarcération de flatuosités. - *Pression des vents vers l'anneau inguinal, comme si une hernie allait s'éta-blir, avec bruit et borborygmes. — Pression douloureuse, tressaillements, tranchées et élancements, ou pesanteur et traction dans les aines. - Gonslement et sensibilité douloureuse des glandes inguinales.

Selles. — *Constipation. — *Selles tardices, dures, en petite quantité, et souvent avec matières non digérées. — Envie inutile d'aller à la selle, quelquefois avec douleur. — Selles difficiles, et



171

seulement tous les deux jours. — Relâchement du ventre, fréquent ou continuel : deux selles par jour. — Selles comme de l'argile, peu abondantes et noueuses ou séreuses, ou en forme de bouillie. — Selles blanches, quelquefois avec stries de sang et douleurs hépatiques au toucher et en respirant. — °Diarrhée pendant la dentition. — °Selles involontaires et écumeuses. — °Diarrhée d'odeur aigre, ou fétide et jaunâtre chez les enfants. — Sortie d'ascarides et de ténia. — Chute du rectum pendant les selles. — Avant la selle, grande irascibilité. — Après la selle, abattement et courbature des membres. — Écoulement du sang par l'anus pendant et hors le temps des selles. — Gonflement et *sortie fréquente des boutons hémorrhoïdaux, surtout pendant les selles, avec douleur brûlante. — Crampes, ténesme et contraction du rectum. — Brûlement au rectum et à l'anus, avec démangeaison et °fourmillement. — Éruption brûlante, en forme de grappe, à l'anus. — Excoriation à l'anus, entre les fesses et les cuisses, — °Chute du rectum, avec douleur brûlante.

les cuisses. — °Chute du rectum, avec douleur brûlante.

Urines. — Ténesme de la vessie. — Émission d'urine trop fréquente, même la nuit. — Pissement au lit. — Urines foncées sans dépot. — Urine couleur rouge de sang, ou rouge brunâtre, d'une odeur acre, mordicante, fétide, avec sédiment blanc et farineux. — °Pissement de sang. — Écoulement de sang par l'urèthre. — Sortie abondante de mucosités avec les urines. — °Polype de la vessie. — *Brûlement dans l'urèthre, pendant et hors le temps

de l'émission des urines.

Parties viriles. — Inflammation du prépuce, avec rougeur et douleur brûlante. — Pression et douleur de meurtrissure dans les
testicules. — *Faiblesse des fonctions génitales, et absence de
l'appétit vénérien. — *Exaltation de l'appétit vénérien, avec
idées voluptueuses et lascives. — Manque ou *trop grande fréquence de pollutions. — *Érection de trop courte durée, et émission de sperme trop tardive et trop faible, pendant le coît. —
*Cancinations et brûlement dans les parties génitales pendant
l'émission du sperme dans le coît. — Après le coît, embarras de la
tête et faiblesse. — Écoulement de la liqueur prostatique après

les selles et l'émission des urines.

Règles. — *Règles trop hâtives et trop abondantes. — oAvant les règles, seins gonflés et douloureux, fatigue, mal à la tête, disposition à s'effrayer, coliques et frissons. — *Pendant les règles, congestion à la tête, avec chaleur au dedans, ou tranchées dans le ventre et douleurs crampoïdes dans les reins, ou bien vertiges, maux de tête, maux de dents, nausées, coliques et autres in commodités. — *Avortement. — Sensation voluptueuse dans les parties génitales, avec éjaculation. — *Écoulement de sang hors le temps des règles. — *Métrorrhagie. — oÉlancements à l'orifice de la matrice, et douleur pressive dans le vagin. — oChute de la matrice avec pression sur les parties — oPolype de la matrice.



- *Démangeaison à la vulve. - Inflammation et gonflement de la vulve, avec rougeur, écoulement purulent et douleur brûlante. · o Varices aux grandes lèvres. — o Leucorrhée avant les règles. - *Leucorrhée avec démangeaison brûlante, ou bien comme du lait, coulant par accès et pendant l'émission des urines. Douleur d'excoriation et d'ulcération aux mamelons. - Gonfle-

ment inflammatoire des mamelles et des mamelons. - Gonfle-

172

ment des glandes du sein.

Larynx. — OUlcération du larynx. — Sécheresse du larynx. *Enrouement fréquent ou de longue durée. — *Accumulation abondante de mucosités dans le larynx et les bronches. - Toux sans expectoration, excitée par un chatouillement dans la gorge et souvent accompagnée de vomissement. — *Toux courte le jour, comme par du duvet dans la gorge. — Toux provoquée en jouant du piano ou en mangeant. - *Toux le soir, au lit, ou la nuit, pendant le sommeil, ou le matin, et généralement violente *et sèche, quelquefois même spasmodique. - Toux, avec expectoration de mucosités épaisses ou jaunâtres et fétides, généralement la nuit ou le matin. — *Expectoration de matières puru-lentes en toussant. — *Toux avec expectoration de sang, douleur d'excoriation dans la poitrine, vertiges et marche mal assurée. — *En toussant, pression à l'estomac, élancements et secousses dans la tête, ou douleurs dans la poitrine.

Poitrine. - Étouffement en se baissant, en se promenant au vent et en se couchant. - *Besoin de respirer profondément. - Sensation comme si la respiration était arrêtée entre les omoplates. *Oppression de la poitrine, comme par congestion de sang, avec tension, ou soulagée en rapprochant les omoplates. - Respiration sibilante. - *Haleine courte, principalement en montant. - Oppression anxieuse de la poitrine, comme si elle était trop étroite et ne pouvait assez se dilater. - *Grande gêne de la respiration. — Sensation de fatigue dans la poitrine après avoir parlé. — Anxiété dans la poitrine. — Pression sur la poitrine. - *Elancements dans la poitrine et les côtés, surtout pendant le mouvement, en respirant profondément et en se couchant sur le côté affecté. - Coups dans la poitrine. - Sensibilité et douleur d'excoriation dans la poitrine, surtout en inspirant et au toucher. - *Brûlement dans la poitrine. - *Battements de cœur, même la nuit, ou après le repas, quelquefois avec anxiété et mouvements tremblants du cœur. — Elancements, pression et contraction dans la région du cœur. — Élancements picotants dans les muscles de la poitrine.

Tronc. - *Douleurs de luxation aux reins, au dos et à la nuque, comme après s'être donné un tour de reins. — Douleurs lanci-nantes dans les reins, le dos et les omoplates. — Douleurs noc-turnes dans le dos. — Douleurs dans la région des reins en allant en voiture. — Traction entre les omoplates, et douleur pressive




CALCAREA PHOSPHORICA.

174

sant quelques gouttes d'acide phosphorique dans de l'eau de chaux, jusqu'à formation d'un dépôt qui ensuite a été lavé, desséché et trituré. Ceux qui veulent se baser sur les symptômes suivants doivent se procurer le médicament préparé de la même manière.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - En se promenant au grand air, pendant un temps venteux, vertiges et traction dans la nuque. —
*Souffrances rhumatismales de toute nature. — Douleurs à diverses parties du corps, traversant les muscles jusque dans les articulations. — Les reins, les genoux et les pouces sont attaqués de préférence. — Sommeil le soir, de bonne heure, avec réveil fréquent la nuit. — Insomnie jusqu'à 2 et 3 heures après minuit. Réveil de bonne heure avec érections. — Rêves de voyages. — Rêves fréquents, quelquefois avec réflexions; rêves de périls et d'incendies. - Horripilation passagère, fréquente. enflées. - La chaleur de l'appartement paraît insupportable. -Prurit brûlant par tout le corps. - Après un bain froid dans le fleuve, corps tout rouge, comme une écrevisse, avec prurit et brûlement, comme par des orties. - Formication par tout le corps. — "Olicères. — Carie. — Sentimentalité qui fait qu'on est facilement ému. — Mauvaise humeur et éloignement pour le travail. — Violence avec disposition à faire des reproches. — Irascible, prompt à la colère et s'indignant facilement en entendant parler des torts que d'autres ont commis. — Grande violence à la moindre contradiction. - Une nouvelle facheuse fait qu'on est tout à fait hors de soi-même. - Mauvaise humeur, répugnance pour la conversation et besoin de rester tranquille après une nouvelle fâcheuse.

Tête. - Gorge. - Vertiges avec nausées. - Mal à la tête avec flatuosités dans le ventre. — Tête entreprise, lourde et doulou-reuse le matin au réveil. — Sensation douloureuse de plénitude à la tête, comme si le cerveau était pressé contre le crâne, augmentée par le mouvement et le changement de position, soulagée en restant couché tranquillement. — Pendant les maux de tête, face et tête chaudes, avec paresse et mauvaise humeur. — Les maux de tête s'aggravent au grand air, ou lorsqu'on se baisse. — Prurit au cuir chevelu, tous les soirs. — Plus myope qu'autrefois, avec trouble de la vue par de petites taches rondes, grisâtres. -Prurit aux yeux, comme s'il y avait du sable ou un poil dedans. Yeux très-affectés, quand on calcule ou écrit à la lumière des bougies. - Douleur dans l'œil, comme à la suite d'un coup. oCouperose au visage; boutons rouges, remplis d'un pus jaunâtre, avec douleurs lancinantes au toucher. — Douleur dans les yeux et dans le nez, comme s'il s'y était introduit un corps étranger. -Accumulation de croûtes jaunes, sèches, dans le nez. — Coryza fluent dans la chambre froide, obturation du nez au grand air. -



CALCAREA PHOSPHORICA.

175

Coryza finent violent, avec excoriation des narines. — Petit ulcère à la cloison du nez, avec douleur d'excoriation. — Éternument fréquent, avec écoulement de mucosités par le nez, et salivation. - Mouchement de sang. - Sensation dans une dent cariée, comme s'il y était entré quelque chose, avec sensibilité douloureuse au contact de la langue. - Accumulation d'une salive acide dans la bouche - Sensation de contraction dans la gorge. - Mal à la gorge, le matin au réveil, aggravé en avalant. — Langue chargée d'un enduit blanc, surtout le matin, avec crevasses, comme des gerçures, et goût fade après avoir mangé des glaces. - Contraction dans le côté gauche de la bouche et des gencives, comme par quelque chose de dur, ou comme si un souffle frais sortait des dents cariées. — Douleur d'excoriation dans la gorge, avec engorgement de l'amygdale droite, amélioré en la mouillant avec des fruits. - Forte accumulation de glaires dans la gorge, avec renâclement fréquent et douleur d'excoriation.

Estemac. — Urines. — Après avoir mangé des glaces, coliques autour du nombril, et langue blanche et gercée. - Fort désir de café et de vin. — Nausées avec vertiges, embarras de la tête, et confusion des idées. — Après avoir pris du café, nausées, pyrosis, tête entreprise et douloureuse, et mauvaise humeur excessive. Douleurs aiguës dans l'estomac, avec grande faiblesse, mal à la tête et diarrhée; le moindre morceau qu'on mange renouvelle les douleurs d'estomac. — Avant le repas, crampe violente à l'estomac, comme après avoir mangé quelque chose de dur, avec sensation de fadeur et de mal au cœur. — Coliques violentes avec ballonnement du ventre, et forte accumulation de flatuosités, ou avec mal à la tête. — Tranchées autour du nombril, comme une colique flatulente, se renouvelant après avoir bu de l'eau froide. - Sortie difficile de vents sans soulagement. — *Selles avec flatuosités abondantes. — Diarrhée avec évacuation de matières purulentes. — Diarrhée très-fétide. — Selles molles, mêlées de ang noirâtre. — Mucosités couleur jaune de safran, sortant après une selle jaune clair, mais bien moulée. — Sortie des hémorrhoïdes, avec battement et douleur d'excoriation. — Émission fréquentes d'urines abondantes, avec lassitude et fatigue. - · Urines foncées et quelquefois chaudes. — Besoin d'uriner la nuit, suivi, le matin, d'un mauvais goût à la bouche. — Élancements dans l'urèthre, hors le temps de l'émission des urines. — Jet des urines éparpillé, avec douleur incisive en urinant. — Orifice de l'urèthre comme collé et enflammé, avec émission nouvelle d'un jet, après avoir uriné. - Envie fréquente d'uriner, avec arrièreémission d'une partie des urines. — Le soir, après s'être couché, besoin fréquent d'uriner. — Après l'évacuation des selles et des urines, les parties génitales sont comme fatiguées. — Le matin, exaltation de l'appétit vénérien, avec jouissance extraordinaire dans le coît. — Petits boutons au scrotum, avec douleur d'exco-



176 CALCAREA PHOSPHORICA. - CAMPHORA.

riation en y touchant. - Fortes érections en allant en voiture. -

Après le coît, faiblesse dans les jambes.

Poitrine. — Membres. — Respiration profonde, suspirieuse. — Craquement dans le sternum. — Douleur dans les reins au moindre effort corporel, quelquefois tellement violente qu'elle force à crier. — *Douleurs rhumatismales à l'épaule et au bras (gauche), parfois avec gonflement de la partie malade, et chaleur fébrile. — Endolorissement, torpeur et *paralysie du bras (gauche). — Paralysie des articulations de la main et des doigts. — Douleurs dans les articulations des mains et des doigts, surtout aux pouces, equelquefois par refroidissement. — Douleurs violentes aux genoux, aux hanches et aux reins, aggravées par le mouvement et surtout par la marche. — Douleurs ostéocopes dans les bras et les jambes. — Tension dans le jarret, comme si les tendons étaient trop courts en étendant la jambe, et améliorée en marchant. — Engourdissement facile des musles de la fesse, avec inquiétude dans les jambes, forçant à les remuer constamment.

CAMPHORA.


CAMPH. — Camphre. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharm. homosop., p. 481. — Doses usitées: 0, 6, 42. — Durée d'action: souvent quelques minutes seulement.

ANTIDOTES: Op. nitr-spir. Comparer avec: Canth. cham. cocc. hyos. kal. laur. op. puls. rhus. stram.

CLINIQUE. — On n'a encore employé ce médicament que contre peu de maladies, telles que le Choléra, la Grippe, quelques cas d'Épilepsie, des affections hydropiques, des Fièvres typhoïdes (après rhus), des Encéphalites (par un coup de soleil?), et comme antidote palliatif de plusieurs substances végétales. Contre les effets toxiques de l'opium, du cocculus, des cantharidés et du muse, ainsi que contre les effets du spongia, il paraît avoir une vertu spécifique. — Les effets du nitre paraissent augmenter par l'emploi du camphre. — On a encore conseillé le camphre contre les Crampes de poitrine causées par les vapeurs de l'arsenic et celles du cuivre, ainsi que contre quelques espèces de Pneumonies par refroidissement, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Convulsions et crampes de différente nature. — *Tétanos, avec perte de connaissance et vomis-



CAMPHORA.

177

sement. — Attaques d'épilepsie, avec râlement, face rouge et bouffie, mouvements convulsifs des membres et même de la langue, des yeux et des muscles de la face, transpiration chaude et visqueuse au cuir chevelu et au front : après l'accès, somnolence comateuse. — Malaise, relâchement et lourdeur dans tout le corps. — Affaissement de toutes les forces. — Accès d'évanouissement. — Craquement dans les articulations. — Lancinations rhumatismales dans les muscles. — Difficulté à remuer les membres. — Sensibilité douloureuse du périoste de tous les os. — Souffrances par suite d'un refroidissement. — La plupart des symptômes apparaissent pendant le mouvement, ou bien la nuit, et sont aggravés par le froid, le grand air, et le contact. — Souvent les symptômes disparaissent dès qu'on y porte son attention. — Grande horreur du grand air, avec besoin de se vêtir trèschaudement.

Peau. — Peau douloureusement sensible, même au plus léger contact. — Inflammations érysipélateuses. — *Peau bleuâtre et

froide, avec froid du corps. — Sécheresse de la peau.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour. — Somnolence comateuse, avec paroles incohérentes. — *Insomnie nocturne par surexcitation nerveuse. — Ronflement et jactation pendant le

sommeil. - Rêves anxieux, pleins de jalousie.

Fièvre. — Sensibilité excessive à l'air frais, et facilité à se froidir. — *Froid de tout le corps, avec pâleur mortelle du visage, frissons et claquements de dents. — Chaleur du corps, avec rougeur du visage, surtout aux joues et au lobe de l'oreille. — Chaleur universelle, qui devient excessive en marchant. — *Pouls remarquablement petit et lent, ou excessivement accéléré et plein. — Sensation de sécheresse de toute la peau du corps. — Le sang ne se porte que difficilement aux parties éloignées du cœur.

Moral. — Anxiété, avec humeur pleureuse. — Humeur querelleuse et contrariante. — Émoussement des sens. — Perte de connaissance. — Délires. — Fureur. — Perte de la mémoire. — Pensées jalouses. — Découragement désespéré. — Grande précipita-

tion.

Tête. — Étourdissement comme par l'irresse, surtout en marchant. — *Vertige et pesanteur de la tête qui oblige à la pencher en arrière. — Mal de tête, comme si le cerveau était meurtri et en plaie. — Mal de tête sourd, au-dessus de l'os frontal, avec envie de vomir. — Mal de tête constrictif, surtout à l'occiput et au-dessus de la racine du nez, fortement aggravé en se baissant, étant couché ou par le toucher, et se dissipant dès que l'on pense à son mal. — Coups incisifs dans la tête après s'être couché. — Douleur térébrante dans les tempes. — Mal de tête pulsatif la nuit, avec élancement dans le front et chaleur du corps. — Congestion à la tête. — Inflammation du cerreau. — Spasmes qui tirent la tête de côté ou en arrière.



CAMPHORA.

178

Yeux. — Inflammation des yeux. — Taches rouges aux paupières. — Tremblement des paupières. — Yeux hagards et convulsés en haut ou enfoncés. — Rétrécissement des pupilles. — Obscureissement de la vue. — Visions d'objets étranges. — Photophobie. — Tout paraît trop éclairé et trop brillant. — Les lettres se confondent en lisant; puis, cercle lumineux devant les yeux.

Oreilles. — Chaleur et rougeur des oreilles, surtout aux lobes. — Abcès dans le conduit auditif, rouge foncé et avec douleur pres-

sive lancinante.

Visage. — Face de pâleur mortelle ou rouge fonce. — Erysipèle à la face. — Distorsion convulsive des traits. — Serrement con-

vulsif des mâchoires. - Face froide et bleuatre.

Dents. — Maux de dents, comme par gonflement des glandes sous-maxillaires, avec sensation d'allongement des dents. — Conps aigus dans les racines des dents incisives. — Vacillement douloureux des dents. — Maux de dents continuels, remuants et térébrants dans les molaires, et aggravés par le vin et le café, l'eau froide et l'air libre. — Les maux de dents cessent pendant le coît. — En s'exposant pendant les maux de dents au grand air, un élancement passe des dents à l'œil.

Bouche. — Haleine fétide le matin. — Écume à la bouche. — Accumulation abondante d'une salive visqueuse et muqueuse.

Gorge. — Mal de gorge en avalant, comme par exceriation de la gorge, se faisant sentir même la nuit. — Chaleur brûlante dans la gorge, depuis le palais jusqu'à l'estomac. — Saveur plus prononcée de tous les aliments, et surtout du bouillon. — Amertume du tabac et des aliments, principalement de la viande. — Dégoût et répugnance pour la fumée du tabac. — °Soif excessive.


Estomac. — Envies de vomir, suivies d'accès de vertige. — Vomissements de bile ou de sang. — Au début des vomissements, sueur froide, principalement au visage. — Sensation de brûlure et chaleur à l'estomac. — Douleur de meurtrissure à l'épigastre. — °Forte pression à l'épigastre. — °Vomissements matutinaux de mucosités aigres. — °Grande sensibilité du creux de l'estomac au toucher.

Ventre. — Crampes dans le ventre. — Douleur tractive de meurtrissure dans tout le côté droit du ventre. — Sensation de plénitude dans le bas-ventre. — Sensation de froid ou chaleur brû-

lante à l'épigastre et au bas-ventre.

Selles. — Constipation. — Selles difficiles, comme par inactivité des intestins, ou par rétrécissement du rectum. — Selles noirâtres.

Urines. — Rétention des urines. — Urines coulant lentement et par un jet mince. — Urine d'un vert jaunâtre, trouble et sentant le moisi. — Pissement de sang. — Douleur brûlante pendant l'émission des urines. — Ourine épaisse et rouge, avec sédiment trouble et épais. — Ténesme de la vessie avec ischurie convulsive.



CAMPHORA. - CANNABIS SATIVA.

179

Parties viriles. — Absence de l'appétit vénérien, et impuissance.

Poitrine. — Respiration profonde et lente. — *Oppression de poitrine suffoquante, et constriction du larynx, comme par la vapeur du soufre. — Accumulation excessive de mucosités dans les voies aériennes. — °Crampes de poitrine. — Battements du cœur que l'on peut entendre frapper vers les côtes, surtout après le

repas. - Tremblement du cœur.

Tronc et Membres. — Tension et roideur dans la nuque, en remuant le cou. — Lancinations tractives entre les omoplates, pendant le mouvement des bras. — Mouvements convulsifs des bras, qui décrivent des cercles. — Pression et tiraillement aigu au bras et à l'avant-bras. — Froid glacial des mains. — Douleurs de brisement aux cuisses et aux genoux. — Douleurs crampoïdes et tiraillements aigus dans les jambes et le cou-de-pied. —*Crampes aux mollets. — Tiraillement aigu à l'extrémité des orteils et sous les ongles, en marchant. — Grande faiblesse des jambes.

CANNABIS SATIVA.

CANN. — Chanvre cultivé. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Pharm. homœop., p. 483. — Doses usitées : 0, 3, 42, 30. — Durée d'action : 2, 5 jours dans des maladies aiguës ; 2, 3 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

ASTIDOTE: Campp.
COMPARER AVEC: Arn. bry. canth. nux-vom. op. petrol. puls, stann.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances hystériques?; Convulsions?; Souffrances à la suite de fatigue et d'efforts physiques?; Manie et autres affections morales?; Ophthalmies scrofuleuses?; Cataracte; Obscurcissement et taches de la cornée; Affections gastriques et bilieuses?; Gastralgie?; Induration du foie; Coliques; Ascite enkystée?; Constipation opiniàtre; Cystite, néphrite, dysurie, hématurie et autres affections des voies urinaires; Calculs urinaires; Gonorrhée aiguë; Flueurs blanches?; Stérilité; Avortement; Affections catarrhales des voies aériennes; Pneumonie; Souffrances asthmatiques; Cardite, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs tractives aiguës et contractives pressives, avec sensation de paralysie, ou coups et élancements profonds à diverses parties, ou bien sensation comme si on était pincé avec les doigts. — Tiraillement rhumatismal pen-



CANNABIS SATIVA.

180

dant le mouvement, comme si c'était dans le périoste. — Abattement général avec chancellement et endolorissement des genoux. —Grande fatigue pour avoir parlé ou écrit. —Tétanos, principalement des membres supérieurs et du tronc. — Plusieurs symptômes sont aggravés ou provoqués par le toucher, le grand air et la chaleur, ainsi que la nuit et après minuit.

Peau. — Brûlement violent sur toute la peau, surtout aux pieds, aux mains, au ventre, puis prurit qui force à se gratter toute

la nuit.

Sommeil. — Envie invincible de dormir le jour. — Le matin, en se réveillant, on est plus fatigué que le soir avant de se coucher. — Insomnie la nuit. — Grande anxiété de cœur, la nuit, avec picotement et sensation de brûlure par toute la peau, comme par de l'eau bouillante. — La nuit, forte chaleur, et sueur.

Fièvre. — Horripilation et frissonnement avec soif. — Froid extérieur et malaise. — Froid du corps avec chaleur au visage. — Pouls lent et à peine sensible. — Chaleur brûlante de tout le

corps, la nuit.

Moral. — Tristesse et indifférence. — On est fortement blessé par le moindre mot. — Disposition à s'effrayer facilement. — Manic, tantôt gaie, tantôt sérieuse ou furieuse. — Irrésolution et încertitude à cause d'une imagination très-mobile. — Le soir et le matin les pensées se confondent, au point de ne savoir plus soi même ce qui est vrai et ce qui n'est que fictif. — Grande distraction au point de ne plus savoir ce que l'on fait. — On se trompe souvent en écrivant. — Les idées se perdent. — Les mots


manquent.

Tête. — Accès de vertige en marchant et en se tenant debout, allant jusqu'à faire tomber de côté. — Tournoiement continuel de la tête, comme si elle remuait constamment. — Bouillonnement dans la tête en écrivant. — Mal de tête comme s'il y avait une pierre qui pressat dessus. — Pression et tension dans les tempes. — Compression dans le sinciput, depuis les bords de l'orbite jusqu'aux tempes. — Congestion à la tête avec battement au cerveau, joues rouges et chaudes. — Sensation au cuir chevelu, comme de quelque chose qui y manquât, et sensation fréquente comme des gouttes d'eau froide tombant sur la tête. — Boutons douloureux au cuir chevelu, à la nuque et derrière les oreilles, avec douleur aux yeux et mal à la gorge.

Yeux. — Douleur pressive aux globes des yeux. — Pression sur les paupières, avec difficulté de les lever. — Tiraillement crampoïde dans les yeux, — Faiblesse et trouble de la vue pour les objets, soit éloignés, soit rapprochés. — *Taches et obscurcissement de la cornée. — Vision comme d'un cercle dentelé de flammes blanchâtres. — Points lumineux et zigzags verticaux

devant les yeux.

Oreilles. - Battement et pression dans les oreilles. - Bruissement



CANNABIS SATIVA.

181

dans les oreilles, et sensation comme s'il y avait une peau devant.

— Boutons enflammés et gonfiement purulent dans l'oreille.

Hen. Gonflement du nez avec rougeur cuivrée. — Chalcur et activesse du nes. — Épistaxis précédés d'une sensation de chalcur dans le nez.

Visage. — Pâleur de la face. — Rougeur de la joue gauche, avec pâleur de l'autre pendant le mal aux dents. — Fourmillement, démangeaison et cuisson au visage, comme par du sel. — Palpitation des muscles de la face. — Chaleur de la face et rougeur des joues. — Gencives d'une dent cariée, gonfiées, enflammées et douloureuses. — Dents émoussées.

Bouche. — Sécheresse de la bouche avec salive visqueuse et absence de soif. — Parole embarrassée; tantôt ce sont les mots qui manquent, tantôt c'est la voix. — En parlant, forte anxiété produite par des douleurs au dos. — Mal à la gorge, a vec élancement aux oreilles. — Douleurs d'excoriation à la gorge, avec sensation de sécheresse.

Estemac. — Renvois à vide. — Régurgitation de matières âcres et d'une sigreur amère. — Nausées avec appétence pour les aliments. — Vomiturition avec strangulation depuis l'épigastre jusqu'à la gorge. — Vomissement de bile verte. — Vomissement de mucosités aigres, après avoir pris du café. — Appétit augment éle soit. — Le matin, au lit, envie de vomir, surtout étant couché sur le côté droit. — Le mal de cœur interrompt le sommeil. — Pyrosis. — Au toucher douleur à l'estomac, comme s'il était ulcéré. — Accès de violentes crampes d'estomac, avec pâleur et sueur du visage, pouls presque éteint et respiration râlante. — Pression, pincements et tranchées à l'épigastre et au-dessus de l'estomac. Ventre. — Douleur de meurtrissure dans les intestins. — Gonfle-

Ventre. — Douleur de meurtrissure dans les intestins. — Gonflement dur et douloureux de la région hépatique. — Douleurs crampoïdes dans l'épigastre. — Pulsation dans le ventre comme du dedans au dehors. — Secousses douloureuses dans le ventre, comme s'il renfermait quelque objet vivant. — Ébranlement des intestins, comme s'ils étaient détachés, lorsqu'on remue les bras. — Tuméfaction partielle du ventre, comme par une ascite enkystée. — Coups et pression vers le dehors, dans la région des aines. — Maux de ventre améliorés en buvant de l'eau froide.

Belles. — Diarrhée accompagnée de maux de ventre crampoïdes. — Pression vers le dehors dans le rectum. — Sensation comme d'un suintement d'eau froide par l'anus. — *Constipation et selles dures. — Selles molles avec ténesme et beaucoup de vents. — Selles liquides, jaunâtres, sortant comme s'il n'allait sortir qu'un vent.

Urines. — Envie pressante d'uriner avec douleur pressive. — *Difficulté d'uriner comme par paralysie de la vessie, et strangurie nocturne. — •Rétention d'urine opiniâtre. — Obturation des voies urinaires par des mucosités et du pus. — Urine trouble, blanche ou rougeâtre et comme mêlée de sang ou de pus. — Incontinence



CANNABIS SATIVA.

d'urine. — *Jet d'urine éparpillé. — °Émission goutte à goutte d'une urine rare et sanguinolente. — *Douleur brûlante dans l'urèthre et la vessie, avant et pendant l'émission des urines. — *Urèthre enflanmé et douloureux au toucher. — *Écoulement jaune et muqueux par l'urèthre. — °Sortie d'une pierre en nrinant.

Parties viriles. — Parties génitales froides. — *Prurit et gonficment inflammatoire du prépuce, du gland et de la verge, avec
rougeur foncée et ophymosis. — Pression dans les testicules, et
tension dans le cordon spermatique, en se tenant debout. — Gonflement de la prostate. — *Érections avec douleurs tensives. —
Répugnance pour le coït, ou forte excitation de l'appétit vénérien,
— Fortes érections après le coït. — Érections sans appétit vénérien.
— Sensation d'étranglement dans le testicule droit, avec
gonflement du testicule et du cordon spermatique; le scrotum
paraît, à sa partie supérieure, rempli de petites nodosités.

Règles. - Stérilité. - Avortement, avec convulsions.

Larynx. — Extinction de la voix. — Accumulation de mucosités tenaces dans le larynx, avec grattement et gêne de la respiration. — Toux violente et sèche. — Toux avec expectoration verdâtre

et visqueuse.

182

Poitrine. — Géne de la respiration, comme s'il y avait un poids sur la poitrine, avec sifflement dans les bronches. — Respiration courte et oppressée. — *Respiration difficile, et qui n'est possible qu'en se tenant debout. — Géne de la respiration, et oppression de poitrine avec inquiétude dans la gorge. — Respiration ralante. — Gêne auxieuse de la respiration, avec élancement entre les omoplates. — *Élancements au fond de la poitrine, surtout en respirant, en parlant, ou pendant le mouvement. — *Inflammation des poumons, avec vomissement verdatre et délire. — Coups douloureux dans la région du cœur. — Gêne douloureuse et tension au cœur, avec battements de cœur et anxiété. — Battements de cœur se faisant sentir plus bas qu'à leur place ordinaire. — Inflammation et prurit du mamelon chez un homme.

Tronc. — Douleurs dans le dos qui empêchent de parler et suspendent la respiration. — Douleur lancinante entre les omoplates.

- Pression vers le dehors, dans les reins et le coccyx.

Bras. — Douleurs de meurtrissure dans l'épaule et le bras pendant le mouvement. — Crampes dans les mains et les doigts. — Faiblesse paralytique subite de la main, avec tremblement en saisis-

sant un objet, et impossibilité de le tenir solidement.

Jambes. — Crampes dans les cuisses, les mollets et les jarrets. —
Faiblesse, chancellement et douleurs des genoux. — Déboitement de la rotule, en montant un escalier. — Pulsation et douleur
extensive dans les pieds et les articulations du pied, comme
après une marche forcée. — «Contraction spasmodique du tendon
d'Achille avec douleurs violentes.

do

CANTHARIS.

CANTH.— Cambacide, Cambaride electric — HAFAFATANA, et prep. Pharmac, helicarde, 1, 320. — Doven MAFAFATANA, 1984 par 20 jours dans quelques cas de analadies chroniques.

Compensa Avec Avec had canada a march a mar ANIDOTE: Gampa.

COMPARER AVEC: Acon. bel. camph. cann. caps. chin. coff. coloc. I str. ?

Ive. puls. rhus. seneg. Dare, date.

CLINIQUE. Se laissant guider par l'ensemble des symptomes. on verra les cas où l'en pentra conculter ce me licament, contre : on verra les cas on l'on pentra consumer come neument, contre :
Affections hydropiques: Convulsions: leterory: Rage, hydrophobie, Affections hydrophones: Convinsions: Teteror: Rage, hydrophone, manies et autres affections morales y: Encephalite, gastrite, hépatite mames et autres ancerens merares : rincepuarre, gastrue, nepatre et autres inflammations locales : Amygdalite et autres angines phlegmonenses?; Nephrile, cystile, uréthrile, hématurie et autres angunes Imeginoneuses; repaires, gone, uremue, memueure et autres affections des roies urinaires; Gonorrhée cordée; Satyrissis?; Primpisme?; Cardites et endocardites rhumatismales; Coralgie; Fièvres intermittentes, etc., etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Douleurs brûlantes comme par excorration dans toutes les cavités du corps. - Elancements aigus vers l'intérieur, à différentes parties. — *Douleurs tractives, arthritiques dans les membres, avec affection des voies urinaires, et améliorées par le frottement. — Douleurs violentes, avec gémissements et lamentations. — Sensation de sécheresse dans les articulations. — Manque de flexibilité de tout le corps. — Abattement et faiblesse, avec sensibilité excessive de toutes les parties du corps, tremblement et besoin de se concher. - Prostration des forces, allant jusqu'à la paralysie. — Convulsions, tétanos. — Les souffrances se manifestent principalement au côté droit et s'améliorent dans la position conchée. — Les symptômes se renouvellent tous les sept jours.

Peau. Vésicules pruriantes, avec douleur brûlante au toucher. Inflammations érysipélateuses. — Douleurs tractives aigues dans les ulcères, avec suppuration plus abondante.

Sommeil - Forte envie de dormir, surtout après midi, avec bâillements et pendiculations, — Insomnie sans cause apparente. — La nuit, demi-sommeil, avec réveil fréquent.

e. Fièvre qui ne se manifeste que par le froid. - Froid et connement, avec chair de poule et pâleur de la face. — Soif lement après les frissons. — Sueur d'odeur d'urine. - Abattement et humeur pleureuse. — Inquiétude anxieuse,



CANTHARIS.

184

avec agitation qui force à se remuer constamment. - Manque de confiance en soi-même. - Pusillanimité et timidité. - Disposition à se facher et à se mettre en colère. - Accès de rage, avec cris, coups et aboiements, renouvelés en se tâtant le gosier, et par l'aspect de l'eau. — Délires. — Vésanie. — Manie, avec actes et

gestes extravagants.

Tête. — Vertige, avec perte de connaissance et brouillard devant la vue, principalement au grand air. — Maux de tête qui înter-rompent le sommeil de nuit. — Lancinations pressives dans la tête, qui disparaissent en marchant. — Douleurs tractives aiguës dans la tête, avec vertige. - Congestion à la tête. -Battement au cerveau et chaleur qui monte à la tête. Sensation de brûlure à la tête, comme si, en dedans, tout était à vif et en plaie, avec inflammation du cerveau. - Tiraillement, secousses et rongement dans les os de la tête. - Maux de tête, comme si on tirait les cheveux. - Hérissement des cheveux. - Maux de tête, comme venant de la nuque et voulant sortir par le front.

Yeux. — Douleurs aux yeux, avec sensation comme si les paupières étaient excoriées, principalement lorsqu'on les ouvre. - Inflammation des yeux, avec cuisson brûlante. - Couleur jaunâtre des

yeux. — Les objets semblent être colorés en jaune. Oreilles. — Inflammation des oreilles, qui sont brûlantes.

Nez. — Gonflement du nez, même à l'intérieur, avec rougeur et chaleur brûlante. — Odeur fétide et nauséabonde devant le nez. - Coryza de longue durée, et catarrhe, avec fort écoulement de

mucosités visqueuses par le nez.

Visage. - Pâleur du visage. - Face creuse, hippocratique, avec traits qui expriment l'angoisse et le désespoir. - Couleur jaunâtre de la face. - Inflammation érysipélateuse et desquamation des joues. — Rougeur brûlante et gonflement de la face. — Gonflement d'un seul côté de la face (le côté droit), avec tension. Gonflement et inflammation des lèvres. — Gerçure et exfoliation


des lèvres. — Trismus. ents. — Maux de dents généralement tractifs, aggravés en ents. — Ulcération des genmangeant. - Fistule aux gencives. - Ulcération des gen-

cives.

Bouche. - Goût de poix de cèdre dans la bouche. - Inflammation de la membrane muqueuse de la bouche. - Inflammation phlegmoneuse de l'intérieur de la joue. — Aphthes dans la bouche. - Salivation écumeuse, avec stries de sang. — Écume à la bouche. - Sang coagulé venant dans la bouche. — Gonflement inflammatoire et suppuration de la langue. - Faiblesse des organes de

la parole, et parole languissante.

Gorge. - Mal de gorge en avalant. - Déglutition difficile, avec étranglement dans la gorge et régurgitation nocturne des ali-ments. — Déglutition empêchée, surtout pour les liquides. —



CANTHARIS.

185

Brûlement dans la gorge en avalant. — Inflammation et ulcération des amygdales et de la gorge. — Douleur brûlante dans la gorge, aggravée en buvant de l'eau.

Appétit. — Perte du goût. — Goût de poix dans la bouche et la gorge. — Soif par sécheresse des lèvres, avec répugnance pour toutes les boissons. — Manque d'appétit, avec dégoût et répugnance pour toutes sortes d'aliments.

Estomac. — Renvois, avec sensation brûlante, comme du pyrosis, aggravée en buvant. — Renvois sanglotants qui semblent prendre la direction inverse et retourner vers l'estomac. — Vomissement des aliments ingérés. — Vomissements de matières bilieuses et muqueuses, ou de sang. — Grande sensibilité de la région précordiale. — Plénitude pressive, avec anxiété et inquiétude dans l'estomac. — Douleurs cuisantes et brûlantes à l'estomac. — Inflammation de l'estomac.

Ventre. — Inflammation du foie. — Élancements et contraction dans l'hypocondre droit. — Grande sensibilité de l'abdomen au toucher. — Douleur brûlante dans le ventre, depuis le gosier jusqu'au rectum. — Douleur brûlante au-dessus du nombril, en toussant, en éternuant, en se mouchant, avec taches jaunâtres à la partie affectée. — Inflammation des intestins. — Gonflement hydropique du ventre. — Incarcération des flatuosités sous les hypocondres.

Selles. — Constipation et selles dures. — Diarrhée avec évacuation de matières écumeuses ou de mucosités verdâtres, avec tranchées après les selles et douleur brûlante au rectum. — Diarrhées dyssentériques, avec évacuation nocturne de mucosités blanchâtres et de morceaux solides comme de fausses membranes, avec stries de

sang. — Selles sanguinolentes.

Urines. — Rétention d'urine avec douleurs crampoides à la vessie.

—*Envie pressante et inutile d'uriner, avec émission douloureuse et goutte à goutte. — *Émission difficile des urines, —en jet mince et éparpillé. — Augmentation de la sécrétion des urines. — Urine jaune pâle ou *couleur foncée et rouge. — Écoulement de mucosités sanguinolentes de la vessie. — *Pissement de sang, goutte à goutte. — Urines purulentes. — *Cuisson brûlante en urinant. — *Douleurs incisives dans l'urèthre avant, pendant et après l'émission des urines. — *Douleurs vives, lancinantes et incisives, —tiraillements successifs, et pulsations dans les voies urinaires. — *Inflammation et —ulcération des reins, de la vessie et de l'urèthre. —*Grande sensibilité douloureuse de la région de la vessie au toucher.

Parties viriles. — Tiraillements dans le cordon spermatique en urinant. — Inflammation et gangrène des parties génitales. — Gonflement douloureux des testicules. — Appétit vénérien fortement exalté avec érections douloureuses, fréquentes et de longue durée, comme par priapisme. — Éjaculation facile pendant des



CANTHARIS. - CAPSICUM ANNUUM.

caresses amoureuses. — Spermatorrhée. — Après le coît, douleur brûlante dans l'urèthre.

Règles. - Règles trop hâtives et trop fortes, avec sang noir et douleurs pendant l'écoulement. - Sortie de môles, de fœtus et du placenta. - *Gonflement du col de la matrice. - *Flueurs blanches corrosives, avec sensation brûlante en urinant, et excitation de l'appétit vénérien. - Inflammation des ovaires.

Larynx. - Enrouement, avec renaclement douloureux de mucosités visqueuses, abondantes, venant de la poitrine, et avec élancements incisifs dans la trachée-artère. - Inflammation du larynx. - Sensation de faiblesse excessive dans les organes de la respiration, en parlant et en respirant profondément. - Voix faible, timide et tremblante.

Poitrine. - Respiration difficile et oppressée, par constriction de la gorge et sécheresse du nez. — Suspension de la respiration, en montant une montagne, avec râlement dans la poitrine et nausées. - Elancements dans la poitrine et les côtés. - Douleur brûlante dans la poitrine, d'où il se détache parfois de petits caillots de

sang. -Battements de cœur.

186

Tronc et Membres. - Douleurs tractives aiguës dans le dos. -Sensation de constriction dans la colonne vertébrale. - Emprosthotonos et opisthotonos. - Douleurs tractives aiguës dans les bras. - Manque de force dans les mains. - Douleurs dans les hanches avec souffrances spasmodiques dans les voies urinaires. -Douleurs tractives, aigues, térébrantes dans les jambes, depuis les pieds jusqu'aux hanches. - Tremblement dans les jambes.

CAPSICUM ANNUUM.

CAPS. — Piment, poivre long ou poivre de Cayenne. — HAHNEMANN. —

Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 484. — Doses usitées: 9, 30. —

Durée d'action: jusqu'à 20 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTE: Camph. — Le capsicum est antidote de: Calad. et chin.

COMPARER AVEC: Arn. bell. Calad. chin. cin. igu. n-vom, puls. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra le cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des personnes d'un tempérament flegmatique; Nostalgie; Migraine et céphalalgie hystérique?; Amblyopie amaurotique?; Névralgie faciale?; Stomacace; Dyssenterie; Diarrhée; Toux catarrhale; Fièvres intermittentes, aussi après l'abus du quinquina, etc., etc.

Voir la note, page 15,



CAPSICUM ANNUUM.

187

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs pressives. — Douleurs tractives dans les membres, excitées par le mouvement. — Douleur de luxation et roideur dans les articulations, avec craquement, surtout au commencement de la marche. — Crampes dans le corps, avec roideur des bras et des jambes, fourmillement et sensation d'engourdissement. — Répugnance pour le mauvement. — Les symptômes se manifestent principalement le soir et la nuit, et s'aggravent par le grand air, le contact et le froid, ainsi qu'au commencement du mouvement, et après avoir bu ou mangé. — Grande sensibilité à l'air frais et au courant d'air. — Insennie sans cause apparente. — Sommeil plein de rêves.

Fievre. — Frissons fébriles et froid de tout le corps, avec mauvaise humeur augmentant avec le froid, ou bien avec anxiété, étourdissement et hébétude de la tête. — Frisson venant du doa. — Froid et frissonnement chaque fois après avoir bu. — *Fièrre avec prédominance du froid et avec soif, chaleur brûlante et souffmaces muqueuses. — °Frissons avec forte soif, puis chaleur sans ou avec soif et avec sueur.

Horal. — Disposition à s'effrayer. — Mécontentement. — *Résistance opiniâtre. — *Forte disposition à prendre tout en mauvaise part, à se mettre en colère, même pour des plaisanteries, et à aire des reproches. — Humeur capricieuse et excessivement changeante. — Émoussement de tous les sens. — Irréflexion et maladresse. — oNostalgie avec rougeur des joues et insomnie. — Disposition à plaisanter et à dire des bons mots.

Tôte. — Tête entreprise. — Ivresse comme par des boissons spiritueuses. — Maux de tête, comme si le crâne allait éclater, en
marchant ou en remuant la tête. — Accès de maux de tête semilatéraux, pressifs et lancinants, avec nausées, vomissements et
perte de la mémoire, aggravés par le mouvement des yeux. —
Douleurs lancinantes, ou tractives aiguës, surtout dans les côtés
de la tête. — Douleur d'écartement pressif dans le cerveau, comme
par plénitude. — Maux de tête pulsatifs. — Prurit rongeant au
cuir chevelu, avec douleur à la racine des cheveux et au cuir che-

velu après s'être gratté.

Yeux. — Presaion dans les yeux, comme par un corps étranger qui s'y serait introduit. — Inflammation des yeux avec rougeur, douleur brûlante et larmoienent. — Yeux proéminents. — Trouble de la vue, surtout le matin, comme si quelque chose nageait sur la cornée, se laissant améliorer pour quelques instants par le frottement. — Vue entièrement éteinte, comme par amaurose.

Oreilles. — Douleurs tractives aiguës dans les oreilles. — Démangeaison et pression au fond du conduit auditif. — Gonflement douloureux derrière l'oreille. — Diminution de l'ouie.

Hen. — Épistaxis, surtout le matin, au lit. — Boutons douloureux sous les narines. — Coryza sec. avec fourmillement et chatouillement dans les narines.



CAPSICUM ANNUUM.

Visage. — Rougeur de la face alternant souvent avec pâleur. —
Beaucoup de petits points rouges à la face. — Dartre rongeante,
pruriante sur le front. — Douleurs à la face, dans les os, où elles
sont aggravées au toucher, ou dans les nerfs, où elles s'aggravent
lorsqu'on s'endort. — Pression sourde à la pommette. — Éruptions ulcérées et gerçures aux lèvres. — Gonflement des lèvres.

Dents. — Douleurs aux dents, comme si elles étaient agacées ou allongées. — Tiraillement dans les dents et les gencives. — Gon-

flement des gencives.

188

Gorge. — Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue. — Salive visqueuse dans la bouche. — Mal de gorge, avec déglutition douloureuse et tiraillement dans le pharynx. — Contraction

crampoïde de la gorge.

Appétit. — Goût aqueux et fade. — Goût aigre de la bouche et aussi du bouillon. — Absence d'appétit. — Désir de prendre du café, avec envie de vomir après en avoir pris: — Pyrosis. — Envie de vomir ressentie généralement dans l'épigastre, avec pression de la partie.

Estomac. — Douleur à l'estomac qui est ballonné. — Sensation de froid dans l'estomac. — Douleur brûlante à l'estomac et à l'épigastre, surtout immédiatement après le repas. — Élancements à l'épigastre, en respirant vite et profondément, en parlant et au

toucher. - Gonflement du creux de l'estomac.

Ventre. — Ventre ballonné jusqu'à éclater, avec tension pressive et suspension de la respiration. — Tiraillements et mouvements dans le ventre. — Fortes pulsations dans le bas-ventre. — Coliques venteuses. — Sortie d'une hernie venteuse par l'anneau inguinal.

Selles. — Ténesme. — Petites selles dyssentériques, avec évacuation de matières muqueuses et sanguinolentes, précédées de coliques venteuses. — *Diarrhées nocturnes, avec douleurs brûlantes à l'anus. — Hémorrhoïdes aveugles, avec douleur pendant les selles.

Urines. — Ténesme de la vessie. — Envie fréquente, *pressante et presque inutile d'uriner. — Douleurs brûlantes en urinant. — Contractions crampoïdes et incisives au col de la vessie. — Douleurs incisives et lancinantes dans l'urèthre, hors le temps de l'émission des urines. — *Écoulement purulent par l'urèthre, comme une gonorrhée. — Écoulement de sang par l'urèthre.

Parties viriles. — Impuissance et parties génitales froides. — Érections matutinales par trop violentes. — Pendant des caresses

amoureuses, tremblement de tout le corps.

Larynx. — *Enrouement. — *Toux plus violente le soir et la nuit, avec douleurs à d'autres parties du corps, surtout à la tête et à la vessie, comme si elles allaient éclater, ou avec pression dans la gorge et les oreilles, comme si un abcès allait s'y ouvrir. — Toux après avoir pris du café. — Toux, avec haleine fétide et goût désagréable dans la bouche.

Poitrine. — Besoin de respirer profondément. — Gêne de la respi-



CAPSICUM ANNUUM. — CARBO ANIMALIS.

ration, parfois comme provenant de l'estomac. — Douleur constrictive dans la poitrine. - Elancements dans la poitrine en respirant. - Douleur pulsative dans la poitrine, qui suspend la respiration et qui est augmentée par le mouvement.

Tronc et Membres. — Douleurs tractives aiguës dans le dos. -Roideur de la nuque. - Tension dans les genoux et roideur dans les mollets, en marchant. - Roideur des bras et des jambes, avec

fourmillement, comme quand ils s'endorment.

CARBO ANIMALIS.

CARB-AN.— Charbon animal.— HAHNEMANN.— Hist. nat. et prép. Pharm. homosop., p. 92.— Doses usitées : 24, 30.— Durée d'action : jusqu'à 40 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTE : Camph. (voir carb-veg.).

COMPARER AVEC : Carb-veg., et les médicaments qui se trouvent inscrits sous cette avaigne.

cette rubrique.

CLIMIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre quelques espèces de Gastralgie, Induration des glandes, Létrorrhagies, Nodosités arthritiques, Aphthes des enfants, Induration de la langue, Bubons syphilitiques, etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs pressives dans les articulations et les muscles des membres. — Douleurs brûlantes. Douleurs nocturnes dans les articulations. — Brisement, manque de force et craquement dans les articulations, qui fléchissent facilement. — Roideur arthritique et nodosités goutteuses dans les articulations. — Tension dans quelques membres, comme par raccourcissement des tendons. — Contraction spasmodique de plusieurs parties. - *Disposition à se donner des tours de reins. - Torpeur de tous les membres, surtout de la tête. — *Grande fatigue et faiblesse, produite surtout par la marche, avec transpiration facile, principalement en mangeant ou en se promenant au grand air. — Sensibilité excessire au grand air, et surtout à l'air froid de l'hiver. — Bouillonnement de sang et disposition à s'échauffer facilement.

Pean. — Prurit par toute la peau du corps, surtout le soir au lit. Inflammations érysipélateuses. — • Engelures. — *Gonflement des glandes, dur et douloureux. — Gonflement des parties extérieures, avec douleur brûlante.

mmeil. — Sommeil tardif, et insomnie nocturne, causés par inquiétude, angoisse, bouillonnement de sang et crainte d'étouf-

189



CARBO ANIMALIS.

190

fer. - Visions effrayantes avant de s'endormir. - Sommeil avec

révasseries, pleurs, jactation et gémissements sourds.

Fièvre. — Frissons, surtout le soir, au lit, avec transpiration pendant le sommeil. — Froid excessif aux pieds et aux mains, le soir. — Chaleur nocturne. — *Transpiration fucile le jour, surtout pendant le repas, ou en se promenant. — Sueur affaiblissante et fétide, surtout la nuit et le matin, principalement aux cuisses. — Sueur qui teint le linge en jaune.

Moral. — Nostalgie et sentiment triste d'abandon, avec larmes. —
Peur et épouvante, surtout le soir. — *Découragement et désespoir. — *Disposition à s'effrayer. — Alternation de gaieté et de tristesse, ou d'irascibilité et de mauvaise humeur taciturne. —

Confusion d'idées et hébétude, surtout le matin.

Tête. — *Vertige, surtout le soir ou le matin, et parfois avec nausées en se relevant, après être resté longtemps couché, ou bien
encore avec obscurcissement des yeux, en remuant la tête. —
Maux de tête, le matin, comme après une débauche. — Maux de
tête à l'air frais, et aggravés par un temps humide. — Pesanteur,
surtout à l'occiput, avec tête entreprise. — *Maux de tête pressifs, même après le repas, —et qui forcent à fermer les paupières.
— *Congestion et chaleur intérieure à la tête. — Sensation de
vacillement du cerveau à chaque mouvement. — Sensation de
torpeur à la tête. — Douleurs tractives, aiguës, dans les téguments du côté droit de la tête. — Tension de la peau du front et
du sommet de la tête. — Sensibilité du cuir chevelu à la pression
du chapeau. — *Croûtes et éruptions à la tête.

Yeux. — Sensation comme si le globe de l'œil était détaché de l'orbite, avec faiblesse de la vue. — Presbytie avec dilatation

des pupilles. - oFongus hématode dans l'orbite.

Oreilles. — Ecoulement par les oreilles. — Confusion de l'one; les sons y arrivent indistincts. — *Bruissement dans les oreilles. — Gonflement du périoste derrière l'oreille. — Gonflement des

parotides.

Nez. — Bout du nez rouge et gercé avec douleur brûlante. — Nez gonflé avec boutons croûteux (comme au commencement d'un cancer?). — Desquamation de la peau du nez. — Sensibilité douloureuse des os du nez. — Épistaxis, précédée de vertige ou de mal de tête pressif. — *Obturation du nez. — *Coryza sec. Coryza fluent avec perte de l'odorat, éternument et bâillements fréquents.

Visage. — Taches à la face, qui sont lisses, épaisses au toucher et de couleur rose. — Élancements aux pommettes, aux mâchoires et aux dents. — Éruption sans douleur et couperose à la face. — o Érysipèle à la face. — Gonflement de la bouche et des lèvres, avec douleur brûlante. — Ampoules aux lèvres. — Lèvres ger-

cées saignantes.

Dents. - Odontalgie tiraillante en mangeant du pain, ou avec pul-



CARBO ANIMALIS.

191

sations sources après avoir bu froid. — Vacillement excessif des dents. — *Douleurs tractives aux gencives. — Gonfiement rouge et douloureux, et caignement des gencives. — Vésicules purulentes aux gencioes.

Bouche et Gorge. — Fétidité de la bouche. — Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue. — *Sécheresse de la langue et du palais. — Mal de gorge comme par exceriation, avec grattement et élancements depuis le gosier jusqu'à l'estemac. — Accumulation de mucosités dans la gorge, avec toussetement et renâclement. — •Induration partielle de la langue.

Appétit. — *Amertume dans la bouche, surtout le matin. —
Goût acide et muqueux. — Répugnance pour la graisse et la
fumée du tabac qui causent des nausées. — *Grande faiblesse de
la digestion, au point que presque tous les aliments causent des

souffrances.

**Renvois avec goût des aliments ou bien **action. —

**Renvois avertés avec douleur. — Pyrosis avec grattement dans la gorge. — *Hoquet après le repas. — *Ecoulement d'une eau aigre par la bouche. — *Nausées, surtout la nuit. — *Fadeur à l'estomac, comme si on allait tomber en faiblesse. — Pituites de l'estomac. — **Pression à l'estomac, -comme par un poids, à jeun, et le soir après s'être couché. — **Douleurs erampoïdes et contractives à l'estomac. — *Douleur brûlante à l'estomac. — **Serrement à l'estomac comme par des griffes. — Gargouillement bruyant dans l'estomac.

Ventre. — Douleur au foie comme par excorlation, au toucher. —
 *Pression et tranchées à la région hépatique. — Ventre ballonné et tendu. — Constriction et serrement, comme par des griffes, dans le ventre. — Tranchées et élancements dans les aines. —
 Hernie inguinale. — *Gargouillements bruyants dans le ventre. —
 *Incarcération de flatuosités. — Vents fétides. — °Bubons

— *Incarcération de flatuosités. — Vents fétides. syphilitiques.

Selles. — Envie inutile d'aller à la selle, il ne sort que des vents.

— Selles dures, noueuses. — *Selles fréquentes le jour. — Avant la selle, traction depuis l'anus jusqu'à la vulve. — Pendant les selles, douleurs dans les reins. — Boutons hémorrholdaux, brûlants. — Douleurs brûlantes et *élancements à l'anus, —et au rectum. — Excoriation et suintement à l'anus. — Sortie de ténis. — Suintement visqueux au périnée. — En allant à cheval on s'écorche facilement à l'anus.

Urines. — Envie pressante d'uriner avec émission plus abondante. — Émission d'urines la nuit. — Émission d'urine involontaire. —

•Urines fétides. — Urines brûlantes.

Parties viriles. — Absence de l'appétit vénérien. — Pollutions fréquentes, suivies de faiblesse et d'inquiétude anxieuse.

Bègles. — Règles trop hâtives. — Leucorrhée brûlante, cuimnte ou qui teint le linge en jaune. — Lochies séreuses et fétides. —



CARBO ANIMALIS. - CARBO VEGETABILIS. 192

*Nodosités et indurations douloureuses aux glandes mammaires.-

·Inflammation érysipélateuse des mamelles.

Larynx. - Oppression de poitrine, surtout le soir et la nuit. Extinction de la voix la nuit. - Enrouement matutinal. - Toux rauque, avec douleur d'excoriation dans la gorge. - Toux nocturne, sèche. — Toux suffoquante, surtout le soir après s'être endormi. — Toux matutinale avec expectoration, excitée par une sensation de sécheresse dans la gorge. — Toux avec expectoration purulente, et élancements dans le côté droit de la poitrine.

Poitrine. - Respiration haletante. - Râlement dans la poitrine le soir au lit. - Gêne de la respiration, surtout le matin et après le repas. - Constriction suffoquante de la poitrine, surtout le matin au lit. - Elancements dans la poitrine comme par un abcès, surtout en inspirant. - Sensation de froid dans la poitrine. *Battement de cœur, le matin, le soir et en chantant à l'église.

Tronc. - Douleurs nocturnes au dos. - Pression et élancements dans les reins, surtout en respirant profondément. — Douleur brûlante dans le coccyx, au toucher. — Douleur brûlante dans le dos. — Induration des glandes du cou avec douleur lancinante. - Dartres sous l'aisselle. - Suintement sous l'aisselle. - Indu-

ration des glandes axillaires.

Bras. — Douleurs ostéocopes, fouillantes dans les bras. sur les épaules. - Douleur de luxation au poignet. - Torpeur et engourdissement des mains et des doigts. - Tension douloureuse et oroideur arthritique des articulations des doigts. - Elance-


ments dans les doigts.

Jambes. - *Douleur lancinante dans la hanche, qui force à boiter, avec élancements. — Tension et raccourcissement dans les aines qui ne permet pas d'étendre les jambes. — Tension dans les jarrets et le cou-de-pied, avec contraction des parties. - Douleur d'excoriation dans les genoux. — Crampes dans les mollets, les jambes et les orteils. — *Tiraillements et élancements dans les jambes. - Fléchissement facile des pieds et des orteils en marchant. - Froid aux pieds. - Gonflement inflammatoire des pieds et des orteils, comme s'ils avaient été gelés, avec chaleur et douleur. - Douleur brûlante aux orteils.

CARBO VEGETABILIS.

CARB-V. — Charbon végétal. — HAHNEMANN. — Hist, nat, et prép. Pharmac, homœop., p. 93. — Doses usitées: 12, 30. — Durée d'action: jusqu'à 40 jours dans quelques cas de maladies chroniques.
ANTIDOTES: Arsen. cham, coff. lach. — Ce médicament est antidote de: Chin. lach. merc. vinum.

COMPARER AVEC: Ant. ars. calc. carb-an. chin. coff. fer. graph. kal. lach. lyc. merc. natr. n-vom. puls. rhod. sep. stram. zinc. — C'est surtout



après : Kal. lach. n-vom. sep. que le charbon fera du bien lorsqu'il sera indiqué. — Après le charbon, on trouvera quelquefois convenables : Ars. hal. mer.

193

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Suites facheuses de l'abus du mercure et du quinquina; Affections scorbutiques; Faiblesse par perte d'humeur ou à la suite de graves maladies aigues; Torpeur nerveuse avec manque de réaction de la force vitale (contre les médicaments); Paralysies; Suites fâcheuses d'un tour de reins ou d'une promensde en voiture ; Souffrances par suite d'un temps chaud (et humide); Sensibilité aux changements de temps; Affections rhumatismales; Varices; Engelures?; Indura--tion des glandes?; Gale miliaire ou humide; Éruptions urticaires; Ulcères putrides; Abcès lymphatiques; Taches de naissance; Anévrismes; Ictère; Fièvre typhoïde, dernière période avec extinction resque complète de la force vitale; Fièvres intermittentes, particu**lièrement c**elles que l'abus du quinquina a rendues opiniâtres; Céphalalgies, surtout celles par suite d'une débauche ou par suite d'un échauffement ; Migraine ; Chute des cheveux à la suite de graves maladies aigues; Ophthalmie pour s'être trop fatigué la vue; Hémorrhagie des yeux; Otorrhée purulente; Parotite épidémique; Coryza fluent; Hémorrhagie nasale; Dartres humides à la face; Boutons à la face chez les jeunes gens; Affection scorbutique des gencives; Stomacace; Angine à la suite des morbilles; Embarras gastrique par suite d'une débauche ; Gastralgie des nourrices ; Gastralgie avec aigreurs ou produite par stagnation du sang dans le système de la veine-porte (après l'usage de nux-vom.); Choléra asiatique avec absence totale du pouls; Coliques par le mouvement de la voiture; Coliques flatulentes ou hémorrhoïdales; Diarrhées putrides ou muqueuses; Hémorrhoïdes aveugles et fluentes; Pissement au lit chez les enfants; Diabète?; Coliques menstruelles; Flueurs blanches; Disposition à l'avortement avec varices aux parties; Inflammation des mamelles; Catarrhe et enrouement, aussi à la suite des morbilles; Grippe; Laryngite chronique (avec ulcération); Toux convalsive; Asthme flatulent; Orthopnée paralytique; Phthisie tuberculeuse (première période); Pneumonie chronique?; Pneumonie asthénique, avec expectoration rouge brun et écumeuse, etc., etc. Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs avec anxiété, chaleur et découragement complet, ou avec accablement après l'accès. — Tiraillements aigus et douleurs tractives, arthritiques, avec faiblesse paralytique, principalement dans les membres, et souffrances par des flatuosités; ou avec gêne de la respiration lorsque



194

c'est la poitrine qui est attaquée. — Douleur de luxation dans les membres ou sensation comme si l'on s'était donné un tour de reins. — Douleurs brûlantes dans les membres et les os. — Pulsations à différentes parties du corps. — Souffrances pour s'être domé un tour de reins ou pour avoir été en voiture. — Tremblement et secousses dans les membres, le jour. — *Engourdissement facile des membres. — La plupart des symptômes apparaissent pendant la marche au grand air. — Amaigrissement surtout du visage. — Brisement de tous les membres, surtout le matin lorsqu'on vient de se lever. — Grande faiblesse des muscles fléchisseurs. — *Accablement excessif, allant souvent jusqu'à la défaillance, même le matin au lit, ou bien au commencement de la marche. — Chute rapide des forces. — Accablement général vers midi avec besoin de s'appuyer la tête et de se reposer. — Paralysie et absence totale du pouls. — *Facilité à se refroidir.


Peau. — Sensation de fourmillement par toute la peau du corps.—
Prurit universel le soir en se réchauffant dans le lit.— Sensation
brûlante à différentes parties de la peau. — *Éruption de petits
boutons semblables à la gale miliaire. — *Éruptions urticaires.
— •Dartres.— Stries d'un brun rougeâtre. — Ulcères sans douleurs au bout des doigts et des orteils. — *Ulcères fétides et saignant facilement avec douleurs brûlantes et écoulement d'un pus
corrosif et sanieux. — •Engelures. — •Varices. — •Réseaux
veineux formés par une dilatation des vaisseaux capillaires, avec
hémorrhagie violente après la plus légère lésion. — •Gonflements
lymphatiques avec suppuration et douleurs brûlantes. — •Induration des glandes.

Sommeil. — *Forte envie de dormir le jour, ¬se dissipant par le mouvement. — *Sommeil dans la matinée ou le soir de bonne heure. — Sommolence comateuse avec râle. — Sommeil tardif et *insomnie causée par une agitation dans le corps. — La nuit ou le soir au lit, mal à la tête, angoisse avec oppression de poitrine, tressaillements et douleurs dans les membres, froid aux mains et aux pieds, etc. — Rêves fréquents, fantastiques, anxieux

et terribles, avec jactation ou avec sursauts et effroi.

Fièvre. — *Frissonnement et froid au corps. — Frisson fébrile le soir et la nuit, suivi de chaleur passagère. — °Fièvre avec soif seulement pendant la période de froid, ou avec sueurs abondantes, suivies de frissons. — °État fébrile avec somnolence comateuse, râle, sueur froide au visage et aux extrémités, face hypocratique, pouls petit et fuyant. — °Absence du pouls. — État fébrile le soir, avec chaleur universelle et chaleur brûlante aux mains et aux pieds. — °Accès fréquents de chaleur passagère. — *Sueur nocturne. — *Sueur matutinale — acide. — °Sueur froide aux membres et au visage.

Moral. — Inquiétude et anxiété, surtout le soir. — Peur de spectres, surtout la nuit. — Timidité, irrésolution et embarras en



195

société. — Désespoir avec humeur pleureuse et découragement avec désir de la mort et tendance ausuicide. — *Disposition à s'effrayer.— *Irascibilité et emportement. — Faiblesse de la mémoire, subite et périodique. — Lenteur de la marche des idées.

— Idées fixes. — Aversion pour le travail.

Tête. -- Vertige après le plus léger mouvement de la tête, ou après avoir dormi, ainsi qu'en se baissant et en marchant. -- Vertiges avec nausées, obscurcissement des yeux, tremblement, bourdonnement d'oreilles, et même perte de connaissance. — Maux de Mete par échaussement. — Mal de tête avec tremblement de la machoire. — Maux de tête nocturnes. — Tension crampoide dans le cerveau, ou sensation comme par contraction des téguments de la tête. — *Lourdeur de la tête. — Mal de tête pressif, surtout au-dessus des yeux, dans les tempes et à l'occiput. - Douleur tractive dans la tête, partant de la nuque, avec nausées. - Elancement au vertex. - *Battement et pulsation dans la tête, surtout le soir, ou après le repas, avec congestion de sang et chaleur, ou sensation brûlante à la tête. — Les maux de tête s'étendent souvent depuis la nuque jusqu'au cerveau, ets'aggravent quelquesois après le repas. — Douleurs tractives aigues dans les téguments de la tête, surtout à l'occiput et au front, souvent partant des membres. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu à la pression extérieure (par exemple celle du chapeau). — Facilité à se refroidir la tête. — Chute des cheveux.

Youx.—•Douleurs dans les yeux, après s'être fatigué la vue. —
Douleurs dans les muscles des yeux, en regardant en l'air.—Prurit,
caisan, chaleur, *pression et douleur brûlante dans les yeux et
les angles des yeux. — Agglutination nocturne des paupières.—
Baignement des yeux, souvent avec forte congestion à la tête. —
Frémissement et tremblement des paupières. — *Myopie. —

Pupille insensible.

Orellies. — Otalgie le soir. — Le soir, rougeur et chaleur de l'oreille à l'extérieur. — Manque de cérumen. — *Écoulement d'un pus fétide par l'oreille. — Obturation des oreilles. — Tintement et bourdonnement dans les oreilles. — Gonflement des parotides.

lement dans les oremes. — Connement des partitues. — *Démangeaison du nez, avec chatouillement et fourmillement dans les narines. — Croûtes et rougeur au bout du nez. — *Obturation du nez, surtout vers le soir, ou écoulement séreux sans coryza. — *Coryza riolent, avec enrouement et raucité de la poitrine, fourmillement et chatouillement dans le neze et envie inutile d'éternuer. — *Épistaxis fréquente et continue, surtout la nuit et le matin, avec pâleur du visage, ou bien après s'être baissé, ou avoir fait des efforts en allant à la selle.

Visage. — *Pâleur de la face. — Teint jaune, -grisâtre ou verdâtre. — °Face hypocratique. — Douleurs tractives, tiraillements algus, térébrations et douleurs brûlantes dans les os de la face. — Genflement de la face et des lèvres, — °Dartres à la face. —



Furoncles devant l'oreille et sous la mâchoire. — Boutons rouges au visage (chez les jeunes gens). — Lèvres gercées. — Vésicules purulentes aux lèvres. — Commissures des lèvres ulcérées. — Éruptions comme des dartres, au menton et aux commissures des

lèvres. — Tressaillements de la lèvre supérieure.

Dents. — *Maux de dents, avec tiraillement ou douleurs tractives, aiguës, ou *contractives, rongeantes ou pulsatives, °provoquées en prenant quelque chose de chaud ou de froid, ~ainsi que par des aliments trop salés. — °Vacillement opiniâtre des dents. — *Décollement, rétraction, excoriation et ulcération des gencives. — *Saignement des gencives et des dents.

Bouche. — Chaleur et *sécheresse, ou accumulation d'eau dans la bouche. — Apreté dans la bouche et sur la langue. — Excoriation de la langue, avec difficulté de la remuer. — •Inflammation

de la muqueuse buccale.

196

Gorge. — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur. — Sensation de constriction dans la gorge, avec déglutition empêchée. — Cuisson, *grattement ¬et douleur brûlante dans la gorge, le palais et le gosier. — Douleur d'excoriation dans la gorge en toussant, en se mouchant et en avalant. — Renâclement de mu-


cosités abondantes qui se détachent facilement.

Appétit. — *Goût amer. — *Goût salé de la bouche et des aliments. — Absence d'appétit, ou soif et faiminmodérées. — *Dégoût chronique de la viande, du lait et de la graisse. — Désir d'aliments salés ou sucrés. — *Après le repas, mais surtout après avoir pris du lait, fort ballonnement du ventre, *aigreurs dans la bouche et rapports aigres. — *Sueur pendant le repas. — Grand échauffement après avoir bu du vin. — Après le diner, embarras à la tête et pression à l'estomac, ou mal de tête, lourdeur

dans les jambes et anxiété morale.

Estomac. - *Renvois à vide ou amers. -- Renvoi des aliments, et surtout des aliments gras. - *Renvois aigres, surtout après le repas. — Pyrosis. — Hoquet, après chaque mouvement. — *Nausées surtout le matin, après le repas ou la nuit. - *Nausées continuelles .- * Écoulement d'eau de l'estomac, comme des pituites, même la nuit. - OVomissement de sang. - Pesanteur, plénitude et tension à l'estomac. — *Crampes d'estomac contractives, ou pressives et brûlantes, avec accumulation de flatuosités et grande sensibilité de l'épigastre. - Sensation de grattement et de tremblement à l'estomac. — Les maux d'estomac s'aggravent ou se renouvellent par la frayeur, les contrariétés, un refroidissement, ainsi qu'après le repas, ou la nuit, et surtout après avoir pris des aliments flatulents, *ou bien encore par l'allaitement. - *Pression au creux de l'estomac, comme si le cœur allait être écrasé, osurtout chez les nourrices.

Ventre. — *Douleur de meurtrissure dans les hypocondres, et surtout dans la région hépatique, principalement au toucher. —



197

*Douleur lancimante sous les côtes. — *Tension, pression et élancements dans la région hépatique. — Élancements à la rate. - *Gêne des vétements autour des hypocondres. — Douleurs dans la région ombilicale, au toucher. — Pesanteur, plénitude, *ballonnement et tension du rentre, avec chaleur dans tout le corps. — Coliques par le mouvement de la voiture. — Pression et crampes dans le ventre. - Douleurs dans le ventre, comme jur un tour de reins ou par luxation. — Douleur brûlante et forte angoisse dans le ventre. — Pincement dans le ventre, partant du côté gauche, et se dirigeant vers le côté droit, avec sensation de faiblesse paralytique dans la cuisse. — Production abondante de flatuosités, surtout après le repas, et quelquefois avec sensation de torpeur dans le ventre. — Coliques venteuses, crampoides, surtout la nuit. - Borborygmes et mouvements dans le ventre. — *Sortie immodérée de flatuosités, -d'odeur putride. — •Pour peu que l'on mange, aggravation des souffrances abdominales. — Les maux de ventre sont souvent accompagnés d'inquiétude et de pleurs.

Belles. — *Constipation. — Selles insuffisantes. — Selles difficiles, mas être dures, arec besoin pressant, douleur brûlante à l'anus et douleurs semblables à celles de l'enfantement, dans le ventre. — *Selles liquides, °pûles ou *muqueuses. — Écoulement de mucosité et de sang au lieu d'une selle, avec cris (chez les enfants). — *Evacuation involontaire de matières d'une odeur putride. — Ecoulement de sang par l'anus, avec toutes les selles. — Diarrhée après avoir mangé des fruits. — Après la selle, mal de ventre passif. — *Boutons hémorrhoïdaux, °douloureux, gros et de couleur bleu foncé. — Hémorrhoïdes fluentes. — Élancements, *démangeaison et douleurs brûlantes à Panus. — Sortie de tenia. — Écoulement par l'anus et le rectum d'une sérosité visqueuse et corrosive, surtout la nuit. — Excoriation et suintement du périnée.

Urines. — *Diminution de la sécrétion des urines. — *Envie fréquente, anxieuse et pressante d'uriner, jour et nuit. — 'Pissement au lit. — Urine rouge, comme si elle était mêlée de sang, et excessivement foncée. — 'Urine rouge foncé avec un nuage de couleur foncée. — Urines abondantes d'un jaune clair, ou épaisses

blanchâtres. - *Cuisson en urinant.

Parties viriles. — °Affluence extraordinaire de pensées volupsueuses. — °Pollutions par trop fréquentes. — *Ejaculation trop prompte dans le coît. — Taches lisses, rouges et suintantes sur le gland. — Écoulement de liqueur prostatique pendant les selles. — Prurit et suintement près du scrotum, à la cuisse. — °Pression dans les testicules.

Bègles. — *Règles trop hâtives et trop fortes, ou trop faibles. avec sang pâle. — Avant les règles, crampes dans le ventre et maux de tête. — Pendant les règles, vomissement et douleurs



dans les dents, la tête, les reins et le ventre. — *Prurit, brûlement, excoriation, ¬aphthès et °gonflement à la vulve. — Écoulement par le vagin, blanc de lait, épais et jaunâtre, verdâtre et corrosif. — Leucorrhée avant les règles. — °Inflammation des mamelles.

mamelles.

Larynx. — *Enrouement prolongé et raucité de la voix, surtout vers le soir. — *Le matin et le soir, enrouement, aggravé par une conversation prolongée, et principalement par un temps froid et humide. — Grattement, fourmillement et chatouillement dans le larynx. — Toux excitée par un fourmillement dans la gorge, ou avec douleur brûlante et sensation d'excoriation dans la poitrine. — *Toux crampoïde, avec ou sans vomiturition et vomissement, journellement trois ou quatre accès, ou bien le soirlongtemps de suite. — Toux le soir, avant de se coucher et au lit. — En toussant, élancements douloureux dans la tête. — *Toux avec expectoration de mucosités verdêtres, ou d'un pus jaunâtre. — Toux avec crachement de sang et douleur brûlante dans la poitrine. — *Expectoration rougeâtre, écumeuse, dans la pneumonie asthénique.

Poitrine. — Géne de la respiration et *respiration courte, en marchant. — *Grande gêne de la respiration et oppression de poitrine. — Accès d'étouffement causés par des flatuosités. — En respirant, battements douloureux dans la tête. — *Crampe de poitrine, avec couleur bleue de la face. — Besoin fréquent de respirer profondément. — Manque d'haleine, surtout le soir, au lit. — *Douleur brûlante, élancements et pression dans la poitrine. — *Compression et constriction crampoïde dans la poitrine, avec face bleuâtre. — La poitrine est prise, avec sensation de plénitude et anxiété. — *Douleur d'excoriation dans la poitrine. — Sensation de fatigue dans la poitrine. — Douleur brûlante dans la région du cœur, avec congestion à la poitrine, et violents battements de cœur. — Douleurs rhumatismales, tractives, tiraillements aigus et pression à la poitrine. — *Taches brunâtres sur la poitrine.

Tronc. — Douleurs rhumatismales, tractives, tiraillement aigu et élancements dans le dos, la nuque et les muscles du cou. — °Élancements continuels aux reins, surtout en faisant un faux pas. — °Roideur de l'épine dorsale. — Boutons pruriants au dos. — Prurit, excoriation et suintement sous les aisselles. — Roideur de la nuque.

Bras. — *Douleurs tractives aiguës et brûlantes dans les muscles et l'articulation de l'épaule. — *Tiraillements et douleurs tractives aiguës dans les avant-bras, le poignet et les doigts. — Relâchement des muscles, des bras et des mains, en riant. — Tension dans les articulations de la main, comme si elles étaient trop courtes. — Contraction crampoïde des mains, — *Chaleur des mains. — Faiblesse paralytique des poignets et des doigts,

198



CARBO VEGETABILIS. - CASTOR EQUI.

199

surtout en saisissant un objet. — Éruption granulée fine et pruriante aux mains, — Bouts des doigts ulcérés.

Jambes. — Torpeur et insensibilité des jambes et des pieds. —

*Douleur tractive et paralytique dans les jambes. — *Tiraillement aigu et douleurs tractives brûlantes dans la hanche et les genoux. — Forte tension et douleur crampoïde dans les articulations coro-fémorales, les cuisses et les genoux. — *Anévrisme au jarret, avec douleur tensive et pulsation. — *Dartres au genou. — *Crampes aux jambes et à la plante des pieds, et *la nuit dans les mollets. — *Ulcères fétides et saignant facilement, —aux jambes. — Torpeur opiniàtre des pieds. — *Transpiration des pieds. — *Cougeur et gonflement des orteils, avec douleur lancinante, comme s'ils avaient été gelés. — Ulcération du bout des orteils,

CASTOR EQUI.

CAST-EQ. — Châtaigne des chevaux. — Héring. — Gazette komœopathique d'Angebeurg. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 321.

SYNPTONES. — Sommeil agité, avec beaucoup de rêves. — Rêves de sa mère malade, de fruits verts sur les arbres (en hiver). — Syncope. — Un vieux cheval prend l'air de vingt ans plus jeune. — Rère extraordinaire à propos de choses non risibles.

Tôte. — Oreilles. — *Céphalalgie avec vertiges et nausées, °aigreure et anorexie; Pression dans les tempes du dedans au dehors; Engourdissement du cuir chevelu à l'occiput, avec sensation comme si l'occiput était plongé dans de la glace. — Derrière les oreilles, éruption de pustules formant un cercle de la grandeur d'un écu.

Hex. — Pression douloureuse dans l'os. — • Coryza fluent avec faim continuelle, même après le repas.

Face. — Autour de la bouche, peau couverte d'une quantité de verrues (chez un cheval, et guéri par thuy.).

Dents. — Douleurs dans les dents du côté gauche.

Bouche. — Mamelles. — Bouche pleine de salive, immédiatement après le repas. — Rentois d'air fréquents; Selles promptes, précédées de coliques, et accompagnées d'émission de vents fétides. — Mamelons pleins de crevasses, pendant la nutrition; Mamelles gonfiées, avec endolorissement au toucher et en descendan l'escalier; Prurit violent dans les mamelles, jusqu'à devenir folle, avec rougeur de l'aréole, et mamelons douloureux et plussecs qu'à l'ordinaire.



CASTOR EQUI. — CASTOREUM

Dos. — °Faiblesse dans la colonne vertébrale; — °Douleur dans le coccyx, chaque soir étant assis. — *Dans la poitrine, douleurs lancinantes.

Bras. — Douleurs errantes dans le bras droit; Douleur de foulure, dans les articulations carpiennes; les ongles se cassent pour pen

qu'on les heurte.

200

Membres inférieurs. — Douleurs dans les genoux et le tibia; Douleur dans le jarret droit en ployant le genou; Furoncles nombreux, petits, aux jambes. — Ongles des orteils très-cassants, et se renouvelant après être tombés sans cause.

CASTOREUM.

CAST. — Castoreum. — HARTLAUB ET TRINKS. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 321. — Médicament encore peu connu.

CLINIQUE. — Ce médicament n'a encore été employé que contre quelques cas de vomissement des femmes enceintes.

SYMPTOMES. — Sommeil de nuit inquiet, avec agitation anxieuse et sursauts avec effroi. — Secousses des membres après qu'on s'est endormi. — Rêves anxieux et effroyables. — Prédominance de froid et horripilation. — Accès de frissonnement, avec froid glacial dans le dos. — Grande tristesse et susceptibilité excessive avec pleurs faciles.

Tête. — Douleur au vertex et battement dans la tête, comme s'il y avait un ulcère au cerveau, aggravée par le contact et la pression extérieure. — Plénitude et pesanteur de la tête, comme si elle allait éclater. — Douleurs tractives aiguës, dans le front et

les tempes.

Yeux. — Pression dans les yeux, le soir, avec faiblesse de la vue. —

Douleur brûlante dans les yeux, en fixant un objet éloigné. —


Larmoiement et agglutination nocturne des yeux. — Étoiles, nuages, et, en fixant un objet éloigné, brouillard devant la vue. —

Susceptibilité de la vue à la lumière du soleil et à celle des bougies.

Oreilles. — Tiraillement aigu dans les oreilles. — Tintement, bruissement et gargouillement dans les oreilles, se dissipant dès

qu'on y fouille avec le doigt.

Nez. — Obturation du nez. — Écoulement de mucosités aqueuses, âcres, corrosives, par le nez.



CASTOREUM. — CAUSTICUM.

201

Dents. — Maux de dents en mangeant, provoqués par les choses froides, et soulagés par les choses chaudes. — Odontalgie avec douleurs tractives aiguës, ou tiraillements successifs, provoquées ou aggravées par le toucher. - Gonflement des gencives, la nuit, avec tiraillement aigu dans les tempes.

leuche. — Odeur fétide de la bouche, dont on s'aperçoit soi-même - Tiraillement et tressaillements dans la langue. — Douleur

brûlante dans la gorge, comme par pyrosis.

Hotemac. — Soif ardente. — Renvois amers. -- Régurgitation d'une aigreur amère. — Dégoût et nausées continuelles. → Vomissement de mucosités blanches, amères. — Sensation de plénitude et de pesanteur à l'estomac. - Sensation d'engourdissement à l'estomac. — Sensation de contraction et douleur d'ulcération à l'épigastre.

Ventre. — Maux de ventre des plus violents, avec rougeur de la face et bâillements, soulagés par la chaleur extérieure, et en se repliant sur soi-même. — Plénitude et ballonnement douloureux

du ventre, surtout après le repas.

Selles. — Envie pressante d'aller à la selle. — Diarrhées accompagnées de frissons et de bâillements, avec brûlement à l'anus, et précédées de mal de ventre avec grondement et borborygmes. -Selles de mucosités sanguinolentes.

Urines. — Émission fréquente d'urine, avec soif ardente, jour et

nuit. — Après l'émission des urines, envie de vomir et dégoût.

Règles. — Règles trop hâtives, avec douleurs à la tête et aux reins, et teint pale et maladif. - Leucorrhée brûlante.

Poitrine. — Respiration difficile, profonde et lente, ou courte et oppressée. — Haleine courte en montant. — Pression à la poitrine. — Sensation de pesanteur à la poitrine, surtout en respirant profondément.

Membres. — Douleurs, comme d'excoriation dans les reins et le dos. - Douleurs tractives dans la nuque. - Tiraillement nocturne dans les épaules et les bras. — Mains chaudes, avec gonfle-

ment des veines. — Faiblesse des membres inférieurs.

CAUSTICUM.

CAUS. — Causticum. — Hannemann. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homopp., p. 93. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 50 jours dans les maladies chroniques.

dans les maladies chroniques.

Antidotes: Cost. coloc. n-vom. nitr-spir. — Ce médicament est antidote de:

Asa. coloc. — Le cosse at le phos. en aggravent les soussrances.

COMPARER AFEC: Amm. asa. bell. calc. cham. coss. coloc. ign. lyc. merc.

natr. n-vom. phos. phos ac. rhus. sep. sulf. veratr. — C'est surtout après:

Asa. enpr. et sep. que le causticum sait du bien lorsqu'il est indiqué. —

Après l'austicum, on trouvera quelquesois convenables: Sep. stann.




202

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections rhumatismales et arthritiques, surtout l'arthrite chronique; Spasmes et convulsions des enfants et des personnes hystériques; Convulsions épileptiques (après l'usage de cuprum); Danse de Saint-Guy; Paralysies, surtout celles qui ne se manifestent que d'un seul côté, ou celles qui sont la suite d'une répercussion de quelque sécrétion morbide ou de quelque éruption, telle que la gale, etc.; Gale; Tumeurs enkystées; Verrues; Excoriation de la peau; Dartres humides; Varices; Melancolie, hypocondrie et hystérie; Migraine; Ophthalmies, aussi chez les personnes scrofuleuses; Blépharophthalmie; Amblyopie amaurotique; Cataracte; Otite et Otorrhée purulente; Dureté de l'ouïe; Coryza chronique, avec obturation du nez; Prosopalgie; Paralysie de la face; Odontalgies rhumatismales et arthritiques; Affection scorbutique des gencives; Fistules des gencives; Paralysie des organes de la parole et mutisme; Paralysie des organes de la déglutition; Embarras gastrique, par suite d'une indigestion; Hématémèse?; Gastralgie; Grosseur du ventre chez les enfants; Constipation; Hémorrhoïdes; Fistule au rectum; Incontinence d'urine; Dysménorrhée; Spasmes hystériques; Flueurs blanches; Excoriation des mamelons; Agalactie; Excoriation et convulsions des enfants; Catarrhe et enrouement opiniâtres; Aphonie; Laryngite chronique (avec consomption); Grippe; Asthme spasmodique?; Affections organiques du cœur; Goître; Faiblesse des jambes chez les enfants; Raccourcissement et induration des muscles?, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - *Douleurs arthritiques et rhumatismales, tractives et déchirantes, surtout dans les membres. -Tiraillement aigu et violent dans les articulations et les os, soulagé à la chaleur du lit. - Raccourcissement des tendons, et roideur dans les muscles fléchisseurs des membres. — Contraction crampoïde de plusieurs membres. — Torpeur et pâlissement de quelque partie ou de toute la moitié gauche du corps. - Para-*Secousses et mouvements convulsifs. - *Accès de lysies. convulsions oavec cris, mouvements violents des membres, grincements de dents, sourire ou pleurs, yeux à demi fermés, regard fixe et émission involontaire des urines; les accès se renouvellent par l'eau froide, et sont précédés de mal de ventre et de tête, émission fréquente des urines, irascibilité et pleurs; après l'accès, les yeux se ferment. - *Convulsions épileptiques. - Aggravation des symptômes, généralement le soir ou au grand air, tandis que cenx qui ont apparu au grand air se dissipent dans l'appartement. -- Le café semble aussi aggraver tous les symptômes .-



203

Les symptomes primitifs tardent plus à se manifester que chez les autres médicaments à longue action. — Souffrances semi-latérales. — *Inquiétude insupportable par tout le corps, le soir, et en étant assis, avec anxiété au cœur. — Le soir, grand abattement et accablement de tout le corps. — *Faiblesse paralytique, avec tremblement et chancellement des membres. — Grande susceptibilité aux courants d'air, *et au froid.

Peau. — Prurit violent, surtout au dos et aux mollets. — *Éruptions ressemblant à la gale. — Éruptions miliaires et urticaires. — Dartres pruriantes et humides. — Vésicules rongeantes. — *Ezcoriation chez les enfants. — Cors aux pieds douloureux. — *Verrues, aussi avec douleur et inflammation. — Panaris. — *Varices douloureuses.

Sommeil. — Envie de dormir le jour, comme par somnolence comateuse. — Insomnie nocture causée par anxiété, inquiétude, chaleur sèche et autres incommodités, avec sursauts fréquents. — Sursauts en s'endormant. — Mouvements fréquents des bras et des jambes pendant le sommeil. — *Rêves anxieux de choses facheuses ou de querelles, ou confus et voluptueux avec paroles et rires. — La nuit, vertiges, maux de tête, sécheresse de la bouche et pesanteur douloureuse des jambes.

Fièvre. - *Forte frilosité. - Frissons nocturnes, avec douleurs dans le dos et suivis de sueur générale. - *Sueur abondante pendant la marche en plein air. - *Sueur nocturne, quelque-

fois d'odeur acide.

Moral. — *Mélancolie et pensées chagrines, jour et nuit, avec pleurs. — *Tristesse hypocondriaque. — *Inquiétude, appréhensions et grande angoisse. — Anxiété de cœur. — Peur surtout la nuit. — Défiance de l'avenir. — *Découragement. — Irascibilité et emportement, avec forte susceptibilité de caractère. — Esprit querelleur et ergoteur. — Peu de goût pour le travail. — *Disposition à s'effrayer. — Faiblesse de la mémoire. — Distrac-

tion. - Facilité à se tromper en parlant,

Tôte. — Fachite a se tromper en pariant.

Tôte. — Embarras dans la tête, comme si elle était comprimée.—

Ivresse, il semble qu'on va tomber. — Vertige avec sensation de faiblesse dans la tête et anxiété. — Accès de maux de tête, avec nausées. — Maux de tête, le matin, quelquefois en se réveillant, avec sensation de meurtrissure dans le cerveau. — Douleur nocturne dans la tête, comme par un abcès au cerveau. — Mal de tête sourd et pressif qui rend sombre, et se fait ressentir principalement au front ou à l'occiput. — *Douleur's lancinantes, surtout dans les tempes. — Fouillement et coups subits dans la tête. — Congestion à la tête, avec bouillonnement et bruit intérieur. — Douleurs tensives ou compressives dans la tête. — Les maux de tête ne se manifestent quelquefois que d'un seul côté (à gauche). — Chaleur et sensation de brûlure dans la tête. — *Roideur et



204

élancements à la tête. — Tension au cuir chevelu. — Sensation de torpeur à l'occiput.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme si la prunelle se dilatait. — Pression dans les yeux, comme par du sable, aggravée quelquefois par le toucher. — Prurit, cuisson et douleur brûlante dans les yeux. — *Inflammation des yeux et des paupières. — *Ulcération des yeux. — *Larmoiement. — Agglutination nocturne des paupières. — Difficulté d'ouvrir les yeux, avec sensation comme si les paupières étaient gonflées. — Frémissement visible des paupières. — Obscurcissement des yeux, souvent subit, et quelquefois comme si les yeux étaient recouverts d'une peau. — Vue trouble, comme s'il y avait devant un voile ou un brouillard. — *Filets noirs qui semblent voltiger devant les yeux. — *Lumières et étincelles devant les yeux. — Photophobie. — oVerrues anciennes dans les sourcils.

Oreilles. — Otalgie avec douleur pressive vers le dehors. — Élancements et douleur d'excoriation dans les oreilles. — Gonflement de l'oreille extérieure, avec élancements et douleur brûlante. — Écoulement d'un pus fétide par l'oreille. — Prurit au lobe de l'oreille comme par une dartre. — Fort résonnement des sons dans l'oreille avec dureté de l'ouie. — *Grondement et bourdonnement, roulement et *bruissement dans les oreilles et la tête. — Sensation d'obturation dans les oreilles.


Nez. — Démangeaison au bout et aux ailes du nez. — *Éruption au bout du nez. — oVerrues anciennes sur le nez. — Mouchement de sang tous les matins. — Épistaxis. — Perte de l'odorat. — *Obturation du nez. — *Coryza sec, chronique. — Coryza

fluent, avec toux nocturne, enrouement rauque et maux de tête.

— Écoulement de mucosités fétides par le nez. — Éternument matutinal.

Visage. — Couleur jaune de la face, surtout aux tempes, avec lèvres bleuâtres. — Sensation brûlante aux joues, et surtout aux pommettes et aux mâchoires. — *Douleurs arthritiques et tensives dans les os du visage, aux pommettes et aux mâchoires. — Gonflement des joues avec douleurs pulsatives. — Sensation de tension et de gonflement sous la mâchoire, qui empêche de l'ouvrir. — Éruptions de boutons rouges à la face. — Paralysie semi-latérale de la face, depuis le front jusqu'au menton. — Crampes dans les lèvres. — Excoriation et éruption aux lèvres, et aux commissures des lèvres. — Dartre à la lèvre inférieure. — Douleur tiraillante tensive dans les mâchoires, avec difficulté d'ouvrir la bouché. — Gonflement inflammatoire du menton, avec douleur brûlante. — Trismus.

Dents. – Odontalgie provoquée par l'introduction de l'air en ouvrant la bouche. — Douleur d'excoriation, ou douleurs tractives et tiraillement aigu, *battements ou -élancements dans les dents. — *Vacillement douloureux et allongement des dents.



CAUSTICUM.

205

Fistule aux gencives.
 *Sensibilité douloureuse, gonflement et saignement facile des gencives.

Benche. — Sécheresse de la bouche. — *Accumulation de mucosités dans la bouche. — Douleur d'excoriation et de brûlure dans la bouche, au palais et au bout de la langue. — Balbutiement, parole embarrassée, siffiante et très-indistincte. — Paralysie de la langue. — Distorsion de la bouche et de la langue en parlant. — Ulcère brûlante à la partie intérieure de la lèvre supérieure.

Gerge. — Mal à la gorge en faisant des efforts, comme si elle était déchirée intérieurement. — Douleur d'excoriation, âpreté, grattement et douleur brûlante dans la gorge. — Douleur lancinante dans la gorge en avalant. — Besoin continuel d'avaler, avec sensation de gonfiement ou de rétrécissement du gosier. — Difficulté d'avaler, par paralysie des organes de la déglutition. — Sensation de froid qui remonte dans la gorge. — Sécheresse de la gorge. — *Accumulation de mucosités dans la gorge et au fond du palais, avec expuition par le renâclement.

Appétit. — Goût putride, gras, rance ou amer. — Soif ardente pour les boissons froides et la bière. — *Répugnance pour les douceurs. — Dès le commencement du repas, perte de l'appétit et dégoût. — Sensation comme si on s'était donné une indigestion. — «Soif ardente avec manque d'appétit. — «Après avoir mangé du pain, pression à l'estomac. — Après chaque repas, pression dans tout le ventre, ou dans l'estomac, ou bien nausées et ballonnement du ventre, ou bien encore frissonnement ou chaleur au

visage.

Stomac. — Renvois à vide, ou avec le goût des aliments ingérés. — Renvois avortés, avec strangulation dans le gosier. — *Nausées surtout après et pendant le repas, ou bien le matin. — *Sensation de fadeur comme si on allait tomber en défaillance. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites. — Vomissement d'une eau acidulée, suivi de rapports acides. — °Vomissement des aliments. — Vomissement nocturne d'un sang coagulé. — Douleurs à l'estomac, avec chaleur à la tête, augmentées par tout mouvement prompt, soulagées par la position couchée, et avec horripilation quand les douleurs s'aggravent. — *Pression, serrement comme par des griffes, constriction et douleurs crampoïdes dans l'estomac et l'épigastre. — *Douleurs lancinantes à l'épigastre.

Ventre. — Pression des vétements sur les hypocondres. — Tension et élancements dans la région hépatique. — Maux de ventre le matin. — *Pression dans le ventre et le bas-ventre. — Ballonnement du ventre, douloureux et tensif. — Gonflement du nombril, douloureux au toucher. — Ventre gros ches les enfants. — Douleurs contractives dans le ventre. — Facilité à se refroidir le ventre, d'où il résulte diarrhée ou pression à l'estomac. —



206

*Incarcération de flatuosités avec selles dures. - Émission fré-

quente de vents petits et fétides.

Selles. - *Constipation chronique. - Envie fréquente et inutile d'aller à la selle, avec douleurs, anxiété et rougeur de la face. -Les selles s'évacuent plus facilement en se tenant debout. -Selles noueuses ou d'un moule très-mince. — «Selles visqueuses et luisantes, comme de la graisse, ou de couleur claire et blanchâtre. - Diarrhée le soir et la nuit. - Diarrhée après s'être refroidi le ventre. - Ecoulement de sang et douleurs incisives dans le rectum pendant les selles. - Après les selles, angoisse, avec battement de cœur et brûlement à l'anus. - *Démangeaison à l'anus. - A l'anus, sortie des boutons hémorrhoïdaux qui sont durs, gonflés et douloureux, et qui génent les selles. - La marche et la méditation aggravent les douleurs hémorrhoïdales jusqu'à les rendre insupportables. - Pression sur les boutons hémorrhoïdaux du rectum, de manière à les faire sortir. oFistule au rectum. - Abcès à l'anus. - Douleur d'excoriation et suintement à l'anus.

Urines. — Envie fréquente d'uriner, avec soif et émission peu abondante. — Émission plus abondante des urines. — Émission des urines la nuit, et pissement au lit. — *Émission d'urine involontaire jour et nuit, même en toussant, en éternuant et en marchant. — Urine âcre et corrosive, ou pâle, aqueuse, couleur brun foncé ou rougeâtre. — Mucosités filantes dans les urines. — Les urines se troublent dans le repos. — Sensation de brûlure en

urinant. - Écoulement de sang par l'urèthre.

Parties viriles. — Augmentation de l'appétit vénérien. —

«Manque d'érections. — *Pollutions fréquentes. — Écoulement de liqueur prostatique après les selles. — Éjaculation d'un sperme sanguinolent pendant le coît. — Pression et élancements dans les testicules. — Ulcères et croûtes pruriantes à la partie intérieure du prépuce. — Taches rouges à la verge. — Sécrétion abondante du smegma derrière le gland. — Prurit au scrotum, au gland et

au prépuce.

Bègles. — Règles retardées, mais plus abondantes, avec écoulement de sang en gros caillots. — Avant les règles, mélancolie, maux de reins et coliques. — «Règles par trop faibles. — Pendant les règles, maux de reins, tranchées et pâleur de la face. — Excoriation entre les jambes, à la vulve. — «Répugnance pour le coît, chez la femme. — Crampes de la matrice. — «Leucorrhée abondante, avec odeur des règles, ou qui coule la nuit. — «Mamelons excoriés, gercés et entourés de dartres. — «Manque de sécrétion du lait.

Larynx. — Enrouement rauque, le matin et le soir. — *Enrouement prolongé, —avec voix faible et étouffée. — Extinction de voix par faiblesse des muscles du larynx. — Sensation d'excoriation au larynx, hors le temps de la déglutition. — Renâclement de



CAUSTICUM.

207

mucosités abondantes, surtout le matin. — Toux avec haleine courte, et gêne de la respiration. — Toux excitée par la parole et par le froid. — Toux matutinale ou nocturne. — *Toux courte, prevoquée par un chatouillement et une sensation d'execoriation dans la gorge. — *Toux sèche, creuse, ébranlante, avec sensation de brûlure et d'execoriation dans la poitrine. — Râlement dans la poitrine, en toussant. — Douleurs dans les hanches, en toussant. — o'Impossibilité d'expectorer les mucosités qui se détachent en toussant.

Poitrine. — *Haleine courte. — Accès d'asthme spasmodique. — Accès d'étouffement, en parlant et en marchant vite. — Géne des vêtements sur la poitrine. — Pression sur la poitrine. — Élancement à la poitrine et au thorax, en respirant profondément et pendant un travail corporel. — Accès de compression crampode et de constriction à la poitrine, avec étouffement. — *Battements de cœur. — Oppression de cœur, avec mélancolie. — Élancements au cœur.

Trens. — Maux de reins qui rendent le moindre mouvement douloureusement sensible. — Maux de reins pressifs, en étant assis. —*Roideur douloureuse dans le dos, surtout en se levant de son siège. — Tiraillement et douleurs tractives aiguës dans les omoplatee. — Prurit et fourmillement dans le dos. — Roideur et tension à la nuque. — Éruption miliaire à la nuque, entre les omoplates. — Dartres pruriantes et humides à la nuque. — Gonfiement goîtreux des glandes du cou.

Bras. — Douleurs dans les bras, la nuit. — *Douleurs tractives et tiraillement aigu dans les bras et les mains. — Mouvements convulsifis et secousses dans les bras. — Démangeaison et éruptions aux bras. — Verrues aux bras. — Pression sur les épaules. — *Douleurs lancinantes à l'avant-bras, depuis les doigts jusqu'au coude. — *Sensation de plénitude dans les mains en saisissant un objet. — Douleurs tractives dans les mains et les articulations des doigts. — Faiblesse spasmodique et tremblement des mains. — Philissement et torpeur douloureuse des doigts. — *Raccourcissement et induration des tendons des doigts. — Dartres pruriantes aux doigts.

Jambes. — *Douleur de luxation dans l'articulation coxofémorale, avec impossibilité de marcher et de rester debout. —
Douleur de brisement dans les cuisses et les jambes, le matin au
lit. — Roideur tensive dans les articulations des jambes et des
pieds. — *Douleurs tractives et tiraillement aigu dans les
cuisses, les jambes, les genoux et les pieds, avec gonflement des
parties. — *Marche incertaine et facilité à tomber, chez les
enfants. — Peau marbrée, aux cuisses et aux jambes. — Tension
et douleur crampoïde aux jambes et aux mollets. — Crampes dans
les pieds. — *Douleurs au cou-de-pied, aux malléoles, à la plante
des pieds et aux orteils, en marchant. — Douleurs névralgiques



CAUSTICUM. - CEPA.

208

à la plante des pieds. — Raccourcissement du cou-de-pied, avec douleur tensive en s'appuyant dessus. — *Froid aux pieds. — *Gonstement des pieds. — *Oouleurs dans les varices. — Four-millement à la plante des pieds. — Vésicules rongeantes et ulcérations aux talons. — Panaris au gros orteil.

CEPA.

CEP. — Allium Cepa, oignon. — HERING, Études pathogénétiques de l'Amérique du Nord, p. 423. — Hist. nat. et prép. — Voy. Pharmac. hom@op., p. 487. ANTIDOTES: N-vom. cham. acon.

Comparer avec: Phos. n-vom, cham, puls. sass, — Incompatibles. Allium. squill. aloës.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament dans les affections suivantes: - Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques; Syncopes; Léthargies; Empoisonnements; Suites fâcheuses de l'ivresse. - Tannes; Taches; Rougeole; Urticaire; Scarlatine; Verrues; Cors; Ongles cassants; Abcès; Charbons; Engorgements glandulaires. — Fièvres intermittentes; Fièvre jaune; Fièvres pestilentielles. — Apoplexies; Céphalalgies catarrhales; Calvitie. - Lippitude; Ophthalmies catarrhales; Ecchymoses, ulcères, taies, dans les yeux; Cataracte?; Amaurose commençante?.-Otalgie; Otorrhée; Dysécée; Bourdonnement d'oreille. - Épistaxis; Coryza fluent. — (Érysipèle facial; paralysie de la face à gauche). - Stomacace ; Scorbut ; (Gonflement de la langue ; Glossoplégie). Angines; Gonflement des amygdales; Ulcères à la gorge; Angines catarrhales; Catarrhe du pharynx et des fosses nasales. - Gastricisme; Coliques des enfants; Coliques gastriques; Coliques nerveuses, spasmodiques; Coliques des gourmands; Coliques des ivrognes; Colique néphrétique. — Ascite; (hernies incarcérées). -Constipations; Diarrhées; Affections vermineuses; Rhagades à l'anus; Hémorrhoïdes. — Catarrhe vésical; Calculs urinaires; Calculs dans les uretères; Coliques néphrétiques; Rétentions d'urine; Spasmes du sphincter de la vessie; Faiblesse de la vessie; Polyurie. Accouchements laborieux ?; Délivrance tardive ?; Tranchées utérines trop fortes ou trop prolongées; Phlegmasie blanche des femmes en couche?. - Catarrhe du larynx; Enrouement; Croup; Bronchite; Catarrhe bronchique. — Asthme. — Panaris; Engelures; Podagra. Voir la note, page 15.




CEPA.

209

mide et froid, tel que les vents d'ouest et de nord-ouest les amènent; Suites fâcheuses de l'usage de crudités froides (des concombres, de la salade); osouffrances pour avoir eu les pieds mouillés, avoir marché dans l'humidité, avoir inspiré un air impur ou bu de l'eau malsaine. - Convient autant aux tempéraments phlegmatiques et froids qu'aux natures colériques et bilieuses .oChez les enfants : affections de la tête; ophthalmies; rhume de cerveau et écoulement continuel du nez; angines; toux; râle muqueux; coliques et flatuosités; affections vermineuses; souffrances urinaires, surtout chez ceux qui désirent beaucoup le grand air, ainsi que chez ceux où les flux catarrheux et muqueux prédominent ou ont été supprimés (concordant en cela le plus avec iod. et phosphor.). — Chez les vieillards : céphalalgies ; ophthalmies; poitrine embarrassée; asthme catarrhal; souffrances néphrétiques, vésicales, urinaires; affections gastriques et intestinales, surtout lorsqu'il s'y joint de la frilosité ou un grand désir d'aller au grand air (concorde en cela avec kal-hydr.). - Au grand air améliorés : *souffrances catarrhales ; *céphalalgie ; *larmoiement; *flux nasal; douleurs rhumatismales. tournant à la chambre chaude, s'aggravent : céphalalgie ; odontalgie; éternument et toutes les souffrances catarrhales. - Le froid améliore l'odontalgie; la chaleur l'aggrave. — Après midi : souffrances gastriques. - Le soir : s'aggravent la plupart des souffrances, surtout les épiphénomènes du rhume de cerveau, dans la tête, les yeux et le nez; les douleurs dans les oreilles, les dents, les mâchoires, la région stomacale, le foie, le bassin, la vessie, les reins et les membres; les rapports, les borborygmes, les émissions de vents; les mictions fréquentes; les souffrances asthmatiques, les expectorations et la fièvre. - Le matin : mauvais goût de la bouche; langue chargée, ainsi que la cavité buccale et la gorge; maux de ventre; émission de vents; évacuations alvines. - Côtés du corps : à la partie supérieure, souffrances d'abord à droite, puis à gauche; à la partie inférieure, d'abord à gauche, puis à droite (à droite, douleurs au-dessus de l'œil, fourmillement); à gauche, flux nasal, ophthalmie catarrhale, douleurs dans l'aine, le ventre et la poitrine, douleurs néphrétiques; rhumatismes principalement la partie inférieure, à gauche; dans la partie supérieure du corps à droite. - Dans la position assise : douleur au-dessous de l'épaule droite ; - mal de ventre ; douleur dans la région pubienne. - Dans la position couchée : douleur plus forte dans le côté gauche ; bourdonnement d'oreille ; mal aux dents. - *Douleurs articulaires. - Sensation de faiblesse et lassitude forçant à se coucher.

Peau. — Picotement dans la peau, comme par des épingles; prurit violent, bien que sourd. — Rougeur de la peau. — Plaies difficiles à guérir. — «Contusions; »brûlures; »plaies vénimeuses et autres lésions traumatiques. — «Verrues. — «Rougeole?



210 CEPA.

Sommeil. — Bâillement avec mal de tête et gastralgie; bâillement et sommeil profond. — Sommeil agité et envie de dormir le matin — Rêves fréquents : d'orages sur mer; de vagues élevées; de la

proximité d'eau; orêves pénibles des convalescents.

Symptômes fébriles. — Frissonnement et horripilations dans le dos, surtout la nuit, passant de haut en bas, avec miction plus fréquente; puis, chaleur et soif. — *Chaleur alternant avec froid, dans les affections catarrhales; chaleur, avec les borborygmes et le rhume de cerveau; chaleur avec soif. — °Fièvre intermittente, renouvelée chaque fois par des marches forcées, avec aggravation vers le matin et chaleur sans soif. — Sueur : facilement excitée; abondante; au creux des aisselles et la paume des mains. — Pouls : accéléré; plein (lent et dur).

Moral et Intellect. — Étourdissement, hébétude, timidité. — Peur que les souffrances ne deviennent insupportables, — Désespoir, avec les coliques (même que verat.); ohumeur très-mélanco-

lique dans les affections catarrhales.

Tête. — Embarras de la tête, pression, plénitudes, pesanteur surtout à l'occiput et derrière le sommet, avec chaleur, pendant le rhume de cerveau, et le scintillement des yeux. — Sensation d'engourdissement comme dans les os du crâne; coup électrique à travers la tête; élancements depuis le sinciput, ou de l'intérieur de la tête vers l'oreille; douleur à la tempe, en clignant des yeux.

- °Céphalalgie catarrhale, douleur au front.

Yeux. — Douleurs filiformes passant des yeux à l'oreille; douleur comme si l'œil était attaché à une corde et qu'il fût tiraillé. — Yeux mats, ternes, avec sensibilité à la lumière, pendant le coryza. — Dans les yeux: brîlement; cuisson comme par de la fumée; irritation qui force à les frotter; rougeur, surtout de l'œil gauche, avec prurit, élancements et sensibilité. — Gonflement autour des yeux. — Ophthalmie catarrhale. — Dans les sourcils: prurit, chaleur, élancements. — *Larmoiement abondant (larmes douces).

Oreilles. — Douleurs, tressaillements, passant de la gorge vers l'entrée de l'oreille et aux alentours. — Tintement d'oreille;

bruits lointains; bourdonnement; bruissement.

Nez. — Éternument, le soir, en entrant dans la chambre chauffée.

*Dégouttement du nez; écoulement aqueux, avec éternument, cuisson acre et exceriation du nez et de la lèvre supérieure.

*Coryza fluent, avec larmoiement, mal à la tête, chaleur, soif, manque d'appétit, toux, tremblement des mains, aggravation le soir dans la chambre chauffée, amélioration au grand air.

soir dans la chambre chauffée, amélioration au grand air.

Face. — Chaleur à la face. — Douleurs filiformes: dans la mâchoire supérieure droite; au-dessus de l'œil droit vers la racine du nez; de la joue passant vers l'œil. — Paralysie du côté gau-

che de la face. - Erysipèle racial.

Dents. - Douleurs dans les molaires, dans la chambre chauffée,



CEPA.

211

pendant un vent froid et humide; augmentation par les boissons froides; amélioration par l'eau froide, ainsi que par le cure-dent

et en suçant avec la langue. - Dents d'un jaune sale.

Bouche et Gorge. — Odeur fétide de la bouche et de la gorge. —
Langue sale, chargée de mucosités. — Sécheresse dans la bouche,
à la racine de la langue, au voile du palais et dans la gorge. —
Sensation d'engourdissement ou de torpeur dans la gorge, en
arrière. — *Douleur dans la gorge, comme s'il y avait là une
pelotte; douleurs à la racine de la langue; au palais; vers l'entrée
de l'oreille; se dirigeant vers l'oreille. — Renáclement de mucosités en morceaux: le soir; provenant des fosses nasales et avec
mauvais goût de la bouche.

Gastricisme. — Mauvais goût de la bouche. — Peu d'appétit; beaucoup de soif. — Des nausées remontent, comme d'un coup, de la gorge. — Dégoût, nausées; au fond de la gorge; remontant le gosier; dans l'estomac, avec fadeur; en se redressant de la position couchée. — Rapports: pendant la chaleur; avec bal-

lonnement du ventre et borborygmes. - Vomissement.

Estomac. — Estomac comme vide; sensation de faiblesse dans l'estomac. — Pression au cardia, en arrière. — Douleur au pilore, sous le sternum, à droite. — Pression à l'estomac et bâillement.

Ventre. — Douleur pressive dans la région du foie, avec horripilation au dos et froid. — Dans la région de la rate: sensation de contraction; élancements en étant couché. — Dans le ventre: tranchées filiformes, se dirigeant vers le milieu; coliques dans la région ombilicale, plus fortes dans la position assise, moindres en marchant; sensation comme à la suite d'un coup, à gauche; ardeur fugace, chaleur, douleur violente à gauche, en bas (vers l'endroit d'une hernie), avec envie d'uriner et émission brûlante. — Ventre ballonné et tête entreprise, avec envie inutile d'aller à la selle; ballonnement et borborygmes, avec envie inutile d'aller à la selle; chaleur, colique, respiration gênée, gêne des vêtements et cessation après l'émission des vents. — Vents très-fétides; émission abondante de vents sans odeur. — «Coliques pour avoir mangé des concombres, de la salade. — «Coliques des enfants.

Anus et Selles. — *Diarrhées après minuit, vers le matin; dans la matinée. — Évacuations difficiles ou entièrement arrêtées; envie inutile d'aller à la selle. — Élancements dans le rectum;

déchirement dans l'anus; cuisson; reptation.

Voies urinaires. — Pression violente sur une petite place dans le bassin, à droite; douleur incisive, violente, comme par de petits couteaux. — Pression brûlante d'abord dans la vessie, puis dans la région sacrale; douleur dans la région rénale, surtout à gauche; douleur dans l'aine; pression et d'autres douleurs dans la région vésicale, dans l'anneau inguinal gauche, dans la région pubienne et dans celle de l'utérus. — *Sensation de faiblesse dans la vessie et l'urèthre; sensation de chaleur dans ces parties.



CEPA. — CHAMOMILLA VULGARIS.

- *Urines abondantes, pendant les affections catarrhales, les paralysies, etc.; urines écumeuses, irisées; urines rouges, avec envies fréquentes et brûlement dans l'urêthre.

Parties viriles. - Appétit vénérien augmenté (vessie et prostate douloureuses après le coït). - Tiraillement dans les cordons sper-

matiques; brûlement au gland.

Règles. — Règles plus abondantes. — Accouchements favorisés. Larynx. — Chatouillement dans le larynx; enrouement; toussotement en respirant l'air froid; *toux, enrouement et coryza, dans la mauvaise saison; râlement muqueux et poitrine embarrassée.

Poitrine. - *Respiration génée, par une pression dans le milien de la poitrine. - Dans la poitrine; *pression, en haut; élancements et brûlement, dans le milieu du côté gauche, en respirant

profondément.

212

Trone. - Maux de reins, lorsque les garde-robes retardent. -Horripilation dans le dos; douleur sous l'omoplate droite, après avoir été assis; élancements dans les lombes. - Elancements au con.

Membres thoraciques. -- Douleurs dans les bras, surtout dans l'avant-bras gauche; sensation paralytique dans les articulations. - Sensation d'engourdissement dans l'articulation du coude gauche. — Mains sèches et rouges; tremblement de la main droite. — Panaris.

Membres pelviens. - Faiblesse dans les hanches. - Douleurs dans les cuisses, au-dessus du genou; urticaire aux cuisses. - Sensation paralytique dans le genou. - Aux pieds, plaques écorchées;

douleurs dans l'articulation du pied et le gros orteil.


CHAMONILLA VULGARIS.

CHAM. — Camomille commune. — Hannemann. — Hist, nat. et prép. Pharmae. homœop., p. 187. — Doses usitées: 12, 30. — Durée d'action: quelques jours.

ANTIDOTES : Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls. - La camomille est antidote

ANTIDOTES: Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls. — La cumomité est autequi de: Alum. bor. coff. coloc. ign. n-vom. puls. senn. COMPARER AVEC: Acon. alum. ambr. arn. ars. bar. bell. bry. camph. caps. caus. chin. cin. cocc. coff. coloc. fer. graph. hell. hyos. ign. ipec. kal. led. lyc. magn. magn-m. merc. n-vom. petr. phos. puls. rhab. rhus. sass. sep. stram. sulf. — Cest p. incipalement après magn. que la camomille fait du hien, lorsqu'elle se trouve indiquéc.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra employer ce médicament contre : Différentes affections des femmes et des enfants, principalement des femmes en couches et des nouveau-nés; Suites fâcheuses de



218

l'abus du café et des palliatifs narcotiques ; Souffrances par suite a un refroidissement ou d'une colère; Affections rhumatismales, avec sièvre; Accès de convulsions et de spasmes, principalement chez les nouveau-nés, les enfants pendant la dentition, les femmes enceintes ou en couches et les personnes hystériques; Accès de défaillance et de faiblesse hystérique ; Convulsions épileptiques ; Catalepsie; Surexcitation nerveuse; Atrophie et amaigrissement des enfants scrofuleux?; Gonflement inflammatoire et induration des glandes; Éruption miliaire (des enfants) ?; Excoriation de la peau (chez les enfants); Disposition de toute lésion à s'ulcérer; Inflammations érysipélateuses; Ictère; État soporeux avec fièvre; Fièvres inflammatoires et nerveuses, avec délire; Fièvres intermittentes; Migraine et céphalalgie hystérique et nerveuse; Céphalalgie catarrhale, par suite d'une transpiration supprimée; Ophthalmie et blépharophthalmie des nouveau-nés, ainsi que par suite d'un refroi-dissement (et chez les sujets arthritiques?); Hémorrhagie oculaire; Blépharo-spasmes; Otalgie; Parotite; Érysipèle à la face; Odontalgie, avec gonflement de la joue ou des glandes sous-maxillaires; Maux de dents par l'abus du casé ou par suite d'un refroidissement; Den-tition difficile, avec diarrhée, sièvre; convulsions, etc.; Affections bilieuses et gastriques, soit par suite d'une colère ou de toute autre cause; Gastralgie, aussi pour avoir fait abus du café; Aigreurs des enfants; Hépatite aiguë; Coliques spasmodiques et flatulentes; Entérite?; Péritonite?; Sortie des hernies inguinales?; Diarrhées muqueuses ou bilieuses; Cholera?; Dyssenterie?; Diarrhée par suite de dentition; Lientérie?; Métrite?; Métrorrhagie, aussi après l'acconchement; Spasmes abdominaux des femmes enceintes et en couches; Coliques menstruelles; Douleurs trop violentes après l'acconchement; Symptômes précurseurs (et suites fâcheuses?) de l'abortus; Péritonite puerpérale; Suppression du lait; Fièvre de lait; Excoriation des mamelons; Érysipèle aux mamelles; Induration des glandes mammaires; Convulsions, cris, coliques, diarrhée et excoriation des nouveau-nés; Toux catarrhale, avec enrouement, principalement chez les enfants et par suite d'un refroidissement en hiver, ou par suite des morbilles; Affections inflammatoires des voies aériennes? (Laryngite? Bronchite? Trachéite?); Croup; Coqueluche?; Toux suffoquante chez les enfants?; Accès d'asthme spasmodique ou flatulent, principalement chez les enfants; Sciatique; Crampes aux mollets; etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTONES GÉNÉRAUX. — *Douleurs rhumatismales, tractives, principalement la nuit, au lit, avec état paralytique et sensation de torpeur dans les parties affectées, et besoin de les remuer constamment; soulagement par la chaleur extérieure. — *Douleurs avec soif, chaleur et rougeur (de l'une) des joues et



CHAMOMILLA VULGARIS.

214


sueur chaude de la tête, même au cuir chevelu.- *Douleurs pulsatives, comme dans un abcès. - *Surexcitation et surimpressionnabilité de tout le système nerveux, avec sensibilité excessive à toute douleur, qui paraît insupportable, et porte au désespoir. *Grande sensibilité au grand air, "et principalement au vent.-*Membres comme roides et paralysés. — Grande faiblesse et caducité; des que la douleur commence, il y a chute des forces jusqu'à tomber en défaillance. - *Aecès d'évanouissement, avec sensation de mollesse et de fadeur dans la région précordiale. - Accès de catalepsie, avec face hippocratique, extrémités froides, yeux à demi fermés, pupilles dilatées et ternes. - *Accès de spasmes et de convulsions, avec face rouge, bouffie, et mouvements convul-sifs des yeux, des paupières, des lèvres, des museles de la face et de la langue. - Convulsions épileptiques, avec rétraction des pouces et écume devant la bouche, précédées de coliques, ou suivies d'un état soporeux. — Grande envie de rester couché: l'enfant ne veut ni marcher, ni être porté sur les bras. - Craquement et douleur de brisure aux articulations.

Peau. — *Éruption -miliaire, *avec prurit et démangeaison nocturnes. — *Peau maladive; toute lésion tend à s'alcérer. — Dans les ulcères, fourmillement, démangeaison, brûlement et élancements tressaillants, avec sensibilité excessive au contact. — *Couleur jaune de la peau. — •Gonflement inflammatoire des

glandes. - Excoriations chez les enfants.

Sommeil. — Sommolence le jour, sans pouvoir dormir lorsqu'on se couche. — *Etat soporeux et coma vigil, —avec douleur tiraillante à la tête et envie de vomir, ou oavec agitation fébrile, respiration courte et soif. — *Insomnie nocturne, avec accès d'angoisse, visions et illusions de la vue et de l'ouïe. — *En dormant, sursauts avec effroi, cris, jactation, —pleurs, paroles, radoteries, gémissements, aspiration ronflante et ocartement continuel des cuisses. — Rèves fantastiques, vifs, querelleurs et fâcheux, avec figure morose et morne. — Délires nocturnes.

Fièvre. — Horripilation avec chaleur intérieure. — *Alternation continuelle de froid ou d'horripilation partielle, avec chaleur partielle, dans différentes parties du corps. — *Chaleur universelle, surtout le soir, ou la nuit, au lit, avec anxiété, soif, rougeur des joues, transpiration chaude de la tête, au front et au cuir chevelu, et quelquefois, principalement en se découvrant, mêlée de frissons ou d'horripilation. — *Après ou pendant la chaleur, sueur acide et qui cause une démangeaison à la peau. — *Chaleur brûlante et rougeur (souvent seulement de l'une) des joues, principalement la nuit avec gémissements, jactation et froid ou chaleur au reste du corps. — Chaleur brûlante avec sueur et délires furibonds, la nuit surtout. — oFièvre intermittente avec exacerbation nocturne, pression au creux de l'estomac, envie de vomir, ou vomissements bilieux, coliques, diar-



CHAMOMILLA VULGARIS.

rhées et émission douloureuse des urines. — Sueur nocturne, en dormant.

Isral. — *Accès d'une grande angoisse, comme si le cœur allait schater, avec inquiétude excessive, agitation, exaspération et jactation, gémissements et pleurs, accompagnée souvent aussi de coliques tractives ou de pression au creux de l'estomac. — *Disposition à pleurer et à se fûcher, avec grande sensibilité aux offenses. - *Humeur querelleuse et colère. - Méchanceté chez les enfants, -- *Surexcitation morale, avec grande disposition à s'effrayer. - Humeur hypocondriaque. - *Le malade ne peut supporter ni que d'autres lui adressent la parole, ni qu'on l'interrompe dans sa conversation. — Taciturnité et répugnance pour la conversation. — État de distraction et d'inadvertance, comme si l'on était plongé dans la méditation, avec conception difficile comme si l'on n'entendait pas bien. - Espèce de stupidité et d'apathie pour le plaisir et pour les choses extérieures, comme . des rêves éveillés. — Désir de différentes choses, dont on ne veut plus dès qu'on les possède. - En parlant et en écrivant, on se trompe facilement. — • Délires frénétiques et furibonds.

Tôto. — Ivresse et chancellement, le matin, en se levant. — •Vertiges en se redressant. — Vertiges arec défaillance. — *Vertiges avec obscurcissement des yeur. — *Vertiges principalement le matin, ou le soir, ou après le repas, ou après avoir pris du café. — Mal à la tête le matin en s'éveillant, ou pendant le sommeil, quelquefois avec sensation comme si la tête allait éclater. — Doulour de meurtrissure, et *pesanteur pressive dans la tête. — *Traillements, élancements et battements dans la tête, souvent seulement semi-latérance. — Craquement dans un côté du cerveau. — *Sueur chaude, visqueuse, au front et au cuir chevelu. — Douleur tressaillante au front, principalement après le repas.

- *Congestion pulsative à la tête.

Yeux. — Douleur de plaie dans les angles des yeux. — Élancements, brâlement et chaleur dans les yeux. — * Yeux enflammés oct rouges, avec douleurs pressives, principalement en remuant les yeux et en secouant la tête. — Grande sécheresse du bord des paupières. — o'Inflammation du bord des paupières. — o'Gonflement et rougeur des paupières avec sécrétion muqueuse, chassie dans les yeux et agglutination nocturne. — o'Couleur jaune de la clérotique. — Ecchynose dans l'œil et ohémorrhagie oculaire. — o'Occlusion spasmodique des paupières. — *Tressaillement des paupières. — *Yeux convulsés. — Pupilles contractées. — *Scintillement devant les yeux. — Vue trouble, plus souvent le matin que le soir. — Obscurcissement semi-latéral de la vue, en regardant quelque chose de blanc. — Photophobie.

Oreilles. — *Otalgie avec douleurs tractives et tensires. — *Élancements étendus dans les oreilles, principalement en se baissant.

avec disposition à se facher pour des riens et à prendre tout en



CHAMOMILLA VULGARIS.

216

mauvaise part. - Tintement et *bourdonnement des oreilles. -Sensation comme si les oreilles étaient bouchées et qu'un oiseau y grattat et voltigeat. - Sensibilité de l'ouïe ; la musique paraît insupportable. - *Gonflement inflammatoire des parotides, ainsi que des glandes sous-maxillaires et de celles du cou. - Ecoulement par les oreilles.

Nez. — Coryza avec obturation du nez. — Ulcération et inflammation des narines. — *Épistaxis. — Odorat très-sensible.

Visage. - *Face chaude, rouge, brulante, ou rougeur et chaleur d'une joue, avec froid et pâleur de l'autre, ou face pâle, creuse, avec distorsion des traits par la douleur. — *Enflure du visage. o Erysipèle à la face, avec gonflement dur et bleuatre d'une joue. - Gonflement d'une tempe avec douleur au toucher. -°Fluxion sur la joue. — °Rides au front. — *Sueur chaude et vis-queuse, au front. — °Douleurs lancinantes, tractives et pulsatives dans un côté du visage. - Miliaire rouge aux joues. -Couleur jaune de la peau du visage. - *Mouvements convulsifs des muscles de la face et des lèvres. - *Lèvres gercées, excoriées et ulcérées. - Crampes dans les machoires avec serrement des dents.

Dents. - *Odontalgie, le plus souvent semi-latérale, et principalement la nuit à la chaleur du lit, avec douleurs insupportables qui portent au désespoir, gonflement, chaleur et rougeur de la joue, ogonflement brûlant des gencives et engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires. - *Les douleurs sont ordinairement tractives et tressaillantes, ou pulsatives et lancinantes ou fouillantes et rongeantes dans les dents creuses, et elles apparaissent fréquemment après avoir bu ou mangé chaud (ou froid), et principalement après avoir pris du café. - Vacillement des

dents.

- *Sécheresse de la bouche et de la langue, ou écoulement d'une salive écumeuse. - *Odeur putride de la bouche. -Langue rouge et fendillée, ou chargée d'un enduit épais et jaunatre. — Vésicules sur et sous la langue, °avec douleurs lancinantes. — Aphthes dans la bouche.—*Mouvements convulsifs de

la langue.

Gorge. - Mal à la gorge avec gonflement des parotides, odes tonsilles et des glandes sous-maxillaires. - Douleurs au pharynx, lancinantes et brûlantes, avec sensation comme s'il y avait un tampon dans la gorge. - Impossibilité d'avaler des aliments solides, surtout étant couché. — Chaleur brûlante dans la gorge, depuis la bouche jusqu'à l'estomac. - Rougeur foncée des parties affectées. - Les aliments s'arrêtent à la fossette du cou.

Appétit. — Goût putride ou muqueux. — Goût acide de la bouche et du pain de seigle .- *Goût amer de la bouche et des aliments. - Les aliments ne peuvent pas passer. - *Dégoût ou désir prononcé du café, quelquefois avec envie de vomir, ou même vomis-



CHAMOMILLA VULGARIS.

sement et accès de suffocation après en avoir pris. — Après avoir mangé, chaleur et sueur du visage, ballonnement et plénitude de l'estomac et du ventre, rapports et envie de vomir. — *Soif

excessive de boissons froides.

du ventre. — Rapports qui aggravent les douleurs de l'estomac et du ventre. — Renvois aigres. — °Régurgitation des aliments. — Envie de vomir après avoir mangé, et principalement le matin. — Malaise et sorte de mollesse à l'estomac, comme si on allait s'évanouir. — *Vomissement des aliments et de matières aigres avec des mucosités. — *Vomissements amers, bilieux. — *Pression excessivement douloureuse à la région précordiale, comme si le cœur allait être écrasé, avec cris, sueur et angoisse. — *Gastralgie pressive, comme par une pierre dans l'estomac, avec gêne de la respiration, principalement après avoir mangé, ou la nuit, avec inquiétude et jactation, et renouvelée ou soulagée par le café. — Douleur brûlante au creux de l'estomac et aux hypocondres.

Ventre. — *Tension et plénitude anxieuse aux hypocondres et à l'épigastre, avec sensation comme si tout se portait vers la poitrine. — *Colique flatulente avec ballonnement du ventre et
affluence des flatuosités vers la hypocondres et à l'anneau inguinal. — *Coliques excessivement douloureuses, tiraillements
et tranchées dans le ventre, quelquefois le matin au lever du
soleil. — Sensation de vacuité dans le ventre, avec mouvements
continuels dans les intestins, et cercles bleus autour des yeux. —
*Tranchées brûlantes dans l'épigastre avec gêne de la respiration
et pâleur du visage. — *Élancements dans le ventre, "principalement en toussant, en éternuant et en le touchant. — °Sensibilité douloureuse du ventre au toucher, avec sensation d'ulcération au dedans. — *Pression vers l'anneau inguinal, comme
s'il allait en sortir une hernie. — *Spasmes abdominaux.

Anus. — Constipation, comme par inertie du rectum. — *Diarrhées, principalement la nuit, avec coliques spasmodiques, le plus souvent avec selles muqueuses blanchátres, ou aqueuses, ou jaunátres et verdátres, ou de mucosités mélées d'excréments, comme des œufs brouillés, ou selles chaudes, corrosives et d'une odeur fétide, comme des œufs pourris, ou évacuation de matières non digérées. — *Hémorrhoïdes avec crevasses très-douloureuses et ulcérations à l'anus.

Urines. — Envie d'uriner avec anxiété. — En urinant, démangeaison et brûlement dans l'urèthre. — °Urines chaudes, jaunâtres, avec sédiment floconneux, ou urines troubles, avec sédiment jaunâtre. — Émission involontaire ou jet faible des urines. — Excoriation au bord du prépuce.

Bègles. — Règles supprimées avec gonflement et douleurs pressives au creux de l'estomac et au ventre, douleurs comme celles de l'enfantement et hydropisie générale. — *Coliques men-



CHELIDONIUM MAJUS. - CHINA.

mangé. — Tranchées alternant avec selles molles. — Elancements sourds au-dessous du nombril, forçant à se replier sur soimême.

Selles et Urines. - Selles dures, noueuses et difficiles. - Diarrhée muqueuse la nuit. - Urines pâles, fréquentes, abondantes ou en trop petite quantité.

Règles. - Règles trop fortes ou en retard. - Disparition du lait

des mamelles.

220

Poitrine. — Respiration difficile et oppressée. — Toux accompagnée de surdité. - Pression à la poitrine en respirant.

Dos. - Déchirement pressif dans le dos, comme si les vertèbres

lombaires allaient se briser, seulement en se courbant en avant ou en arrière. Bras. - Paralysie des muscles du bras, avec mouvements diffi-

ciles et douloureux. - Veines gonflées aux mains. - Doigts morts avec ongles bleuâtres.

Jambes. - Paralysie de la cuisse et du genou, en appuyant le pied. - Tractions paralytiques depuis la hanche jusqu'aux orteils. — Crampe et contraction de la plante des pieds. — Accès de torpeur, pâleur et froid aux pieds, qui sont comme morts. -•Roideur des cous-de-pied.


CHINA.

CHIN. — Quinquina. — HAHNEMANN. — Hist, nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 189. — Doses usitées: 9, 12, 30. — Durée d'action: jusqu'à 49 jours dans quelques cas de maladies chroniques.
ANTIDOTES: Arn. ars. hell. calc. caps. carb.v. cin. fer. ipec, merc. natr. natr.m. pu's. sep. sulf. veratr. — Le quinquina est antidote de: Ars. asa. aur. cupr. fer. hell. ipec, merc. sulf. veratr. — Le selen. en aggrave les offste.

effets

COMPARER AVEC: Amm. arn. ars. asa. bar, bell. bry. calc. caps. carb-v. cham. cin. cupr. dig. fer. graph. hell. hep. iod. ipec. lach. mere, mur-ac. natr. natr-m n-vom. phos. phos-ac. puls. rhus. samb sep. sil. stann. sulf. thui. veratr. — C'est surtout après: Arx. ipec. merc. phos-ac. et veratr. que le quinquina fait du bien lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le quinquina conviennent quelquefois: Ars. bell. puls. veratr.


CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des personnes d'une constitution maigre, sèche et bilieuse, ou leucophlegmatique avec disposition à des affections hydropiques ou à des catarrhes, à des rhumes de cerveau et autres écoulements muqueux, ou à des diarrhées; Affections surtout du sexe féminin; Affections rhumatismales; Suites fâcheuses d'une colère, d'un refroi-



dissement, d'un coryza supprimé ; Suites fâcheuses de l'abus du thé de Chine; Souffrances des ivrognes?; Inflammations asthéniques; Suites fâcheuses de abus du mercure; Souffrances arthritiques; Arthrocace?; Hydrarthre?; Affections hydropiques; Souffrances du système lymphatique; Ictère; Chlorose?; Hémorrhagies, surtout celles par suite de faiblesse; Atrophie; Faiblesse, surtout à la suite de pertes débilitantes (perte de sang, de sperme ou d'autres humeurs) ou après de graves maladies aigues; Danse de Saint-Guy?; Souffrances à la suite de la petite vérole ou des morbilles; Fièvres avec affections bilieuses, gastriques, muqueuses et rhumatismales; Fièvres intermittentes; Fièvres des marais; Fièvres typhoïdes, même avec symptômes de putridité; Fièvres lentes; Hypocondrie surtout celle par suite de perte d'humeurs; Céphalalgies rhumatismales, catarrhales et congestives; Migraine; Céphalalgie par suppression d'un rhume de cerveau; Ophthalmie aussi chez des personnes acrofuleuses; Amblyopie amaurotique, surtout après des excès de boissons alcooliques ou par suite de perte d'humeurs; Hémorrhagie masale (ou buccale); Prosopalgie et odontalgie rhumatismales ou congestives; Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques, surtout par suite de perte d'humeurs ou de fortes maladies aigues; Cholérine; Affections bilieuses; Ictère; Hépatites aiguës et chroniques?; Engorgement et induration du foie ou de la rate; Splénalgie?; Coliques aussi à la suite des morbilles; Coliques spasmodiques et flatulentes; Tympanite; Ascite et ascite enkystée; Affections vermineuses; Entérite chronique avec diarrhée sans douleur; Diarrhées, aussi celles à la suite de la petite vérole; Diarrhée par faiblesse; Lientérie; Souffrances hémorrhoïdales; Satyriasis?; Impuissance; Flueurs blanches; Métrorrhagies, surtout celles par suite de faiblesse; Catarrhe des voies aériennes; Grippe; Pleurésie; Pneumonie; Bronchite; Hémoptysie; Pneumonie chronique avec suppuration; Catarrhe suffoquant?; Gonite; etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTONES GÉNÉRAUX. — *Tiraillements tensifs ou déchirements tressaillants et lancinants, surtout dans les os longs des membres, avec douleurs paralytiques et faiblesse des parties affectées. — Douleurs déchirantes, rhumatismales dans les membres, en commençant à marcher.—*Douleurs et souffrances provoquées ou aggravées par le toucher, la nuit ou après le repas.— Inquiétude dans les parties affectées, qui force à les remuer. — Sensation de torpeur dans diverses parties. — Engourdissement des parties sur lesquelles on est couché. — *Gonflement arthritique, dur et rouge de quelques parties. — *Gonflement hydropique de quelques parties ou de tout le corps. — *Gonflement érysipélateux de tout le corps. — *Grande faiblesse générale arec tremblement, marche difficile et grande disposition à la trans-



222 CHINA.


piration pendant le mouvement et le sommeil. — Vivacité plus qu'ordinaire avec yeux fixes. — «Mouvements convulsifs des membres. — *Surexcitabilité de tout le système nerveux. — Aversion pour le travail du corps et de l'esprit. — Évanouissements. — Accès d'asphyxie. — *Atrophie et amaigrissement, surtout des bras et des jambes. — *Grande susceptibilité aux courants d'air et souffrances en s'y exposant tant soit peu. — Lourdeur de tout le corps.

Pean. — Sensibilité excessive de la peau de tout le corps. — *Couleur jaune de la peau. — Peau flasque, sèche, — Elancements térébrants et battements dans les ulcères. — Prurit brûlant ou rongeant, surtout le soir au lit, quelquefois avec éruption de boutons ou de taches saillantes, comme par des piqures d'orties.

Sommeil. — Envie de dormir le jour, souvent avec battement de cœur. — Bâillement fréquent, avec pandiculations. — *Sommeil tardif et insomnie, à cause d'une grande affluence d'idées. — Rêvasseries en s'endormant. — *Insomnie avec mai de tête pressif ou boulimie. — *Sommeil agité, non réparateur. — Sursauts avec effroi en s'endormant. — En dormant, on est couché sur le dos, la tête renversée et les bras étendus sur la tête, avec respiration lente et avec pouls plein et accéléré. — Gémissements et ronflements pendant le sommeil, même chez les enfants. — *Rêves pénibles, effrayants, qui agitent même encore après le réveil. — *Rêves désordonnés, insensés, après minuit, avec une

sorte d'hébétude au réveil.

Fièvre. — *Frissons avec horripilation, ou tremblement fébrile, ordinairement sans soif. — *Froid du corps, avec congestion à la tête, chaleur et rougeur du visage, et front chaud. - Augmentation générale de la chaleur, avec veines gonflées, sans soif. — *Frissons avec mal à la tête, nausées, adipsie, vertiges, congestion à la tête, pâleur du visage, froid aux mains et aux pieds, vomiturition de glaires, etc. — Frissons plus forts, après avoir bu. - *Chaleur, avec sécheresse de la bouche et des lèvres qui sont brûlantes, rougeur du visage, mal à la tête, faim maladive, délire, pouls plein et accéléré. — Chaleur, avec picote-ments çà et là, et soif ardente. — Chaleur avec besoin de se découvrir, ou avec frissons pour peu qu'on se découvre. — °Fièvres quotidiennes et doubles quotidiennes, ou tierces, débutant principalement le soir, on après midi, ou le matin, par des frissons avec tremblement, suivis de chaleur et de sueur nocturne. oFièvres avec douleurs pressives et congestion à la tête, endolorissement et gonflement du foie et de la rate, goûts, rapports et vomissements amers et bilieux, couleur jaunâtre de la peau et du visage, toux courte, convulsive, grande faiblesse, douleurs aux membres, et point douloureux dans la poitrine. - *Les accès fébriles sont fréquemment précédés de souffrances, telles que battement de cœur, éternument, angoisses, nausées, soif exces-



CHINA.

223

sive, boulimie, mal à la tête, coliques pressives, etc. — *La soif n'a ordinairement lieu qu'avant qu après les frissons, ou pendant la sueur, rarement pendant la chaleur et presque jamais pendant les frissons. — Pouls petit, faible. — *Transpiration facile pendant le sommejl et pendant le mouvement. — *Sueurs nocturnes affaiblissantes — Sueurs huileuses le matin.

Meral. — *Apathie et insensibilité morale. — *Abattement hypocondrisque. — *Grande anxiété. — Caractère trop scrupuleux. — Découragement. — Mécontentement; en se croit malheureux et tracsseé par tout le monde. — Irascibilité expessive avec pusillanimité et impossibilité de supporter le moindre bruit. — Désobéissance. — *Mépris de toutes choses; tout paraît fade. — Maussaderie, avec pleurs faciles ou avec irritabilité. — *Peur de chiens et d'autres animaux, surtout la nuit. — *Grande abondance d'idées et de projets, avec marche lente des idées. — Horreur du travail.

Tête. — Embarras sourd de la tête, comme par des veilles pre-Rongées. — Vertiges en relevant la tête, surtout à l'occiput, comme si la tête allait fléchir en arrière. — Vertiges, avec nausées. — Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements. – *Mal à la tête comme par un coryza supprimé. — Lourdeur de la tête avec abattement. -- Céphalalgie au front, en ouvrant les yeux. — *Douleurs de meurtrissure au cerveau, avec térébration pressive au sommet de la tête, aggravées par la méditation et la conversation. — *Mal de tête pressif, surtout la nuit, avec insomnie, -ou le jour, et aggravé par le grand air. — *Douleurs aiguës, tressaillantes ou pressives à la tête. — *Mal de tête comme si la tête allait éclater. — Douleurs lancinantes à la tête, avec fortes pulsations dans les tempes. — *Congestion à la tête, avec chaleur et plénitude. - Mouvements et battements douloureux au cerveau, abligeant à hausser et baisser alternativement la tête. - *Maux de tête augmentés par le toucher, le mouvement et la marche, ainsi que par un courant d'air ou par la marche contre le vent. - Les maux de tête ne siégent souvent que d'un seul côté. — *Sensibilité de l'extérieur de la tête et même de la racine des cheveux au toucher. — Mal à la tête, comme si l'on arrachait les cheveux ou que le cuir chevelu se contractat. — Pression lancipante aux bosses frontales. Sueur du cuir chevelu.

Yeux. — Douleur aux yeux, comme par une pression aux bords de l'orbite. — Douleur comme si un grain de sable s'était introduit dans l'œil, pendant le mouvement. — Cuisson pénible dans les yeux. — Inflammation dans les yeux, avec chaleur, rougeur, douleurs brûlantes et pressives, et aggravation le soir. — Yeux ternes. — Yeux proéminents. — Cornée terne, comme s'il y avait de la fumée au fond de l'œil. — Couleur jaunâtre de la selérotique. — Larmoiement, avec fourmillement à la face in-



CHINA.

224

terne des paupières. - Faiblesse de la vue qui ne permet de voir que le contour des objets peu éloignés. - En lisant, confusion des caractères qui paraissent pâles et entourés d'un bord blanc. — *Pupilles dilatées et peu sensibles. — Cécité, comme par amaurose. — *Scintillements, points noirs voltigeants, et obscurcissement devant les yeux. — Photophobie.

Oreilles. — Déchirements dans les oreilles, le plus souvent à

l'oreille extérieure. - Élancements, *bourdonnement et tintement dans les oreilles. - Dureté de l'ouïe. - Rougeur et chaleur de l'oreille extérieure et surtout des lobes. - Éruption dans

la conque de l'oreille.

Nez. — Nez chaud et rouge. — *Saignement du nez et de la bouche. — *Coryza avec éternument. — *Épistaxis.

Visage. - Chaleur et rougeur du visage, surtout des joues et du lobe des oreilles. - *Teint pâle, terreux, parfois jaune noirâtre. - *Visage abattu avec yeux enfoncés et cernés, et nez pointu. — *Visage bouffi. — *Douleurs rhumatismales au visage. — *Lèvres desséchées, noirâtres. — *Lèvres gercées. — Gonflement des lèvres. — Pustules brûlantes, démangeantes, aux lèvres et à la langue. — Douleurs et gonflement des glandes sous-maxillaires.


Dents. — Odontalgie avec douleurs tressaillantes ou tractives provoquées par le grand air ou le courant d'air .- *Douleur sourde et pénible dans les dents cariées. — *Odontalgie pulsative. — *Les maux de dents se manifestent principalement après le repas et la nuit, et sont soulagés par une forte pression ou en serrant les dents; un léger contact les aggrave excessivement. - Dents branlantes ne causant de douleurs qu'en mâchant. - Dents recouvertes d'un enduit noir.

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Bouche pâteuse, avec goût fade, aqueux. - Langue fendillée, noire ou *chargée d'un enduit jaune ou blanc. - Lancinations brûlantes dans la langue. -Gonflement douloureux de la langue vers la racine, - Manque

de la parole. — Écoulement de sang par la bouche. Gorge. — Sécheresse de la gorge. — Élancements dans la gorge, surtout en avalant, provoqués par le moindre courant d'air.

Gonflement du palais et de la luette.

Appétit. — *Goût fade, muqueux ou aqueux, surtout après avoir bu. — Goût trop salé, ou *insipidité des aliments. — Goût dou-ceâtre dans la bouche. — *Goût acide ou amer de la bouche, ainsi que des aliments et des boissons. - *Répugnance pour les aliments et les boissons avec sensation de plénitude. - Goût aigre du café et du pain de seigle. - Goût amer de la bière et du pain de froment. - Dégoût pour le beurre, la bière et le café. Grand désir de vin. — Dégoût de l'eau avec désir de la bière. - *Soif ardente; on boit souvent, mais peu à la fois. - Boulimie, avec goût fade dans la bouche, nausées et envie de vomir.



CHINA.

-- Voracité. - Appétit seulement pendant qu'on mange, avec indifférence pour tous les aliments. — *Désir de divers aliments et convoitise confuse de friandises, sans qu'on sache exactement laquelle. — Après chaque gorgée d'une boisson, horripilation ou frissons avec chair de poule, élancements dans la poitrine ou coliques. — Renvois aigres et dérangements de l'estomac, après avoir pris du lait. — *Grande faiblesse de la digestion; *après le repas le moins abondant, malaise, envie de dormir, grande plénitude de l'estomac et du bas-ventre, lassitude et paresse, goût fade de la bouche, humeur hypocondriaque et mal à la tête. — *Renvois amers, acides ou sans goût, surtout après avoir

mangé. — On ne digère pas du tout, après avoir soupé tard.

**Renvois, surtout après le repas, le plus souvent amers, acides ou sans goût. - *Renvois avec goût des aliments. - Pyrosis, accumulation d'eau dans la bouche, vomiturition et pression à l'estomac, dès que l'on a mangé la moindre chose. — oVomissements acides, de glaires, d'eau et d'aliments. — °Vomissements de sang. — *Pression à l'estomac et douleurs crampoldes, surtout après avoir mangé. — Sensation d'excoriation et pression

à l'épigastre, surtout le matin.

Fentre. — Douleurs dans les hypocondres. — *Douleurs lancinantes et pressives dans la région hépatique, surtout au toucher. - *Durêté et gonflement du foie. - *Gonflement et dureté de la rate. - *Elancements dans la rate. - Tranchées dans la région ombilicale, avec horripilation. - Forte presison, comme par un corps dur et plénitude dans le ventre, surtout après chaque repas. - *Gonflement hydropique du ventre avec souffrances asthmatiques et toux fatigante. - Gonflement partiel du ventre, comme par une ascite enkystée. - *Ballonnement excessif du ventre, comme par une espèce de tympanite. — Dureté du ventre, comme par induration des viscères. - oColique avec soif inextinguible. — Coliques excessivement douloureuses; douleurs crampoides et constrictives dans le ventre. — Inflammation et ulcération des viscères abdominaux. — Coliques pressives, lancinantes (sous le nombril), surtout en marchant vite. - *Incarcération des flatuosités; elles ne sortent ni par en haut ni par en bas. — *Coliques venteuses dans la profondeur du bas-ventre, avec contraction des intestins et affluence de flatuosités jusque dans les hypocondres. — Sortie de vents fétides. — Pression vers l'anneau inguinal, comme si une hernie allait sortir.

Selles. — Selles peu abondantes et s'évacuant lentement. — Evaçuation difficile de selles molles, comme par inactivité des intestins. — OSelles fréquentes, de la consistance de la bouillie, ou écumeuses. — *Évacuations putrides ou bilieuses. — *Diarrhées muqueuses, aqueuses, jaunâtres. — Diarrhée après avoir mangé des fruits. — * Selles diarrhéiques, avec excrétion de tous les aliments non digérés. — Diarrhées sans douleurs, mais avec




CHININUM SULFURICUM.

228

dîad, digit, ferr. ign. ipec. merc. mosch. m-mosch. n-vom. op puls, sulf. tart. veratr.
ANTIDUTES: Voyez parmi les médicaments ci-dessus.

AVIS CLINIQUES. - Rhumatismes aigus?; Douleurs et affections arthritiques?; Névralgies, surtout avec périodicité ou intermittence? ! Symptômes scrofuleux?; Hémorrhagies?; Spasmes périodiques de la tête, du visage et des bras?; Eclampsie?; Épi-lepsie?; Paralysie; Apoplexie, même séreuse; Hémiplégie?; Asphyxie??; Faiblesse, surtout après des maladies aiguës, des fièvres, des rhumatismes?; Faiblesse et amaigrissement chez les vieillards; Érusipèle; Erysipèle gangréneux?; Hydropisie?; Ictère?; Suites de la morsure de la vipère?; °Ulcères ichoreux; — Écorchure des malades alités (decubitus)?; Ulcères carcinomateux; Fièvres intermittentes ???; Fièvres des enfants; Fièvres automnales avec splénalgie?; Fièvres intermittentes avec inflammations, hydropisie, affections hépatiques?; Fièvres pernicieuses?; Fièvres exanthématiques?; Fièvres hectiques?; Fièvre jaune; Fièvres nerveuses, éréthistiques ou torpides?; Fièvres typhoïdes avec pétéchies et affection prédominante des systèmes cérébral et nerveux; Fièvres lentes?; *Delirium tremens; M.graine; Céphalalgie rhumatismale, nerveuse, périodique ou intermittente?; Hydrocéphale aiguë?; Héméralopie??; Prosopalgies intermittentes?; Affections scorbutiques des gencives?; Angines, surtout avec déglutition difficile, constriction, hydrophobie?; Dyspepsies, nerveuses, ou avec amaigrissement, fièvre étique, etc., ou encore avec vomiturition, vomissements, coliques?; Colique venteuse?; Météorisme; Selles involontaires??; Rétention d'urine??; Incontinence d'urine; Symptômes de la pierre??; Diabète?; Métrorrhagies?; Flueurs blanches?; Avortement?; Convulsions des femmes enceintes, ou pendant les couches ??; Fièvre puerpérale ?; Coqueluche ??; Croup ??; Phthisie laryngée ??; Toux grasse ?; Toux grasse à la suite de la rougeole; Phthisie muqueuse?; Phthisie adynamique avec expectoration purulente abondante, manque de force, fièvre vers le soir, et sueurs nocturnes?; Souffrances asthmatiques sans toux?; Angine de cœur??; Pulsations de cœur intermittentes??; Myélite?; Marasme dorsal, surtout après des pertes séminales????; Paralysie des membres (supérieurs ou inférieurs); Sciatique??

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Agit premièrement sur le système nutritif, puis sur les autres; affecte principalement le caual intestinal, puis le cerveau, les organes génitaux et urinaires; enfin, les extrémités et la peau. — Douleurs pressives; élancements ou douleurs incisives, douleurs pulsatives, tensives, brû-



CHININUM SULFURICUM.

lantes et expansives. — Déchirements tractifs ou tressaillants. Craquement dans les articulations. — Déchirements, surtout dans les jambes : tressaillants dans les membres, tractifs dans les mains, les pieds, le front, etc. — Aggravation des symptômes tous les deux jours, ou bien tous les jours à la même heure. -Tous les deux jours, il y a (entre autres): Traction dans le front avec anorexie et selles en forme de bouillie; douleur frontale le soir, ou bien après midi et avec chaleur, soif et sueur. — Crises nerveuses; surexcitation nerveuse, avec anxiété, lassitude, et mêmes symptômes hystériques. — Spasmes dans les membres; convulsions du côté gauche, avec vomissement de bile, diarrhée, congestion à la tête et cephalalgie effroyable. — Paralysie, d'abord d'un seul côté, puis générale. — Lassitude: avec bâillement continuel; avec incapacité de travailler et horreur du trarail; avec tremblement des membres; grande faiblesse et caducité. - Amaigrissement, même avec fièvre hectique, anorexie, constipation, ventre tendu, pression dans la région ombilicale, nausées, vomiturition et démence ; Amaigrissement et hydropisie. - Tremblement des membres, surtout des pieds, avec endolorissement des malléoles, tremblement avec froid général.

Peau. — Peau flasque, ou très-sensible au toucher. — Inflammations gangréneuses; rougeur livide de la peau, avec formation d'une membrane gélatineuse, ou de croûtes superficielles. — Formation d'une croûte épaisse, livide et humide, qui devient noire et sèche, aux bords d'abord rouges et suintants, puis jaunâtres

et se ramollissant.

Sommeil. — Bâillement fréquent, surtout le soir; ou bien avec pendiculations, frissons, oppression, bras meurtris, douleur au dos, et sensibilité des vertèbres cervicales et pectorales à la pression. — Envie de dormir le jour. — Sommeil profond et non restaurateur, agité, avec sueurs débilitantes, jactation et rêves extraordinaires. — La nuit au lit, forte chaleur, avec grande soif, mal de tête et tintement d'oreilles; insomnie parfois avec sueur abondante, ou bien avec chaleur sèche, picotement dans la

peau et sueur à la face.

Symptômes fébriles. — Froideur des membres parfois avec tremblement, sensation de froid avec tremblements intérieurs, face pâle, envie pressante d'uriner, et urines pâles le soir. — Frissons, même par un temps chaud; frisson grelottant après midi, avec chaleur à la face et urine spastique déposant des cristaux; frisson le soir, avec pouls accéléré, fréquent, sécheresse de la bouche, soif, sommeil agité, et dépôt couleur de brique dans les urines. — Accès fébriles avec vertiges, éblouissement, douleur frontale, amertume du pain, nausées, vomissements, diarrhée. coliques, frisson violent, forte chaleur, bàillements, éternument et sueur abondante; accès violents avec frisson grelottant, sueurs abondantes, hémorrhagies et douleurs dans l'hypocondre gauche



CHININUM SULFURICUM.

230


-Accès de la durée d'une heure, composé de pâleur, frisson et horripilation, avec lèvres et ongles bleuâtres et pouls spastique et contracté, puis chaleur générale avec rougeur de la face, pouls plus développe (qu'il n'était d'abord) et soif, enfin sueur légère. - Pendant les frissons, pâleur du visage, céphalalgie, tintement d'oreilles, soif, appétit augmenté, selles difficiles, douloureuses, et grand accablement moral, - Chaleur extérieure, avec sécheresse de la bouche et de l'arrière-gorge, constipation opiniatre, et disposition à tomber en marchant dans les rues; ou bien avec sueur à la poitrine, rougeur de la face, mouvements convulsifs des muscles, et pouls fréquent, — Chaleur qui passe à la sueur, principalement le soir. — Pouls : lent, surtout après midi, ou dans les accidents périodiques; plein ou petit, mais souple et lent; - fréquent, comme les battements de cœur; - accéléré, surtout le matin, ou une heure après le dîner (c'est-à-dire, après le dîner pris à midi, comme on a l'habitude de le faire en Allemagne où ce médicament a été étudié). - Sueurs faciles à provoquer, visqueuses, ruisselantes à la poitrine, débilitantes, avec épuisement prompt, après chaque effort.

Moral. — Anxiété par accès; grande angoisse, parfois le matin au lit et forçant à se lever plus tôt qu'on ne voudrait; - ou bien après minuit, avec cris et besoin de se lever. - Grand accablement moral; mélancolie taciturne; découragement, envie de pleurer et désespoir. - Morosité et mauvaise humeur, avec baillement et horreur du travail. - Grande paresse avec lassitude. - Excitation comme après avoir pris du café ou comme causée par le

vin. - Grande gaieté.

Sensorium. - Intelligence faible, avec faiblesse qui fait tomber, grande chaleur à la peau, sécheresse de la bouche et de la gorge, et constipation. - Încapacité de prononcer les substantifs, et réflexion lente. - Sensation de vide dans la tête, avec chaleur à la face, soif, ou tintement dans les oreilles; - tête entreprise, avec bourdonnement dans le dedans, ou avec ivresse et lourdeur; - stupeur avec céphalalgie dans le côté gauche du front; espèce de rage dans la tête, empêchant presque de marcher, avec impossibilité de diriger les membres à volonté. - Délires. Forte exaltation et espèce de démence. — Vertiges : en se baissant; - tournoyants; - comme si la tête allait tomber en arrière, aggravés par le mouvement, moindres lorsqu'on est couché; comme par ivresse, avec bourdonnement dans les oreilles, chaleur à la peau, et pouls accéléré; — avec céphalalgie et étourdissement. Tête. — Céphalalgie : surtout le soir, ou bien en marchant au soleil; — avec lassitude, baillement, envie de dormir, et morosité; douleur sourde, avec surdité, angoisse, sueur, tremblement des membres, et pouls lent; du côté gauche surtout, avec pulsation

des artères temporales, grande excitation du corps, face pale, soif violente, nausées, faiblesse des pieds, et sueur générale; - dans



la tempe gauche, avec besoin de se concher et amélioration en appuyant la tête sur des endroits frais, - Céphalulgie frontale : le matin en se réveillant; le soir surtout; - après midi, avec lourdour de la tête, et chaleur à la face; - avec tintement dans les oreilles et chaleur générale, ou bien du côté gauche, avec vertiges, appétit augmenté, soif, rapports, nausées, flatuosités, et grande lascitude; - douleur au front et dans les tempes, avec pulsation des aptères temporales, chaleur à la tête, tintement dans les oreilles, soif fréquente, urines abondantes, anxiété et grande lassitude. - Pression dans la tête; dans l'occiput, éveillant la muit et disparaissant en se levant ; dans le front et les orbites, aggravée en tournant la tête ou les yeux; depuis le matin jus-qu'au soir, avec chaleur au front. — Douleur expansive, surtout dans la région temporale, aggravée par le mouvement et au grand air ainsi que la nuit, avec sommeil dérangé. - Pulsation dans la tête. — Bouillonnement vers la tête, le soir, surtout avec pulsation des artères, douleur comme si la tête allait éclater, chaleur à la face, vertiges, tintements et bourdonnement dans les oreilles, dureté de l'ouïe, étincelles devant les yeux, pouls accéléré et fréquent, sommeil agité et plein de rêves, et sortie fréquente de vents par le haut et le bas. - Sensibilité du cuir chevelu.

Yeux. — Sensibilité des yeux avec larmoiement. — Vue trouble comme par un brouillard, avec sécheresse des yeux. — Étincelles devant les yeux; taches noires, et parfois l'on ne voit qu'un seul côté des objets; obscurcissement de la pue, surtout en fixant un

objet; — Amaurose passagère. Oreilles. — Tintement dans les oreilles; bourdonnement, surtout dans l'oreille gauche, parfois jusqu'à la surdité de ce côté; dureté de l'ouïe, parfois avec mal de tête violent.

Nes. — Saignement fréquent au nez; — éternument fréquent.

Pace. — Couleur pâle, mauvaise mine; air souffrant, avec youx enfoncés. - Fuce terreuse, avec blanc des yeux sale, et yeux ternes. — Teint ictérique. — Rougeur de la face, parfois avec chaleur autour des yeux et larmoiement à l'aspect de la clarté. Chaleur de la face, surtout le soir, ou bien comme après avoir pris du café. — Lèrres bleuâtres; éruption à la lèvre supérieure.

Bouche. — Sécheresse : avec chaleur, soif, odeur animale de la bouche, et sensation de constriction dans l'œsophage; bouche et de l'arrière-gorge, avec constipation et intelligence faible. — Grande pâleur de la cavité buccale; érosion aux gencives et aux parois de la cavité buccale, avec douleur vio-lente et croûtes gangréneuses. — Accumulation de mucosités dans la bouche, avec angine nocturne; sécrétion de salive augmentée; salivation. — Langue chargée de mucosités blanches, jannes dans le fond; — enduit épais d'un blanc jaunaire; enduit jaunâtre, surtout à la racine, ou bien avec langue soche. Gerge. — Douleurs dans la gorge : en avalant, le matin en se



CHININUM SULFURICUM.

levant; en avalant et en remuant le cou, violentes le matin; chatouillement dans le gosier et le larynx; grattement dans la gorge, quelquefois avec élancements, ou bien avec voix rauque (après midi); sensation de sécheresse dans la fossette du cou, avec sensation comme s'il y avait un corps étranger; brûlement de la gorge. — Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge, quelquefois surtout la nuit, réveillant et forçant à tousser.

Appétit et Goût. - Goût: amer, quelquefois avec langue nette; pâteux, fade; goût de terre; empyreumatique. — Le pain paraît amer. — Absence d'appétit, quelquefois durant plusieurs jours; indifférence pour les aliments et les boissons; absence d'appetit avec faim plus forte. - Fort appétit avec goût désagréable des aliments, ou bien avec forte soif (quelquefois surtout le soir). -Faim avec abattement, comme par le jeune, avec bon appétit ou manque d'appétit; forte faim quelquefois après un repas copieux, se transformant en fudeur et nausées; faim après le souper, accompagnée de nausées, boulimie, quelquefois la nuit.

Symptômes gastriques. - Renvois : après le repas, avec pression dans le ventre et l'estomac et oppression de la poitrine; à vide, quelquefois avec nausées; amers. — Hoquet et vomiturition. · Nausées : avec renvois (à vide ou amers); mouvements dans le ventre et émission de vents; après le repas avec renvois violents. — Dégoût avec maux de tête; dégoût avant le repas; avec nausées, vomissement, céphalalgie, insomnie, boulimie nocturne, appétit diminué, et langue chargée, jaunâtre, sèche; après le repas, avec vomissement et amertume croissante de la bouche; nausées avec envie de vomir. - Vomissement : pendant une fièvre intermittente; avec pression à l'estomac; avec dégoût, pyrosis, sensation de constriction à l'estomac, et enflure du ventre qui dure plusieurs jours; vomissement fade après midi.

Estomac. — Plénitude d'estomac et tension du ventre. — Pression à l'estomac : avec vomiturition, borborygmes dans le ventre et selles liquides; après tout aliment, même le plus léger, agitant la nuit; dans le creux de l'estomac, avec diminution de l'appétit. — Cardialgie (crampes d'estomac), quelquefois avec envie de vomir. - Douleur tiraillante dans l'œsophage, avec borborygmes dans le ventre et émission de vents. - Sensation de chaleur dans le creux de l'estomac et la région précordiale jusque dans le duodenum, avec renvois à vide, ardeur dans l'estomac partant du cardia et s'étendant jusque dans le ventre et la poitrine.

Hypocondres. - Dans les hypocondres : tension, pression dans les précords. — Dans la région hépatique : douleurs, quelquefois surtout vers le soir ; pression soulagée, en appuyant dessus; sensation comme d'ulcération sous-cutanée; gonflement. - Dans la région splénique : douleur sourde se dissipant en appuyant dessus; douleur pressive, tension qui oblige à desserrer les vête-



CHININUM SULFURICUM.

ments (quelquefois dans les deux hypocondres); élancements, gonflement, avec élancements douloureux en marchant et en appuyant dessus. — Gonflement et dureté des régions splénique et hépatique, avec élancements, surtout en respirant profondé-

ment, en éternuant, etc.

Fentre. — Douleurs dans le haut du ventre, depuis la région de l'estomac jusqu'à l'ombilic, aggravées en appuyant dessus; coliques violentes, coliques le matin vers la région de l'estomac; déchirements dans le ventre avec pouls fréquent, petit, irrité. Tranchées dans le ventre : sans évacuation, dans le haut du ventre, quelquefois avec forte lassitude; dans le haut du ventre et la région ombilicale, quelquesois le soir avec vents et mouvements dans le ventre; avec selle diarrhéique fétide, en bouillie, et émission de vents fétides, quelquesois surtout le matin en se levant. - Ballonnement du ventre, quelquefois avec tension, renvois et émission des vents. - Tension du ventre avec douleur en pressant dessus, quelquefois, le soir surtout, avec incarcération de flatuosités, ou bien avec émission de vents fétides. -*Coliques flatulentes, ogonflement météorique. — Mourements dans le ventre comme pour une diarrhée, avec émission de vents, forts mouvements dans les précords avec ballonnement du ven-tre, borborygmes dans le ventre, émission de vents. — Inflammation de longue durée de la membrane muqueuse des intestins. - Phthisie intestinale, avec nausées, vomiturition, absence d'appétit, ventre tendu, pression persistante dans la région ombilicale, constipation, amaigrissement, fièvre étique et alienation.

Selles et Anus. — Constipation opiniatre, avec forte chaleur de la peau, sécheresse de la bouche et du palais, imagination affaiblie et chute dans la rue, momentanée, alternant avec selles fréquentes, selles blanches en bouillie. - Selles dures, manquantes, paresseuses, quelquefois hachées; selles molles, difficiles à évacuer, quelquefois arec besoin ou bien avec sensation comme si un objet remontait depuis la main jusqu'à l'épaule. — Besoin d'aller à la selle, quelquefois sans effet ou bien avec tranchées et suivi d'une évacuation. Evacuation abondante, molle: quelquefois avec émission de rents abondants, ou bien (le matin après le lever), avec selle fétide. - Plusieurs selles dans la journée; diarrhées, quelquefois avec tiraillements et douleurs incisives dans les intestins grêles. - Faiblesse des intestins abdominaux, avec langue nette ainsi que les premières voies. — A l'anus, sensation de chaleur gagnant le reste des intestins abdominaux. — Augmentation des mouvements hémorrhoïdaux, prurit au rectum et ténesme; écoulement de sang artériel par l'anus; flux de sang par le rectum.

Voies urinaires. — Besoin d'uriner avec émission abondante d'une urine comme de l'eau. — Augmentation de sécrétion et



CHININUM SULFURICUM.

d'émission d'urine. - Urine : saturée, qui dépose des cristaux : comme du petit-lait; pâle, claire, avec besoin fréquent; précédée de ballonnement du centre, avec géne de la respiration, chez les hydropiques; abondante, saturée, qui est trouble ou bien a une très-forte odeur d'urine. - Diminution des urines, quelquefois saturées et avec des cristaux. — Urine trouble, rouge, ou bien d'une forte odeur d'urine, se troublant promptement, avec flocons muqueux, derenant jumenteuse avec sediment jaune sablonneux et sédiment couleur d'argile et gras; se décomposant fucilement, avoc cristaux. - Comme de l'eau (spastique), quelquefois avec cristaux. - Urine écumeuse, avec sédiment fin, blanc jaunâtre, en se refroidissant. - Sédiment : blanc jaunâtre, d'odeur forte; couleur d'argile, d'une urine claire comme de l'eau; jaune rougeâtre dans les urines abondantes; forte, couleur de brique. --Gravelle. - Cristaux dans les urines : abondants avec sédiment jaunatre; clairs comme de l'eau, avec sédiment couleur d'argile venant d'une urine claire comme de l'eau; avec sédiment jaune rougeâtre et urines plus abondantes; dans une urine saturée et plus rare. — Après avoir uriné, le soir, cuisson contractive à l'orifice de l'urèthre.


Parties génitales. — Appétit vénérien, supprimé, diminué. —
Pression douloureuse se portant vers les aines. — Règles trop
hâtives. — Pendant les règles, saisissement et serrement dans
le ventre, remontant de l'ombilic dans la poitrine, avec pression
se portant vers les aines. — Écoulement de sang par le vagin avec
ardeur et turgescence de cette partie à la suite de leucorrhée

pendant la menstruation.

Larynx. — Enrouement, tous les après-midi (4 heures), avec constriction, ou bien gonflement qui ferme la gorge, irritation qui fait tousser, géne de la respiration, douleurs dans le front, chaleur à la tête, pouls accéléré, fréquent, mou, pression dans le haut du ventre, et surtout à l'hypocondre gauche, émission de vents fétides, urine saturée qui forme des cristaux et douleur d'une vertèbre pectorale en appuyant dessus. — Irritation qui fait tousser, dans la gorge, quelquefois avec expectoration difficile; forte toux tout le jour, ou bien le soir, difficile à détacher jour et nuit; toussiculation sèche; toux grasse; expectoration de mucosités gélatineuses en toussant.

Poitrine. — Respiration courte et gênée, en se donnant beaucoup d'exercice; oppression de poitrine; respiration gênée, avec ballonnement du ventre, disparaissant rapidement après avoir uriné. — Accès d'éloussement nocturne (angin. ademat. lymph.), vers minuit, avec gonstement de la gorge, qui est presque sermée, respiration génée, ronslante, haletante, sueur sur tout le corps, avec frisson général (surtout au dos); pouls lent, petit, mou; douleur en appuyant sur une vertèbre pectorale; accumulation de mucosités dans la bouche; forte faim, qui oblige à manger; émis-

234



CHININUM SULFURICUM. — CHLORUM.

sion abondante de vents; sommeil paisible après l'accès et disposition des symptômes à reparaître par une toux soutenue. -Douleurs de poitrine, au côté droit, toute la matinée, douleurs au travers de la poitrine. — Pression dans le côté gauche de la poitrine, douloureuse surtout en respirant profondément, et en retirant le bras en arrière, soulagée en appuyant le bras et en se courbant en avant. — Sensation comme si on était saisi par une main derrière le sternum. — Elancements dans la poitrine : vers le cœur, immédiatement après le repas; dans le côté gauche de la poitrine, empêchant de respirer profondément; qui semblent vouloir sortir de la poitrine surtout en étant couché ou assis, se dissipant en marchant ou détant debout; dans le côté droit de la poitrine, remontant vers l'épaule, coupant la respiration, et soulagés en se penchant en avant; douleurs lancinantes au-dessous du sternum, en respirant profondément et par des mouve-ments rapides. — Palpitations de cœur. — A l'extérieur de la poitrine, élancements picotants dans la peau (quelquefois au dos et aux cuisses, le soir), en marchant au grand air, suivis de tranpiration à la poitrine et au dos.

Dos. Reins. — Extrémités. – – Sensibilité douloureuse des rertèbres pectorales, en appuyant dessus, surtout pendant le frisson de la fièrre. — Au cou, douleur des deux côtés des nerfs jugulaires, se portant vers le larynx, avec sensibilité à la pression; gonflement indolent au cou. — Au bras, sensation après chaque selle, comme si des gouttes glissalent depuis la main jusque sons l'aisselle. — Paralysie des extrémités supérieures ; -craquement de l'articulation de l'épaule; déchirements et tiraillements dans les mains. — Paralysie des extrémités inférieures; déchirements dans les jambes; sensibilité douloureuse des malléoles et tremblement des membres; gonflement ædémateux des pieds.

CHLORUM.

CHLOR. - Chlore, - Archives de Stapf. - Hist. nat. et prép. Pharmac.

homop., p. 96.
Antidotes: Contre des effets toxiques: le blanc d'œuf?, du lait?, de la farine?, de la magnésie?, de la craie?, des vapeurs d'alcool?, de l'alcool pris sur du sucre?, de l'hydrogène sulfureux, attènué.— Sert d'antidote contre l'acide hydrocyanique et les hydrosulfates des substances ammoniacales.

GENERALITÉS. — Paraît exercer une action particulière sur le système des membranes muqueuses. — Chez les personnes habituées aux vapeurs du chlore, les effets de cette substance consistent en faiblesse et disparition de la graisse. -- Enroidis-



CHLORUM.

236

sement des membres. — Tremblement. — Lassitude. — Envie de rester couché. — Faiblesse dans les extrémités inférieures. — Au grand air : larmoiement; amélioration des souffrances de poitrine, et du frissonnement ainsi que de la fièvre en se promenant. — Horripilations plus fortes au soleil. — Le matin : Réveil vers les 3 heures, avec angoisse; goût de la bouche, comme dans la fièvre; faiblesse dans le ventre; diarrhée; éternument; larmoiement; roideur des membres; difficulté de se lever; humeur irascible. — Après midi : Écoulement du nez; plus indisposé après le repas. — Le soir : Moins d'appétit; coryza subit; attaque de toux; horripilation; frissonnement. — Paraît agir plus promptement quand il est pris le soir.

Peau. — Peau du nez comme excoriée. — Appliqué sur la peau, le chlore produit une sensation semblable à la piqure d'insectes, avec transpiration abondante, congestion de sang à la peau, et même éruption de petites nodosités et de vésicules. — Produit des éruptions dartreuses et des sueurs critiques. — °Gale et dar-

tres. - OUlcères fétides et carcinomateux.

Sommeil. — Sommeil tardif, après chaque excitation de l'esprit, les premiers jours; plus tard, sommeil le soir de bonne heure. — Le matin, difficulté de se lever et mauvaise humeur. — En s'éveillant le matin vers les 3, 4 heures, sensation comme si une grave

maladie allait se déclarer.

Fièvre. — Frissons, horripilation et grelottement le soir dans la chambre chaude. — Horripilation le matin, plus forte au dos et augmentée au soleil. — Fièvre le matin vers les 10 heures jusqu'à 2 heures du soir; horripilation froide à la partie antérieure des bras, du dos et des cuisses, avec trouble de la vue, et mal de tête avant l'accès; puis, après le repas, augmentation de la chaleur et malaise qui force à se coucher, quoique la promenade dans la chambre produise plus tard du soulagement. — Chaleur pendant et après le repas, avec humeur très-irascible. — Chaleur dans l'estomac et dans les voies aériennes. — Fièvre et rhume de cerveau. — Produit des crises par la sueur. — °Typhus?, °fièvre scarlatine?, °sueur chez les phthisiques améliorée.

Moral. — Moral très-fatigué, jusqu'au point de craindre de devenir fou, de ne pouvoir faire face à ses affaires; tout paraît confus, avec impossibilité de se rappeler rien. — Grande difficulté de se rappeler le nom des personnes qu'on voit, ou bien de se rappeler les personnes en voyant leurs noms. — Accès d'une grande angoisse. — Très-mauvaise humeur et grande irascibilité, surtout

le matin.

Tête. — Vertiges et étourdissements. — Sensation douloureuse et fatigante dans le vertex et le long du côté gauche de la tête, avec besoin de se coucher. — Mal de tête avec le rhume, avec les horripilations, et après le repas.

Yeux. - Larmoiement, surtout au grand air, le matin au réveil et



CHLORUM.

237

pendant le rhume. — Yeux proéminents. — Vue trouble pendant la fièvre.

Oreilles. — Tintement dans les oreilles.

Mes. — Membrane muqueuse du nez sensible. — Sensation comme si les angles du nez étaient excoriés. — Écoulement d'une eau corrosive du nez. - Sécheresse du nez, ou sensation d'une sécheresse étouffante; avec excitation à la toux dans le larynx, se transformant plus tard en coryza. — Coryza violent, avec forte affection de la membrane muqueuse du nez et de la bouche. Écoulement de la narine droite, avec obturation de la narine gauche. — Le soir, subitement, écoulement de sérosités corrosives du nez, avec obturation du nez, larmoisment et sécheresse de la langue, du palais et de l'arrière-gorge. — Le matin, violent éternument, après le coryza du soir. - An bout de vingt-quatre heures, le coryza se transforme en sécrétion d'un mucus jaune, comme celui d'un rhume mûr.

Face. — Teint plus coloré. — Face bouffie.

Dents. — Sensation de plénitude dans les dents.

Bouche et Gorge. — Membrane muqueuse de la bouche fortement affectée. — Excoriation et petits ulcères dans la bouche, la gorge et le pharynx, avec rougeur. — Impossibilité d'avaler. — oUlcères putrides à la gorge?, cangines, malignes?. — Sécheresse dans la bouche, à la langue, au palais et dans la gorge, sans soif; beaucoup de glaires dans la bouche. — Salivation.

Appétit et Coût. — Appétit pour le vin augmenté. — La fumée du tabac répugne et produit une sensation mordicante à la langue et de la sécheresse à la gorge. — Vomissement de matières

brun verdâtre, cris et mort (chez un chien).

Estomac. — Agit sur la membrane muqueuse de l'estomac comme un excitant. — Aigreurs de l'estomac chez les ouvriers en chlore. Après la mort, membrane muqueuse de l'estomac d'un rouge noir ou cerise; au pylore, taches noires avec des croûtes ou des trous; ulcères d'un bord jaunâtre au fond de l'estomac.

Ventre. — Faiblesse dans le ventre le matin. — Affections non inflammatoires du foie?. — Après la mort, couche épaisse et jaune (de bile) dans le duodenum et le jejunum. — La qualité de la

bile se trouve altérée.

Selles. — Selles diarrhéiques, le matin surtout. Urines. — Envie fréquente d'uriner. — Urines plus abondantes.

Parties génitales. — Impuissance subite, voire même répugnance complète pour toute jouissance sexuelle; les plus fortes excitations laissent froid (après la cessation de la cause, totalement enlevée par *lycop*., ce qui prouve combien il était absurde de vouloir nier l'action du lycopode, comme certains soi-disant critiques avaient en l'arrogance de le faire. (Note du docteur Hering.) — Syphilis?.

Laryax et Toux. — Accès de suffocation et toux, suivis souvent



CHLORUM. — CICUTA.

d'un rhume opiniatre. — Irritation violente dans le larynx, la trachée-artère et les bronches, avec oppression et pression à la poitrine, impossibilité d'avaler, sensation d'un plus grand bien à l'air libre (cependant sans diminution de l'oppression et de la constriction), grande angoisse qui ne permet de prononcer que des paroles entrecoupées, respiration difficile, forte affection de la membrane muqueuse du nez et de la bouche, accumulation de mucosités dans la bouche, coryza violent, face bouffie, yeux proéminents, toux spasmodique (allégée par la respiration d'acide hydrosulfurique). — Sensation d'étranglement et de constriction de la poitrine (par la respiration du chlore). — Inflammation de la membrane muqueuse des bronches. — Produit des hémoptysics, la phthisie et la mort, lorsqu'il est respiré en grande quantité; en moins grande quantité, il produit la toux et des oppressions, ou bien une sensation de chaleur dans les voies aériennes et des expectorations plus faciles. — Spasme dans la glotte.

Poitrine. — Oppression de la poitrine, gêne de la respiration, constriction de la poitrine et accès de suffocation, parfois avec toux violente. — Après la mort, cœur rempli de sang veineux, les plèvres couvertes de fausses membranes, et contenant des séro-

sités rougeâtres.

238

Tronc. — Mouvements convulsifs violents du cou et de la colonne vertebrale, tirant la tête en arrière. — Le matin, moins de roideur au dos, comme autrefois, mais roideur dans tous les membres.

Extrémités inférientes. — Faiblesse dans les cuisses.

CICUTA.

CIC. — Cigué d'eau. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 191. — Dose usuée: 80. — Durée d'action: jusqu'à 4, 5 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.

Antidotes : Arn. tabac (en cas d'empoisonnement). — La cigué est antidote de : Op.

COMPARÉR AVEC: Arn. con. lyc. merc. op. puls. thui. sil. veratr. — C'est p surtout après lach que la ciguë se montre efficace, lorsqu'elle est d'ailleurs indiquée.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Convulsions, spasmes hystériques, épilepsie, éclampsie, catalopsie, tétanos, trismus, et autres affections spasmodiques, sartout chez les femmes et les enfants, ou par abus de l'opium; Sultes facheuses de l'introduction de corps étrangers (d'une écharde, etc.), dans les parties molles; Dartres humides et croûteuses; Congestions et autres



CICUTA.

289

affections cérébrales, aussi par suite de commotion du cerveau; Teigne; Amblyopie amaurotique, avec affection cérébrale; Hémorrhagie des oreilles; Durett, de l'ouie; Ozène?; Dartres faciales; Croûtes de lait?; Cancer aux livres?; Ulcères dans la bouche (après l'emploi de laches.); Trismus; Bégaiement?; Affections gastriques; Affections vermineuses, avec convulsions; Paralysie de la vessie?; Convalsione des femmes en couches; Crampes de la poitrine, etc., etc. Vov. la note, vage 15.

SYMPTOMES CENERAUX. — Douleurs d'excoriation, ou comme si l'on s'était donné des coups, à différentes parties. *Tremblement des membres. — *Secousses, comme par des étincelles électriques, dans la tête, les bras et les jambes. — *Contorsions crampoides et tressaillements des membres. — *Convulsions générales et attaques d'épilepsie, quelquefois avec cris, pâleur ou couleur jaune du visage, serrement des mâchoires. étourdissement et distorsion des membres, suspension de la respiration, et écume à la bouche; après l'accès, le corps reste insensible et comme mort. — État d'insensibilité et d'immobilité, avec perte et connaissance et de forces. — *Accès de catalepsie, avec relâchement de tous les muscles, et absence de la respiration. - *Tétanos. - *Douleurs tractives dans les membres

Pean. — Démangeaison brûlante par tout le corps. — *Éruptions purulentes, avec croûtes jaunâtres et brûlantes. — Boutons len-

ticulaires d'un rouge foncé. — Prurit brûlant par tout le corps.

Semmeil. — Insomnie et sueur nocturne. — *Demi-sommeil, avec mouvements inquiets et rêves confus. — Réveil fréquent, avec sueur forte mais qui soulage. — Rêves vifs des événements de la journée.

Fièvre. — Friesons et désir perpétuel d'être auprès du feu. -

Froid aux cuisses et aux bras, avec fixité du regard.

Meral. — Anxiété et grande facilité à être vivement affecté en entendant des récits tristes. — Gémissements, plaintes et hurlements. — Mécontentement et mauvaise humeur. — Soupçons et mésiance, avec misanthropie. — Disposition à s'esfrayer. avec danses, rires et gestes ridicules. — Démence. — Étourdissement et absence d'esprit.

Tête. — Vertiges et chancellement au point de tomber. — Vertiges tournoyants en se redressant dans le lit, avec obscurcissement de la vue. — Ivresse. — Mal de tête au-dessus des orbites. - Accès de céphalalgie semi-latérale, avec nausées. - Pesanteur de la tête, avec étourdissement. — Pression stupéfiante au front. — Diminution des douleurs à la tête, en se redressant et en émettant des vents. — Mal à la tête, comme par commotion du cerreau. - * Éruptions suppurantes au cuir chevelu, avec



240 CICUTA.

douleurs brûlantes. — Tressaillements et secousses spasmodiques

à la tête, qui fléchit en arrière.

Yeux. — Douleur brûlante dans les yeux. — *Pupilles ou trèsrétrécies, ou dilatées. — *Perte momentanée de la vue, avec vertiges en marchant. — Regard fixe, parfois avec une sorte d'absence d'esprit. — °Vacillement de tous les objets devant la vue. — °Mobilité des caractères en lisant. — *Diplopie ou obscurcissement des yeux, quelquefois alternant avec dureté de l'ouïe. — Cercle lumineux et coloré autour de tous les objets que l'on voit. — °Photophobie. — *Agglutination nocturne des paupières.

Oreilles. — Sensation d'excoriation et douleur de contusion derrière les oreilles. — *Éruptions purulentes devant, derrière et sur les oreilles. — Écoulement de sang par les oreilles. — Ouïe indistincte, quelquefois alternant avec obscurcissement des yeux.

tincte, quelquefois alternant avec obscurcissement des yeux.

Nez. — Douleur d'excoriation et de meurtrissure à l'aile du nez.

— °Croûtes dans les narines. — Écoulement jaunâtre par le nez. — Obturation du nez, avec sécrétion abondante de mu-

Visage. — Pâleur et froid du visage, avec mains froides. — Joues pâles, avec yeux cernés et abattus. — Rougeur et gonflement de la face et du cou. — *Éruption à la face, confluente, purulente et d'un rouge foncé, avec boutons lenticulaires sur le front. — Croîtes brûlantes avec sérosités jaunâtres sur la lèvre supérieure, les joues et le menton. — Ulcère douloureux aux lèvres. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires. — *Trismus. — *Disposition à grincer des dents.

Bouche et Gorge. — Écume devant et dans la bouche. — Pustules blanchâtres, douloureuses au toucher, et ulcères au bord de la langue. — Parole embarrassée, avec mouvements convulsifs de la tête et des bras à chaque mot que l'on prononce. — Mutisme.

- Impossibilité d'avaler ; la gorge est comme fermée.

Appétit. — Manque d'appétit à cause d'une sensation de sécheresse dans la bouche. — *Satiété et pression dans l'estomac, après la première bouchée. — Grand désir de manger du charbon. — Soif ardente, surtout pendant les crampes. — Après le repas, coliques, tranchées, pression à l'épigastre et envie de dormir.

Estomac. — Hoquet violent et bruyant. — Régurgitation amère et jaunâtre en se baissant, et suivie d'une sensation brûlante dans la gorge. — Nausées le matin et pendant le repas, quelquefois avec mal à la tête. — Vomissement de sang. — Vomissements, alternant avec spasmes toniques dans les muscles de la poitrine et mouvements convulsifs des yeux. — Pression brûlante à l'estomac. — Douleurs pulsatives à l'épigastre, qui est fortement ballonné. — Oppression et anxiété dans la région de l'épigastre.

Ventre. — °Coliques avec convulsions, comme par des vers. — Tranchées, immédiatement après le repas, avec envie de dormir. — °Pincements et borborygmes dans le ventre. — Accumulation



CICUTA. - CINA.

de flatuosités avec angoisse et mauvaise humeur. — Douleur d'ulcération dans les aines.

Selles et Urines. — Constipation. — Selles liquides et par trop fréquentes. — Rétention d'urine. — Besoin fréquent d'uriner. Urines involontaires comme par paralysie de la vessie.

Poitrine. — Enrouement. — *Respiration génée et manque d'haleine. — Toux avec expectoration abondante. — Pression sur la poitrine, comme par un poids, avec gêne de la respiration. — *Spasmes toniques dans les muscles de la poitrine, alternant avec vomissement. — Chaleur dans la poitrine. — Douleur de meurtrissure et d'excoriation à l'extrémité inférieure du sternum. -Douleur de brûlement aux mamelons.

Dos. — Renversement spasmodique du dos. — Tension au-dessous des omoplates. — Douleur d'ulcération aux omoplates. — Tension comme par une plaie dans les muscles du cou, en renver-

sant la tête en arrière. - Gonflement du cou.

Bras. — Douleur de meurtrissure ou d'excoriation dans les articulations de l'épaule et dans les avant-bras. — Sensation de pesanteur et manque de force dans les bras. — *Tressaillements et mouvements convulsifs dans les bras et les doigts. - Doigts morts.

Jambes. - Tressaillement involontaire des membres inférieurs. - Roideur douloureuse des jambes. - Tremblement des jambes.


- Fléchissement des pieds pendant la marche.

CINA.

CIN. — Armoise d'Alep (non de Judée). — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p 192. — Doses usitées: 9, 30. — Durée d'action: 14 à 21 jours dans quelques cas de maladies chroniques. Antidotes: [pec?. — On l'emploie comme antidote de : Chin. COMPARER AVEC: Arn. bell. bry. calc. caps. cham. chin. fer. hep. ignat. ipec. phos. sabad. — C'est surtout après arn. et hyos. que le cina se moutre effeces lorsen il des d'alleurs indiend.

montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des enfants; Faiblesse par suite de perte d'humeurs; Atrophie?; Affections scrofuleuses; Convulsions, épilepsie, éclampsie, et autres affections spasmodiques; Fièvres intermittentes, aussi celles des marais; Affections cérébrales, encéphalite, hydrocéphale aigue des enfants; Amblyopie amaurotique, aussi par suite de la masturbation; Taches de la cornée; Affections gastriques;



CINA. 242

Affections vermineuses; Pissement au lit; Coqueluche, principalement chez les enfants scrofuleux ou souffrant de vers, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Douleurs paralytiques, tractives, dans les membres. - Pression et serrement avec lancinations obtuses ou déchirements crampoides, tiraillements et tressaillements, on elancements brulants dans diverses parties .- Convulsions et distorsion des membres. - Convulsions épileptiques nocturnes, suivies de mal à la tête. - Convulsions épileptiques avec cris, renversement sur le dos, et mouvements violents des mains et des pieds. - Roideur tétanique de tout le corps. - La pression extérieure aggrave ou renouvelle les souffrances. - Sensibilité douloureuse de tous les membres au mouvement et au toucher. - La plupart des souffrances apparaissent la nuit, ou en étant assis, et s'aggravent le matin et le soir. - Lourdeur dans les membres.

Sommeil. - Baillement frequent, avec tremblement et horripilation. - *Insomnic nocturne, avec agitation, pleurs, cris, cha-

leur et angoisse.

Fièvre. - Horripilation fréquente avec tremblement, même auprès du feu. - *Fièvres quotidiennes ou otierces, *avec boulimie, nausées, langue nette, diarrhées, pupilles dilatées et amaigrissement. — Frissons le soir. — °Forte chaleur fébrile avec délire, jactation et agitation. — *Chaleur, surtout à la tête, avec pâleur ou couleur jaunâtre de la face et yeux cernés, -ou avec rougeur des joues. - Après la fièvre, mal à la tête. -Sueur froide au front et aux mains.

Moral. — *Humeur pleureuse et plaintes. — L'enfant pleure lorsqu'on le touche. - Inquiétude perpétuelle, avec désir de toutes sortes de choses qu'on rebute quelques instants après. — Grande angoisse et anxiété, en se promenant au grand air. — Délire.

Tête. — Mal à la tête, alternant avec pression dans le bas-ventre. - Pression étourdissante comme par un fardeau qui pèse sur la tête, surtout en se promenant au grand air. — Céphalalgie déchirante, tractive, aggravée par la lecture et la méditation. — Douleurs sourdes dans la tête, avec yeux fatigués principalement le matin en s'éveillant.

Yeux. — Pression aux yeux en les fatigant par la lecture. — Mouvements convulsifs des muscles des sourcils. — Trouble de la vue en lisant, qui disparaît en se frottant les yeux. - *Pupilles dilatées. - *Vue faible avec photophobie et pression dans les yeux, comme si du sable s'y était introduit.

Noz. — Epistaxis. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — Ecoulement de pus par le nez. - Éternument violent, qui provoque une sensation de pression dans les tempes, et semble devoir



244 CIMICIFUGA RACEMOSA. — CINNABARIS.

la main et des doigts. — Faiblesse de la main; elle laisse tout échapper. — Douleurs paralytiques et *crampoïdes*, et tiraillements dans les jambes. — Extension crampoïde des jambes.

CIMICIFUGA RACEMOSA.


CIMIC. - Christophoriane en grappes. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé avec succès contre les affections suivantes :

Convulsions épileptiformes, pendant ou peu avant l'apparition des règles. - Chorée, aggravée pendant les règles, et affectant surtout le côté gauche. - Nymphomanie et autres aliénations mentales, avec forte surexcitation du système nerveux et du moral. -Méningite cérébrospinale, avec céphalalgie violente, comme si à chaque pulsation du cœur un coin était poussé de la nuque au vertex, avec dos roide, spasmes cloniques et toniques, douleurs violentes dans le globe des yeux et langue enflée. - Prosopalgie, surtout lorsqu'il y a en même temps affection des ovaires. — Dans la phthisie tuberculeuse, contre les congestions et inflammations pulmonaires, à la suite d'un froid, avec toux sèche et fatigante; ainsi que contre la diarrhée et les sueurs nocturnes. — Pleurodynie du côté droit, aggravée par le mouvement jusqu'à faire pousser des cris. - Métrorrhagie avec sang coagulé et couleur foncée, douleurs dorsales violentes jusque dans les hanches et les cuisses, humeur pleureuse, surexcitation nerveuse, convulsions hystériques et douleurs violentes dans la tête et le globe des yeux, aggravées par le moindre mouvement. - Suppression des règles, à la suite d'un froid ou d'une émotion morale, avec douleurs rhumatismales dans les membres, céphalalgie violente ou crampes utérines. - Dysménorrhée avec les mêmes symptômes indiqués à la Métrorrhagie (ci-dessus). - Sciatique, lorsqu'il y a affection des ovaires ou de l'utérus. - Rhumatisme articulaire des membres inférieurs, avec forte chaleur et enflure des parties affectées. — Douleurs violentes, aiguës, dans la tête, les yeux, les oreilles, ou dans le ventre, pendant la grossesse ou à la suite d'une fausse couche.

CINNABARIS.

CINN. — Cinabre. — Sulfure rouge de mercure. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 97. — Doses usitées: 9, 30. — Durée d'action: jusqu'à 3 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.



CINNABARIS,

245

CLINIQUE. — On n'a encore employé ce médicament que contre des Excroissances sycotiques, des Flueurs blanches et des Coryzas corrosifs.

SYMPTONIA GÉNERAUX. — Froid dans les articulations. —
Tiraillements et horripilation dans les bras et les jambes. —
Doulours paralytiques dans les membres, avec paresse et envie de
dormir, — Insomnie nocturne qui cependant ne fatigue pas. —
Cauchemar après minuit.

Tête et Nen. — Accès de céphalalgie violente et affreuse, au sinciput et aux tempes, soulagés par la compression de la tête. —
Bourdonnement stupéfiant dans la tête, peu après le diner et le soir avant le coucher. — Élancements aux téguments de la tête. — Sensibilité douloureuse du crâne et des cheveux au toucher. — Inflammation des yeux avec élancements pressifs et larmoisment continu, en les fixant sur un objet. — Violent corysa fluent avec sécrétion de sérosités brûlantes.

Bouche et Appétit. — Sensation brûlante, contractive au palais. — Salivation. — Sécheresse et chaleur nocturne dans la bouche et la gorge, avec forte soif. — Contractions pressives dans la gorge, en avalant à vide. — Manque d'appétit avec dégoût pour tous les aliments. — Après le repas, sensation désagréable de gonfement de tout le corps, avec serrement à la poirtine et à l'estomac. — La nuit, chaleur qui monte de l'estomac vers le cou et la tête, et se dissipe quand on se redresse dans le lit.

Selles et Urines. — Selles molles, fréquentes, précédées de pincements dans le ventre. — Diarrhées nocturnes opiniâtres, sans coliques. — Douleur d'excoriation dans l'urèthre en urinant.

Parties génitales. — Gonflement de la verge. — Gonorrhée bâturde avec rougeur et gonflement du prépuce. — Éruption granulée au gland. — *Condylomes. — Appétit vénérien fortement exalté et grande disposition au coït arec appétit prononcé pour le boire et le manger. — Fortes érections le soir au lit. — Busurs fétides et corrosives, entre le scrotum et les cuisses, en marchant.

Poitrine. — Toux sèche, à traits isolés, en étant couché. — Douleurs pulsatives et lancinantes dans la poitrine, surtout en marchant.

Tronc. — Déchirement dans le côté du dos, même la nuit en se remuant dans le lit, soulagé par la chaleur du feu. — Douleurs de luxation dans les vertèbres du cou.

Membres. — Déchirements dans les bras, en écrivant, soulagés par la chaleur du feu. — Fort élancement dans le bras. — Tressaillement douloureux dans la jambe, le soir, après s'être endormi.



CISTUS CANADENSIS.

246

CISTUS CANADENSIS.

CIST. — Ciste hélianthème. — HERING. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 494 — Doses usitées: 1 (souffrances scrofuleuses), 45 (affections des voies aériennes).

COMPARER AVEC : Bell. carb-veg. phos. médicaments qui peuvent être administrés en alternant avec le cisie, lorsqu'ils sont d'ailleurs indiqués.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra lés cas où ce médicament pourra être consulté contre : —
Engorgement des glandes avec suppuration, ulcères et autres affections scrofuleuses; Affection scorbutique des gencives; Otorrhée purulente; Carie de la mâchoire; Laryngite chronique, etc., etc.
Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Le soir, douleurs aux genoux, à la main droite et à l'épaule gauche. — ⁰Aggravation des souffrances le matin. — Douleurs tractives dans les parties musculeuses des mains et des extrémités inférieures, avec douleurs aux articulations de la main, des doigts et des genoux. — Douleurs déchirantes et tractives dans toutes les articulations, surtout dans celles des genoux et des doigts. — ⁰Glandes engorgées et ulcérées. — Douleur de meurtrissure et sensation de lassitude dans tous les membres. — *Pieds froids. — *Disposition frileuse. — Frissons violents avec tremblement, suivis de chaleur fébrile, avec oreilles rouges et gonflées et engorgement des glandes du cou. — Chaleur avec soif qui force à boire abondamment. — Prurit sur tout le corps sans éruption. — Chaque altération aggrave fortement les souffrances. — Suites facheuses d'un chagrin.

Tête et Yeux. — Mal pressif à la tête avec pression au-dessus des yeux et au front. — Sensation de pesanteur au-dessus des yeux. — Élancements à l'œil gauche. — Sensation à l'œil comme si quel-


que chose y tournoyait, avec élancements.

Oreilles. — Gonflement depuis l'oreille jusqu'à la joue. — Gonflement dans l'intérieur des oreilles. — Oreilles bouchées par gonflement, avec écoulement. — écoulement de sérosités et d'un pus fétide par les oreilles.

Nez. — Sensation de brûlure dans la narine gauche. — Inflammation et gonflement douloureux de la narine. — Éternument sans

coryza ni autre cause.

Visage. — Sensation comme si les muscles du visage se tiraient de côté. — Chaleur et ardeur dans les os du visage. — Chaleur pas-



CISTUS CANADENSIS. — CLEMATIS ERECTA.

247

angère au visage. — «Érysipèle vésiculaire au visage. — «Carie de la mâchoire inférieure.

Bouche et Gorge. — Gencives gonfiées, décollées, saignant facilement et d'un aspect dégoûtant. — Mal à la langue, qui paraît comme exceriée. — «Sécheresse de la langue et du palais. — «Démangeaison périodique dans la gorge. — «Chatouillement et douleur d'exceriation dans la gorge, surtout le matin. — Sensation continuelle de sécheresse — et de chaleur dans la gorge. — Sensation insupportable à la gorge, en avalant la salive pour soulager la sécheresse. — «Sensation comme s'il y avait du sable dans la gorge. — «Amélioration des maux de gorge après le repas. — «Douleurs dans la gorge en respirant à l'air frais. — «Sensation de mollesse dans la gorge. — «A chaque émotion, élancements dans la gorge, obligeant à tousser. — *Expectoration difficile de mucosités très-tenaces.

Estemac, Selles. — "Nausées fréquentes. — Douleurs à l'estomac après le repas. — Élancements à l'hypocondre gauche. — Flatuosités abondantes et sensation de malaise dans le ventre. — Diarrhée passagère. — Diarrhée après avoir mangé des fruits.

Poitrine. — *Haleine fétide. — Douleurs au larynx. — *Pression sur la poitrine. — Sensation de plénitude dans la poitrine. — Le soir, après le coucher, fourmillement par tout le corps, avec respiration difficile et anxiété soulagées par l'air frais. — *Toux excitée par des élancements dans la gorge. — Expectoration de mucosités amères.

Trenc et Membres. — Sous l'omoplate, tache rouge, douloureuse au toucher et suivie d'une éruption érysipélateuse, avec douleurs brûlantes qui s'aggravent au toucher. — Le soir, douleurs violentes à l'épaule et à la poitrine, avec envie de les soulager en y frappant du poing. — Engorgement et suppuration des glandes du cou. — Douleurs à l'épaule. — Douleurs de luxation au poignet, avec douleurs tractives et rongeantes. — Après midi, douleurs violentes à la main, empêchant de s'en servir. — Douleurs aux doigts en écrivant. — Douleurs déchirantes à la cuisse en marchant. — Douleurs aux genoux et à la cuisse en marchant et en étant assis. — Le soir, élancements violents dans l'orteil.

CLEMATIS ERECTA.

CLEM. — Clématite droite. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop, p. 196. — Doses usitées: 6, 30. — Durée d'action: jusqu'à 6 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Bry. camph.
COMPARER AVEC: Bell. bry rhus. sass.



CLEMATIS ERECTA.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : - Souffrances par l'abus du mereure; Rhumatisme articulaire; principalement par suite de gonorrhées supprimées; Éruptions de dartres croûteuses; Excroissances fongueuses?; Ulcères carcinomateux?; Mélancolie?; Migraine et autres espèces de céphalalgies?; Teigne?; Ophthalmies chroniques; Cancer aux lèvres?; Rétrécissement de l'urèthre, orchite, engorgement et induration des testicules et autres affections des voles urinaires et des parties génitales, par suite d'une gonorrhée supprimée; Gonorrhée chronique?; Engorgement et induration des glandes; Nodosités

Voy. la note, page 15,

arthritiques : Cancer au sein ?; etc., etc.

248

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Mouvements convulsifs des muscles à diverses parties du corps. - Relâchement des muscles. -Grand amaigrissement. - Fatigue de tous les membres, surtout après le repas, avec battement dans toutes les artères. - Réson-

nement dans tout le corps après s'être couché.

Peau. — Eruptions miliaires opiniatres, — Eruptions vésiculaires au corps. - Dartres squameuses, avec écoulement d'un pus sanieux, jaunâtre et corrosif, et avec rougeur, chaleur et gonflement de la peau. — Dartres opiniatres, rongeatres et suintantes, avec démangeaison insupportables à la chaleur du lit. — Les dar-tres sont rouges et humides pendant que la lune croît, mais pâles et sèches à la lune décroissante. - Douleur brûlante ou fourmillement et pulsation dans les ulcères, avec élancements dans les bords au toucher. - Pustules galeuses par tout le corps.

Sommeil. - Forte envie de dormir, le jour, même le matin après s'être levé. — Insomnie le soir et la nuit. — Sommeil, avec rêves fréquents, agitation et jactation. - Le matin, sensation comme

si l'on n'avait pas assez dormi.

Fièvre. — Fièvre quarte, qui consiste en horripilation, suivie de sueur. — Sueur au réveil, avec sensibilité de la peau, telle qu'on ne peut supporter d'être découvert.

Moral. - Tristesse et appréhensions. - Morosité. - Aversion pour

la conversation. — Indifférence.

Tête. — Le matin, embarras et lourdeur de la tête. — Tension pressive dans le front et les côtés de la tête, ainsi que dans les os du crâne. — Pression fouillante dans le cerveau. — Térébration dans les tempes. - Martellement et coup dans la tête. - Boutons purulents au front, douloureux au toucher. - Douleurs brûlantes, incisives dans la peau du front. - Eruptions à la tête; phlyctènes suintantes à l'occiput et à la nuque.

Yeux et Oreilles. - Pression sur le globe de l'œil. - Cuisson dans les yeux et aux bords des paupières, surtout en les fermant.



CLEMATIS ERECTA. - COCCULUS.

de la poitrine et du ventre. -- Élancements dans la poitrine,

aggravés en inspirant.

Membres. — Pustules pruriantes autour du cou, avec exceriation après s'être gratté. — Dartre humide depuis la nuque jusqu'à l'occiput. — °Gonflement des glandes axillaires. — Pression ou tiraillement dans les muscles des bras et des mains. — °Nodosités arthritiques aux articulations des doigts. — Éruption de pustules dans la région des lombes. — Déchirements dans les cuisses. — °Dartres squameuses à la cuisse. — Furoncles à la cuisse. — Vésicules rongeantes aux mains et aux doigts, avec gonflement; l'eau froide aggrave les souffrances.

COCCULUS.

COCC. — Coque du Levant. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 497. — Doses usitées : 4!, 30 — Durée d'action : 20 à 30 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.


ANTIDOTES : Camph. n-vom . - On l'emploie comme ant dote de : Cham. cupr.

ign. n-vom.

250

COMPARER AVEC: Ant. ars. carb veg. cham. coff. colch. cupr. ign. iod. ipec. merc. mosch. natr. natr-m. nitr. n-vom. oleand. puls. rhus. sabin. sass. stram. tart. veratr. — C'est surtout après ipec. que le cocculus convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections des personnes (surtout des femmes) d'un tempérament doux et flegmatique; ou bien d'un tempérament bilieux et colérique; Souffrances par suite d'une colère ; Suites fâcheuses de l'abus de la camomille; Affections causées par le mouvement d'une voiture, d'une balançoire ou d'un navire; Faiblesse nerveuse; Syncope chez les personnes hystériques; Paralysie surtout des membres inférieurs, avec exaltation du système nerveux; Spasmes et convulsions, surtout chez les femmes hystériques et mal réglées; Convulsions traumatiques; Affections arthritiques; Danse de Saint-Guy; Fièvres, avec affections bilieuses ou gastriques, même par l'abus de la camomille; Fièvres lentes avec faiblesse nerveuse, surtout après de fortes maladies aigues, des fièvres typhoïdes, le choléra, etc.; Congestion cérébrale et apoplexie, même par suite d'évacuations sanguines; Migraine et céphalalgie hystérique; Esophagite?; Affections gastriques et bilieuses, aussi celles causées par les mouvements de la voiture, etc.; Mal de mer; Gastralgie, aussi par suite de faiblesse; Coliques spasmodiques et flatulentes; Hernies inguinales (chez les enfants); Coliques menstruelles; Dysménorrhée, avec souffrances spasmodiques; flueurs blanches, crampes de la matrices et autres souf-



COCCULUS.

frances des femmes vierges ou qui n'ont pas eu d'enfants; Ténesme de la vessie chez les femmes enceintes; Crampes de poitrine; Palpitations de cœur; *Tabes dorsalis?*; Goutte aux mains et aux piales Goutte arthritique, etc., etc.

Voyes la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tiraillements et déchirements paralytiques, par accès ou continus, dans les membres et dans les os. - Mouvements convulsifs des muscles à diverses parties. Douleurs ostéocopes, fouillantes, dans les membres. — Douleurs de meurtrissure, même dans les organes internes. — *Sensation de vacuité ou de constriction dans les organes internes. — Sensibilité douleureuse des membres au plus léger contact. — Roideur douloureuse et craquement des articulations. — *Souffrances semi-latérales. — Douleurs rhumatismales, avec gonflement chaud des parties affectées. — Douleurs lancinantes dans les tumeurs froides. — Engorgement et induration des glandes. — Hémorrhagies. — *Crampes et convulsions des membres et de tout le corps, equelquefois provoquées par des ulcères, ou des plaies, doulouremement sensibles au contact, ou en essayant de faire usage des parties affectées. — Mouvements convulsifs des membres et des muscles, comme dans la danse de Saint-Guy. oPendant les accès de convulsions, face rouge, bouffie et chaude. - Tremblement des membres. — Attaques d'épilepsie, — *Paralguies, principalement semi-latérales, avec insensibilité des parties affectées. - *Aggravation des souffrances par le sommeil, la parole, le boire et le manger, mais surtout en prenant du café ou en fumant du tabac, ainsi que par l'air froid. — Faiblesse et pertes des forces, après la moindre fatigue corporelle, le mouvement ou l'interruption du sommeil.—Manque d'énergie vitale. - *Évanouissement. - Engourdissement, tantôt des pieds, tantôt des mains, par accès passagers. — Le grand air est insupportable, qu'il soit chaud ou froid. - OAmaigrissement.

Peau. — Fort prurit, surtout le soir, en se déshabillant, ou la nuit au lit. — Boutons rouges et semblables à des grains de millet, avec démangeaison à la chaleur. — Éruptions de boutons durs et noueux, avec auréole rouge et douleur brûlante. — Taches vineuses, rouges, à la poitrine et aux côtés du cou. — *Couleur pâle

de la peau.

Sommeil. — Besoin opiniâtre de dormir, le matin. — Baillement spasmodique. — Sommeil tardif par suite d'une grande affluence d'idées. — Demi-sommeil, comme un coma vigil. — Sommeil interrompu par une angoisse et une inquiétude affreuses. — Pendent le sommeil, surrants, cris, mouvements convulsifs des mains, des yeux et de la tête. — Réves ancieux, effrayants



COCCULUS.

252

rêves de mort, de maladies, etc. - Peur de revenants, la nuit. -

Sommeil non réparateur, avec réveil fréquent.

Fièvre. — Frisson et sensation de froid avec tremblement. — °Le soir, frissons et horripilations au dos. — Fièvre, avec disposition frileuse, bien que la peau soit chaude au toucher. — Chaleur brûlante et rougeur des joues, souvent avec froid aux pieds. — °Fièvre, avec douleurs crampoïdes à l'estomac et faiblesse paralytique dans les reins. — Transpiration facile pendant le mouvement, avec grande fatigue.—Sueurs la nuit et le matin.— °Pouls plein, dur et fréquent.

Moral. — *Préoccupation et réflexions tristes et mélancoliques, comme si l'on avait eu à souffrir des offenses. — 'Humeur hypocondriaque; désespoir. — *Forte appréhension anxieuse, inquiétude et peur de la mort. — *Disposition à s'effrayer. — *Susceptibilité excessive. — Disposition à prendre tout en mauvaise part et à se fâcher. — Manie. — On se trompe sur la durée du

temps; il passe trop vite. - Pleurs fréquents.

Tête. — Obnubilation de la tête, surtout après avoir bu ou mangé. — Hébétude dans la tête, augmentée par la lecture ou la méditation. — Vertige comme par ivresse, ou en se redressant de son lit, avec envie de dormir qui force à se recoucher. — Accès de vertiges, avec nausées et perte de connaissance. — Mal à la tête avec envie de dormir, ou vomissements et douleurs de meurtrissure dans les intestins. — *Douleurs pressives, violentes, surtout dans le front. — *A chaque mouvement, mal à la tête, comme si les yeux devaient être arrachés de l'orbite, avec vertiges. — *Mal à la tête, qui est comme vide et creuse, ou sensation de constriction dans le cerveau. — Douleurs pulsatives, tantôt au sommet de la tête, tantôt dans les tempes. — Tremblement convulsif de la tête.


Youx. — Pression et douleur de meurtrissure dans les yeux, et difficulté d'ouvrir les paupières, la nuit. — Rotation convulsive du globe des yeux pendant les spasmes. — Pupilles fortement dilatées. — Inflammation des paupières. — Yeux proéminents, vitreux. — Trouble de la vue, avec taches noires devant les yeux.

- Fantômes devant les yeux.

Oreilles et Nez. — Bourdonnement dans les oreilles, avec dureté de l'ouie et sensation comme si les oreilles étaient bouchées. — Gonflement des parotides. — Gonflement du nez, parfois semi-

latéral. — Coryza avec narines ulcérées.

Visage et Dents. — *Visage d'un rouge ardent, boussi et chaud, surtout aux joues. — Chaleur fugace aux joues. — Cercles bleus autour des yeux. — Visage contracté convulsivement. — Crampes à la pommette et dans les masseters. — Gonslement et induration des glandes sous-maxillaires. — Douleurs dans les dents cariées, seulement en mangeant. — Vacillement des dents, avec gonslement des gencives.



COCCULUS.

Bouche et Gerge. — *Sécheresse de la bouche; sans soif. — Écume devant la bouche, formant des bulles.—Langue chargée d'un enduit jaune. — Sécheresse de la gorge. — Sensibilité excessive du palais; les aliments semblent tous être trop forts ou trop salés. — Constriction dans le gosier, qui semble être paralysé. — *Douleur brûlante dans l'œsophage et jusque dans la gorge, avec goût sulfureux dans la bouche.

agorge, avec goût sulfureux dans la bouche.

Appétit. Goût métallique, cuivreux. — Goût acide, surtout après le repas, ou en toussant. — Goût acide du pain. — Goût amer du tabac. — Désir de boissons froides et surtout de bière. — Soif pendant le repas. — *Dégoût excessif pour toutes les boissons ou tous les aliments, sans exception. — Répugnance

pour tous les acides. — Boulimie.

**Estemac. — Renvois, avec douleur à l'estomac et à l'épigastre. —

**Renvois avec envie de vomir. — *Renvois à vide, ou fétides et putrides. — **Accès de nausées, jusqu'à faire perdre connaissance. — Envie de vomir, en se redressant dans le lit, qui force à se recoucher. — Envie de vomir pendant le repas, ou pur suite d'un refroidissement, avec accumulation abondante de salive. — *Vomissements et nausées partie mouvement de la coiture, ou sur mer. — Sensation de pléntude dans l'estomac, avec gêne de la respiration. — *Violentes douleurs crampoides, serrement comme par une griffe, et crampes à l'estomac, quelquefois après le repus. — Oppression anxieuse et pincement à l'épigastre, avec géne de la respiration.

Ventre. — Douleurs de meurtrissure dans les hypocondres. —


**Douleur pressive dans la région hépatique, aggravée par la toux ou en se baissant. — •Élancements dans la région hépatique. —

Douleurs abdominales, comme si les intestins étaient meurtris, ou comme par un abcès intérieur, à chaque mouvement. — Pression comme par une pierre dans la région ombilicale et dans le bas-ventre. — Sensation dans le ventre comme s'il était creux et vide. — *Ballonnement du ventre. — Pincements contractifs dans la partie supérieure du ventre, avec suspension de la respiration. — *Douleur brûlante, tiraillements et déchirements dans le ventre. — Douleurs crampoides dans le ventre. — *Coliques venteuses, crampoides, surtout la nuit, aggravées en toussant ou en se penchant en avant. — *Disposition à la sortie des hernies inguinales.

Belles et Urines. — Constipation, avec ténesme. — Selle dure, difficile. — Selle diarrhéique d'odeur putride. — *Selles molles, jaunes et equi brûlent à l'anus. — Urine aqueuse, avec envie pressante. — *Envie fréquente d'uriner, même chez les femmes

enceintes.

Parties viriles. — Prurit au scrotum. — Douleur tiraillante de meurtrissure dans les testicules, au toucher. — Grande sensibilité et excitation des parties génitales, avec désir du coît. — Après



le cort, faiblesse des jambes, pesanteur et sensation de meurtrisle coit, laibles sur le corps.
sure par tout le corps.
sure par tout le corps.
Règles - Règles trop hâtives, avec écoulement abandant de la laise de laise de laise de la laise de laise de laise de l gies. - Regles trop nature ecoulement abondant d'un sang Règles douloureuses, avec écoulement abondant d'un sang Regles douloured - Suppression des règles, avec coagulé, suivies d'hémorrhoides. - Suppression des règles, avec cosgule, survies a structure et pressives, flatuosités, faiblesse paracoliques spasmores anxieté, crampes de poitrine, accès de nau-lytique, oppression, anxieté, crampes de poitrine, accès de naulytique, oppression, et mouvements convulsifs des memoRègles pen abondantes, irrégulières, avec leucorrhée bres. - onegate de l'entroprise de l'entropris dans les internationes par la matrice, pendant la grossesse.

*Leucorchée, semblable à de l'eau dans laquelle on aurait lavé de la viande, entremêlée d'une sérosité sanieuse et purulente, oCrampes de matrice.

Larynx. - Toux fatigante, par oppression de poitrine qui ne se manifeste que pendant la toux. — Toux périodique, de quatre nuits l'une, vers minuit ou 2 heures du matin, avec constriction

dans la gorge qui force à tousser.


Poitrine. - Suspension de la respiration, qui s'arrête dans la fossette du cou, comme par constriction de la gorge. - Respiration courte, intermittente. - Pression sur la poitrine comme par une pierre. - Crampes de poitrine avec soupirs et gémissements. - *Constriction tensive de la poitrine, quelquefois d'un seul côté, avec gêne de la respiration. - Gargouillement et sensation de vacuité dans la poitrine. - Fatigue de la poitrine par la lecture à haute voix. - Congestion à la poitrine avec anxiété. - *Battement de çœur. - Taches rouges sur la poitrine.

Tronc. - Déchirements paralytiques aux reins. - Tiraillements et déchirements dans le dos, surtout en parlant, en marchant et en se baissant. -- Elancements entre les omoplates et dans les reins. - Craquement des vertèbres du cou pendant le mouvement. - Faiblesse des muscles du cou, ils ne peuvent pas sup-

porter la tête. - Taches rouges au cou.

Bras. - Lancinations dans l'articulation de l'épaule et dans le bras. pendant le repos. - Douleurs lancinantes dans le bras, provenant d'un doigt blessé. - Convulsions du bras avec rétraction des pouces. - *Paralysie des bras. - Palpitation des muscles du bras. — Douleur de meurtrissure duns les os du bras, pendant le mouvement. - Gonflement chaud et arthritique des mains. - Engourdissement ou chaleur et froid alternant de l'une à l'autre main. - Torpeur des mains. - Contractions crampoides et tressaillement des doigts.

Jambes. - *Paralysie des membres inférieurs, provenant des reins. - Déchirements tractifs dans les genoux, les pieds et les orteils. - Douleur de meurtrissure dans les cuisses, pendant le mouvement. - Craquement des genoux, pendant le mouvement. - Gonflement inflammatoire du genou avec lancinations pas-



COCCULUS. - COCCUS CACTI.

255

sugères. — Sensation brûlante aux pieds. — Gonflement chaud et pruriant des pieds, quelquefois aussi le soir. — Engourdissement des pieds. — Froid et transpiration des pieds.

COCCUS CACTI.

COCC-GAC. — Coccinella Indica, Cochenille du Nopal ou Mexique. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 324. — Durée d'action: dans les affections aiguês, 24 à 48 heures au plus; dans les affections chroniques, plusieurs semaines.

CLINIQUE. — Médicament qui pourra devenir très-important dans les affections des membranes muqueuses, certaines mélancolies et misanthropies, les affections des organes urinaires, génitaux et respiratoires, comme dans les ophthalmies, stomatites, bronchites muqueuses, ainsi que dans certaines affections spasmodiques. — Nous citerons ci-après les symptômes les plus importants et qui paraissent être particulièrement caractéristiques de ce médicament.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs brûlantes, lancinantes, cuisantes, dans les membranes muqueuses des yeux, de la langue, de la gorge, des bronches et de l'urèthre; douleurs crampoides dans l'œsophage, l'estomac, le rectum, les reins et la vessie; mouvements convulsifs; aggravation des souffrances par le mouvement et la chaleur; diminution par le repos, le froid, les lotions fraiches, l'air libre. — Sommeil agité, interrompu par des douleurs vésicales et envie d'uriner, avec rèves vifs de beaucoup de personnes, de palais et de sociétés choisies dans lesquelles on se trouve déplacé, ou de tendres relations amoureuses. — Fièrre, consistant en horripilation et frissons fréquents; chaleur à la face, pendant les douleurs vésicales. — Moral morose, nauvaise humeur, après quelques instants d'un grand bien-être, avec humeur gaié.

n de sang, augmentée par le mouvement de la tête et diminuée r le froid et deulotions froides. — Yeux douloureux, comme la présence d'un corps étranger, avec enfiure des paupières. Veilles comme bouchées, avec pression et tiraillement; doupulsatives, pressives et lancinantes dans les oreilles, jusque a bouche et la gorge; bourdonnement. — Nez sec, avec sion d'ebtaration catarrhale et sécrétion comme dans un



COCCUS CACTI. - COFFEA.

le matin; toux sèche; toux grasse avec expectoration de mucosités jaunâtres ou rerdâtres, ou épaisses, gluantes et albuminouses; brûlement dans le larynx après chaque quinte de tous; toux nocturne, avec ou sans expectoration; augmentation de la toux par la chaleur de la chambre et celle du lit, amélioration par l'eau froide prise par petites gorgées; toux provoquée par le nettoiement des dents. - Expectoration de mucosités abondantes, albumineuses, blanchatres ou jaunatres, d'un goût sale, parfois avec vomiturition, ou même avec vomissement des aliments après les repas; expectoration de mucosités, toux le matin, avec expectoration de mucosités jaunâtres ou grisâtres et rougeatres, épaisses, globuleuses, et d'un goût aigre ou aigredoux et nauséabond. — Coqueluche?.

Poitrine et Respiration. - Haleine chaude. - Elancements rayonnants et pression dans la poitrine; gêne de la respiration comme si le thorax était trop étroit, avec besoin de respirer profondément. — Cœur battant plus fort par moments; palpitations comme après une frayeur, avec pulsation dans la poitrine, à la tête et dans l'oreille, la nuit. - Pression et douleur fouillante d'écorchure au cœur; sensation comme si tout poussait vers le cœur

Dos et Membres. - Tension, pression, élancement et déchirement dans les lombes, la nuque, le cou, le bras, les mains et les doigts, jusque dans les régions des reins, ainsi que dans les hanches, les cuisses, les jarrets, le tibia, les mollets et les orteils, et augmentant le matin et par le mouvement. — Picotement et élancements comme par des échardes de verre ou des courants électriques, aux cuisses, au genou et sous les ongles des doigts et des orteils, augmentant tellement par le mouvement que la démarche devient impossible.

COFFEA.

COFF. — Calé cru, Coffea arabica, Coffea cruda. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 197. — Doses usitées: 3, 40, 50. — Durée d'action: jusqu'à 10 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Acon. cham. ign. n-vom. — Le café est antidote de psoricum et de toutes les autopsorines.

COMPARER AYEC: Acon. agar. ang. ars. bell. bry. canth. carb-veg. canst. cham. cocc. coloc. con. ign. kal. laur. mang. merc. n-vom. op. phos. phos-ac. puls. rhus. sep. sulf. valer.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre ;



euse; Nécralgies excessivement douloureuse Sailes fachences d'un refroidissement; Convulsions; Prodrom Suite fachenses d'un renome (et de la scarlatine); Miliai la petita verole, des morbilles (et de la scarlatine); Miliai la petita verole, des morbilles (et de la scarlatine); Miliai 258 de la petite vérole, des moronte de la petite vérole, de la petite de l mittente; Sustes pacceuses ?; Migraine ?; Céphalalgie co Apoplexies sanguines (Odontalgies et angines excessiveme gestive?; Dureté de l'oule; Odontalgies et angines excessiveme gestive ?; Durete de douloureus d'enfantement et tranchées trop violente douloureuses; Douleurs d'enfantement et tranchées trop violente douloureuses: Houseurs Cris et agitation des nouveau-nés; Gr Péritonite puerpérale; Cris et agitation des nouveau-nés; Gr Péritonite souffrances gastriques à la suite de la petite un religie?; role, etc., etc. Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Surimpressionnabilité doulo reuse des parties affectées. — Grande mobilité des muscles, agilité de tout le corps. - *Surexcitabilité morale et physique - Aversion pour le grand air, avec malaise et exacerbation d symptômes pendant une promenade en plein air. - Convulsion avec grincements de dents et froid aux membres. - *Insomn par exaltation de l'imagination, affluence d'idées et visions fa tastiques .- Besoin de se coucher et de fermer les yeux, bien q l'on ne puisse pas dormir. - Fort frissonnement avec augme tation fébrile de la chaleur du corps. - Fièvre avec angois inconsolable .- Horripilation avec coliques et agitation violent - *Pleurs, hurlements, cris, jactation et découragement, su tout pendant les accès de douleur. - Cris des enfants. Anxiété de cœur et de conscience avec appréhensions. - *Viv cité et loquacité exaltées. - Vivacité et exaltation de l'imag nation, avec acuité des facultés intellectuelles.

Tête - Gorge. - Maux de tête, comme si le cerveau était meu tri. — Céphalalgie semi-latérale, comme si un clou était enfon dans l'os pariétal. — Pesanteur de la tête. — Congestion à la têt surtout en parlant. — Yeux vifs, rouges, avec vue plus distinct Sensibilité excessive de l'ouïe ; les sons de la musique semble être trop forts et trop aigus. - Dureté de l'onie avec bourdonn ment d'oreilles. - Épistaxis, avec lourdeur de la tête. - Chale du visage, avec rougeur des joues. - *Tiraillements successi et douleurs vives dans les dents avec inquiétude, anxiété pleurs, surtout la nuit et après le repas. - *Mal de gorge av sensibilité douloureuse et gonflement du voile du palais.

Estomac - Selles. - Goût de noisette ou d'amandes douc dans la bouche. - La fumée du tabac paraît particulièrement agréable. - Sensation de faim immodérée. - Soif augmenté surtout la nuit. - Vomissement bilieux. - Crampes d'estome avec douleurs pressives lancinantes. - Anxiété et oppression la région de l'épigastre ; les vêtements gênent. -* Douleurs abd

minutes qui product insertine d'arreit, surrout chez les fommes, le 8 l'arreit de la constant de

Urines et Parties génétales, le limité le d'urine abandante, suct est vers minuit, le Grande espération d'impérie vénérien, avec flued lité en fact excit d'action de la la france prarit tion inma déce des nortes grait le de la france, avec prarit y luptueux, fortessination de comment de la monte de sur-

w ingluent, is, single - Metre of egie.

Poitrine et Membres. — ET executive, accordée, siche, avec forte excitation dans le benny et insteines, unions s. — Accès de sufficentien. — Translement des rains, publics que l'on tient un objet. — Contract insentant les les la distre — Crampes dans le mellet en plient le gate et « Champes a la plante des pieds en tendant le consle-plat. — Translement des pieds.

COLCHICUM AUTUMNALE.

COLCH. — Colchique, Safran des prés, Safran bâtard. — Archives de STAPF. — Hist. nut. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 199 — Doses usitées: 3, 40 30. — Durée d'action: jusqu'à 30 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: N. voin. puls. cocc.

COMPARER AVEC : Acon. chin. cocc. merc. natr-m. n-vom. op. puls. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques; Paralysies; Affections hydropiques; Fatigue nerveuse par suite de veilles prolongées: Surexcitation nerveuse; Otorrhée purulente à la suite des morbilles; Gastrite?; Ascite?; Affections gastriques; Dyssenterie; Coliques flatulentes surtout chez les personnes hystériques; Affections des voies urinaires et des reins; Crampes de la poitrine; Hydrothorax, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirement rhumatismal et arthritique dans les membres, et autres parties du corps, surtout par un temps chaud. — Élancements tressaillants dans les muscles et le périoste des membres, surtout par un temps froid. — Tressaillement fréquent du corps. — Élancements dans les articulations. — Faiblesse paralytique des muscles. — Douleurs accompagnées de faiblesse paralytique et de paralysie réelle. —



COLCHICUM AUTUMNALE.

Les souffrances sont singulièrement donflements hydropiques.— Les souffrances sont singulièrement donflements hydropiques.— Les souffrances sont singulièrement donflements hydropiques.— Les souffrances sont singulièrement de souffrances par la fatigue intellectuelle, le contact, une lumière aggravées par la fatigue de la nuit jusqu'à l'aurore de souffrances de la nuit jusqu'à l'aurore de souffrances sont singulièrement de souffrances par la fatigue intellectuelle, le contact, une lumière aggravées par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation des souffrances par la fatigue de la viande de porc. — Exacerbation de la viande de la viande de la viande de la viande de porc. — Exacerbation de la viande de la vian 260 trop vive et l'odeur de la nuit jusqu'à l'aurore. — Affais-symptomes depuis l'entrée de la nuit jusqu'à l'aurore. — Affaissymptomes depuis l'en suite, sensibilité douloureuse de tout le sement général, et par suite, sensibilité douloureuse de tout le sement general, et par corps, en sorte qu'on ne peut se bouger sans gémir. — Fatigue nerveuse et faiblesse par le travail de nuit.

nerveuse et lande par des orties. - Fourmillement à différentes parties, comme après avoir été gelé. — Éruption d'un

rouge pourpre à la face, aux bras et aux cuisses. Fièvre rhumatismale, avec courbure douloureuse des articulations des mains et des pieds, douleurs aux épaules, aux hanches et aux reins, racine de la langue donloureuse en avalant, sucurs acides.

Sommell. - Envie de dormir le jour, avec inaptitude au travail. Insomnie par surexcitabilité nerveuse. — Réveil fréquent,

avec effroi. - Chaleur nocturne, avec forte soif.

Moral. - Grand abattement. - Mauvaise humeur. - Les souffrances paraissent insupportables. - La moindre impression extérieure met hors de soi. - Faiblesse de la mémoire. - Oubli et distraction.

Tête. - Pression à l'occiput, pendant des efforts intellectuels. -Maux de tête crampoïdes, surtout au-dessus des yeux. — Déchirement semi-latéral dans la tête. - Fourmillement dans le front

et sur la téte.


Yeux. - Douleurs dans les yeux, comme un tiraillement fouillant dans la profondeur du globe. - Gonflement des paupières inférieures. - Suppuration des glandes de Meibomius. - Traction visible dans la paupière inférieure.

Oreilles. - Otalgie, avec élancements déchirants. - Fourmillement dans les oreilles, comme si elles avaient été gelées. - Sensation d'obturation des oreilles. - Ecoulement purulent par les

oreilles, avec douleurs tractives.

Nez. - Douleur pressive dans les os du nez. - Douleur d'excoriation à la cloison des narines, aggravée par le toucher. - Sensibilité excessive de l'odorat. - Coryza opiniâtre, avec renâclement de mucosités visqueuses et abondantes, provenant du nez.

Visage. — Traits du visage défigurés. — Aspect maladif, triste, souffreteux. — Visage tacheté de jaune. — Gonflement ædémateux de la face. - Sensation d'écartement dans les os de la face. Sensation dans les masseters, comme si on les élargissait, avec difficulté d'ouvrir la bouche.
 Tractions et tressaillements successifs dans les muscles et les os du visage. - Déchirement semilatéral dans la face, jusque dans l'oreille et la tête. - Fourmillement dans la peau du visage, comme s'il avait été gelé. -Lèvres gercées. — Déchirement dans la lèvre inférieure, -- Douleurs crampoïdes dans l'articulation de la mâchoire.



COLCHICUM AUTUMNALE.

261

Dents. — Odontalgie, avec douleurs déchirantes. — Sensibilité des dents, lorsqu'elles se touchent en fermant la mâchoire. — Douleurs aiguës dans les gencives.

Bouche. — Chaleur dans la bouche. — Déchirement dans le palais. — Salivation séreuse, abondante, avec sécheresse de la gorge.—

Lourdeur, roideur et insensibilité de la langue.

Gorge. — Mal de gorge, comme par gonflement de l'orifice de l'œsophage. — Fourmillement dans le palais. — Constriction du gosier.—Inflammation, déchirement et élancement au palais et à la gorge. — Accumulation de mucosités verdâtres dans la gorge et la bouche.

Appétit. — Appétit se dissipant promptement, seulement par l'aspect ou l'odeur des aliments, avec dégoût. — Insipidité des ali-

ments. — Forte soif, surtout pour le café.

Estomac. — Renvois d'air fréquents. — Hoquet continuel. —
Nausée qui va jusqu'à faire perdre connaissance par l'odeur des
œufs frais ou de la viande grasse. — Nausées pendant le repas.
—Nausées après avoir avalé la salive. — Vomissement d'aliments
ou de bile, parfois avec douleurs violentes à l'estomac et diarrhée
bilieuse, jaunâtre. — Estomac très-sensible au toucher. — Sensation d'excoriation et fourmillement à l'estomac. — Sensation
de froid ou de brûlure à l'estomac. — Elancements dans le creux
de l'estomac.

Ventre.—Ballonnement et plénitude du ventre.—Pression vers le dehors dans la partie supérieure du ventre.— Colique, avec douleurs déchirantes. — Douleur d'excoriation dans le côté gauche du ventre, au toucher. — *Gonflement hydropique du ventre. — Douleur de brûlure et pression dans le basventre, dans la région de la vessie et dans les parties génitales internes.

Selles. — Constipation. — Selles lentes, difficiles, insuffisantes, avec besoin pressant. — Évacuation des selles sans qu'on s'en aperçoive. — *Diarrhée dyssentérique de mucosités blanches, transparentes, gélatineuses. — Écoulement de mucosités abondantes par le rectum. — Selles sanguinolentes, et comme mêlées de fausses membranes. — Chute du rectum. — Fourmillement, prurit, brûlement et déchirement à l'anus. — Crampes dans le sphincter de l'anus.

Urines. — Besoin pressant d'uriner, avec émission abondante d'urines claires. — *Émission peu abondante d'une urine de couleur foncée, avec ténesme et sensation brûlante. — Urine brunâtre ou noirâtre. — Dépôt blanchâtre dans les urines. — Sensation brûlante et pression dans les voies urinaires et la vessie. — Tiraillements, déchirements et douleurs incisives dans l'urèthre.

Laryax. — Fourmillement dans la trachée-artère. — Chatouillement dans le pharynx, qui provoque une petite toux sèche. —



COLOCYNTHIS. — CONIUM MACULATUM.

parties génitales, des deux côtés du ventre, de manière à provoquer l'éjaculation. — Excitation de l'appétit vénérien, comme une sorte de priapisme. — Impuissance complète. — Rétraction du prépuce derrière le gland. — Nodosités douloureuses dans les mamelles.

Larynx et Poitrine. — Petite toux sèche provoquée par une irritation dans le larynx, ou par la fumée de tabac. — Accès d'asthme, la nuit. — Oppression de la poitrine comme si elle était comprimée. — Battements de cœur.

Trenc. — Douleurs tractives dans le dos, comme si les muscles étaient tendus. -- Tension dans le cou et les omoplates. -- Engorgement et suppuration des glandes axillaires.

Bras. — Douleur de meurtrissure dans l'articulation de l'épaule, surtout après s'être mis en colère. — Douleur ostéocope, pressive et lancinante, dans les bras. — Douleur crampoide dans les mains, qui ne permet d'ouvrir les doigts qu'avec difficulté. - Tiraillement dans les tendons des pouces.


Jambes. — Douleur dans l'articulation coxo-fémorale, comme si elle était serrée par des bandes de fer, au bassin et la région du sacrum, avec douleurs dans la région lombaire jusque dans les jambes. — Lancinations tensives dans la région des lombes et des hanches, surtout en étant couché sur le dos. — Douleur pendant la marche, comme si le psoas était trop court. — Luxation spontanée de l'articulation coxo-fémorale. — Manque de flexibilité du genou qui ne permet pas de s'accroupir. — Crampes dans les jambes. — Elancements dans les jambes, surtout pendant le repos. — Grande pesanteur et tremblement des jambes. Déchirement dans la plante des pieds pendant le repos.

CONIUM MACULATUM.

CON. — Grande eiguë. — Hahnemann. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 201. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 40 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Coff. nitr-spir. — On l'emploie comme antidote de: Nitr-ac. COMPARER AVEC: Arm. asa. bell. coff. dig. dulc. graph. iod. lyc. magg. magn. merc. mosch. nitr-ac. n-vom. phos. phos-ac. plumb. puls. rath. rut. sabad. sep. staph. sulf-ac. tar. teuer. valer.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: - Affections hypocondriaques, surtout chez les célibataires à principes sévères et d'une abstinence absolue, ou bien chez les personnes qui ont fait abus du coit; Spasmes, accès de



CONIUM MACULATUM.

faiblesse et autres affections des personnes hystériques; Affections scrofuleuses, avec induration et engorgement des glandes; Affections des vieillards, des femmes, et surtout des femmes enceintes; Anciennes affections par suite de contusion, principalement dans les glandes, ainsi que dans des parties tendineuses et membraneuses; Ecchymose sénile; Affections hydropiques; Chlorose; Taches hépatiques; Dartres; Indurations squirreuses et ulcères carcinomateux, surtout par suite de contusion; Carie?; Ulcères gangréneux?; Pétéchies?; Fièvres lentes?; Fièvres inflammatoires?; Mélancolie hypocondriaque ou hystérique; Manie?; Apoplexie avec paralysie, principalement chez les personnes agées; Migraines; Hydrocéphale?; Congestion cérébrale avec vertiges; Ophthalmie, principalement des personnes scrofuleuses; Cataracte par suite d'un coup (d'une commotion); Obscurcissement de la cornée?; Photophobie scrofuleuse; Myopie; Presbyopie; Amblyopie amaurotique; Otalgie; Dureté de l'ouïe; Engorgement des parotides; Ozène, aussi celle par abus du mercure; Prosopalgie; Cancer aux lèvres; Spasmes dans la gorge; Dyspepsie, aigreurs, nausées et autres affections gastriques; Cancer de l'estomac?; Constipation; Lientérie?; Diabète?; Hématurie?; Catarrhe de la vessie?; Rétention d'urine; Strangurie?; Orchite par suite de contusion; Impuissance, surtout par suite de pollutions; Pollutions chez les jeunes gens d'une constitution irritable; Crampes de matrice; Dysménorrhée; Aménorrhée; Flueurs blanches; Stérilité avec aménorrhée?; Squirre (et cancer) du sein, surtout par suite d'une contusion; Chlorose; Catarrhe avec fièvre, angine et souffrances gastriques; Toux sèche des sujets scrofuleux; Toux convulsive et suffoquante; Coqueluche; Hémoptysie?; Asthme, surtout chez les vieillards; Asthme hystérique; Affections chroniques du cœur; etc., etc.

Voir la note, page 15.

266

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Crampes et douleurs crampoïdes, dans diverses parties. — *Courbature des membres et des articulations dans le repos. — *Douleurs nocturnes et souffrances qui troublent le sommeil. — Les symptômes apparaissent pendant le repos, et s'aggravent au commencement de la marche ou du mouvement. — Facilité à se donner des tours de reins. — *Accès de souffrances hystériques et hypocondriaques. — Soubresauts des tendons, tremblement et secousses convulsives dans les membres. — Bouillonnement du sang. — Gonflements hydropiques. — *Gonflement et induration des glandes; avec douleurs fourmillantes et lancinantes. — *Accès d'évanouissement. — Grand abattement général avec rires involontaires. — Sensation de fatigue, surtout de bon matin, au lit. — *Inquiétudes dans le corps, surtout dans les jambes. — Manque d'énergie



CONIUM MACULATUM.

et faiblesse nerveuse. — Consomption. — *Affaissement subit pendant la marche. — Grande disposition à se refroidir. — *Grande fatigue et autres souffrances par la promenade en plein air. — *Manque opiniâtre de chaleur vitale naturelle. — Mouvements convulsifs des parties supérieures du corps, avec paralysie des parties inférieures.

Peau. — Elancements et prurit picotant à la peau. — Couleur bleuâtre de la peau de tout le corps. — Inflammation douloureuse de la peau. — «Éruption urticaire à la suite d'un fort exercice corporel. — Boutons, comme ceux de la gale, qui deviennent croûteux. — «Taches brunâtres ou rouges et pruriteuses sur le corps, qui disparaissent et reviennent. — «Dartres humides, ou croûteuses et brûlantes. — Ulcères noirâtres, avec écoulement sanieux, sanguinolent et fétide, extension fourmillante. — Ulcères gangréneux. — Ulcération des os. — Panaris. — Pétéchies. — *Taches rougeâtres et verdâtres comme par ecchymose.

Sommeil. — *Envie de dormir le jour, même de fort bon matin. — Somnolence. — *Envie de dormir le soir avec affaissement des paupières. — *Sommeil tardif. — Sommeil agité et non réparateur, avec pleurs et rêves fréquents, auxieux et effrayants. — Rêves de maladies, de mutilations, de morts, de dangers et de querelles. — La nuit, maux de tête, nausées, gastralgie, saignement de nez, douleurs dans les membres, etc. — Réveil incomplet, après minuit, avec grande angoisse. — Cauchemar. — Tressaillement des membres pendant le sommeil.

Fièvre. — Frissons, froid et horripilation fréquente. — Chaleur sèche, intérieure. — Fièvre lente, avec manque total d'appétit. — Fièvre inflammatoire, avec forte chaleur, sueur abondante, anorexie, diarrhée et vomissements. — Fièvre, avec inflammation de la gorge et toux. — Pouls irréguliez. — Sueurs nocturnes, même au commencement du sommeil. — Sueurs locales, fétides et mordicantes.

Moral. — *Angoisse hystérique, avec tristesse et forte envie de pleurer. — Anthropophobie, et cependant peur de la solitude. — Caractère peureux (peur de voleurs). — Idées superstitieuses. — *Disposition à s'effrayer. — *Mauvaise humeur et morosités. — *Indifférence hypocondriaque. — *Manque d'énergie morale. — Inaptitude au travail. — *Irritabilité et disposition à se facher. — Idées désordonnées et manie. — Confusion des idées, comme quand on s'assoupit. — Conception lente. — Faiblesse des facultés intellectuelles et de la mémoire. — *Oubli facile. — Délire. Tête. — Ivresse, après avoir pris la plus petite quantité d'une boisson spiritueuse. — *Vertige tournoyant en se levant, et oparfois à faire tomber de côté lorsqu'on regarde en arrière, ou lorsqu'on est couché, surtout le matin, au lit. — Coup de sang, avec face gonfiée et ecchymosée, comme chez un homme étranglé, respiration difficile, pouls lent, extrémités froides. — Accès de maux de

tête acce nausées et vomissement de mucosités. — Douleurs stupéfiantes dans la tête, surtout pendant la marche en plein air. — Sensibilité excessive du cerveau, même à la parele et au bruit. — Maux de tête quotidiens, par suite de selles (rop peu abondantes. — Douleurs semi-laterales dans la tête, comme si elle était meurtrie. — Sensation comme s'il y avait dans la tête un corps etranger volumineux. — Pesanteur et plenitude dans la tête, surtout le matin en se reveillant. — Tiraillement dans la tête, avec engourdissement du cerveau. — *Accès de maux de tête déchirants, qui forcent à se coucher. — *Douleurs laucmantes opinieures dans le sincipat, ou qui semblent sortir par le front. — Pesanteur et seriement comme par une griffe, dans le front.

comme provenant de l'estomac. - Chute des chereux.

Yeux. — Pression dans les yeux, en lisant. — *Demangeaism au-dessous des yeux, avec douleur brûlante et cuisante, lorsqu'en les frotte. — Élancements pruriants ou cuisson dans l'angle interne des yeux. — •Sensation de froid dans les yeux, pendant la marche en plein air. — Douleur de brûlure dans les yeux, avec pression dans les orbites, le soir. — Inflammation et rougeur de la sclérotique. — *Orgelet aux paupières. — (Taches de la cornée). — Couleur jaune de la sclérotique. — Yeux ternes. — Yeux proéminents. — Regard tremblotant. — Obscurcissement de la vue. — Cécité momentanée le jour à l'ardeur du soleil. — *Myopie. — *Presbyopie. — Diplopie. — Mobilité des lignes pendant la lecture. — *Taches noires et bandes colorées devan la vue, dans l'appartement. — Aspect rouge des objets. — *Éblouissement par la lumière du jour. — *Photophobie •avec couleur rouge pâle du globe des yeux.

Oreilles. — Déchirements et élancements dans les oreilles et autour des oreilles, systout en se promenant au grand air. — *Accumulation de cérumen, qui ressemble à du papier moisi, et qui est mêlé de mucosités purulentes. — Cérumen couleur rouge de sang. — *Bourdonnement, tintement et grondement dans les oreilles. — Sensibilité douloureuse de l'ouie. — *Diminution de l'ouie, cessant lorsqu'on a écarté le cérumen, et jusqu'à ce qu'il soit renouvelé. — *Gonfiement et induration des paro-

tides.

Nez. — *Gonflement des narines. — °Écoulement purulent par le nez. — Hémorrhagie nasale. — Exaltation de l'odorat. — *Éternument par trop fréquent. — °Sensation de sécheresse pénible dans le nez. — °Obturation opiniâtre des deux narines. — °Obturation du nez, le matin.

Visage. — *Chaleur du visage. — Teint pâle, bleuâtre, parfois aussi avec gonfiement de la face. — Crevasses à la peau du avec douleur d'excoriation après s'être lavé et essuyé. — leurs nocturnes dans la face, déchirantes et lancinantes *Prurit, éruptions pruriantes, odartres et ulcères rongean'



CONTUM MACULATUM.

2..9

visage. — Éruption boutonneuse au front. — Sécheresse et exfoliation des lèvres. — Ampoules et ulcères aux lèvres. — oUlcère carcinomateux à la lèvre. — Serrement spasmodique des mâchoires. — Grincement de dents.

Dents. — *Odontalgie, généralement tractive, °provoquée par la marche au grand air, "ou excitée dans les dents creuses par des aliments froids. — Élancements, "secousses, rongement et térébration dans les dents. — Gencives gonflées, ecchymosées et

saignantes.

Benche. — Sécheresse de la bouche et de la gorge, ou salivation. — Parole embarrassée. — Langue roide, douloureuse, gonfiée. — Mal de gorge, comme par une boule qui monterait de l'épigastre. — Déglutition empêchée. — *Déglutition involontaire. — Besoin d'avaler constamment en marchant contre le vent. — Crampes dans le gosier. — *Grattement dans la gorge.

Appétit. — *Amertume dans la bouche et la gorge. — *Goût putride ou acide dans la bouche. — *Absence totale d'appétit, et grande faiblesse de la digestion. — Le pain ne peut pas descendre, et ne plaît pas au goût. — Boulimie. — Désir de café ou d'aliments acides ou salés. — Pendant le repas, et surtout après avoir pris du laitage, sensation de ballonnement de l'estomac et du ventre, et satiété prompte. — *Après le repas, aigreurs, pyrosis, pression et plénitude de l'estomac, rapports, "coliques, flatnosités acquéées doigts morts faiblesse fatique et sueurs.

fiatuosités, nausées, doigts morts, faiblesse, fatigue et sueurs.

Betomac. — *Renvois à vide, fréquents et bruyants, parfois durant toute la journée. — *Renvois avortés avec sensation de plénitude dans la fossette du cou. — *Renvois avec goût des aliments. — *Pyrosis qui remonte dans la gorge, quelquefois après le repas. — Régurgitations acides, surtout après le repas. — *Nausées arec envie de vomir et perte complète de l'appétit, ou bien avec rapports et lassitude. — Nausées après chaque repas. ou le soir. — Vomissements de mucosités. — Pression à l'estomac, même pendant le repas. — Ballonnement de l'estomac. — Douleur crampoide, contractive, élaucements et douleur d'excoriation à l'estomac et à l'épigastre. — Douleur avec sensation de froid dans l'estomac.

Ventre. — Douleur tensive dans les hypocondres, comme par un lien fortement serré. — Pression, traction, déchirements et élancements dans la région hépatique. — *Lancinations dans l'hypocondre gauche, parfois le matin au lit, avec oppression. — *Plénitude du ventre, même le matin en se réveillant. — Gonflement des glandes du mésentère. — *Contraction du ventre avec oppression. — Coliques spasmodiques. — Douleurs abdominales incisives et lancinantes. — oMouvement et fouillement dans la région ombilicale. — *Sensation d'excoriation dans le ventre, osurtout en marchant sur le pavé. — *Bruits et borborygmes dans le ventre. — Émission de vents froids avec tranchées. — oIn-



CONIUM MACULATUM.

carcération de flatuosités. — oTranchées en émettant des flatuosités.

Selles. — *Constipation arec ténesme. — *Selles dures, seulement tous les deux jours. — *Selles diarrhéiques non digérées, avec tranchées et renvois fréquents. — Diarrhées débilitantes. — Lancination à l'anus. — Ardeur et sensation brûlante au rectum, pendant et hors le temps des selles. — Selles avec stries de sang. — Après les selles, faiblesse, battement de cœur, émission fré-

quente de vents, et tremblement.

Urines. — Pression sur la vessie, comme si les urines allaient sortir violemment. — La nuit, émission d'urine fréquente et quelquefois involontaire. — Flux d'urine avec douleurs violentes. —

oUrine épaisse, blanche, trouble. — Urines rouges. — Rétention d'urine. — Emission difficile d'une urine qui ne coule que goutte à goutte. — Pissement nocturne. — Pissement au lit. — *Envie fréquente d'émettre une urine claire et aqueuse. — Mucus visqueux mêlé aux urines qu'on ne peut émettre qu'avec de grandes douleurs. — Écoulement de pus par l'urèthre. — Pissement de sang, quelquefois avec gène de la respiration. — *Les urines s'arrêtent tout à coup, et ne recommencent à couler qu'après quelques instants. — *Douleurs incisives dans l'urèthre pendant l'émission des urines. — Sensation brûlante et élancement dans l'urèthre, surtout après l'émission des urines.


Parties viriles. — *Gonflement des testicules. — Lascivité. —
°Impuissance et défaut d'érection. — °Défaut d'énergie dans le
coît. — °Érections insuffisantes et de trop courte durée. — Émission facile de sperme, même sans fortes érections. — °Après le
coît, accablement. — *Pollutions immodérées. — Écoulement de
liqueur prostatique pendant les selles, et après toute émotion

morale.

270

- °Crampes de matrice avec pincements, ou douleur de crispation, ou avec fouillement au-dessus de la vulve, accompagnées de tension dans le ventre et d'élancements jusque dans le côté gauche de la poitrine. —*Démangeaisons dans les parties génitales externes et internes. — Elancements dans le vagin et sensation comme si tout se portait vers le bas. — Elancements dans les lèvres. — *Règles trop hâtives et otrop faibles. — *Suppression des règles. — Avant les règles, douleurs dans les seins; rêves anxieux, chaleur sèche, courbature des membres, humeur pleureuse, inquiétude et douleurs hépatiques. — *Pendant les règles, sensation comme si tout affluait vers le bas, tiraillement dans la cuisse, ou crampes douloureuses dans le ventre. - *Leucorrhée brillante, acre, corrosire et mordicante, accompagnée ou précédée de coliques. -- Mamelles flasques. -- *Induration squirreuse des glandes mammaires, avec prurit et douleurs lancinantes.

Larynx. - Catarrhe avec fièvre, mal de gorge et manque d'appé-



CONIUM MACULATUM.

tit. — Enrouement. — Sécheresse à une petite place circonscrite dans le larynx et chatouillement qui donne envie de tousser. — Toux provoquée par une démangeaison et un grattement dans la gorge. — Toux sèche provoquée par un chatouillement, avec oppression de poitrine et fièvre le soir. — Toux suffoquante, avec chaleur fugace au visage. — *Toux sèche, convulsive. — *Toux comme la coqueluche, avec expectoration sanguinolente, ou par quintes, la nuit. — La toux se manifeste généralement la nuit ou le soir. — Toux provoquée en respirant profondément ou en prenant des choses acides ou salées. — Toux grasse, mais sans expectoration. — Expectoration jaune, purulente et d'odeur putride. — Toux augmentée en étant couché. — Pendant la toux, douleurs dans la tête ou dans le ventre, avec élancements dans le côté gauche aggravés par le mouvement.

Poitrine. — *Respiration courte en marchant, et au moindre mouvement, souvent avec toux convulsive. — *Géne de la respiration, même le matin en se réveillant. — Respiration difficile et lente, surtout le soir au lit. — Gêne de la respiration avec douleurs de poitrine, le soir, au lit. — Accès de suffocation comme si quelque chose obstruait la gorge. — *Élancements dans le sternum, ou dans le côté de la poitrine. — Douleurs violentes à la poitrine avec forte toux. — Pression à la poitrine, au sternum et dans la région du cœur. — Douleurs tractives dans la poitrine. — *Secousses dans la poitrine. — Battements de cœur, surtout après avoir bu. — Coups fréquents dans la région du cœur. —

Carie du sternum.

Tronc. — Douleurs dans les reins quand on se penche en arrière.

- *Pression et compression au-dessus des hanches. — Douleur pressive, crampoide et tractive dans le dos. — *Tension dans la nuque. — Douleur d'excoriation dans les vertèbres du cou. —

Grosseur du cou.

Bras. — *Epaules douloureuses, comme si elles étaient meurtries et excoriées. — Dartres humides, croûteuses et brûlantes à l'avant-bras. — Engourdissement des mains, et surtout de la paume des mains. — *Sueur de la paume des mains. — Torpeur des doigts.—Prurit au dos des doigts. — Taches jaunes sur les

doigts et ongles jaunâtres. — Panaris.

Jambes. — Douleurs tractives dans les hanches. — Douleurs arthritiques dans le genou, déchirantes et tensives, aggravées au commencement de la marche, après avoir été assis, avec sensation comme si les tendons étaient trop courts (pendant la suppression des règles). — *Inquiétude et accablement dans les jambes. — *Lassitude dans les genoux. — Gonflement douloureux des jambes et des pieds. — *Taches rouges aux mollets, quelquefois douloureuses, devenant ensuite vertes ou jaunes, comme après un coup ou une meurtrissure, et empêchant de mouvoir le pied qui est rétracté, comme si les tendons étaient raccourcis. — Crampes

72 COPAIVÆ BALSAMUM. - CORALLIUM RULL

aux mollets. — *Froid et forte disposition à se refroidir les pieds. — Torpeur et insensibilité des pieds. — Vésicules purulentes aux pieds.

COPAIVÆ BALSAMUM.

COP. — Baume de copahu. — HABREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac, homœop., p. 203. — Doses usitées: 3, 30. — Doses d'action : 10 a 12 jours. — Remede encore peu connu, et qu'on n'a encore employé que contre les gonorrhées.


SYMPTOMES. — Éruptions urticaires. - Fièvre -quotidienn≥. avant midi, frissons et froid: puis, après midi, chalcur génerale et soif avec désir d'eau froide. — Pendant le froid febrile, le cou-de-pied est douloureusement sensible au mouvement. — Crachement de sang. — Envie de vomir. — Déchirements dans le ventre, précédés de tiraillements dans les os des cuisses. -Sensation de brûlure dans le ventre. - Borborygmes et mouvements dans les intestins. - Selles blanches, diarrhéiques, généralement le matin, avec froid et déchirements tractifs dans le ventre, qui forcent à se replier sur soi-même. - Selles involontaires. — Envie continuelle et inutile d'uriner. — Émission d'urine goutte à goutte. — Prurit, cuisson et sensation de brûlure dans l'urèthre, avant et après l'émission des urines. - Douleur d'excoriation à l'orifice de l'urèthre. - Inflammation et gonflement de l'orifice de l'urèthre, qui reste béant, avec douleur pulsative dans tout le membre. - Ecoulement jaune et puriforme par l'urèthre. - Métrorrhagies. - Battements de cœur.

CORALLIUM RUBRUM.

COR. — Corail rouge. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 327. — Dose usitée : 30. — Remède encore peu connu.

PTOMES GÉNÉRAUX. — Courbature des membres après le mdre exercice en plein air. — Taches rouges et lisses sur la su. — Sensation de froid dans les parties chaudes en les découant. — Les symptômes de chaleur et de froid sont améliorés la chaleur artificielle. — Frissons fébriles, avec soif ardente et aleurs dans le front. — Chaleur sèche intérieure et extérieure





avec pouls plein et dur. — Bâillements violents, fréquents, et se succédant rapidement, avec douleur dans l'articulation de la mâchoire. — Forte envie de dormir qui est insurmontable. — Rêves anxieux et sursauts en s'endormant. — En dormant, agitation et juctation. — Humeur grondeuse et jurements à cause des douleurs. — Irascibilité et mauvaise humeur.

Tête. — Tête entreprise, comme à la suite de l'ivresse. — Confusion dans la tête, qui est comme vide et creuse. — Ivresse après avoir bu très-peu de vin. — Céphalalgie pressive, comme si tout allait sortir par le front, laquelle force à remuer la tête, et n'est soulagée qu'en se découvrant le corps, qui est d'une chaleur brûlante. — Céphalalgie violente, avec nausées fortement aggravées dès qu'on s'assied. — Douleur dans le sinciput, comme s'il était aplati. — Aggravation de maux de tête et congestion à la tête et au visage, en se baissant. — Sensation comme si du vent traversait la tête, en la remuant rapidement. — Sensation comme si la tête avait augmenté de volume.

Yeux. — Sensation de compression dans l'orbite. — Douleur d'excoriation dans les yeux, en remuant le globe ou les paupières. — Sensation de chaleur dans les yeux, en fermant les paupières, avec sensation comme s'ils nageaient dans les larmes. — Sensation de brûlure dans les yeux à la lumière des bougies.

Nos. — Gonflement semi-latéral du nez avec chaleur, pulsation et insomnie. — Ulcère douloureux dans la narine. — Épistaxis, quelquefois la nuit. — Grande sécheresse du nez. — Coryza fluent avec sécrétion excessivement abondante, d'une mucosité inodore et ressemblant à du suif.

Visage. — Chaleur de la face, augmentée en se baissant. —
Douleur de meurtrissure à la pommette aggravée au toucher.
— Douleur de luxation dans l'articulation maxillaire, en mâchant et en ouvrant grandement la bouche. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires. — Levres gercées, douloureuses.

Appétit. — Grande sécheresse du palais et de la gorge, avec sensation d'excoriation en avalant. — Insipidité des aliments. — Goût douceâtre de la bière. — Désir des choses acides ou salées. — Après le repas, la tête tourne comme si l'on était ivre.

Parties génitales. — Urines brûlantes et couleur d'argile, avec sédiment couleur d'argile. — Forte sueur des parties génitales. — Gonflement du prépuce, avec douleur d'excoriation au toucher. — Gonorrhée bâtarde, avec sécrétion fétide et de couleur vert jaunatre. — Ulcères rouges et lisses, au gland et aux parois internes du prépuce, avec sécrétion sanieuse et jaunatre. — Pollutions.

Poitrine. — Toux douloureuse, comme s'il y avait une pierre qui déprimât la plèvre. — Expectoration jaune, puriforme, à la suite de la toux. — En respirant profondément, sensation de froid



274 CORALLIUM RUBRUM. - CROCUS SATIVUS.

dans les voies aériennes, avec renaclement difficile du mucus

bronchique.

Membres. — Douleur pressive dans les omoplates, aggravée en toussant. — Roideur dans la nuque. — Douleurs dans les articulations scapulaires, comme si la tête de l'humérus était pressée violemment vers le dehors. — Taches lisses et de couleur rouge foncé, dans la paume des mains et aux doigts.

CROCUS SATIVUS.

CROC. — Safran cultivé. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 204. — Doses usitées : 6, 30. — Durée d'action : jusqu'à 7 jours.
ANTIDOTE : Op.

COMPARER AVEC : Acon. bell. ign. mos. op. plat.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Danse de Saint-Guy; Affections hystériques; Imbécillité; Mélancocolie; Mélancolie religieuse; Hémorrhagies actives; Coma; Blépharospasme; Métrorrhagie, même après l'accouchement ou par suite d'une frayeur; Hémoptysie?; Avortement; Lochies trop abondantes, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Mouvements, comme par quelque chose de vivant, dans différentes parties du corps. — *Accès de convulsions, comme la chorée, avec rires, danses et sauts, altermant avec des quintes de coqueluche. — Sensation de relâchement et de fléchissement dans les articulations. — Engourdissement de quelques membres, la nuit, pendant le sommeil. — Amélioration des symptômes au grand air; plusieurs d'entre eux apparaissent la nuit, et s'aggravent en général le matin. — Ébullition de sang quelquefois dans tout le corps. — *Écoulement par divers organes d'un sang noir et visqueux. — Pesanteur et courbature des membres après un léger exercice. — Alternation frappante des symptômes physiques et moraux les plus opposés. — Faiblesse générale excessive, avec accès d'évanouissement pendant le mouvement. — Grand accablement le matin. — Tremblement de tous les membres.

Peau. — Rougeur écarlate de tout le corps. — Engelures. — Sup-

puration d'anciennes blessures.





CROCUS SATIVUS.

Semmeil. - Forte envie de dormir, le jour, surtout après le repas, quelquesois le soir. - Somnolenes, avec yeux ternes et vitreux. Chants, cris et sursants pendant le sommeil. offrayants ou gais et plaisants.

Meral. — Grande disposition à la tristesse, alternant quelquesois avec grande gaieté et humeur joyeuse. — Forte envie de rire, de plaisanter et de chanter, quelquefois avec faiblesse excessive. -Manie gaie et plaisante, avec pâleur du visage, mal de tête et obscurcissement des yeux. — Abandon de son libre arbitre. — Emportement colérique et violence, fréquemment suivis d'un prompt repentir. - Alternation de dureté et de douceur dans le caractère. — Oubli et distraction. — Vivacité de la mémoire.

Tête. — Céphalalgie stupésiante comme si l'on était ivre, avec yeux abattus. - Vertige avec évanouissement. - Vertige confus en se levant après avoir été couché. — Céphalalgie au-dessus des yeux, avec douleur brûlante, sensation de brûlure et pression dans les yeux, surtout le soir à la lumière. - Tête lourde le matin, avec pression an vertex. - Douleur tractive dans le front, avec nausées. — Pulsation semi-latérale dans la tête et à la face. — Coups dans le front et les tempes. - Sensation de vacillement

du cerveau pendant le mouvement.

Yeux. — Prurit aux paupières. — Fourmillement dans les sourcils. - Pression, douleur d'excoriation et sensation de brûlure dans les yeux et les paupières, surtout en les fermant ou en lisant, ou le soir à la lumière. — Sensation de gonflement des yeux, comme si on avait beaucoup pleuré. — Sécheresse des yeux. — Larmoiement en lisant. - Agglutination nocturne des paupières. - *Frémissement visible des paupières. —* Lourdeur et contraction crampoide des paupières. - Crampes nocturnes dans les paupières. - Clignotement continuel des yeux. - Pupilles dilatées. - Besoin continuel de se frotter les yeux. trouble, comme à travers un voile, surtout le soir en lisant à la lumière des bougies. — Le papier semble avoir un reflet rose pâle en lisant. - Scintillement devant les yeux.

Oreilles. — Otalgie semblable à une crampe. — Tintement dans les oreilles le soir après s'être couché. — Bruissement dans les

oreilles, avec dureté de l'ouïe, surtout en se baissant.

Nex. — Epistaxis d'un sang noir et visqueux, souvent seulement par une narine, et jusqu'à faire perdre connaissance. - Eternument violent et fréquent.

Visage. - Couleur terreuse de la face. - Alternation de rougeur et de pâleur du visage. - Chaleur ardente du visage, surtout le matin. — Lèvres gercées et ulcérées. — Pulsations dans un seul côté du visage. — Taches rouges à la face.

Boushe. — Grattement et apreté dans la bouche. — Accumulation d'eau dans la bouche. — Langue humide et chargée d'un enduit

blanc, avec érection des papilles. *



CROCUS SATIVUS.

Gorge. - Mal de gorge comme par allongement de la luette, ou comme s'il y avait un tampon dans la gorge, pendant et hors le temps de la déglutition. - Grattement et apreté dans la gorge.

Appétit. — Goût répugnant, acide, douceâtre. — Goût doux ou amer au fond du gosier. - Soif continuelle, le soir, avec malaise dans le ventre après avoir bu. - Absence d'appétit avec sensation de plénitude pour peu qu'on ait mangé.

Estomac. — Renvois à vide, le matin à jeun. — Pyrosis après avoir mangé de bon appétit. - Fadeur, malaise et sensation d'accablement à l'épigastre. - Douleur brûlante à l'estomac. -

Borborygmes et fermentation à l'épigastre.

Ventre. - Ventre ballonné avec sensation de plénitude. - Maux de ventre crampoïdes. - Pincements dans le ventre après avoir bu (de l'eau). - Maux de ventre par refroidissement. - Mouvements dans le ventre, comme par quelque chose de vivant. -Coups au-dessous de l'hypocondre gauche. - Sensation de pesanteur dans la région inguinale.

Selles. - Prurit et fourmillement à l'anus. - Élancements obtus

à côté et au-dessus de l'anus.

276

Urines. — Écoulement de sang par l'urèthre. — Urines jaunes.

Règles. - Affluence de sang vers les parties génitales, comme pour les règles. - Règles trop fréquentes et abondantes. - Règles douloureuses. - *Métrorrhagies d'un sang noir et visqueux. Écoulement de sang pendant la nouvelle et la pleine lune.

Larynx. - Toux violente, sèche, ébranlante, très-soulagée en pas-

sant la main sur l'épigastre.

Poitrine. — Gêne de la respiration. — Besoin de respirer profondément, par suite d'une sensation de pesanteur au cœur. - En inspirant, sensation comme si l'on avait de la vapeur de soufre dans la gorge. - Haleine fétide. - Élancements dans la poitrine et surtout dans les côtés. - Mouvements comme par quelque chose de vivant dans la poitrine. - Coups dans la poitrine qui suspendent la respiration. - Sensation de chaleur qui remonte au cœur, avec anxiété et gêne de la respiration, soulagée par des bâillements. — Sensation de pesanteur au cœur.

Tronc. - Tiraillement dans les reins, avec douleur dans les aines. - Sensation de roideur au cou, pendant le mouvement. — Gon-

flement extérieur du cou.

Bras. — Douleur dans l'articulation scapulaire, en remuant le bras comme s'il était démis ou qu'il allât se déboiter. - Engourdissement des bras et des mains, avec immobilité, surtout la nuit, pendant le sommeil. - Tiraillement fouillant dans les avantbras. - Pesanteur et douleur de meurtrissure dans les avantbras, après les avoir remués légèrement. — Picotement brûlant et tension dans le bout des doigts, comme par stagnation du sang, après une promenade en plein air. - Engelures à la main et aux doigts.



CROCUS SATIVUS. — CROTALUS HORRIDUS.

277

Jambes. — Sensation de faiblesse dans les cuisses, en étant assis. Déchirement nocturne dans la jambe avec inquiétudes dans cette partie. — Douleur de meurtrissure dans les mollets. — Fatigue dans la plante des pieds, avec douleur brûlante et fourmillement. - Engelures aux orteils.

CROTALUS HORRIDUS.

CROTAL. — Venins dentaire du serpent à sonnettes. — lienne. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharm. homœop., p. 180. — Durée d'action : plusieurs semaines.

ANTIDOTES: 1º phosph., 2º arr. bell. caps.
COMPARER AVEC: 1º Bell. hep. merc., 2º ars. caus., 3º carb-veg. phos-ac.,
4º alum. capa. con. dulc. natr-m, n-vom. samb. veratr.
Voyez aussi Lachesis, tome II.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — La plupart des symptômes se manifestent du côté droit, et les douleurs paraissent occuper de préférence les ce des membres. — Les sujets gras paraissent en être plus affectés que les personnes maigres. -- Affections du printemps. — • Endolorissement de tous les membres, permettant à peine de rester couché. — oRhumatismes invétérés. — oParalysies. — Lassitudes, accès de défaillance, mort apparente. — Tremblement par tout le corps. — Spasmes et convulsions. — Hémorrhagies par toutes les ouvertures du corps. — Saignement facile des blessures. — °Chlorose?.

Peau et Lésions de continuité. — Ecchymoses. — Taches noires, rouges ou marbrées. — Taches jaunes par toute la peau. — • Jaunisse. — • Fièvre jaune. — Enflure cedémateuse du corps. Ulcères autour d'anciennes blessures. — D'anciennes cicatrices s'ouvrent de nouveau. — Gangrènes avec rougeur noirâtre.

Sommeil. — Grande somnolence, même au grand jour, ou le soir. - Le matin, au réveil, membres comme brisés. — *Délires noc-

turnes, avec yeux ouverts.

Fièvre. — Fièvre ardente. — Pouls presque insensible, tremblant, intermittent. - Fièvre typhoïde. - Fièvre tierce. - Soif pendant la fièvre.

Moral. — Abattement avec indifférence pour tout. — Angoisse et inquiétude. — • Mélancolie. — • Humeur querelleuse. — • Dé-

mence. — Faiblesse frappante de la mémoire.

Tête. — Vertiges. — Affections cérébrales. — oCéphalalgie par congestion de sang et constipation. - Secousses et vacillement dans le vertex, furtout en montant les escaliers. -- Élancements dans les tempes. - Prurit violent au cuir chevelu, avec formation de pellicules. — Gonflement de la têté.



CROTALUS HORRIDUS.

Yeux. - *Brûlement dans les yeux. - Rougeur des yeux, avec larmoiement. — Écoulement de sang par les yeux. — Yeux jaunes, ou ternes, troubles et enfoncés. - Pupilles dilatées. Scotomie, en lisant.

Oreilles. - Chaleur dans les oreilles. - Tiraillements avec sensation d'obturation. - Écoulement de sang par les oreilles.

Nez. - Saignement du nez, avec vertiges.

Face. - Face blanche comme de l'albâtre, cercle bleu autour des yeux. — Teint plombé. — Face jaune, °ou rouge et bouffie. — Érysipèle de la face. — °Boutons à la face, chez des jeunes filles, au printemps. - Lèvres tremblantes. - Crampe des mâchoires.

Dents. - Secousses dans une molaire, comme des coups. - Exfo-

liation des dents. — Vacillement des dents.

Bouche et Gorge. — Langue noire et gonflée. — Perte de la parole, comme par constriction de la langue et du gosier. - Parole confuse, indistincte. - Déglutition difficile de la salive. - Besoin fréquent d'avaler la salive, avec sensation comme si la gorge se

comprimait. - Hydrophobie rabiéique.

Gastricisme. - Régurgitation d'un liquide aigre et acre, après avoir mangé du pain blanc. — Pyrosis. — Nausées, par accès, surtout pendant la marche et la station. — Après avoir mangé quoi que ce soit, vomissement des aliments, violent, verdâtre, bilieux et très-amer. - Ventre tellement irritable que tout est

Estomac et Ventre. - Douleurs d'estomac. - Endolorissement du creux épigastrique. - Élancements dans le creux de l'estomac. - Pression dans l'estomac, avec goût rance dans la gorge. - Gêne des vêtements autour des hypocondres. - Pression sous la région splénique, ou élancements comme après une course forcée. - *Tranchées, °le matin et après le repas. - Brûlement dans le ventre. - Inflammation des intestins. - Ventre ballonne, comme trop plein, avec douleur au toucher et brûlement.

Anus et Selles. - Constipation avec mal à la tête. - Selles diarrhéiques fréquentes, avec coliques au-dessous du nombril. -

Evacuations involontaires. - Saignement par l'anus.

Urines. — Rétention douloureuse des urines, avec de hauts cris. - Sensation comme si une boule roulait dans la vessie et allait sortir par l'urethre. - Urines augmentées. - Urines saturées et augmentées. - Saignement par l'urêthre.

Parties viriles. — Appétit vénérien exalté.

Larynx. - Enrouement et voix basse, rauque. - Chatouillement dans la fossette du cou, provoquant la toux. - Toux sèche. Toux avec point de côté. - Expectoration sanguinolente. Hémoptypsie. - Douleur dans le larynx en y touchant.

Poitrine. - Respiration rapide, à bouche ouverte. - Grande oppression de poitrine ne permettant point, la nuit, de rester couché. - Dyspnée avec soif inextinguible. - Dyspnée avec



CROTALUS HORRIDUS. CROTON TIGLIUM.

279

angoisse, nausées, soif et diarrhée. — *Oppression jusqu'à foire tomber en défaillance. — Douleurs de poitrine, avec vomissements de matières verdâtres. — Pneumonie. — Péricardite.

Trens. — Manx de reins. — Gonflement sous la mâchoire et autour du cou.

Membres supérburs. — A l'articulation humérale, nodocités molles sons la peau, avec élancements. — Douleur d'excoriation au bras, par suite d'une contusion. — Tremblement des mains dans le repos. — Douleurs ostéocopes, paralysantes, dans les doigts. — Suintement de sang sous les ongles. — Panaris.

Membres inférieurs. — Jambes facilement engourdies en les - croisant. — Tiraillement depuis la hanche droite jusqu'au pied, le soir, en marchant. — Douleur crampoïde et lassitude dans les cuisses, comme après des efforts fatigants. — Ulcères à la cuisse. — Douleurs arthritiques au genou. — Gonfiement de la cuisse avec brûlement. — Douleurs de brisure aux malléoles, très-fortes en marchant. — Douleur d'excoriation dans la plante des pieds, comme pour avoir marché sur des choses aiguës. — Gonfiement des pieds, avec sensation de froid et brûlement en dedans. — Orteils comme fatigués par une longue marche.

CROTON TIGLIUM

CROT. — Graine de Tigli, Graine des Moluques. Pignon d'Inde. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac, homœop., p. 206. — Médicament encore très-peu connu du côté pratique.

SYNPTONES GÉNÉRAUX. —Lassitude générale et abattement; douleurs dans les membres. — Malaise général, avec lassitude, suivie d'envie de dormir, aggravé en se couchant, avec perte de la vue et de l'ouie; gouttes de sueur sur le front et sensation comme s'il lui était impossible d'atteindre la prochaine maison, avec vertige, pâleur du visage, lassitude et abattement, poussant à aller au grand air, où cependant on se trouve plus mal. — Benssein d'engourdissement de tout le corps. —Forte excitation de tout le corps; tremblement général. — Faiblesse, quelquefois avec malaise, ou bien avec abattement. — Accès d'évanouissements. — Amélioration des symptômes pendant le sommeil.

Peau. — Chaleur ardente, surtout aux mains, avec veines gonfiées; prurit suivi de douleur brûlante; inflammation vésiculeuse de la peau; rougeur avec pustules qui, le jour suivant, forment des croêtes; pustules avec inflammation presque générale des tégu-

ments du ventre et suivie de desquamation.



CROTON TIGLIUM.

Sommeil. — Bâillements fréquents, toute la matinée, avec sensation de flaccidité et d'endolorissement dans l'estomac. — Envie de dormir, invincible l'après-midi, vers midi, forçant à se coucher sans que cependant on puisse s'endormir, avec palpitations de cœur. — Sommeil agité la nuit, à cause d'une affluence de réves, qui quelquefois sont pénibles et anxieux. — La nuit, au lit, jactation anxieuse sans pouvoir dormir, puis sommeil subit avec rêves pénibles. — Réveil à minuit d'un sommeil lourd, avec jambes pesantes comme du plomb; au réveil, lassitude, brisement des membres et tête lourde et entreprise; mal de tête qui ré-

des membres et tête lourde et entreprise; mal de tête qui réveille. — Réveil subit.—On s'endort, couché sur le dos, et se réveille par une pollution. — Réves abondants, pénibles, affligeants, de soi-même.

Fièvre. — Froid: Facilement; surtout aux extrémités, avec chair de poule et se dissipant au lit; après midi, ne cessant pas même dans le lit; principalement au dos; surtout au ventre; des pieds jusqu'aux mollets; peau fraîche au corps, devenant chaude lorsque le pouls s'élève, avec transpiration; froid subit et pâleur des mains (comme mortes), avec rides aux doigts. — Frilosité, avec horripilation; le soir, frisson parcourant tout le corps. — État fébrile, quelquefois douloureux; d'abord augmentation de la chaleur du corps, puis sensation de froid dans le dos, dans la région des vertèbres lombaires. — Augmentation de chaleur dans tout le corps, dans le ventre. — Chaleur: partant des vertèbres lombaires; générale avec transpiration et céphalalgie; brûlante, cuisante, puis froid partant des vertèbres lombaires. — Pouls fréquent et plein, accéléré et irrité; faible et quelquefois fréquent en même temps, ou bien petit, plein, petit et accéléré. — Sueur,


quelquefois seulement au front.

Moral. — Tristesse, quelquefois avec répugnance pour le travail ou bien avec anxiété et déplaisir de toutes choses; mélancolie fréquente. — Agitation. — Humeur grognonne, quelquefois avec mécontentement. — Répugnance pour le travail, on ne veut que flâner et rien entreprendre de sérieux. — Aspect désordonné avec yeux hagards, étincelants. — Faiblesse de la

mémoire.

Tête. — Tête entreprise: en se levant, comme obscurcie, avec hébétude et pression dans le front; dans le front, avec pression et pesanteur; avec pression dans les tempes; dans l'occiput, quelquefois comme s'il était pris dans un étau (à gauche), avec pesanteur de la tête et fouillement dans les yeux, avec plénitude, obscurcissement et pesanteur dans le front, surtout à droite, avec pression descendant de l'occiput et se propageant jusque sous l'oreille avec des élancements; étourdissement dans la tête comme après des boissons spiritueuses. — Vertiges: avec maux de tête; avec pesanteur de la tête; à faire tomber en se tenant debout; ne permettant presque pas d'être assis, surtout en levant les yeux;

280



CROTON TIGLIUM.


avec embarras de la tête jusqu'au souper; en se promenant en plein air; surtout à droite, avec pression dans l'œil; dans le sinciput, avec tiraillements à travers le nez jusque dans le front. -Plénitude dans la tête : avec étourdissement et pesanteur dans le front; tout le jour avec forte pesanteur et ne permettant pas de hire; avec sensation de vertige dans le front, avec pression. -Pression dans la tête : dans la tempe droite et le côté du front : dans le sinciput, et quelquefois surtout à gauche, ou bien avec douleurs violentes, battements et tension, partant du front, avec embarras de toute la tête, aggravée après le repas ; étourdissante ; dans les orbites, aggravée dans l'appartement et vers le soir, surtout à l'air; pression à l'occiput. — Tension dans le sinciput, avec pression et élancements; serrement dans les tempes. — Décitirements: Remontant vers le vertex; dans le front, jusque dans la tempe droite où ils se changent en élancements. - Élancements : Dans le front, au-dessus de l'œil droit; dans la tempe gauche; entre l'occiput et la nuque. — Congestion à la tête, partant du ventre, avec peau ardente et transpiration. — A l'extérieur : Picotement aux téguments de la tête, fourmillement à l'occiput; tressaillement à la tête; brûlement à la tempe; comme par des charbons ardents; sensibilité des téguments de la tête, le chapeau fait mal.

Youx. — Élancements, surtout dans l'œil gauche; tressaillements et élancements dans l'angle gauche, avec contractions fréquentes et tressaillement de tout l'œil; douleurs contractives dans les paupières gauches, surtout vers l'angle interne. — Prurit aux paupières. — Irritation de la conjonctive; rougeur inflammatoire de la conjonctive gauche; inflammation de l'œil dans lequel une goutte d'huile s'est introduite, occupant tout le côté du visage; gonflement œdémateux des paupières; petites vésicules autour de l'œil; gonflement d'une glande sous la peau, au-dessous de la paupière inférieure droite, avec rougeur de la peau. — Fort tremblement des paupières. — Larmoiement. — Vue trouble, comme à travers un brouillard ou de la fumée; nuage descomme l'œil faible, devant les deux; la rue se perd, quelquefois comme par un vertige (dans l'appartement), ou bien par pesanteur et faiblesse des yeux.

Oreilles. — Epreinte dans l'oreille gauche; quelquefois spasmodique et profondément dans l'intérieur; pression sourde vers les deux conduits auditifs; pression et tournoiement vers le trou de l'oreille avec embarras de la tête; élancements au-dessous de l'oreille gauche. — Dureté de l'ouie, par l'oreille droite: perte de l'oreil de courte danée, houit dans les crailles.

l'ouie de courte durée; bruit dans les oreilles.

Mes. — Inflammation du nez et de toute la face. — Éruption à la cloison, avec rougeur de cette partie, douleur au toucher, et petites vésicules jaunes qui, plus tard, forment une croûte et s'écaillent enfin. — Irritation de l'intérieur du nez: sécheresse;



CROTON TIGLIUM.

282

manque de respiration par le nez. — Augmentation de la sécré-

tion nasale; léger coryza.

Face. — Pâleur et froid du visage; chaleur augmentée; brûlement quelquefois, surtout aux joues, ou bien à toute la face et durant plusieurs jours. — Inflammation de la face et du nez; gonflement du visage, éruptions de boutons. — Lèvres brûlantes, quelquefois surtout aux commissures des lèvres et avec gonflement des bords externes; tension dans les commissures des lèvres; sécheresse des lècres, quelquefois avec gerçures, ou bien surtout le soir, et avec tension. — Dans l'articulation sous-maxillaire gauche, tiraillement; gonflement d'une glande, avec douleur au toucher.

Dents. — Dans une molaire creuse, douleur d'excoriation en mâthant. — Gencires saignant en les nettoyant; gonflement inté-

rieur, quelquefois douloureux.


Bouche. — Bouche comme brûlée à l'intérieur; ardeur dedans; sécheresse avec grattement dans la gorge. — Accumulation d'eau, quelquefois avec écoulement par les coins de la bouche; sécrétion de salive augmentée, avec sensation de chaleur dans la bouche; salivation fréquente; irritation des glandes salivaires, forçant à cracher souvent, provoquant une sensation de brûlement et une âcreté avec goût rance dans la gorge, ne cessant qu'après avoir éprouvé dans le rectum des symptômes analogues qui sont suivis d'une selle. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Gonflement du palais; chatouillement, grattement et brûlement à la jonc-

tion des parties molles et solides.

Garge. — Sensation, dans la gorge, d'une cheville qu'on ne peut avaler. — Tressaillement dans la gorge. — Grattement dans la gorge: forçant à renâcler; brûlant dans le gosier et le larynx; précédé de sensation de rudesse; suivi de brûlement; éloigné en prenant du bouillon.—Brûlement dans la gorge: comme par du poivre; continuel, avec contraction, fort amélioré après un court sommeil; amélioré en inspirant, aggravé en expirant; ardeur dans la gorge et l'œsophage, jusque dans l'estomac. — Luette rouge et allongée; amygdales gonflées et douloureuses à la pression. — Sécheresse du gosier: avec irritation, comme par inflammation; avec difficulté d'avaler; avec expectoration de mucosités acides comme du vinaigre. — Expectoration abondante de mucosités visqueuses, avec goût acide.

Appétit et Goût. — Goût: d'amandes; fade, avec fourmillement douloureux au bout de la langue; pâteux, avec langue chargée d'un enduit blanc; doux amer, et comme par l'électricité au bout de la langue; amer; acide, âcrc, remontant à l'estomac. — Appétit diminué de même que la soif; appétit nul; dégoût répugnance pour la bière; impossibilité de manger, même de l soupe au lait, à cause de dégoût et de maux de cœur; après avo pris du lait, fort dégoût et nausées, avec envie de vomir. — Apr

le repas, mal au ventre.



CROTON TIGLIUM.

lymptômes gastriques. — Renvois : arec nausées, quelquefois urtout après avoir bu, ou bien avec abattement; avec dégoût. Régurgitations : d'eau; de bile, le soir. — Hoquet. — Nausées et envie de vomir : fréquemment ; avec dégoût persistant et malaise ; avec dégoût; continuels, avec froid, régurgitation d'eau et salivation; avec vertige et absence d'appétit, ne permettant presque pas d'écrire; dans le ventre, avec vomiturition; haut-le-cœur fréquents avec accumulation d'eau dans la bouche. - Vomissements : Avec nausées; du café ingéré; de mucosités, avec amertume de la bouche : d'une eau jaunâtre, avec odeur d'huile et goût douceatre, comme l'huile; après le repas, d'eau, de mucosités et de pain, avec nausées continuelles; amers le soir, des aliments ingérés au souper, précédés de nausées, plénitude et pression à l'estomac, suivis de sueur à la face; la nuit, d'un liquide acide, d'odeur àcre, précédés de nausées; violents des aliments ingérés, en se promenant en plein air (après de fortes nausées), ou bien d'eau et a la suite de nausées, aggravées après des tartines de beurre ; forts, subits, d'une eau écumeuse, blanc jaunâtre, avec efforts spasmodiques ; vomissements de bile.

Estomac. — Plénitade: avec sensibilité douloureuse de l'estomac; pressive, quelquesois avec nausées et absence d'appétit. — Sensibilité douloureuse de l'estomac: au toucher; avec sensation de vacuité et nausées avec envie de vomir jusqu'après midi. — Pression à l'estomac: avec mouvement dans le ventre; avec chatouillement; avec angoisse; avec malaise dans le ventre; avec serrement, angoisse, et malaise excessif, ou bien accompagné de tension; pression dans le creux de l'estomac. — Contractions dans l'estomac, avec pression dans le creux et écoulement d'eau par les yeux et le nez; mouvements spasmodiques, comme pour vomir, avec nausées; rétrécissement de la partie supérieure de l'estomac. — Crattament dans l'estomac, brûlement, quelquesois comme

— Grattement dans l'estomac; brûlement, quelquefois comme par des charbons ardents; brûlement et chaleur dans le creux de l'estomac; borborygmes, avec pesanteur sur la poitrine.

Ventre. — Dans la rate : élancements; pression. — Douleurs violentes dans le ventre et l'estomac; bas-ventre affecté et dou-loureux; maux de ventre améliorés après avoir pris une soupe au lait; douleur permanente dans le ventre en touchant le nombril, avec bruit dans le ventre et maux de ventre; douleur dans la région ombilicale et le bas-ventre; les douleurs dans la région ombilicale sont aggravées par le toucher, ou en appuyant dessus, sur quoi elles s'étendent quelquefois jusqu'à l'anus qui sort alors. — Coliques dans la région ombilicale, quelquefois surtout le soir, et avec ballonnement du ventre qui est suivi d'une selle; douleur comme si les intestins se tordaient dans la région ombilicale, suivie de déchirements dans le côté gauche; violentes douleurs spasmodiques dans le ventre, plus fortes en étant assis courbé, qu'en marchant et en se tenant debout. — Tension dans le ven-




CROTON TIGLIUM.

284

tre : entre l'ombilic et le creux de l'estomac; pénible et spasmodique dans la partie supérieure du ventre, surtout en étant assis; forte avec ballonnement de tout le ventre, selle, émission de vents fétides, et forte aggravation de tous les symptômes en étant assis; dans la région ombilicale, en étant assis, avec pression sur l'anus. - Pression dans le ventre : en sortant, remontant vers l'estomac, avec nausées subites, et avec pincements et tension dans l'ombilic; au-dessus du nombril avec serrement. - Pincement dans le ventre : avec borborygmes; dans la région ombilicale, quelquefois surtout en marchant; avec tranchées, quelquefois surtout dans la région ombilicale et le côté gauche du ventre; avec pression sur l'anus; fort, en se réveillant, avec grondement dans le ventre, peu après, émission de vents fétides avec fort besoin d'aller à la selle, et évacuation avec tranchées et spasmes abdominaux. - Tranchées : avec pincements ; dans le colon transversum, renouvelées après chaque selle ; partant de l'ombilic, coupant presque la respiration, et forçant à se courber de côté; au-dessus de l'ombilic, comme avec des couteaux, se dissipant après une selle, dans la région ombilicale et les intestins en même temps, ou bien suivies d'une selle; au-dessous de l'estomac, dans le ventre. - Déchirements dans le ventre : Pendant le repas; dans le côté droit du ventre, avec douleurs incisives au-dessous de l'estomac, dans le colon, dans la région ombilicale, après le repas. - Elancements dans le ventre : au-dessus de l'ombilie; à gauche de l'ombilie; dans le cœcum; dans la région de l'S romain. - Douleurs d'excoriation dans le bas-ventre, en toussant : sensation comme si de l'eau tiède se mouvait dans les intestins, surtout du côté gauche; sensation de froid dans le ventre. — Pesanteur : dans la partie supérieure du ventre avec nausées; dans le bas-ventre, avec rétraction du ventre. - Plénitude dans le ventre : avec borborygmes et coliques; avec pincements: avec tension et coliques dans la région ombilicale. Ballonnement du ventre tout le jour avec tension et borborygmes aggravés en marchant. - Mouvements dans le ventre; fluctuation comme par de l'eau; borborygmes, quelquefois à gauche; grondement surtout dans les intestins grêles. - Extérieurement, chaleur fourmillante dans les téguments du ventre. - Dans les aines, tension et douleur. - Emission de vents : avant la selle : avec borborygmes dans le ventre; fréquente, quelquefois avec elancements, ou bien comme avant une selle molle; vents fétides.

élancements, ou bien comme avant une selle molle; vents fétides.

Selles — Anus. — Besoin d'aller à la selle: avec grondement et pincements dans le ventre; comme par chaleur et agitation dans le ventre; avec pression sur l'anus comme par une diarrhée; le matin au lit, et après s'être levé, selle suivie de douleur d'excoriation à l'anus; subit, immédiatement après s'être levé ou donné de l'exercice; si pressé qu'il ne peut aller assez vite pour atteindre le vase. — Selles: molles, comme de la bouillie, quelquefois avec



CROTON TIGLIUM.

brûlement à l'anus; visqueuses; muqueuses; aqueuses, quelquefois très-abondantes et fréquentes, même la nuit, ou bien avec élancements à l'anus; liquides avec grattement à l'anus; jaunes, diarrhéiques, quelquefois après les vomissements, ou bien avec sueur; muqueuses, avec ténesme; vert foncé liquides, suivies de lassitude de longue durée; d'abord fermes, puis bilieuses-muqueuses, et enfin aqueuses; brunes, en bouillie, avec mucosités, ou bien suivies de borborygmes dans le côté gauche; vert grisatre, brun sale, promptes et partant d'un seul jet. — Après avoir pris du café, les selles (fréquentes) cessent. — Après la selle : tiraillements et pression dans le haut du ventre et la région oute bilicale. — Émission d'ascarides et de ver solitaire. — Dans le rectum, pression et ténesme, avec tranchées à se tordre en étant assis. — Dans l'anus : brûlement, quelquefois ne permettant pas de rester assis, et avec gonflement des alentours, ou avec pulsations et élancements; grattement après la selle; douleur d'excoriation et brûlement après s'être donné de l'exercice, douleurs contractives et élancements en marchant; douleur comme si une cheville cherchait à sortir; douleur d'excoriation après la selle, avec sortie de l'anus et besoin d'aller à la selle, et en comprimant le ventre, pression sur l'anus jusqu'aux parties génitales et au gland, avec cela forte angoisse, oppression, sueur au front et nausée avec perte de la vue et de l'ouïe; le repos adoucit les douleurs.

Urines. — Dans la région rénale droite, forts élancements qui coupent la respiration; excitation des reins, avec urine abondante. — Besoin d'uriner, quelquefois immédiatement après avoir uriné; émission augmentée, quelquefois arec urine fréquente, même toutes les demi-heures. — Urine jaune abondante; nuage dans les urines, qui quelquefois sont troubles; après que le nuage s'est dissipé, des cristaux bruns nagent à sa place; urine pâle, écumeuse, le matin; pâle, avec sédiment blanc, le jour; jaune orange, pâle, la nuit, un peu trouble et floconneuse au fond; foncée, enflammée et très-floconneuse, la nuit et le matin; rouge de sang, déposant beaucoup de mucosités au fond, qui, en les remuant, s'allongent en fils; sédiment trouble dans les urines, puis urine avec pellicule irisée. — En urinant, ardeur dans l'urèthre, ou dans le gland.

Parties génitales. — Verge douloureuse avec rougeur du gland et élancements dans l'urèthre; tiraillements dans le cordon spermatique gauche, empêchant de marcher; testicule gauche rétracté, le droit pendant et flasque; éruption dartreuse au scrotum; érections. — Règles trop peu abondantes ou tout à fait supprimées et avec dyspnée et palpitations de cœur, surtant en

montant un escalier.

Larynx. — Enrouement; voix rauque, quelquefois comme par un rhume ou avec besoin de renâcler; chatouillement dans le larynx;



CROTON TIGLIUM.

sécrétion et accumulation de mucosités, augmentées quelquefois avec chatouillement ou principalement le soir; catarrhe bronchique; pression sur le laryux, surtout à gauche. — Toux, avec renâclement fréquent; continuel, quelquefois avec mucosités dans les bronches, qui ne veulent pas se détacher; avec expectoration de mucosités, surtout le matin, ou bien le soir, et avec pression sur la poitrine; mucosités continuelles dans les poumons,

qui ne se peuvent détacher, avec dyspuée et sifflement en respirant profondément.

286


Poitrine, Respiration. — Respiration : empêchée par des maux de ventre : difficile ; avec oppression, quelquefois avec angoisse ; respiration génée, quelquefois avec plénitude et angoisse dans la poitrine; respiration courte après la selle; dyspnée; aggravée en montant l'escalier. - Poitrine douloureuse en appuyant dessus; plénitude et sensibilité douloureuse des deux cavités, avec élancements brûlants à gauche et vers les deux omoplates, ou bien avec pression et brûlement à droite et à gauche; malaise particulier dans la poitrine et le ventre; sensation de vacuité dans la poitrine. - Pression sur la poitrine : en respirant profondément ; forte, le soir ; profondément dans le milieu de la poitrine. - Elancements dans la poitrine : en bas, à droite, en inspirant ; du côté gauche quelquefois, surtout le soir. - Pulsation, derrière. du côté droit. - Brûlement dans la poitrine, quelquefois violent, jusque dans les intestins. - Palpitations de cœur : violentes quelquefois, que l'on peut sentir extérieurement; pendant le coit; après le repas, surtout en étant couché; battement subit dans la région de l'aorte. - Elancements fréquents dans la région du cœur, quelquefois surtout en inspirant; tressaillement fréquent vers le cœur; le ventricule gauche du cœur est surtout affecté. - Extérieurement, pulsation, glouglou, et battements sur la poitrine; déchirements.

Dos, Reins, etc. — Dans les lombes, fourmillement, comme par des insectes. — Dans les vertèbres cervicales, pressions et tirail-

lement.

Extrémités supérieures. — Sur l'épaule droite, pression; élancements dans la gauche. — Dans les bras, pesanteur et lassitude; brisement tensif; sensation de pesanteur et accablement; déchirement dans le droit. — Dans le coude gauche, térébration dans l'articulation. — Dans l'avant-bras droit, tiraillement; tension, pression et brisement; déchirement dans le gauche. — Dans la main droite, tiraillements. — Dans les doigts gauches, tressaillements; tiraillements et déchirements dans le doigt du milleu gauche; douleurs fouillantes dans les dernières phalanges des doigts.

Extrémités inférieures. — Dans l'articulation coxo-fémorale gauche, douleur tensive, sensible surtout en se levant de son siége; tiraillements et gonflement dans les fesses, à l'anus, après



CROTON TIGLIUM. — CUPRUM METALLICUM.

s'être donné du mouvement. — Dans les jambes, lassitude et accablement. — Dans les ouisses, tension et brûlement; brûlement pruriant à la gauche; sensation de paralysie à la même. Dans les genoux, fouillement et déchirement; tension et picotement; soullement arthritique. — Dans la jumbe gauche, picotement; déchirement; tressaillement pendant la sieste; ardeur pruriante au tibla droit. — Au pied droit, pesanteur et pression dans l'articulation; élancements dans les deux, quelquefois comme s'ils étaient luxés (gauche); tressaillement et déchirement dans la plante du pied gauche. - Dans les orteils, élancements et déchirements, surtout dans les gros.

CUPRUM METALLICUM.

CUPR. — Caivre métallique.—Hannenann. — Hist. mat. et prép. Pharmac. homosop., p. 99. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 30 à 30 jours dans quelques cas de maladies enroniques.

Antidotes : Bell. chin. cocc. dulc. hep. ipec. merc. n-vom.— On l'émploie comme anti vote de : Aur.

Comparer avec : Bell. calc. chin. cocc. dros. dulc. hep. iod. tpec. merc. n-rom. puls. rhue. sulf. verair. — C'est surtout après verair. que le cuivre se montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le cuivre conviennent quelques si Calc. verair.

CLINIQUE. - Se laiseant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: - Affections rhumatismales; Douleurs ostéocopes; Affections spasmodiques et convulsions, surtout chez des personnes irritables et sensibles; Epilepsie; Danse de Saint-Guy, aussi par suite d'une frayeur; Faiblesse, avec surexcitation du système nerveux; Consomption?; Paralysies?; Ictère?: Eruptions chroniques?; Gale?: Ulcères incétérés; Dartres?; Carie?; Fièvres hectiques?; Fièvres lentes?; Mélancolie?; Manie; Rage?; Encéphalite?; Ophthalmies?; Gastralgie?; Gastrite?, et autres affections gastriques; Choléra asiatique; Coliques spasmodiques; Diarrhées; Coqueluche; Hémoptysie?; Croup?; Asthme spasmodique, principalement chez les enfants par suite d'un refroidissement, ou chez les femmes pendant les règles, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirements pressifs ou tressaillements dans les membres. — Douleur de meurtrissure à plusieurs endroits, surtout aux articulations et aux membres. Douleurs ostéocopes. - Douleurs rhumatismales. - Beaucoup de



CUPRUM METALLICUM.

douleurs, surtout celles qui sont pressives, s'aggravent au toucher. — Douleurs ébraniantes qui parcourent tout le corps, — Secousses ou coups douloureux à diverses parties. — En pleurant, convulsions avec manque d'haleine, et rétraction des cuisses. - *Spasmes toniques, avec perte de connaissance, renversement de la tête en arrière, rougeur des yeux, salivation et émission fréquente d'urines. — *Convulsions épileptiques. oMouvements involontaires des membres, comme dans la danse de Saint-Guy, avec rougeur du visage, distorsion des yeux, du visage et du corps, pleurs et anxiété, bouffonneries et envie de se cacher. - Les convulsions commencent le plus souvent aux doigts et aux orteils. - Rire spasmodique. - *Tressaillements convulsifs, la nuit, en dormant. - *Convulsions violentes, avec grand déploiement de forces. - Affections paralytiques. - Symptômes qui apparaissent périodiquement et par groupes. Grande lassitude et affaissement de tout le corps. - *Faiblesse opiniâtre. - Consomption. - *Surimpressionnabilité de tous les organes. - Accès d'évanouissement.

Peau. — Éruptions qui ressemblent à la gale. — Dartres avec écailles jaunes. — Carie. — Éruptions miliaires, surtout à la poi-

trine et aux mains. - OUlcères opiniatres.

Sommeil. - Sommeil profond, avec secousses dans le corps, et tres-

saillement des membres.


Fièvre. — Frissons après les attaques d'épilepsie. — Fièvres lentes.

- Sueur froide. - Fortes sueurs la nuit.

Moral. — Mélancolie, avec accès d'angoisses mortelles. — *Manque de force morale. — Anxiété et pleurs, alternant avec bouffonneries. — Douceur alternant avec obstination. — Inaptitude au travail, avec crainte de l'oisiveté. — Accès d'aliénation, avec idées fixes d'occupations imaginaires auxquelles on croit se livrer, ou avec chants gais, ou bien avec malice et morosité, et souvent avec pouls accéléré, yeux rouges, enflammés, regards égarés et suivis de sueur. — Fureur. — Démence. — Perte des sens et de

l'esprit. — Délire. — °Caractère très-peureux.

Tête. — Vertige en lisant et en regardant en l'air. — Vertige tournoyant, comme si la tête allait pencher en avant. — °Sensation, comme si la tête était vide. — Douleur à faire crier, à l'os pariétal, en y portant la main. — Douleurs de meurtrissure dans le cerveau et les orbites, en remuant les yeux. — Dépression stupéfiante dans la tête, avec fourmillement au vertex. — Pression aux tempes, aggravée par le toucher. — Tiraillement dans la tête, avec vertiges, amélioré en étant couché. — °Mal à la tête à la suite d'une attaque d'épilepsie. — Élancements extérieurs, brûlants, dans le côté du front, aux tempes et au vertex. — Douleurs à l'occiput et à la nuque, en remuant la tête. — Gonflement de la tête, avec visage rouge. — Distorsion de la tête, de côté et en arrière.



CUPRUM METALLICUM.

Youx. — Démangeaison dans les yeux, vers le soir. — *Pression dans les yeux et les paupières, aggravée au toucher. — Yeux rouges, enflammés, égarée, fixes. — Convulsions et mouvements inquiets des yeux. — Yeux proéminents, brillands. — Yeux formés. — Pupilles insensibles. — Obscurcissement de la vue. — Douleum de meurrents dans les orbites, en tournant les yeux.

Oreilles. — Déchirements dans les oreilles. — Pression dans les oreilles, comme par un corps dur.

Mes. — Forte congestion au nez. — *Obturation du nez. — Violent coryza fluent.

Visage. — Visage pâle, avec yeux abattus et cernés. — Visage bleuâtre. — Distorsion spasmodique du visage. — Air triste, anxieux. — Rougeur de la face. — Lèvres bleuâtres. — Excoriation de la lèvre supérieure. — Pression à la mâchoire inférieure, augmentée par le toucher — Crampe à la mâchoire.

tion de la lèvre supérieure. — Pression à la mâchoire inférieure, augmentée par le toucher. — Crampe à la mâchoire.

Dents et Bouche. — Odontalgie, avec tiraillements aigus, jusque dans les tempes. — Bouche pâteuse, le matin. — Accumulation d'eau dans la bouche. — Écusse à la bouche. — Sensation brûlante dans la bouche. — Langue muqueuse, chargée d'un enduit blanc. — Cris, comme le coassement des grenouilles. — Perte de la parole. — Obott de la langue froid.


Gerge. — Sécheresse de la gorge, avec soif. — Inflammation du pharynx, avec déglutition empêchée. — *On entend le bruit que font les boissons en descendant. — Gonflement des glandes du

Appétit. — Goût douceâtre, ou métallique, ou acide, salé. — Goût aqueux des aliments. — Appétence pour les choses froides, plutôt que pour les chaudes.

Estomac. — Renvois continuels. — Hoquet. — eÉcoulement d'eau, comme des pituites, après avoir pris du lait. — Nausées avec envie de vomir, depuis le bas-ventre jusque dans le gosier, mais principalement à l'épigastre, avec ivresse, dégoût, et goût putride dans la bouche. — Vomissements périodiques, violents, soulagés en buvant. — Vomissements de bile, d'eau, de glaires ou même de sang. — Vomissements violents, avec pression dans l'estomac, crampes dans le ventre, diarrhée et convulsions. — Crampes d'estomac. — *Pression excessivement pénible à l'estomac et à l'épigastre aggravée par le toucher et le mouvement. — Anxiété à l'épigastre.

Ventre. — Douleurs de meurtrissure dans les hypocondres, au touchez. — Douleurs tractives, depuis l'hypocondre gauche jusque dans la hanche. — Douleurs violentes dans le ventre, avec grande anxiété. — Ventre dur, avec douleurs violentes au toucher. — Pression dans le rentre, comme par un corps dur, aggravée au toucher. — Rétraction du ventre. — Coliques spasmodiques arec conculsions et cris aigus. — Ulcères lancinants et rongeants dans

les intestins.



CUPRUM METALLICUM.

290

Selles. — Constipation, avec grande chaleur du corps. — Diarrhées violentes, quelquefois sanguinolentes. — Saignement des boutons hémorrhoidaux de l'anus.

Urines. — Besoin pressant d'uriner, avec émission peu abondante. — Émission fréquente d'urines fétides, visqueuses. — Élancements brûlants dans l'urèthre, pendant et hors le temps de l'émission des urines. — °Pissement nocturne.

Parties génitales. — Gonflement de la verge, avec inflammation du gland. — Avant les règles, ébullition de sang, battement de

cœur et mal à la tête.

Larynx. — Enrouement opiniatre, avec besoin de se coucher. — Bruit dans les bronches, comme par des mucosités. — Chatouillement dans le larynx. — *Toux sèche, avec étouffement, comme la coqueluche. — Toux avec expectoration de mucosités blanchâtres, pendant les accès d'asthme spasmodique. — Toux matutinale,

avec expectoration de matières putrides.

Poitrine.— Respiration accélérée, râlante, gémissante, avec efforts convulsifs des muscles abdominaux.— Respiration difficile, courte, avec toux spasmodique et crépitation dans la poitrine. — Toux, avec respiration sifflante, aussitôt qu'on tâche de respirer. — Gêne de la respiration, augmentée en toussant, en riant, en renversant le corps en arrière, etc., ainsi que la nuit. — Asthme en montant ou en marchant vite, avec besoin de respirer profondement. — Asthme spasmodique. — Accès de suffocation. — Pression à la poitrine. — Contraction douloureuse de la poitrine, surtout après avoir bu. — Crampes de poitrine, qui coupent la respiration et la voix. — Battements de cœur.

Trone et Bras. — Sensation de pesanteur dans les glandes axillaires. — Gonflement des glandes du cou. — Dartre dans le pli du coude. — Gonflement de la main, avec inflammation d'un vaisseau lymphatique jusque dans l'épaule. — Pression et tiraillements aigus dans les os du métacarpe. — Faiblesse et paralysie de la main. — Tressaillements des mains, le matin, après le lever. — Torpeur et racornissement des doigts. — °Convulsions

aux doigts.

Jambes. — Douleurs aux jambes, surtout aux mollets, pendant le repos. — Douleurs tensives et crampes aux mollets. — Douleurs pressives et tractives dans le métatarse. — Sensation brûlante à la plante des pieds. — "Sueur aux pieds. — "Suppression de la sueur aux pieds. — "Convulsions aux orteils."



CUPRUM ACETICUM.

291

CUPBUM ACMIICUM.

CUPR-AG. — Actate de quivre, verdet, vert-de-gris. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmec. homesop., p. 98. — Peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Lassitude, avec tremblement et manque d'appetit; grande faiblesse, quelquefois avec convulsions; impossibilité de se tenir debout. — Insensibilité et faiblesse; roideur des membres et du corps; paralysie des membres. Couché sur le côté, l'animal montre de l'angoisse, avec évacuations intestinales verdâtres et écumeuses; il était étendu, presque sans respiration, avec besoin de vomir et mort prompte; position sur le dos, avec tête renversée en arrière; grande agitation et cris fréquents. — Trismus, avec spasme dans le palais et mutisme; tressaillements convulsifs, avec mouvements comme pour macher et avaler, vomissements douloureux et dyspnée. — Jaunisse; Inflammation et gonflement (par des applications extérieures). - Fièrres, avec ballonnement du ventre et constipation; chaleur, avec pouls dur, céphalalgie, difficulté d'avaler et ballonnement du ventre; pouls petit et contracté. -Angoisse extrême, avec comissements, coliques, soif, froideur des membres et pouls accéléré et spasmodique; tristesse et abattement, avec yeux enfoncés, langue humide, goût fade dans la bouche, manque d'appétit, renâclement continuel, renvois avec **goût de cuivre, soif violent**e et pouls petit. — Délire.

Tête. — Fes. — Pesanteur de la tête et légère surdité; céphalalgie violente avec soif et fortes coliques. — Sur la fuce, expression

de forte angoisse; écoulement de sang par le nez.

Bymptomes gastriques. — Goût cuivreux et langue chargée d'un enduit grisâtre. — Répugnance pour le boire et le manger (chez des animaux), quelquefois avec vomiturition. — Renvois avec goût cuivreux et renâclement continuel. — Envie continuelle de romir, quelquefois avec toux et respiration conrulsive; ou bien avec émission fréquente d'urine. — Vomissements, quelquefois très-fréquents, avec coliques et convulsions; vomissement verdâtre, blanc, écumeux; vomissement fréquent de matières bleuâtres, suivi de vomiturition; gémissements, dyspnée et pouls irrégulier et fréquent; romissements et éracuations diarrhéiques; vomissement sanguinolent, à la suite de vomituritions fréquentes.

Estomac — Ventre. — Dans la région précordiale, déchirements; contractions périodiques de l'estomac. — Ventre rétracté, peu sensible à la pression; violentes coliques accompagnées de comis-



292 CUPRUM ACETICUM. — CUPRUM CARBONICUM.

sements et de diarrhée; coliques nocturnes avec vomissements, fort gonflement du ventre, avec évacuation abondante de matières fécales; ventre dur, ballonné, douloureux au toucher.


Selles et Urines. — Selles avec beaucoup de vers, noirâtres ou avec mucosités sanguinolentes; selles vertes, quelquefois avec vomissement douloureux; selles accompagnées de ténesmes et de faiblesse générale. — Urine trouble, rouge foncé, avec sédiment jaune, accompagnée de forte soif et de malaise général.

Parties sexuelles. — Règles très-abondantes et violentes.

CUPRUM CARBONICUM.

CUPR-CARB. — Sous-carbonate de cuivre. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 99. — Peu connu.

SYMPTOMES. — Lassitude, quelquefois avec pouls petit, contracté, et céphalalgie violente, ou bien avec insomnie et pouls faible, faiblesse et évanouissements fréquents; douleurs dans les membres; paralysie des membres (bras et jambes); tressaillements convulsifs, quelquefois violents; symptômes apoplectiques. - Fièvre et stupeur léthargique; pouls petit, inégal, un peu convulsé. - Angoisse avec tremblement des membres et douleurs d'estomac; rage, avec coliques, vomissements et évanouissement. — Céphalalgie violente, quelquefois avec vomissement. Teint pâle; face hippocratique, avec ventre douloureusement ballonné. — Goût cuivreux dans la bouche. — Nausées, avec vomissement vert, coliques, convulsions, et perte de la connaissance; dégoût, quelquefois avec vomissements et constipation; haut-le-cœur, avec vomissement et colique, accompagnés de forte angoisse. - Vomissements, quelquefois violents, ou bien continuels, le plus souvent avec coliques riolentes, ou avec mouvements convulsifs et spasmes; vomissements avec diarrhée sanguinolente. — Maux d'estomac, quelquefois très-violents, avec vomissements et colique (ou ténesmes); ardeur dans l'estomac. — Maux de ventre, quelquefois avec vomissements violents et fréquents; tranchées violentes et fièvre; déchirements et tranchées dans le ventre; coliques violentes, quelquefois avec flatuosités, ou avec romissements (quelquefois de matières bilieuses avec vomiturition et manque d'appétit); le matin, vers deux heures, coliques avec vomissements; coliques périodiques, suivies de tremblement des membres et de transpirations abondantes. - Constipation de longue durée; diarrhée de longue durée. -Asthme. — Faiblesse et douleurs dans les extrémités inférieures; crampes dans les mollets.



CYCLAMEN EUROPÆUM.

CYCLAMEN EUROPÆUM.

YCL. — Cyclame d'Europe. — Hannemann. — Hist. nat. et prép. Voy. Phar-mae. homœop., p. 201. — Médicament encore peu connu, et qui n'a été employé que contre des Maux de dents et quelques Affections gastriques. CYCL.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Traction pressive ou déchireents, principalement aux endroits où les os sont recouverts immédiatement par la peau. — Pendant le mouvement, toutes les souffrances disparaissent, excepté l'abattement; mais de nombreux symptômes se manifestent lorsqu'on est assis. — Grande lassitude, surtout le soir, avec courbature et roideur dans les jambes et pression tractive dans les cuisses et les genoux.

Peau. — Démangeaison rongeante à plusieurs parties de la peau, surtout en étant assis. - Démangeaison lancinante et insup-

portable le soir au lit.

Sommeil. — Grande envie de se coucher et de sommeiller. — Le soir, sommeil tardif, avec pulsations sensibles au cerveau. — Cau-

chemar après s'être endormi.

Fièvre. — Frissons fébriles et froids, suivis de chaleur, surtout au visage, avec rougeur, augmentant après le repas, ensuite anxiété avec chaleur à quelques parties, au dos de la main et à la nuque, mais non au visage. — Sueurs froides.

Moral. — Chagrin secrèt et trouble de conscience. — Mauvaise humeur et maussaderie avec éloignement pour la conversation, par accès. — Amour du travail, alternant avec paresse. — Mémoire alternativement vive et faible. — Lourdeur et confusion

de l'esprit, avec inaptitude à toute espèce de travail.

Tête. - Vertiges, étant debout, comme si le cerveau remuait. -Mal de tête étourdissant, avec obscurcissement des yeux.— Elancements dans le cerveau en se baissant. - Élancements dans les tempes. — Démangeaison picotante au cuir chevelu, ne faisant

que changer de place par le grattement.

Yeux — Nes. — Yeux ternes et creux. — Élancements dans les yeux et les paupières. — Gonflement des paupières. — Pupilles dilatées. — Vue trouble comme à travers un nuage. — Traction dans les oreilles. — Diminution de l'ouïe, comme si les oreilles étaient bouchées. — Diminution de l'odorat. — Coryza fluent avec éternument.

Dents. — Mal aux dents arec tractions sourdes, la nuit. — *Elancements et térébration dans les dents.

Bouche. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Sensation continuelle d'apreté et de mucosités dans la bouche. — Sensation de



CYCLAMEN EUROPÆUM.

torpeur dans la lèvre supérieure, comme si elle était endurcie. -Le soir, grande sécheresse dans le palais, avec faim et soif.

Appétit. - Goût putride de la bouche. - Goût fade de tous les aliments. — Faim et appétit peu prononcés, surtout le matin et le soir. — Prompte satiété suivie de dégoût, dès que l'on commence à manger. - Répugnance pour le beurre et les aliments

froids. — Après le repas, grande envie de dormir. Estomac: — Renvois fréquents, à vide ou acides. — Renvois avec hoquet, surtout après le repas. - Nausées avec envie de vomir, et malaise dans la région de l'épigastre, comme après avoir pris des aliments gras, surtout après le dîner et le souper. - Ecoulement d'eau comme des pituites, avec nausées, surtout le soir. -Vomissement sanguinolent avec diarrhée semblable, sueur froide, tintement des oreilles, convulsions et vertiges.

Ventre. - Plénitude et pression au creux de l'estomac, comme par surcharge. - Malaise dans le bas-ventre, avec nausées. -Sensibilité douloureuse du bas-ventre au moindre attouchement. - Accès subits de tranchées avec pincements. - Borborygmes

dans le bas-ventre, immédiatement après le repas.

Selles. - Selles dures, fréquentes. - Évacuations de la consistance de la bouillie. - Pression tractive à l'anus et au périnée, comme par une ulcération sous-cutanée. - Diarrhée sanguinolente,

Urines. - Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante d'urines blanchâtres. - Élancements dans l'urèthre, en urinant.

Poitrine. — Le soir, haleine courte comme par faiblesse. — Accès de suffocation. — Oppression de la poitrine avec géne de la respiration. — Lancinations et tiraillements aigus dans la poitrine, avec respiration courte et gênée. - Pression au cœur, comme par congestion de sang, avec battements de cœur trèssensibles.

Tronc. - Douleurs lancinantes dans les reins. - Douleurs d'excoriation à la nuque, - Pression, avec faiblesse paralytique, ou

traction à la nuque et au cou.

Bras. - Pression comme par un corps dur dans les bras et jusque dans les doigts, qui empêche d'écrire. - Douleurs tractives dans les bras et jusque dans les doigts. - Douleur comme après s'être heurté, ou douleur de meurtrissure dans le bras. -Traction douloureuse dans le bras et le poignet. - Contraction des doigts. - Vésicules rouges aux articulations des doigts, précédées de prurit violent.

Jambes. - Douleurs crampoides dans les cuisses. - Taches rouges aux cuisses, comme par une brûlure. - Démangeaison fréquente et violente aux mollets, à la cheville des pieds et aux orteils. - Douleur de luxation dans les articulations du pied. Douleurs d'excoriation dans les orteils, en marchant. Orteils morts, après avoir marché. - Sueur fétide entres les orteils.

294



DAPHNE INDICA.

DAPHNE INDICA.

DAPH. — Daphné des Indes. — Héring. — Hist. nat. et prép. Pharmac. homosop. — Doses usitées: 1, 30. — Durée d'action: Plusieurs semaines dans les affections chroniques.

Antidores: Bry. dig. rhus. silic. sep. zine.

clinique. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Affections rhumatismales et arthritiques, même après des gonorrhées supprimées; Arthrite vague; Douleurs ostéocopes et exostoses; Amblyopie amaurotique; Gastralgie et autres affections gastriques, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉBAUX. — *Douleurs lancinantes, comme des coups, dans différentes parties du corps, passant souvent rapidement d'une partie à l'autre, étant aggravées par l'air froid oet en prenant de l'eau-de-vie. — Douleurs rhumatismales et arthritiques tant dans les muscles que dans les os. — Exostoses avec douleurs lancinantes ou pressives et sourdes. — Douleur d'excoriation dans les exostoses. -*La plupart des souffrances se manifestent au côté gauche du corps, et s'aggravent principalement à l'air frais, cainsi que pendant la lune décroissante, le matin, ou overs le soir, et surtout au lit. — Grande lassitude et courbature dans tous les membres. — Besoin de rester couché. - *Insomnie complète, equelquefois à cause de douleurs ostéocopes. — Envie de dormir sans pouvoir y réussir. — Rêves de feu ou de chats noirs, avec cauchemar. — Sommeil agité, non réparateur. — Sursauts avec effroi, en s'endormant, accompagnés de frissonnement avec sueur visqueuse. - Fièvre semblable au typhus, avec frissons excessifs, suivis de chaleur continue, de sueur visqueuse par tout le corps, et perte complète de l'appétit. - Fièvres avec souffrances gastriques et nerveuses. - Sueur visqueuse, d'odeur putride. — *Abattement moral. — Caractère peureux. Irritabilité, surexcitation et tremblement pendant les douleurs. Irascibilité, absence d'esprit et indécision.

Tête. — Malà la tête, provoqué par un travail intellectuel quelconque. — Douleur derrière les yeux, d'une tempe à l'autre. — *Sensation de plénitude dans la tête, comme si le crâne allait éclater, surtout en se redressant dans le lit. — Sensation comme si la tête était trop rolumineuse, avec élancements dans les ten-



DAPHNE INDICA.

pes. — Sensation comme si les parties extérieures du cerveau étaient enflammées et se heurtaient douloureusement contre le crane. - *Forte chaleur dans la tête, surtout au vertex, et parfois avec sensation comme si la tête était comprimée. — Pulsation douloureuse dans les tempes (et les gencives), quelquefois avec douleur d'excoriation au toucher. — Exostoses au crâne. Tubérosités au vertex, molles, comme s'il y avait de l'eau dedans, avec douleurs pénibles, surtout la nuit; les douleurs empêchent le sommeil, et s'aggravent au toucher. — Gonflement dur de tout le côté gauche de la tête (du crâne?), avec sensation de tor-

peur et douleurs lancinantes, aiguës, passagères.


Youx et Oreilles. - Grattement dans les yeux. - Sensation pénible autour des yeux et des paupières, avec sécheresse et pesanteur des paupières. — Sensation douloureuse comme si l'on poussait les yeux en dehors de la tête. - Douleurs violentes aux prunelles, le soir, avec forte surexcitation nerveuse. — Yeux enflammés, faibles, ternes et comme noyés de larmes. — Sensation comme si une pellicule s'était placée devant les yeux. - Vue faible avec confusion des caractères en lisant. — Diplopie. -Pupilles fortement contractées. — Bourdonnement des oreilles.

Face — Dents. — Chaleur et sensation brûlante aux joues, autour des oreilles et au vertex, parfois avec besoin continuel de bâiller.—Sensation de gonflement, de roideur et de tension dans l'articulation temporo-maxillaire, avec cuisson brûlante à la peau. - Pulsation dans les dents et les gencives. — Douleurs tractives aiguës dans toutes les dents. - Mal aux dents avec et sans salivation. — Mal aux dents avec érections, ou après le coït. --

Mal aux dents avec accès de frissons ou avec dispositions à transpirer.

– **Ventre. – La**ngue chargée d'un seul côté. **– «Séche**resse de la langue, comme si elle était brûlée, près le sommeil. oFétidité de la langue. — Salivation. — Salive chaude. — Grand désir de fumer du tabac. - Pyrosis et vomissement aigre. - Vomissement avec nausées, après le déjeuner. - Sensation de plénitude et bouillonnement dans la région précordiale. — Pression dans l'estomac après avoir bu. — Crampes fréquentes de l'estomac. -•Après chaque repas, douleur brûlante et sensation d'excoriation dans l'estomac, avec renvois d'air fréquents; les douleurs s'étendent jusqu'à l'hypocondre gauche et au dos. — Élancements et douleurs dans la région splénique. — Douleurs arthritiques qui ·passent rapidement des membres au ventre.—Mal au ventre avec frissons.

Selles — Parties génitales. — *Resserrement du ventre et constipation. - OSelles peu copieuses et sanguinolentes sur la fin. -*Emission d'urine fréquente et abondante. — Pissement nocturne fréquent. - Urines troubles, épaisses, jaunâtres comme des œufs pourris. -- Urines de couleur jaune rougeatre. -



DAPHNE INDICA. - DIGITALIS PURPUREA.

Urines fétides. — Dépôt rougeâtre qui adhère aux parois du vase. — Réplaur d'excoriation dans l'urèthre en urinant. — Sueur du scrotum. — Écoulement de liqueur prostatique après avoir uriné. — Érections pendant les maux de dents. — Après le colt, mal aux dents.

Poitrine. - Voix faible. - Haleine fétide. - Expectoration séreuse, abondante. - Expectoration sanguinolente. - *Toux avec romissement, et expectoration jaunâtre, écumeuse, mêlée parfois de stries de sang; la toux fatigue et empêche le sommeil. — Batte-

ment et tressaillement du cœur, avec impossibilité de rester couché sur le côté gauche. — Douleurs aigues dans la région du cœur, avec découragement et tremblement. - Étouffement la nuit, avec sensation comme si les glandes du cou étaient gon-

flées, et les artères roides de sang.

Membres. — Douleur à la nuque avec mal à la tête. — Prurit brûlant au dos. — Tiraillement douloureux le long de la moelle épinière, aggravé en se baissant. — Phlyctènes très-pruriteuses aux bras et aux mains. — Douleurs ostéocopes, térébrantes, et douleurs lancinantes aigues aux doigts. — Miliaire pruriante aux jambes. — Douleurs rhumatismales aux caisses et aux genoux. — Froid aux genoux et aux pieds. — Douleur de contusion aux orteils. — Gonflement douloureux de la partie charnue du gros orteil, avec douleurs qui souvent passent rapidement dans d'autres parties du corps.

DIGITALIS PURPUREA.

IG. — Digitale pourprée. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 210. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 50 jours dans quelques cas de maladies chroniques. DIG. — Digitale pourprée.

ANTIDOTES: N-vom. op.

COMPARER AVEC: Ars. bell. chin. coff. coloc. con. bell. merc. n-vom. op.

petr. puls. spig. sulf-ac.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: Affections arthritiques (avec nodosités?); Engorgement et induration des glandes; Ictère; Cyanose; Affections hydropiques; Fièvres, avec affections gastriques, bilieuses ou muqueuses; Fièvres lentes, avec affection du système nerveux?; Fièvres vermineuses?; Mélancolie par affection organique du cœur?; Apoplexie séreuse?; Hydrocephale?; Ophthalmies catarrhales (arthritiques et scrofuleuses?); Cataractes; Amblyopie amaurotique?; Affections gastrico-muqueuses ou bilieuses; Gastrite?; Ascite; Uré-



DIGITALIS PURPUREA.

298

thrite chronique?; Rétrécissement de l'urèthre?; Ténesme de la vessie à la suite d'une gonorrhée; Hydrocèle; Aménorrhée avec doigts bleuâtres et taches bleues à la face; Hémoptysie; Affections organiques du cœur; Hydrothorax, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élancements brûlants et déchirements, surtout dans les membres. — Douleurs pénétrantes et sensation de courbature dans les articulations, comme après une grande fatigue. — Engorgement des glandes. — Gonflements tendus et douloureux, surtout des membres. — Convulsions. — Attaques d'épilepsie. — *Gonflements hydropiques. — Amaigrissement. — Grand accablement et faiblesse nerveuse. — Accès de faiblesse excessive, surtout après le déjeuner et le dîner. — Prostration subite des forces, comme si l'on allait s'évanouir, avec sueur générale.

Peau. — Démangeaison rongeante, se changeant, si l'on ne gratte pas, en un picotement brûlant et insupportable. — Desquamation de la peau de tout le corps. — Peau bleuâtre, particulièrement

aux paupières, aux lèvres, à la langue et aux ongles.

Sommeil. — Envie de dormir le jour et somnolence interrompue par des accès de vomissements convulsifs. — La nuit, demi-sommeil avec agitation. — *Sommeil nocturne, interrompu par des


rêves anxieux, avec sursauts.

Fièvre. — Froid du corps, souvent avec sueur froide, surtout au front ou d'un seul côté du corps. — Froid aux mains et aux pieds. — Accès fréquents et subits de chaleur fugace, suivis de faiblesse. — Sueurs nocturnes et abondantes, précédées parfois de frissons ou d'horripilation, avec chaleur intérieure dans la journée. — Pouls petit, faible et d'une lenteur excessive, mais accéléré par le plus léger mouvement.

Moral. — *Angoisse extréme, surtout le soir, avec disposition à pleurer et grande crainte de l'avenir. — Remords. — Morosité pleureuse, avec sensation de malaise intérieur. — Indifférence. — Beaucoup de goût pour le travail. — Faiblesse de la mémoire. —

Délires nocturnes et agitation.

Tête. — Étourdissement. — *Vertiges avec tremblement. — Pression saccadée à la tête, surtout pendant les travaux d'esprit. — Tension dans le front en tournant les yeux. — Déchirement dans les tempes et les côtés de la tête. — Elancements aux tempes et au front, quelquefois s'étendant jusqu'au bout du nez, surtout après avoir bu froid. — Prurit dans le cerveau, d'un seul côté de la tête. — Sensation en se baissant, comme si le cerveau tombait en avant. — Ondulations dans le cerveau, comme s'il contenaît de l'eau, avec embarras de la tête. — Gonflement de la



DIGITALIS PURPUREA.

299

tête. — La tête fléchit constamment en arrière. — Congestions violentes à la tête, avec grand bruit dans les oreilles.

Yeux. — *Pression dans les yeux, fortement augmentée par le toucher. — *Douleur brûlante et pression au-dessus des yeux, avec vue trouble. — *Élancements dans les yeux. — Rougeur inflammatoire de la conjonctive et des paupières, avec gonflement et sensation, comme si du sable s'était introduit dans les yeux. — Inflammation des glandes de Meibomius. — *Larmoiement cuisant, augmenté par une clarté vive et à l'air froid. — *Agglutination des paupières, avec forte sécrétion de mucosités. — Disposition des yeux à se tourner de côté. — Pupilles insensibles et dilatées. — Vue trouble comme à travers un brouillard. — Obscurcissement de la vue et cécité complète, comme par une amaurose. — Obscurcissement du cristallin. — Illusions de la vue. — Fantômes, visions et couleur d'are-en-ciel devant les yeux. — *Les objets paraissent verts ou jaunes. — Étincelles devant les yeux. — Diplopie. — Le feu paraît bleu.

Oreilles. — Otalgie avec douleurs tensives et contractives dans les

oreilles. - Gonflement des parotides.

Visage. — Páleur du visage. — °Couleur bleue des lèvres et des paupières. — Convulsions d'un côté du visage. — Douleurs crampoïdes et tractives aux pommettes. — Gonflement de la joue avec douleur au toucher. — Éruptions, avec prurit rongeant aux joues et au menton. — Pores noirs et suppurants au visage. — Gonflement des lèvres. — Éruptions aux lèvres. — Lèvres desséchées.

Bouche. — Apreté, excoriation et grattement dans la bouche et la gorge, avec goût pâteux. — Salive douceâtre et fétide. — Saliration avec excoriation de la langue et des gencives, — *Langue bleuûtre. — Gonflement de la langue. — Ulcère à la langue. —

Langue chargée de mucosités blanches.

Appétit. — Goût douceâtre, surtout après avoir fumé du tabac, quelquefois avec accumulation continuelle de salive dans la bouche. — *Amertume dans la bouche. — Goût muqueux, — Goût amer du pain, — *Absence d'appétit, quelquefois même avec langue nette. — Soif, surtout de boissons acides, — Grande appétence pour les choses amères. — Après le repas, pression et ballounement du ventre et de l'estomac.

Estomac. — Renvois et régurgitations aigres, quelquefois après le repas. — Pyrosis. — *Nausées avec envie de vomir, accablement moral et inquiétude. — *Vomiturition convulsive. — Vomissements et nausées, avec plénitude et pression à l'épigastre. — Vomissement matutinal ou nocturne. — *Vomissements de mucosités, ~des aliments ou de bile, avec nausées excessives. — Nausées le matin en s'éveillant. — Nausées et vomissements pendant le repas. — Vomissement des aliments dès qu'on crache. — Vomissement violent, avec vertige. — Sensation de rétraction



DIGITALIS PURPUREA.

de l'estomac. — *Pression, douleur brûlante et pesanteur à l'estomac et à l'épigastre. — Sensation de faiblesse à l'estomac, comme si la vie allait s'éteindre, surtout immédiatement après le repas. — Douleurs crampoïdes à l'estomac, parfois avec nausées et vomissements, soulagés par des renvois. — Élancements au creux de l'estomac, jusque dans les côtés et le dos. — Plénitude au creux de l'estomac.

Ventre. — Douleur de tension contractive dans les hypocondres. —
oSensibilité et douleurs pressives dans la région du foie. — Torsion et pincements crampoïdes dans les intestins. — Coliques
lancinantes et déchirantes, avec envie de vomir, surtout pendant
le mouvement et l'expiration. — oBallonnement du ventre. —
Gonflement hydropique du ventre. — Tranchées comme par un
refroidissement ou une diarrhée. — Tension crampoïde dans les
aines. — Souffrances par des flatuosités.

Selles. — *Selles blanches comme de la craie ou couleur de cendre. — Diarrhée d'excréments mêlés de mucosités, précédées de frissons et de tranchées. — Selles dyssentériques. — Selles involon-

taires. — Diarrhées aqueuses.

300


Urines. — Rétention d'urine. —*Besoin pénible et presque inutile d'uriner, avec émission d'urines chaudes, brûlantes et excessirement rares. — *Émission d'urine difficile, comme par rétrécissement de l'urèthre. — Pissement nocturne. — Flux d'urine. — Diminution de la sécrétion des urines, alternant quelquefois avec émission abondante. — Douleurs incisives dans l'urèthre, avant et après l'émission des urines. — Émission involontaire des urines. — *Urines de couleur foncée, brunâtres ou rougeâtres. — Nausées avant et après l'émission des urines. — En urinant, sensation brûlante et constriction dans l'urèthre. — Inflammation du col de la vessie.

Parties génitales. — Douleur de meurtrissure dans les testicules. — Gonflement des testicules. — Appetit vénérien fortement exalté, avec érections et pollutions fréquentes. — Gonflement

hydropique du scrotum.

Larynx. — Enrouement et coryza le matin. — Mucosités abondantes dans le larynx, se détachant en toussant légèrement. — Toux après le repas, avec vomissement des aliments. — *Toux sèche, -avec douleurs dans les épaules et les bras. — Toux avec expectoration de matières ressemblant à de l'amidon. — Cuisson dans la poitrine en toussant. — Toux crampoïde, sèche, provoquée par une conversation soutenue. — *Expectoration sanguinolente en toussant.

Poitrine. — Respiration péniblement génée, surtout la nuit, en étant couché, et le jour en marchant ou en étant assis. — Le matin, constriction suffoquante de la poitrine, forçant à se redresser dans le lit. — Souffrances asthmatiques comme par hydrothorax. — Pression à la poitrine en se tenant courbé. —



DIGITALIS. — DROSERA ROTUNDIFOLIA.

301

Tension dans la poitrine, avec besoin de respirer profondément. Douleur contractive dans la poitrine en se courbant. — Cuisson dans la poitrine. — Sensation de faiblesse dans la poitrine, provenant de l'estomac. — Congestion à la poitrine. — Accélération des fonctions du cœur, avec battements sensibles à l'oule, angoisse et contraction au sternum. — Horripilation au sein. — Palpitations violentes, avec bouillonnement de sang, la nuit, forçant à se lever et à ouvrir la fenêtre.

Trenc. — Douleurs tractives dans le dos et aux reins, comme après un refroidissement. — Douleurs de meurtrissure aux reins, en se mouchant. — Roideur et tension des muscles du cou et de la

nuque.

Bras. — Tiraillements paralytiques et déchirements dans les bras.
Gonfiement nocturne de la main droite et des doigts. — Froid aux mains. — Déchirements dans les articulations des doigts.
Roideur subite et paralytique dans les doigts. — Torpeur et

engourdissement facile des doigts.

Jambes. — Grande roideur des jambes après avoir été assis, se dissipant par la marche. — Manque d'énergie et faiblesse paralytique dans les jambes. — Gonflement aux genoux comme un stéatome. — Douleurs incisives dans la cuisse, et sensation brûlante dans le mollet, en croisant les jambes. — Tension dans le jarret. — Pieds froids. — Gonflement des pieds, le jour seulement.

DROSERA ROTUNDIFOLIA.

DROS. — Drosère à feuilles rondes. — Rosée du solli. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 201. — Doses usitées: 9, 12, 30. — Durée d'action: 6 à 7 jours.
ANTIDOTE: Camph.

COMPARER AVEC : Acon. bry. cin. cupr. hep. hyos. ipec. n-vom. spong.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Épilepsie; Fièvres intermittents; Presbyopie et autres défauts de la vue (même à la suite d'ophthamie syphilitique?); Affections gastriques; Catarrhe et enrouement, même à la suite des morbilles; Coqueluche; Affections des voies aériennes à la suite du croup; Laryngite chronique, même avec ulcération; Pneumonie chronique?; Phthisie florissante avec aphonio et vomissement des aliments.

Voy. la note, page 15.



DROSERA ROTUNDIFOLIA.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élancements rongeants dans la cavité des os des bras et des jambes, excessivement forts, avec lancinations violentes dans les articulations, pendant le repos plutôt que pendant le mouvement. — Pression lancinante et douloureuse dans les muscles (des membres), ne s'améliorant dans aucune position. — Douleur de meartrissure, sensibilité excessivement douloureuse, faiblesse paralytique dans tous les membres. — Faiblesse dans tout le corps, avec joues et yeux creux. — Convulsions épileptiques, avec sommeil et crachement de sang après les accès. — La plupart des souffrances apparaissent la nuit et le matin, ainsi que dans la chaleur et pendant le repos.

Sommeil. — Ronflement pendant le sommeil, et étant couché sur le dos. — Sursauts fréquents, avec effroi pendant le sommeil. — Réveil nocturne causé par une sueur qui s'établit. — Sommeil

à midi et le soir au coucher du soleil.

Fièvre. — Horripilation par tout le corps, avec chaleur du visage, froid glacial aux mains et absence de soif, ou *frissons avec froid et pâleur des mains, des pieds et du visage. — Chaleur avec mal à la tête et toux convulsive. — *Fièvre avec nausées et envic de dormir, et autres souffrances gastriques, ou avec mal à la

gorge.

302

Moral. — Abattement moral, causé par des idées d'inimitiés imaginaires. — Anxiété, surtout dans la solitude, avec peur des revenants. — Inquiétude qui ne permet pas de s'occuper longtemps du même objet. — Inquiétude sur l'avenir. — Exaspération à la moindre occasion. — Envie de se noyer. — Obstination à exécuter ce qu'on a résolu. — La moindre chose met le malade hors de lui-même.

Tête. — Embarras douloureux de la tête, comme après avoir parlé fort. — Vertiges en se promenant au grand air, au point de faire tomber (à gauche). — Douleurs pressives à la tête, surtout au front et aux pommettes, quelquefois avec nausées et étourdissement. — Battement et martellement au front du dedans au dehors. —

Douleur d'excoriation au cuir chevelu.

Yeux. — Élancements dans les yeux, vers le dehors, surtout en se baissant. — *Suspension de la vue, ou confusion et pâleur des caractères en lisant. — *Presbyopie. — oÉblouissement par la clarte des lumières et celle du jour. — oVoile devant les yeux.

Oroilles. — Élancements et serrement dans les oreilles, surtout en avalant. — Dureté de l'ouïe avec bourdonnement et bruissement

dans les oreilles.

- Nez. *Saignement de nez, surtout le soir. Mouchement de sang. — Pores noirs au nez. — Sécheresse continuelle du nez. — Grande sensibilité aux odeurs acides. — Coryza fluent avec éternument.
- Visage. Pâleur du visage avec joues creuses et yeux abattus.

 Sensation brûlante et picotante à la peau des joues au-dessous des



DROSERA ROTUNDIFOLIA.

303

yeux. — Lèvres gercées et constamment sèches. — Pression dans les pommettes vers le dehors, aggravée par la pression et le con-

tact. - Pores noirs au menton, à la face et au nez.

Bouche et Gorge. — Douleurs lancinantes dans les dents, après avoir pris des boissons chaudes. — Ulcères à la langue. — *Sai-guement de la bouche. — Ulcération du voile du palais. — Élancements à la gorge, après avoir mangé du salé. — Difficulté d'avaler des aliments solides, comme par rétrécissement de la gorge. — Sensation dans la gorge, comme si des mies de pain s'y étaient arrêtées. — Renâclement de mucosités jaunâtres ou verdâtres.

Appétit. — Soif surtout le matin. — Insipidité des aliments. —
Goût amer des aliments et surtout du pain. — Renvois amers. —
Hoquet fréquent. — Écoulement d'eaux comme des pituites. —

Répugnance pour la viande de porc. — Vomissements la nuit et
après le dîner. — *Vomissements de bile, le matin. — Vomissement de sang. — Nausées après avoir mangé des aliments gras.

— *Vomissements de glaires et des aliments, pendant la toux.

- Élancements et battements au creux de l'estomac.

Ventre. - Douleurs dans les hypocondres, en toussant et au tou-

cher. - Coliques après avoir mangé des acides.

Selles et Urines. — Selles fréquentes de mucosités sanguinolentes, avec tranchées. — Besoin fréquent d'uriner, avec émission peu abondante, souvent goutte à goutte. — Émission d'urine la nuit. — Urines brunâtres, d'une odeur forte.

Règles. - Règles supprimées. - Règles tardives. - Flueurs blan-

ches, avec douleurs comme celles de l'enfantement.

Larynx. - Fourmillement dans le larynx, qui provoque une petite toux et des élancements jusque dans la gorge. - Sensation comme s'il y avait un corps mou dans le larynx, une plume, par exemple. - Sensation de sécheresse, d'apreté et de grattement au fond du gosier, avec besoin de tousser .- *Enrouement et voix très-basse et creuse. - Endolorissement du larynx, en parlant. Accumulation de glaires, alternativement dures et molles, jaunâtres, grisâtres et verdâtres. — *Toux et enrouement. Toux que l'on tire du fond de la poitrine, avec douleurs dans les hypocondres et la poitrine, soulagées en appuyant la main dessus, - Toux la nuit et le soir, immédiatement après s'être couché. - *Toux sèche crampoïde, arec vomiturition. - *Toux fatigante comme la coqueluche, avec visage bleuatre, respiration sibilante, accès de suffocation, saignement du nez et de la bouche, et anxiété. - La toux est provoquée par des rires, des pleurs et des émotions morales. - *Vomissement des aliments après et pendant la toux. - Toux avec haleine fétide. - Le chant, la fumée du tabac et les boissons excitent la toux. - Toux avec expectoration d'un sang rouge vif, ou de caillots noiratres. *Toux le matin avec expectoration amère et nauséabonde. -*Toux avec expectoration de matières purulentes, et clance-



304 DROSERA ROTUNDIFOLIA. — DULCAMARA.

ments dans la partie supérieure de la poitrine.—Expectoration verdâtre.

Poitrine. — Gêne de la respiration en parlant, comme si la gorge se contractait, principalement en étant assis. — Oppression de poitrine, comme si, en toussant ou en parlant, quelque chose arrêtait la voix. — Serrement de la poitrine en toussant. — Douleurs à la poitrine en toussant et en éternuant. — Douleurs d'ulcération sous-cutanée au sternum, en pressant dessus.

Tronc. — Douleur de meurtrissure dans le dos. — Roideur de la nuque, avec douleurs pendant le mouvement. — Pores noirs à la

poitrine et aux épaules.


Bras. — Douleurs de meurtrissure dans les articulations des bras et des mains, — Crampe et enroidissement des doigts en saisissant un objet. — Douleurs nocturnes dans les os du bras.

Jambes. — Douleurs paralytiques dans l'articulation coxo-fémorale et dans les cuisses en marchant, et qui force à boiter. — Élancements incisifs dans les jambes. — Déchirements dans les articulations du pied, comme si elles étaient déboitées, seulement en marchant. — Roideur de l'articulation des pieds. — Sueur froide aux pieds qui sont constamment froids.

DULCAMARA.

DULC. — Douce amère. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 211. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 20 à 30 jours. Antidotes: Camph. ipec. merc. — On l'emploie comme antidote de: Cupr. Comparer avec: Acon. ars. bell. bry. con. cupr. ipec. lach. merc. n-vom. phos. rhus. sulf. — C'est surtout après: Cupr. merc. et lach. que dulc. se montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par l'abus du mercure; Affections par suite d'un refroidissement (dans l'eau aussi); affections des membranes muqueuses; Affections scrofuleuses, avec engorgement et induration des glandes; Tumeurs froides; Affections hydropiques; Paralysies; Affections à la suite des morbilles; Dartres de différentes espèces, même celles par l'abus du soufre; Pemphigus chez els enfants; Ramollissement des os: Éruptions urticaires; Verrues; Scarlatine et miliaire pourprée, lorsqu'il y a complication de ces deux maladies; Fièvre, avec affection des membranes muqueuses; Céphalalgie, surtout par suite d'un refroidissement; Croûte de lait; Ophthalmie scrofuleuse; Amblyopie amaurotique; Glossoplégie; Angines, surtout l'angine catarrhale (après l'usage



DULCAMARA.

da mercure); Affection scorbutique des gencives; Cholérine; Dyssenterie par refroidissement; Diarrhée muqueuse?; Catarrhe de la vessie; Rétrécissement de l'urèthre?; Bubons scrofuleux; Dartres aux parties génitales; Catarrhes invétérés avec enrouement; Coquelache?; Phthisie muqueuse?; Asthme pituiteux; Pneumonie chronique?; Hydrothorax; Phthisie florissante?; etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYNTTONIES GÉNÉRAUX. — *Douleurs déchirantes, ou lancinantes, tractives dans les membres. — *Souffrances comme par refroidissement dans diverses parties. — Aggravation des souffrances, principalement le soir ou la nuit, et pendant le repos; amélioration par le mouvement. — Douleurs avec froid au corps. — *Gécrétion et excrétion immodérée des membranes muqueuses, — *Gonflement et induration des glandes. — Amaigrissement. — *Gonflement hydropique de tout le corps, emembres et du visage. — Gonflement rapide de tout le corps. — Faiblesse et courbature de tout le corps. — Convulsions semi-latérales, avec perte de la parole. — Affections paralytiques des membres. — Grande lassitude.

Peau. — Sécheresse et chaleur de la peau. — *Miliaire urticaire avec fièvre. — *Dartres de différentes espèces, savoir : a) **Obartres humides, croûteuses, —pâles, suintantes après les avoir grattées; b) Dartres rougeâtres avec auréole rouge, saignant après les avoir grattées; c) Dartres à bords rouges, avec sensibilité douloureuse au contact et à l'eau froide; d) Petites dartres rondes, saignant après avoir gratté; e) ***Obartres sèches, furfuracées. — ***Croûte dartreuse sur tout le corps. — ***Éruptions dartreuses avec gonflement des glandes. — ***Verrues. — ***Obartres dans les articulations. — **Éruption de pustules pruriantes, qui passent en suppuration et se recouvrent d'une croûte, surtout aux membres inférieurs et à la partie postérieure du corps.

Benneil. — Forte envie de dormir, le jour. — Sommeil nocturne, agité, inquiet, par suite de chaleur et de tressaillement dans le corps, surtout après minuit. — Réreil de très-bonne heure. —

Rêves effrayants. — Visions le matin, en s'éveillant.

Pièvre. — Le soir, frissons fréquents et froid, ne s'apaisant pas même à la chaleur du feu. — Froid pendant les douleurs. — D'abord frissons fébriles, puis chaleur brûlante avec douleur étourdissante à la tête, visage rouge, chaleur brûlante dans le palais, et soif inextinguible de boissons froides. — *Chaleur sèche et sensation brûlante à la peau, avec délires et soif. — oFièvre avec exacerbation le soir. — Pouls dur, tendu. — Sueur générale, surtout la nuit. — Sueur fétide, avec émission abondante d'urines.

Heral. — Agitation morale. — Grande impatience. — Désir impa-



DULCAMARA.

306

tient de diverses choses, qu'on repousse dès qu'on les a obtenues.

— Disposition à se quereller, sans colère. — Délires nocturnes, avec exacerbation des douleurs.

Tête. — °Grand étourdissement, comme s'il y avait un étau sur le front. — Douleurs pressives, étourdissantes à diverses parties de la tête. — *Térébration et douleur brûlante dans le front, avec fouillement de dedans en dehors. — *Les maux de tête s'aggravent par le plus léger mouvement, °et même en parlant. — Sensation de pesanteur à la tête. — Congestion à la tête, avec bourdonnement d'oreilles et dureté de l'ouie. — Sensation comme si l'occiput était plus développé.

Youx. — Pression aux yeux, surtout en lisant. — Sensation comme s'il jaillissait du feu par les yeux. — *Inflammation des yeux. — Tressaillement des paupières à l'air froid. — Étincelles devant les yeux. — Vue trouble, comme par une amaurose commençante.

Oreilles. — Otalgie, la nuit, avec nausées. — Tiraillements aigus, avec élancements dans les oreilles.

Noz. — Epistaxis d'un sang très-chaud et rouge rif, avec douleur pressive au-dessus du nez. — Coryza avec obturation du nez, aggravé à l'air froid.

Visage. — Pâleur du visage avec couleur circonscrite des joues. —

°Éruptions et verrues au visage. — °Croûtes épaisses, brunâtres ou jaunâtres, au visage, au front, aux tempes et au menton. — Dartre suintante aux joues. — Tressaillement des lèvres à l'air froid. —

Paralysie de la mâchoire inférieure. — °Gonflement des glandes sous-maxillaires. — Rougeur du visage. — Distornion de la bouche.

Bouche. — Salivation. — Sécheresse de la langue. — °Langue


Bouche. — Salivation. — Sécheresse de la langue. — Langue chargée de mucosités épaisses. — Gonflement de la langue. — Boutons et ulcères dans la bouche. — Gencives décollées et fongueuses. — *Paralysie de la langue et parole embarrassée, surtout en se refroidissant. — Mal de gorge, comme par allongement de la luette, avec douleur pressive. — Chalcur brûlante dans le palais. — *Maux de gorge, comme après un refroidissement.

Appétit. — Goût fade, et comme de savon, dans la bouche. —

Amertume de la bouche. — *Soif ardente de boissons froides, généralement avec sécheresse de la langue, jointe à une sécrétion plus abondante de salive. — Faim, avec répugnance pour tout aliment. — Après avoir mangé modérément, ballonnement du ventre et de l'épigastre. — *Nausées, avec vomissement de mucosités risqueuses.

Estomac. — *Pression à l'estomac et jusque dans la poitrine. —
Contraction crampoïde à l'estomac, au point de suspendre la respiration. — Rétraction de l'épigastre, avec douleur brûlante.

Ventre. — Douleurs dans la région ombilicale. — Pincements lancinants et tranchées dans la région ombilicule, surtout la nuit.
 — Pincements, rongements et sensation comme si un ver rampait dans le ventre. — *Maux de rentre, comme par un refroidisse-



DULCAMARA. — EUPHORBIUM.

ment. — *Engorgement inhammatoire et indu inguinales, avec douleurs tractives et tensives. - *Engorgement inflammatoire et induration des glandes

L. — Constipation. — *Diarrhée, comme après un refroidissement, avec tranchées, ou avec vomissements, renvois et soif. *Diarrhées de mucosités verdâtres ou brunâtres. — Diarrhée sanguinolente, avec démangeaison à l'anus, et chute du rectum. — Diarrhées nocturnes, séreuses, avec coliques.

Urines. - Rétention d'urine. - Urines rares et fétides. claire et visqueuse, ou trouble, avec sédiment muqueux. - Urines ronges, brulantes. - Emission involontaire des urines, comme par paralysie du cal de la vessie. — Émission difficile des urines, et goutte à goutte de la vessie. — *Écoulement de mucosité de l'urèthre. — Rétrécissement de l'urèthre. - Urines troubles et blanchâtres.

Bègles. — Règles retardées et plus abondantes. — •Éruption dartreuse aux grandes lèvres. — Avant les règles, éruption miliaire.

– Dartres au sein.

Larynx. -- Catarrhe et enrouement, comme par un refroidissement. Toux avec enrouement. — Toux grasse. — Toux avec expectoration de sang rouge vif. - *Toux semblable à la coqueluche, oprovoquée en respirant profondément.

Poitrine. - Forte oppression de la poitrine, surtout en respirant. - Elancement obtus, comme des coups, dans et sur les deux côtés de la poitrine. - Douleur pénible d'ondulation dans le côté gauche de la poitrine. — Fort battement de cœur, sensible à l'ex-

térieur, la nuit.

Tronc. — Douleurs violentes dans les lombes, au-dessus des hanches, fouillantes, lancinantes ou tractives, principalement la nuit dans le repos. — Roideur de la nuque. — Engorgement et induration des glandes de la nuque et du cou. — Tiraillements lancinants aux reins, aux épaules et aux bras.

Bras. — Paralysie des bras, avec froid glacial, comme par une apoplexie. — Douleur paralytique dans les bras, comme par une meurtrissure, principalement dans le repos. -- *Eruption dartreuse et rerrues aux mains. - Sueur dans la paume des mains.

Jambes. — Tractions et déchirements dans les jambes, surtout dans les cuisses — Dartres aux genoux. — Bouffissure et gonfiement de la jamie jusqu'au genou. — Sensation brûlante dans les pieds et le : orteils. — Desquamation érysipelateuse et prurit aux pieds. Fourmillement dans les pieds.

EUPHORBIUM.

EUPHORB. – Euphorbe officinal. – Archives de STAPF. — Hist. nat. el prép. Voy. Pharmac. homosop, p. 214. — Dose usitée : 21, 30. — Durée d'action : jusqu'à 50 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.



EUPHORBIUM.

Antidotes: Camph. citr.

COMPARER AVEC: Bell. merc. mez. nitr-ac. — C'est surtout après bell. merc. et nitr-ac. que ce médicament convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances par l'abus du mercure?; Affections des os et des membranes muqueuses?; Ulcères invétérés et torpides?; Scarlatine?; Verrues; Ophthalmies catarrhales? Erysipèle vésiculeux de la face?; Œsophagite?; Gastralgie?; Ebréchement des dents; Ptyalisme; Affections des voies urinaires; Suites fâcheuses d'une pleurésie ou d'une pneumonie, avec adhérence de la plèvre?, etc., etc.

Voy. la note, p. 15.

308

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs dans les membres, déchirantes, ou pressives et lancinantes, surtout dans le repos, soulagées par le mouvement. — Douleurs lancinantes et tensives dans
les muscles. — Douleurs brûlantes à diverses parties du corps,
surtout dans les organes internes. — Faiblesse paralytique dans
les articulations, avec difficulté de se lever de son siége. —Grande
mollesse et lassitude. — La plupart des symptômes sont aggravés pendant le repos, en étant assis et au toucher.

Peau.—Prurit rongeant et brûlant qui oblige à se gratter presque constamment. — Stries d'un rouge pourpre sur la peau. — Furoncles. — Ulcères indolents. — (Sphacèle?) — °Verrues.

Sommeil. — Envie de dormir le jour, accompagnée de bâillements fréquents. — Somnolence comateuse, le jour. — Difficulté de s'endormir le soir, avec tremblements et sursauts. — Réveil fréquent.

Fièvre. — Horripilation et manque de chaleur vitale, surtout dans les affections des organes internes. — Frissons au commencement du repas. — Horripilation et frisson avec froid des mains et chaleur des joues, sans soif. — Sueur matutinale, avec chaleur, sans soif.

Moral. — Appréhensions anxieuses. — Taciturnité. — Goût pour le travail.

Tôte. — Vertige tournoyant à faire tomber de côté. — Maux de tête pressifs, lancinants. — Douleur de meurtrissure à l'occiput. — Inflammation érysipélateuse de l'extérieur de la tête.

Youx. — Inflammation des yeux, avec prurit et sécheresse des paupières et des angles des yeux. — Inflammation chronique des yeux. — Larmoiement cuisant et agglutination nocturne des paupières. — Sécrétion abondante de mucosités dans les angles des yeux. — Trouble de la cornée. — Trouble de la vue. — Myopie. — Diplopie.



EUPHORBIUM.

309

Oreilles et Hes. — Otalgie en plein air. — Démangeaison suffoquante dans le nez et jusque dans le cerveau, avec écoulement abondant de mucosités. — Éternument fréquent.

Pace. — Gonflement érysipélateux de la joue, avec éruption de vésicules jaunâtres et douleur térébrante et fouillante. — Gonflement pâle de la joue. — Douleur brûlante à la face.

Dents. — Maux de dents pressifs, lancinants, ou avec douleur térébrante, aggravés par le contact de la mastication, ou bien au commencement du repas, avec frissons et douleur dans la tête et les pommettes. — *Ebréchement des dents.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche, sans soif. — Saliration avec horripilation, envie de vomir et pincements dans l'estomac. — Salive salée. — Douleur brûlante depuis la gorge jusqu'à l'estomac, accompagnée de chaleur, anxiété, tremblement et écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites.

Betomac. — Goût fade, rance, amer. — Forte soif de boissons froides. — Renvois à vide. — Hoquet. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, avec chaleur, anxiété et tremblement. — Douleur de meurtrissure à l'estomac. — Relâchement et flaccidité de l'estomac, avec rétraction du ventre. — Crampes d'estomac contractives. — Pincements et sensation de griffement à l'estomac. — Douleur brûlante dans l'estomac et à l'épigastre. — Inflammation de l'estomac.

gastre. — Inflammation de l'estomac.

Ventre. — Maux de ventre avec douleurs constrictives. — Colique spasmalique, venteuse, avec douleur d'écartement ou qui semble presser vers le haut, soulagée généralement en appuyant la tête sur le genou et le coude. — Sensation de vacuité dans le ventre. — Douleur brûlante dans le ventre. — Déchirement comme par suite de luxation dans les aines.


Selles et Urines. — Envie pressante d'aller à la selle, avec prurit au rectum. — Diarrhées liquides avec ténesme, sensation de brûlure à l'anus, et douleur d'excoriation dans le ventre. — Envie pressante d'uriner avec écoulement difficile, peu abondant et goutte à goutte. — Écoulement de sang par l'urêthre.

Parties génitales. — Lancinations déchirantes au gland. — Prurit

Parties génitales. — Lancinations déchirantes au gland. — Prurit voluptueux au prépuce. — Déchirement dans les testicules. — Douleur brûlante au scrotum. — Érections continuelles sans lascirité. — Écoulement de liqueur prostatique.

Larynx. — Toux sèche, creuse, provoquée par un chatouillement brûlant dans la trachée-artère et la poitrine. — Toux sèche, jour et nuit, comme par une oppression, le matin avec expectoration fréquente.

Poitrine. — Respiration génée et haleine courte, avec douleur tensive dans les muscles de la poitrine. — Sensation d'extension spasmodique dans la poitrine. — Sensation comme si l'un des lobes du poumon était adhérent. — Pression dans les muscles de la poitrine. — Lancination pressive sur le sternum. — Lancination



310 EUPHORBRUM. - EUPHRASIA OFFICINALIS.

dans le côté gauche de la poltrine, pendant le repos, soulagée par

le mouvement. - Douleur brûlante dans la poitrine.

Tronc et Membres. — Douleur crampoïde dans l'épine dorsale, le matin au lit, en étant couché sur le dos. — Sueur au cou. — Tension paralytique dans l'articulation de l'épaule, pendant le repos, soulagée par la marche. — Stries écarlates sur l'avant-bras, pruriantes au toucher. — Tractions crampoïdes à la main après avuré écrit. — Douleurs de luxation dans les hanches. — Douleur brilante, la nuit, dans les os des cuisses. — Grande faiblesse des jambes. — Contraction crampoïde des orteils.

EUPHRASIA OFFICINALIS.

EUPHR. — Euphrasie officinale, — HAHNEMANN. — Hist, nat. et prép. Voy. Pharmac, homoop., p. 214. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à 20 jours dans quelques cas. ANTIDOTES : Puls ?.

COMPARER AVEC : Arn. merc. n-vom. puls. seneg. spig.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Suites fâcheuses d'une contusion, d'un coup, d'une chute, etc.: Ophthalmies rhumatismales, scrofuleuses, catarrhales, traumatiques, etc.; Blennorrhée des yeux; Obscurcissement, inflammation et taches de la cornée; Amblyopie amaurotique; Toux humide à la suite de la grippe; Condylômes, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs crampoïdes par tout le corps. — Picotement aux extrémités comme par une mouche, avec sensation de torpeur. — Exacerbation des symptômes le soir. — Forte envie de dormir le jour, comme par fatigue des yeux. — Bâillements violents en se promenant au grand air. — Lancinations violentes à diverses parties et qui empêchent de dormir. — Rèves effrayants avec réveil fréquent et en sursaut, avec effroi. — Prédominance du froid. — Forte sueur nocturne. — Taciturnité et répugnance pour la conversation; on est concentré en soimème. — Indifférence hypocondriaque. — Paresse. — Mélancolie.

Tête. — Embarras et douleur de meurtrissure dans la tête, le soir, augmentés en étant couché. — Maux de tête pressifs, avec photophobie et chaleur, principalement au front. — Élancements





EUPHRASIA OFFICINALIS.

aux tempes et au front. — Battement dans la tête, sensible au dehors.

Youx. — Pression dans les yeux. — Sensation mordicante dans les yeux. — Rougeur inflammatoire des yeux. — Inflammation de la cornée. — Inflammation et ulcération du bord des paupières, avec maux de tête. — Cicatrices d'ulcères et taches à la cornée. — Écoulement abondant de larmes corrosires, au point d'aveugler, surtout quand on est exposé au vent. — *Gonfiement et agglutination des paupières. — Cuisson dans les yeux, comme par du sable. — Lancinations dans les yeux, excitées par une lumière trop vive. — Éruptions de petits boutons miliaires autour des yeux. — *Sécrétion abondante de mucosités, quelquefois sanguinolentes, par les yeux et les paupières. — Compression dans les paupières. — Contraction dans les yeux et-les paupières, qui force à clignoter. — La lumière semble être obscure et vaciller. — Photophobie, surtout à la lumière du jour et au soleil.

Oreilles. — Otalgie, avec douleurs térébrantes dans la région du

tympan

Hex. — Boutons purulents aux ailes du nez. — Excoriation et sensibilité douloureuse des narines. — Épistaxis. — Coryza fluent, le jour ; la mait, obturation du nez. — *Violent coryza fluent, arec sécrétion abondante de mucosités, embarras excessif de la tête et larmes corrosives dans les yeux.

Visage. —Roideur des joues, en parlant et pendant la mastication, avec sensation de chaleur et douleurs lancinantes. — Miliaire au visage, avec sensation de brûlure et rougeur, en se mouillant la face. — Lèvre roide comme si elle était de bois. — Élancements

dans la machoire inférieure et au menton.

Benche. — Bégayement et interruptions fréquentes de la parole. — Parole difficile, à cause d'une roideur paralytique de la langue et des joues. — Sensation d'un gloussement qui remonte dans la gorge.

Dents. — Douleurs lancinantes dans les dents inférieures. — Sai-

gnement abondant des gencives.

Estomae — Urines. — Goût insipide. — Nausées et amertume dans la bouche après avoir fumé. — Renvois avec goût des aliments. — Pincements dans le ventre pur courts accès. — Serrement pressif et brûlant au travers du ventre. — Coliques alternant avec affections des yeux, — Selles dures et insuffisantes. — Emission fréquente d'une urine abondante et claire.

Parties viriles. — Rétractions spasmodiques des parties génitales, le soir, au lit. — Prurit lancinant et voluptueux au gland et au prépuce. — •Condylômes. — Rétraction et fourmillement des

testicules.

Poitrine. — Toux, surtout le jour, avec expectoration difficile. —
Toux, avec suspension de la respiration. — Toux matutinale,



312 EUPHR, OFFICINALIS. - FERRUM METALLICUM.

avec expulsion abondante de mucosités, et coryza fluent. -Gêne de la respiration, même en étant assis.

Membres. — Douleurs crampoides, pressives, dans le dos. -Douleur d'engourdissement dans les bras et les mains. - Douleurs crampoides, pressives, dans les mains et les doigts. - Accès de gonflement des articulations de la main ou des doigts en remuant ces parties. - Torpeur des doigts. - Elancements dans les jambes pendant le repos. — Tension, comme par raccourcissement des tendons dans le jarret et le tendon d'Achille, en marchant. — Sensation de pesanteur et douleur crampoide dans les mollets, en restant longtemps debout. — Secousses qui remontent le long de la cuisse, suivies de torpeur paralytique de cette partie.

FERRUM METALLICUM.

FER. — Fer métallique. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 403. — Doses usitées: 42, 30. — Durée d'action: 6 à 7 semaines dans quelques cas de maladies chroniques.
ANTIDOTES: Arn. ars. bell. chin. hep. ipec. merc. puls. veratr. — On l'emploie comme antidote de: Ars. chin. the de Chine.
COMPARER AVEC: Amm. ars. calc. carb-veg. cham. chin. cin. graph. hep. ipec. n-vom. puls. sep. thui. veratr.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections arthritiques; Suites fâcheuses de l'abus du quinquina ou dn thé de Chine; Paralysies, celles aussi qui proviennent de pertes débilitantes; Affections hydropiques; Chlorose; Congestion de sang et hémorrhagies, avec surexcitation de tout le système sanguin; Atrophie?; Faiblesse par suite de pertes débilitantes?; Fièvres intermittentes, empirées par l'abus de quinquina; Migraine; Céphalalgie congestive; Ophthalmies scrofuleuses?; Hémorrhagies na-sales et buccales; Dyspepsie avec vomissement des aliments (surtout chez les sujets phthisiques); Gastralgie; Coliques spas-modiques, flatulentes et vermineuses; Lientérie?; Diarrhée, surtout chez les personnes phthisiques et chez les enfants; Ascarides; Métrorrhagie, après l'accouchement aussi; Stérilité; Avortement; Vomissement des femmes enceintes; Grippe; Coqueluche?; Asthme spasmodique (et flatulent)?; Toux convulsive; Phthisie (première période); Hémoptysie; Congestion à la poitrine, avec palpitations de cœur; Edème des pieds par suite de pertes débilitantes, etc., etc. Voy. la note, page 15.



FERRUM METALLICUM.

318

SYMPTOMMS GÉMÉRAUX. — Douleurs violentes, déchirements et élancements surtout la nuit, avec besoin de remuer les parties affectées. — Varices. — Crampes et contractions spasmodiques des membres. — Gonfiements hydropiques, avec douleurs lancinantes. — *Bouillonnement de sang et hémorrhagies. — La plupart des symptômes se manifestent la nuit, s'aggravent en étant assis, et s'améliorent par un mouvement doux. — *Grande lassitude et faiblesse générale, excitées même par la parole, alternant souvent avec un tremblement anxieux de tout le corps. *Grande · Amaigrissement. — Après s'être promené au grand air, fatigue nerveuse au point de perdre connaissance, avec obscurcissement des yeux et bourdonnement dans la tête. — Grand besoin d'étre couché et faiblesse paralytique.

Peau. — Sensation brûlante à diverses parties de la peau, avec douleur d'excoriation au toucher. - Pâleur de la peau de tout le


corps, ou teint terreux. Semmeil. — *Grande fatigue somnolente, arec sommeil agité, la suit, jactation anxieuse, affluence de rêves et difficulté de se rendormir lorsqu'on s'est éveillé. — Sommeil tardif, le soir. — Yeux à demi ouverts pendant le sommeil. — Impossibilité de dormir en étant couché sur le côté.

Fièvre. - Frissons fréquents et de courte durée. - Manque de chaleur vitale. — Frissonnement le soir, avec froid dans le lit, toute la nuit. - Frissons avec forte soif, précédés ou accompagnés de mal à la tête. — Chaleur sèche avec besoin de se dé-couvrir. — Bouillemnement de sang, le jour, avec chaleur le soir, surtout dans les mains. — Fièrre avec congestion à la tête, bouffissure autour des yeux, gonflement des veines, vomissement des aliments, respiration courte et faiblesse paralytique. - Sueur abondante, facilement provoquée par le moindre mouvement et pendant le sommeil. - Sueur nocturne d'odeur forte. — Sueur froide avec anxiété pendant les crampes. Sueur colliquative et visqueuse. — Sueur le matin, à la suito des maux de tête.

Moral. — Anxiété avec battements dans l'épigastre. -- Humeur querelleuse, acariatre, emportements et ergoterie. — Gaieté al-

ternant avec tristesse d'un jour à l'autre.

– Vertige à faire tom-**Tête.** — Embarras et pesanteur de la tête. ber en avant comme par le mouvement de la voiture, *surtout en se baissant, en se remuant, etc. — Étourdissement et vertige tournoyant en regardant l'eau courante. — *Douleur pressive dans la tête, surtout à l'air frais. — Embarras douloureux dans la tête, au-dessus de la racine du nez, surtout le soir. — Tiraillement depuis la nuque jusque dans la tête, où l'on ressent des clancements et un bourdonnement. - *Maux de tête périodiques, martelants et pulsatifs, qui obligent à se coucher, otoutes les deux ou tres semaines. — Congestion à la tête. — Douleur



FERRUM METALLICUM.

au cuir chevelu, comme s'il était écorché. — Chute abondante des cheveux, avec douleur lorsqu'on les touche.

Yeux. — Yeux troubles, ternes et larmoyants, surtout après une légère fatigue (en écrivant). — Yeux rouges, avec douleur brûlante. — Gonflement et rougeur des paupières avec un orgelet.

Oreilles et Nez. — Bourdonnement dans les oreilles, soulagé en appuyant la tête sur une table. — *Epistaxis*, principalement par une seule narine et le soir. — Accumulation continuelle de

caillots de sang dans le nez.

Face et Gorge. — *Visage terreux ou *pâle, hâce, avec yeux enfoncés. — *Visage rouge comme du feu. — Taches jaunes ou bleuâtres à la face. — Petites taches rouges sur la joue qui est pâle. — Bouffissure de la face autour des yeux. — *Lèvres pâles. — Douleurs pressives dans la gorge, en avalant. — *Crache-

ment de sang.

314

Appétit. — Goût douceâtre comme de sang. — *Goût amer des aliments. — Absence d'appétit, surtout dans la matinée, alternant avec boulimie. — Dégoût pour la viande et les acides. — La viande pèse sur l'estomac. — Soif inextinguible, ou absence de soif. — Les aliments solides paraissent trop sees. —Après chaque repas, renvois et régurgitation des aliments, même de ceux qu'on a mangés de bon appétit. — Après avoir pris des acides, vomissement. — Après tous les repas et toutes les boissons, pression à l'estomac et au ventre. — La bière porte à la tête ou fait vomir.

Estomac. — Nausées avec envie de vomir pendant le repas. —

*Vomissement des aliments, surtout la nuit, ou immédiatement après le repas, même après n'avoir mangé que des œufs frais. —

Vomissement aigre et renvois acides. — Renvois amers après avoir mangé des choses grasses. — *Pression à l'estomac, surtout après avoir mangé de la viande. — Douleur cramposide à l'estomac. — Crampes pressives à l'estomac, toutes les fois qu'on a bu ou mangé.


Ventre. — Ballonnement et dureté du ventre. — Douleurs crampoïdes dans le ventre et le dos. — Crampes des muscles abdominaux comme si le ventre était contracté, surtout en faisant des efforts et en se baissant. — Coliques flatulentes, la nuit. — Pe-

santeur douloureuse dans le bas-ventre, en marchant.

Selles. —*Diarrhées oaqueuses et corrosives, quelquefois accompagnées de douleurs crampoïdes dans le ventre, le dos et l'anus. — o Selles non digérées. — Selles muqueuses. — *Ascarides du

rectum. - Hémorrhoïdes aveugles et fluentes.

Parties génitales. — Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections et pollutions fréquentes. — Écoulement de mucosités par l'urèthre. — *Métrorrhagies, vavec surexcitation du système sanguin, et douleurs d'enfantement. — Visage rouge comme du feu et écoulement abondant d'un sang tantôt liquide, tantôt noir et coagulé, accompagné de douleurs semblables à celles de l'en-



FERRUM METALLICUM.

815

fantement, aux reins, et dans le ventre. — Règles faibles et d'un sang pâle. — Suppression des règles. — Pendant le coît, cuisson et douleur d'excoriation au vagin, avec manque de jouissance. — Avant les règles, douleurs lancinantes dans la tête, avec tintement dans les oreilles. — *Arortement. — L'eucorrhée laiteuse et corrosive, — Stérilité.

rosive. — Stérilité.

Laryax. — Enrouement et âpreté dans la gorge. — Chatouillement dans la trachée-artère, qui excite fortement à tousser. — Toux, seulement en se remuant et en marchant. — *Expectoration purulente par la toux. — Toux spasmodique, surtout le matin, avec expectoration de mucosités tenaces et transparentes, cessant immédiatement après le repas; ou *toux spasmodique, sèche, commençant après le repas, avec romissement des aliments. — Expectoration fétide verdâtre, avec stries de sang. — *Toux avec expectoration de sang, surtout la nuit ou le matin. — Toux après le repas, avec vomissement des aliments. — En toussant, douleurs à l'occiput, ou élancements et douleur de meurtrissure dans la potirine.

poitrine. — Géne de la respiration, avec soulèvement presque imperceptible de la poitrine, et forte dilatation des narines, en expirant. — *Géne de la respiration, surtout la nuit ou le soir, comme partant de l'épigastre, aggravée pendant le repos, et soulagée par les occupations intellectuelles ou physiques.—Accès de suffocation, le soir au lit, avec douleur brûlante dans la gorge et la partie supérieure du corps, et froid dans les membres. — *Oppression constrictive de la poitrine. — Crampes constrictives de la poitrine, aggravées par la marche ou le mouvement. — Lancination tensive dans la poitrine et jusque dans les omoplates.

- Congestion à la poitrine. - Battement de cœur.

Tronc. — Déchirement entre les omoplates, la nuit. — Élancements dans les omoplates en remuant les bras. — Roideur des muscles du cou avec douleur pendant le mouvement. — Gonfle-

ment des glandes du cou.

Bras. — *Elancements et déchirements dans l'articulation de l'épaule et dans le bras, ou tiraillements, faiblesse paralytique et pesanteur. — Inquiétudes dans les bras. — Gonflement et desquamation de la peau des mains. — Crampes et torpeur dans les

doigts.

Jambes. — Déchirements arec lancinations riolentes, depuis l'articulation coxo-fémorale jusque dans le tibia, aggravés le soir, au lit, et dans le repos. — Douleur paralytique et torpeur dans les cuisses. — *Faiblesse des genoux au point de fléchir, au lit, et dans cette partie. — Varice aux jambes. — *Roideur. traction et pesanteur dans les jambes. — Gonfiement des genoux et des articulations des pieds. — *Gonfiement des pieds avec douleur tractive, surtout au commencement de la marche. — Crampes dans les mollets, la plante des pieds et les orteils.



FERRUM MURIATICUM. — FLUORIS ACIDUM. 316

FERRUM MURIATICUM.

FERR-MUR. - Muriate ou hydrochlorate de fer. -- Boenninghausen. -Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 104.—Peu connu.

SYMPTOMES. — Dans les membres, quelquefois spasmes subits; torsion des membres; déchirements paralytiques depuis l'articulation de l'épaule jusqu'au haut du bras et à la clavicule, avec impossibilité de lever le bras, et se dissipant par un mouvement doux. — Crampes dans les mollets, dans le repos, surtout la nuit. - Chaleur sèche, avec tendance à se découvrir ; odeur forte de la sueur nocturne; sueur froide de la face pendant les crampes dans les muscles. — Douleurs dans l'occiput, en toussant. Dans le nez, constamment du sang caillé. — Face pâle, avec taches rouges sur les joues pâles. — Les aliments solides semblent être secs et sans saveur. — Absence d'appétit, surtout le matin; horreur de la viande et des aliments acides. - Soif inextinguible, ou bien aussi absence de soif. — Renvois, avec goût acide, amer, après des aliments solides; vomissements, après avoir mangé des œufs. — Maux de ventre, crampes dans les muscles, comme si le ventre était rétracté, surtout par la fatigue en se baissant, après quoi on ne peut se relever que très-lentement. — Pendant le coit, douleur d'excoriation et cuisson dans le vagin, avec absence ou sensation voluptueuse. — Respiration forte, comme pendant le sommeil, en étant assis tranquille. — Toux spasmodique, le matin, avec expectoration de mucosités visqueuses, transparentes et cessant immédiatement après avoir mangé; en toussant, douleur de brisement dans la poitrine, ou bien élancements dans la poitrine.

FLUORIS ACIDUM.


FLUOR-AC. — Acide fluorique. — Dr HÉRING. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 104. — Doses usitées: 15 à 30.

COMPARER AVEC: Ambr. baryt. calc. coni. nitr-ac. op. phosph. rhus. silic.

— Convient parfois particulièrement après : Calc. silic., surtout dans les maladies des os, ainsi que après nitr-ac., dans les affections syphilitiques mercurielles. — Dans ces mêmes circonstances, ces mêmes médicaments conviennent suvent aussi après la Finerace. conviennent souvent aussi après le Fluor-ac.

ANTIDOTE : Nitr-ac?

GÉNÉRALITÉS. — Sensation comme si on luxait ou séparait les



317

membres du corps, aux articulations de la hanche et de l'épaule. - Douleurs tressaillantes à divers endroits. — Douleurs violentes, brûlantes, pulsatives ou térébrantes, en général de courte du-- Douleurs vagues, légères, comme si des démangenisons allaient se déclarer, à la partie gauche du corps. — Pression et douleurs paralytiques, surtout dans la main, le bras et le pied. - Diverses douleurs dans les os des avant-bras et des cuisses. --Grande disposition à remuer constamment toute partie du corps; l'on montre sa mauvaise humeur dans les traits de la face et les mouvements. — Les mains, les doigts, les orteils, les pieds, les mâchoires, les lèvres, les sourcils, les paupières et les muscles de la face sont constamment en mouvement. — Augmentation de l'activité musculaire, sans fatigue ; aucune marche, même double de celle qu'on pouvait à peine faire auparavant, ne fatigue plus, nonobstant la chaleur ou le froid (effet curatif?). - La marche fatigue, avec difficulté de lever les jambes, qui paraissent trop lourdes. - Surtout le soir, subitement, grande fatigue. - Grande lassitude, parfois avec nausées et renvois. — Lourdeur paraly tique de tout le corps. — La plupart des symptômes apparaissent à la chambre et pendant qu'on lit ou qu'on écrit. — Plusieurs symptômes sont plus forts pendant le repos; plusieurs encore sont pires en restant debout, mais moins forts qu'étant assis. — Aussitôt qu'on se lève, tous les symptômes reparaissent de nouveau. — Amélioration des symptomes par le mouvement et la marche. — Le mouvement n'aggrave que la pesanteur de la tête, la douleur de la hanche, la douleur de poitrine, la diarrhée; la marche n'aggrave que les souffrances gastriques, le prurit, la chaleur, la sueur, les douleurs dans l'articulation du pied. - La plupart des symptômes paraissent se montrer à droite dans la partie supérieure du corps et à gauche dans la partie inférieure du corps. - L'usage du café ne paraît point contrarier l'action des atténuations éloignées, mais il paraît aggraver les symptômes nerveux, ainsi que le vin le fait pour la chaleur et les congestions sanguines. - Souffrances syphilitiques et mercurielles, chro-

niques.

Peau. — L'application extérieure de ce médicament détruit la peau; il survient une douleur vielente, les alentours de la partie affectée deviennent blancs et douloureux, formant une ampoule épaisse qui se remplit de pus. — Pustules après la plus légère application sur la peau. — Douleurs brâlantes circonscrites à plusieurs endroits de la peau (après l'usage interne). — Prurit à la tête, aux sourcils, aux paupières, à la face; le prurit se manifeste aux sourcils, aux paupières, à la face; le prurit se manifeste vers le soir, ou apparaît le soir et le matin. — Dans la plapart des cas, le prurit est picotant et fourmillant, circonscrit sarde petites places, forçant impérieusement à se gratter, et suivi parfois de petits boutons réunis en groupes. Petits groupes



318

de points rouges, forçant la nuit à se gratter comme si une dartre allait se former. — D'anciennes cicatrices redeviennent pruriteuses, rouges aux bords, et se couvrent de petites vésicules. — Taches rouges, élevées, au-dessus des sourcils. — Boutons, surtout aux cuisses et aux jambes, se couvrant de croûtes et suivis de desquamation. — Plusieurs petites télangiectasies, en forme de petites vésicules sanguinolentes, comme de petits bourgeons, depuis la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'un grain de chanvre. — °Gonflements variqueux opiniâtres. — °Dartres sèches, pruriteuses, brûlantes. — °Ulcère carieux. — °Ulcères mercuriels.

Sommeil. — Envie continuelle de dormir, surtout le matin et particulièrement les dernières heures avant midi. — Le soir, de bonne heure, envie de dormir, presque constamment suivie d'un long sommeil de nuit. — Insomnie toute la nuit, suivie parfois, vers le matin, d'un court sommeil parfaitement réparateur. — Sommeil profond et long jusqu'au grand matin, avec étourdissement au réveil. — Beaucoup de rêves, principalement de morts ou de choses effrayantes, les rêves sont quelque fois aussi distincts que si les choses se passaient en réalité, mais on les oublie bientôt. — Souvent les rêves n'ont lieu que vers le matin ou après minuit. — Ronflement et cris pendant le sommeil. — Le matin, au réveil, on se trouve mieux, même après avoir peu dormi.

Fièvre. — Point de frissons. — Calorification du corps augmentée, on trouve le froid agréable, on se réchauffe plus vite après avoir pris froid, et ne se refroidit point, quoique couchant la nuit la fenêtre ouverte. — Les lotions froides sont très-agréables et produisent la sensation d'un grand bien-être. — Chaleur générale avec nausées. — Plus grande facilité de supporter la chaleur de l'été. — Sueur et sensation de chaleur plus prononcée du côté gauche que du côté droit. — Sueur abondante, acide, et d'une odeur désagréable. — Le soir, sueur visqueuse, désagréable et d'une grande abondance (en marchant) ou bien avec prurit. —

Sueur, à la suite de pensées anxieuses.

Moral. — *Disposition à des pensées anxieuses. — Le soir trèsmécontent, voyant tout en noir, le matin suivant très-éveillé et disposé à la plaisanterie. — Mauvaise humeur, grande disposition à la colère; en pensant seulement à ce qui pourrait arriver, on se fâche en soi-même, jusqu'à perdre tout son sang-froid. — Grande disposition, étant seul, à se faire toute sorte de pensées imaginaires, qui portent toutes le caractère de la répugnance contre les personnes de la plus proche connaissance. — "Humeur insupportable chez une vieille dame paralytique, qui se querellait avec ses nièces, renvoyait son indispensable gardemalade et tourmentait toute sa maison. — Irritation contre certaines personnes jusqu'à la plus grande haine, cessant aussitôt






que ces personnes se présentent. — Indifférent et sans amour pour ses affaires. — Contentement, gaieté; tout plait, tout paraît agréable, les premiers jours. — Les jours suivants, caractère plus solide, et moins de disposition que les premiers jours à causer et à flaner. — Pendant plusieurs souffrances, sensation comme s'il y avait du danger, ou qu'il allât arriver quelque chose d'effroyable. — Le matin, sensation comme si l'on avait rapidement vieilli, avec besoin de se regarder dans la glace. — Difficulté de retrouver l'ordre des idées, lorsqu'on a été interrompu dans ses pensées. — Intelligence difficile pour les choses philosophiques, mais parfaitement bonne pour les choses pratiques. — Grande disposition à oublier les choses. — Mémoire plus lucide le matin.

Tête.—Souvent, sensation d'un chancellement dans la tête, d'abord étant assis, ensuite aussi à chaque mouvement court et rapide. Vertiges avec nausées. — Congestion douloureuse à la tête, au commencement du mouvement après être resté debout, ou bien avec perte de connaissance et sensation comme si un coup de sang allait arriver. — Tête entreprise, principalement le matin jusqu'au déjeuner, et surtout du côté droit de la tête ou de l'occiput. — Pesanteur de la tête, avec douleur sourde profondément dans le milieu du front. — Mal de tête pressif du dedans au dehors, comme si la tête était trop lourde, précédé de salivation qui diminue au moment où le mal de tête commence. — Pesanteur au-dessus des yeux, avec nausées, et plus forte pendant le mouvement.—Douleurs pressives dans la tête, parfois remontant de la nuque, ou comme dans les os du front, mais surtout dans les deux tempes ou des deux côtés de l'occiput. - Pression dans les tempes du dedans au dehors. - Pression du cerveau vers le haut. - Le matin, sensation comme s'il y avait quelque corps étranger dans l'os pariétal gauche. — Le soir, après avoir beaucoup parlé, chaleur à la face et serrement pressif profondément à l'intérieur du côté gauche de la tête, suivi d'odontalgie dans la mâchoire supérieure gauche, avec sensation comme si l'on devait serrer surtout les dents qui ont été arrachées et dont les racines. également arrachées, semblent faire du mal. - Douleurs de tête qui passent rapidement d'un point à l'autre avec sensation d'un danger imminent. - Mal de tête avec nausées et vertiges. -Espèce de faiblesse indescriptible, surtout dans la tête et les mains, avec malaise dans l'estomac. — Prurit à la tête, forçant à se grattes -- Les cheveux se collent facilement. -- Chute des cheveux. - Carie de l'apophyse pierreuse de l'os des tempes. Yeux. — Taches rouges élevées au-dessus des sourcils. — Desquamation et picotement dans les sourcils. — Prurit aux yeux, aux angles et aux paupières, forçant à se frotter. — Écoulement des yeux; larmoiement. — Douleurs et pression surtout dans

l'œil droit. — Sensation comme si l'on ouvrait les paupières par



FLUORIS ACIDUM.

force, et qu'un vent frais soufflât dessus. — Vue plus claire et plus forte, les petits caractères se lisent avec plus de facilité qu'autrefois. — Grand cercle lumineux devant les yeux, en les fermant. — Le soir, au lit, éclairs croisés devant les yeux. — Les lunettes deviennent insupportables, surtout pendant les accès de coryza, quoique la vue ne soit point meilleure. — 'Fistule lacrymale à l'œil gauche, comme si l'on remuait profondément à l'intérieur un corps pointu, avec des croûtes longues et blanches sur la fistule, suintement et prurit périodique.

Oreilles. — Douleurs montant derrière l'oreille droite, dans la tête, avec douleur dans le talon. — Douleur et pression dans l'oreille droite. — Le matin, la susceptibilité de l'ouïe est plus forte.

Nez. — Bouton purulent, plat, à bord rouge, à l'aile gauche du nez, avec disparition d'une excoriation douloureuse chronique de la narine droite. — Petit bouton entre la racine du nez et l'œil. — Bouton avec une auréole large et enflammée, au dos du nez. — Eternument fréquent, le matin, avec accumulation de salive dans la bouche, et quelques mucosités séreuses dans le nez. — Le matin, en rinçant la bouche, accumulation subite de mucosités dans le nez. — Souvent des accès de coryza, venant subitement et d'aparaissant de même. — Après avoir pris, le soir, de la lière (on du vin rouge); coryza subit le lendemain matin, avec écoulement violent.

écoulement violent.

Face. — Aspérité au front, en forme d'une ligne convexe. — Chaleur à la face, surtout le soir après avoir beaucoup parlé, ou bien après avoir pris du vin. — Grand besoin de se laver la figure à Feau froide. — Chaleur au front ou an-dessous des yeux. — Prurit picotant au côté droit de la face. — Muscles de la face toujours en mouvement. — Douleurs dans les os faciaux, tantôt spasmodiques, tantôt brûlantes, ou encore comme si l'on y remuait un corps pointu. — Douleur depnis l'œil droit jusque fort en avant de la mâchoire supérieure. — Exuptions dartreuses et croûtes à la face, chez les enfants de deux ans; petits boutons suintants, sur un fond rouge, avec fort prurit forçant à se gratter. — Croûte de lait, avec éruptions à la tôte. — Sensation d'un embarras crampoide dans les mâchoires, dans la droite avec chaleur. — Rongement dans l'os de la mâchoire inférieure.

Dents. — Sensation de chaleur aux dents, surtout aux dents canines et incisives. — Émoussement des dents, — Mal de dents dans la mâchoire gauche. — Dents tellement douloureuses que la mastication devient impossible. — L'air froid, en entrant dans la bouche, frappe douloureusement les dents cariées. — Le mal de dents du côté droit passe rapidement à la cuisse gauche. — °Fistule dentaire à la canine supérieure droite. — Les dents incisives paraissent aigués, comme cassées, au point de faire mal à la langue lorsque celle-ci les touche. — Goût âcre, putride, de la vicille racine d'une dent incisive supérieure. — °Les dents cariées



FLUORIS ACIDUM.

paraissent moins sécréter et les gencives saignent moins qu'auparavant.

sche et Gorge. — Goût semblable à de l'encre, paraissant provenir d'une dent. - Brûlement et comme d'excoriation, dans la bouche et aux lèvres. - Accumulation de salire dans la bouche, la nuit, avec la diarrhée, ou bien pendant les éternuments; salivation suivie de mal à la tête. — Picotement à la langue, avec salivation et cuisson au palais. — • Petit ulcère douloureux dans la bouche, au coin entre les mâchoires supérieure et inférieure, trèssensible en mangeant. — Sécheresse du palais, à gauche. — Sensation comme si la région des fosses nasales était largement ouverte, pendant la promenade au grand air. - Sensation comme si, à l'entrée du pharynx, vers le côté gauche, il y avait un point excorié, ou qu'il allat s'y former un ulcère. - Sensation de chaleur dans la gorge. — Constriction de la gorge, avec borborygmes, pression et brûlement dans l'estomac, rapports et vomiturition. — Sensation de grattement au larynx forçant à faire le mouvement de la déglutition et à renacler. — Mal de gorge avec douleur d'excoriation et déglutition difficile au point de ne pas même permettre d'avaler du pain sans de grandes douleurs; les mucosités détachées par le renâclement contiennent un peu de sang.

Goût et Appétit. — Goût dans la bouche comme de l'encre, paraissant provenir d'une dent. — Goût âcre, putride, provenant d'une vieille racine de dent. — Goût salé dans la bouche, le matin au réveil. — Goût acide, et sensation de graisse dans la bouche. Arrière-goût des aliments ingérés, dans la gorge. — Satiété prompte en mangeant; on mange moins qu'autrefois, les aliments plaisent au goût; plus tard, appétit plus prononcé le soir qu'a midi. — Appétit augmenté, faim très-prononcée et grande voracité. — Désir de choses piquantes. — Moins de goût pour le vin qu'autrefois. — Pendant l'augmentation de l'appétit, besoin de rétracter les muscles abdominaux. — Répugnance pour le café, plus tard, après avoir éprouvé le contraire les premiers jours.

Betomac. — Rapports acides fréquents, parfois avec pyrosis et besoin de rendre beaucoup de vents. — Renvois fréquents d'air, parfois avec mal au cœur. — Rapports d'un goût fade et nauséabond, avec envie de vomir. — Pression, constriction, plénitude, chaleur et brûlement dans l'estomac. — Entre les repas, pression, comme par une indigestion. — Gargouillement dans l'estomac.

Ventre. — *Douleurs dans le côté gauche du ventre comme dans la rate, pressives ou pinçantes. — Tressaillements dans le côté gauche du ventre. — Maux de ventre immédiatement après avoir mangé (des poissons au yinaigre, du melon, des harengs). — Maux de ventre avec borborygmes et douleurs errantes. — Battement comme du pouls, en touchant la poitrine et le ventre. — Sensa-



322

tion de défaillance, comme un vide dans la région ombilicale, avec besoin de respirer profondément, et améliorée en serrant le ventre. — Beaucoup de borborygmes et fréquente sortie de vents. —

Vents très-fétides.

Selles. — Selle diarrhéique, chaque matin après le café et le soir tard, avec ténesme et sortie du rectum, chez un homme affecté de souffrances hémorrhoïdales. — Diarrhée d'été. — Diarrhée nocturne, avec accumulation de salive à la bouche, douleurs à l'estomac, et sensation comme si des flatuosités s'accumulaient dans le ventre. — Selles abondantes en forme de bouillie, parfois avec pincement; les selles diarrhéiques arrivent tous les deux jours, un peu plus tard, rétrogradant de 2 heures du matin jusque vers midi. — Sensation comme si les vents ne pouvaient pas sortir de l'anus. — Avant les selles, beaucoup de vents très-fétides. — Congestion à l'anus, après avoir pris du vin. — Prurit hémorrhoïdal à l'anus.


Urines. — Douleurs dans la région de la vessie et des aines, — Ayant et après l'émission des urines, douleur dans la vessie ou au col de la vessie; la pression est aussi douloureuse. — Sécrétion urinaire diminuée les premiers jours; augmentée les jours suivants. — Émission facile d'urines claires, non augmentées, avec sensation d'un bien-être après. — Odeur pénétrante piquante des urines. — Odeur agréable des urines, avec sédiment d'un rouge pourpre.

Parties génitales. — Sensation d'affluence vers les cordons spermatiques. — Élancements et tiraillements du testicule droit vers l'anneau inguinal. — Appétit vénérien diminué, sans impuissance; les premiers jours, ou bien: Désir violent du coît, avec érections surtout la nuit pendant le sommeil. — Éjaculation moins prompte qu'autrefois, et très-abondante, sans nulle incommodité après.

Règles. — Règles trop hâtives, plus abondantes qu'autrefois, avec écoulement d'un sang épais, coagulé. — Leucorrhée jaunatre, corrosive, avec excoriation et brûlement aux parties. — • Métrorrhagie chronique avec souffrances asthmatiques.

Larynx. — Sensibilité du larynx, avec douleur d'excoriation en toussotant et en renaclant. — Excoriation dans la gorge jusque dans le larynx. — Douleur dans le larynx, comme s'il y avait là un cartilage excitant la déglutition. — Renaclement de mucosités sanguinolentes.

Poitrine. — Douleurs au côté gauche en respirant. — Besoin de respirer profondément, parfois avec sensation de plénitude dans la poitrine. — Oppression de la poitrine, comme si elle était trop étroite sur le devant. — Gêne de la respiration comme s'il y avait un obstacle au haut de la poitrine et dans la fossette du cou. — Sifflement en respirant, avec besoin de respirer profondément. — °Hydrothorax, les souffrances bien allégées. — Inquiétude, dou-



323


leur discoriation et tressaillements au cour. — Pression à la poitrine; élancements dans le côté gauche; douleur dans le côté gauche, jusqu'aux aines, augmentée en respirant profondément. — Prurit à la poitrine, forçant à se gratter jusqu'au sang. —

Rougeur et gonflement d'un mamelon, précédé de prurit.

gratter, le soir en sortant. — Douleur tractive au côté droit de la maque et du cou. — Roideur de la nuque. — Crampe dans les muscles du cou. — Chaleur, comme un souffle chaud, dans la maque et remontant vers l'occiput. ou se dirigeant vers l'épaule. — Chaleur au milieu du dos se répandant vers les lombes. — La nuit, douleur profondément à l'intérieur de la région lombaire gauche. — Douleur dorsale, profondément à l'intérieur, au-dessous de la pointe des omoplates, le plus prononcée étant assis et surtout en allant en voiture. — Douleur dorsale, comme dans la région des reins. — Prurit et petits boutons au dos et aux deux épaules. — Secousses et tressaillements au sacrum.

Extrémités supérfeures. — Prurit et boutons aux épaules. Douleurs ostéocopes dans les bras, passant du bras droit au bras gauche. - Pression dans les bras. - Douleurs dans les articulations du coude. - Secousses douloureuses, électriques, dans les doigts. - Douleur rhumatismale dans l'os du bras droit, avec paralysie. - Engourdissement paralytique du bras droit, le soir en s'appayant dessus, avec picotement. - Le matin, au réreil, bras droit lourd, et comme engourdi, ou bien comme meurtri et gelé. - Engourdissement de la main et du bras gauches, rers le matin, avec tressaillement et faiblesse paralytique, tous les jours jusqu'à midi. — Manque de force, fuiblesse, torpeur et sensation paralytique dans les mains. — Douleur dans les articulations de la main droite et les doigts. - Les deux mains sont très-rouges à l'intérieur, comme marbrées avec sensation de chaleur et de plénitude. - Sueur continuelle à la paume des mains. - Prurit et petites vésicules galeuses à l'index droit. -Douleurs ostéocopes, sensation de luxation, picotements et battements, comme après une contusion. dans les doigts. --- Picotement dans les bouts des doigts. — Douleur qui parait sortir au-dessous de l'ongle du pouce. - Brûlement reitere dans le bout du petit doigt. -- Sensation comme si un cheveu était placé le long du dos du petit doigt. - Douleur d'excoriation aux verrues de la main gauche. - Les ongles paraissent croitre plus rapidement. Peau des mains cassante, sèche, gercée, surtout après s'être lavé, bouts des doigts comme creux, ongles cassants et repliés en dedans, aux coins.

Extrémités inférieures. — Picotement à l'os de la hanche droite. se répandant au-dessus des fesses. — Douleur à la tête du fémur gauche. — Douleur dans le nerf sciatique droit. — Douleur et sensation de meurtrissure dans la hanche gauche, surtout en



324 FLUORIS. - GELSEMINUM SEMPERVIRENS.

montant au lit, ou en se levant. — Douleur brûlante, passant comme un éclair dans le nerf, le long de la cuisse, depuis la hanche, ou depuis la région vésicale.—Cuisses comme meurtries. — Douleurs dans les genoux, surtout le soir. — Douleurs tractives dans les jambes, surtout à gauche. — Engourdissement facile des jambes, surtout du côté gauche. — Douleur tractive dans le cou-de-pied droit, le soir à la promenade, suivie de faiblesse paralytique dans l'articulation du pied et celle du genou. — Douleur paralytique, comme une luxation dans l'articulation des pieds. — Chaleur et brûlement dans la plante du pied droit. — Brûlement dans les orteils, empêchant presque de marcher. — Endolorissement des cors aux pieds. — Ulcères aux jambes, autour des malléoles.

GELSEMINUM SEMPERVIRENS.

GELS. - Gelsémine. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé jusqu'ici avec succès contre :

Éclampsies et convulsions épileptiformes des femmes et des enfants, avec spasme violent de la glotte. - Épilepsie, avec embarras dans le vertex et sensation de plénitude dans la région de la moelle allongée. - Paralysie, sans perte de la sensibilité; paralysie des organes de la déglutition et aphonie à la suite de diphthérites. — Fièvres intermittentes, avec douleurs pressives et lanci-nantes, traversant les tempes et les narines, avec yeux étincelants et loquacité. — Congestions cérébrales, pendant la dentition. — Méningite cérébro-spinale, avec perte complète de la vue, de la parole et du mouvement; pouls et respiration faibles, nausées et vomissement. — Coryza à chaque changement du temps, avec mal de gorge dans la partie supérieure du pharynx; douleur en avalant, jusque dans l'oreille; dysécée. - Prosopalgie, avec palpitations et contractions musculaires autour des parties affectées; grande nervosité et perte de la domination des muscles du mouvement volontaire. Diphthéritis, avec gémissement, paralysies ou anesthésies partielles, et vue anomale qui fait paraître les objets ou plus éloignés, ou doubles ou renversés. - Spasme de la glotte, avec voix croupale, inspirations lentes et exspirations subites et violentes. - Gastralgie avec la sensation d'un poids lourd ou d'une tension; épigastre comme vide, et fausse faim. - Jaunisse avec grande prostration et selles comme de l'argile ou de la crême. - Diarrhée après chaque émotion morale. - Spermatorrhée avec face pale, yeux creux, moral abattu, marche lourde et trainante, et appetit sexuel facile à



GINSENG. — GRANATUM.

exiter. — Leucorrhée, avec écoulement blanc, sensation de plénitude à l'épigastre et d'endolorissement au sacrum. — Ménorrhagie, avec écoulement continuel du sang, sans nulle douleur.

GINSENG.

GINS. - Ginzeng. - Bibliothèque de Genève, t. VIII, p. 456. - Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 219.

N.B. La plante n'étaut point encore bien déterminée, nous attendrons que l'on publie d'autres symptômes avec la substance mieux définie.

GRANATUM.

GRAN. — Écorce de la racine du grenadier. — Bibliothèque de Genève. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 221. — Doses usitées : 0: 1:30?

COMPARER AVEC: Ars. chin. iod., etc.

CLIFICUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Toxication par l'arsenic; Défaillance, syncope et lipothymie; Suppuration des organes internes, surtout du foie; Gonflements inflammatoires; Blessures; Ulcères; Engelures; Fièvres tierces, gastriques, bilieuses et typhoïdes; Ophthalmie; Taches de la cornée ?; Lippitude; Ulcération de l'oreille; Épistaxis; Ramollissement et saignement des gencives; Stomacace; Odontalgie; Branlement des dents; Ulcères de la bouche; Angine séreuse et catarrhale; Amygdalite, avec ulcération; Dégoût et vomissement; Gastralgie; Diarrhée et dyssenterie; Diarrhées séreusès; Choléra; Chute du rectum; Chute du vagin et de l'utérus; Leucorrhée; Toux catarrhale; Enrouement; Pleurésie; Hémoptysie; Palpitations de cœur, etc., etc. (Toutes affections contre lesquelles l'ancienne école a recommandé ce médicament.)

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. —Grande lassitude et fatigue, surtout dans les jambes, parfois avec impossibilité de rester debout et besoin de se coucher. — Lassitude somnolente, avec mal à la tête, comme après une débauche nocture dabuttement



GRANATUM.

326

et prostration, parfois avec chaleur ardente dans les mains. — Tremblement des membres. — Relâchement et flaccidité des muscles, surtout dans les membres inférieurs. — Amaigrissement. — Bâillements, parfois convulsifs, et pandiculations fréquentes. — Sommeil agité avec rêves fréquents, cris et jactation. — Horripilations partielles et semi-latérales, parfois avec maux de tête semi-latéraux. — Chaleur sèche, ardente, par tout le corps, avec besoin de se découvrir. — Les horripilations et les frissons ont ordinaîrement lieu le matin ; la chaleur se manifeste le soir. — Sueur au moindre mouvement. — Grande sensibilité et disposition à s'affecter. — Irritabilité et arrogance. — Humeur taquine et querelleuse. — Scrupules hypocondriaques. — Mélancolie, humeur sombre, abattement et découragement. — Stupéfaction et embarras intellectuel.

Tête. — Vertiges, surtout pendant un travail intellectuel, ou le matin en se levant, et parfois avec obscurcissement des yeux, ou avec nausées et maux d'estomac. — Sensation de vide dans la tête. — Douleur stupéfiante et lourdeur douloureuse dans la tête, surtout au front. — Pression au front et à l'occiput, — Douleurs tractives aiguës, principalement dans le côté droit de la tête. — Elancements au front. — Pustules sur le front et à la tempe, avec douleur d'excoriation, laissant de petits tubercules en

séchant.

Yeux, Oreilles, Nez. — Yeux cernés et creux. — Prurit et cuisson brûlante dans les angles des yeux. — Sécheresse et cuisson dans les yeux. — Teint jaunâtre de la sclérotique. — Inflammation des yeux, comme dans le coryza. — Pupilles dilatées. — Mouvements convulsifs de la paupière. — Obscurcissement des yeux. — Vue faible. — Serrement crampoïde, douleurs tractives aiguës et élancements dans les oreilles. — Tintement et bourdonnement des oreilles. — Chaleur ardente et sécheresse dans les narines, ou accumulation d'un mucus tenace. — Prurit formicant dans

le nez. - Coryza alternativement sec et fluent.

Face et Dents. — Teint maladif, jaunâtre et terreux. — Chaleur ardente de la face, parfois passagère. — Prurit rongeant à la face, et surtout aux joues. — Gonflement de la joue, avec lividité, chaleur ardente, prurit, tension et formication, comme des engelures. — Douleurs serrantes et tractives aigués à la face, aux pommettes et à la racine du nez, souvent d'un seul côté. — Sécheresse et sensation brûlante aux lèvres. — Douleur tractive aigué, tension et serrement dans les articulations maxillaires, et craquement pendant la mastication. — Douleurs lancinantes aux dents, même la nuit, au lit. — Les dents semblent s'être allongées. — Gencives décollées et saignant facilement.

Bouche et Gorge. — Forte accumulation de salive, parfois d'un goût douceâtre, dans la bouche. — Langue humide et blanche. — Fort crachotement de mucosités. — Sensation d'astriction aux



diverses parties de la bouche et du gosier. — Rétrécissement du gosier.

Appétit. — Grande variabilité de goût; goût alternativement fin et émoussé. — Appétit alternativement diminué et augmenté. — Faim extraordinaire et voracité, même après le repas. — Grande variabilité de l'appétit; désir de diverses choses, et surtout de café, de fruits, d'aliments succulents et acides. — Soif, avec envie de boire de l'eau. — Les aliments liquides et les pommes de terre

causent des nausées et des rapports.

Estomac. — Renvois d'air, fréquents et bruyants. — Nausées fréquentes, parfois avec lassitude, afflux d'eau à la bouche, mal de ventre et d'estomac, fréquente envie d'aller à la selle, sans résultat, frissonnements, mauvaise mine et mauvaise humeur. — Vomissements, même la nuit, et parfois avec lassitude, tremblement, sueur ou vertiges. — Pression pénible, plénitude, sensation brûlante et anxiété dans la région précordiale. — Crampes

d'estomac, le matin à jeun.

Ventre. — Maux de ventre fréquents et souvent continus, parsois avec nausées, affluence d'eau à la bouche, frissonnement et décubitus, ou avec vertiges. — Maux de ventre après chaque repas, ou le matin à jeun. — Maux de ventre soulagés par la chaleur externe et le coucher, ainsi qu'en buvant de l'eau froide. — Pincements, élancements et rotation autour du nombril et dans l'estomac. — Anxiété dans le ventre. — Ballonnement douloureux de l'abdomen, parsois avec faim en en Production et évacuation fréquente de flatuosités. — Gonstement du nombril comme par une hernie ombilicale. — Fermentation dans le ventre. — Traction dans le ventre comme pour aller à la selle. — Pression douloureuse et gonstement aux aines comme si une hernie allait paraûtre.

Belles. — Plusieurs selles par jour. — Évacuations copieuses et de couleur très-soncée. — Diarrhées, avec selles fréquentes, et évacuation de matières fécales et muqueuses. — Avant les selles diarrhéiques, nausées et sermentation dans le ventre; pendant les selles, chaleur ardente à la face et pression sur le rectum; après, chaleur ardente du-rectum. — Ténesme, avec mouvement et sermentation dans le ventre. — Chute du rectum pendant les selles. — Prurit et titillation insupportable dans le rectum. — Prurit brûlant à l'anus, aux sesses, au périnée, au scrotum et à la partie chevelue des organes génitaux, et surtout aux cuisses. — Elance-

ments à l'anus et dans le rectum.

Urinea et Parties génitales. — Douleurs incisives, lancinantes et rongeantes dans l'urèthre. — Inflammation et gonflement de l'urèthre. — Suintement muqueux par l'urèthre, comme dans une gonorrhée, avec traction brulante dans les corps caverneux, jusqu'su gland. — Excitation de l'appétit vénérien. — Règles trop hâtives et trop abondantes, et accompagnées de coliques et de



GRANATUM. — GRAPHITES.

pression depuis les reins jusque dans les aines. -- Leucorrhée jaunâtre.

Poitrine. — Sensation d'anxiété dans la poitrine et gémissement.
 — Forte oppression de poitrine, avec lassitude dans les jambes.
 — Pression sur la poitrine et à travers le sternum. — Douleurs rhumatismales, lancinantes et tractives au diaphragme. — Élancements dans la poitrine, surtout en marchant. — Tension et serrement douloureux dans les côtés. — Palpitations de cœur,

parfois au moindre mouvement. — Douleurs et contractions crampoïdes dans les muscles de la poitrine.

328

Tronc et Membres. — Fréquentes douleurs de brisement et de surcharge entre et sur les épaules et aux reins. — Traction, douleurs rhumatismales, formication et sensation de paralysie dans les bras, avec difficulté de les lever. — Douleurs rhumatismales dans les articulations des mains et des doigts, ainsi qu'aux avant-bras. — Roideur douloureuse et paralytique dans les doigts. — Gonflement de la pulpe des pouces, avec lividité, chaleur ardente et enflure marbrée des veines. — Prurit rongeant et insupportable à la paume et au dos des mains. — Sensation de roideur dans la hanche, comme par une sciatique. — Douleurs tractives aiguës, tiraillement paralytique, lourdeur et élancements au genou. — Douleur de foulure au cou-de-pied. — Cors douloureux aux pieds.

GRAPHITES.

GRAPH. — Graphite, plombagine, mine de plomb. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 405. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 50 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Ars. n vom. vinum. — On l'emploie comme antidote de : Ars. COMPARER AVEC: Acon. agar. ambr. amm. ars. bell. bry. calc. carb-v. cham. chin. con. guai. hep. hyosc. kal. lyc. magn. magn-m. n-vom. phos. puls. rhus. sabin. sep. sil. sulf. — C'est surtout après lyc., que graph. convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections arthritiques, même avec nodosités; Engorgement et induration des glandes; Excoriation de la peau; Affections scrofuleuses; Érysipèles fllegmoneux et vésiculeux; Zona; Eczéma suintant; Dartres de plusieurs espèces, surtout au visage et chez les femmes qui ont les règles faibles; Ulcères invétérés; Tumeurs enkystées (loupes); Squirre et cancer, développés sur d'anciennes cicatrices à la suite de plusieurs abcès; Mélancolie noire; Teigne; Migraine;



Ophthalmies de différentes espèces; Dureté de l'ouïe et bourdonnement des oreilles par congestion de sang; Érysipèle à la face; Paralysie de la face; Dyspepsie; sans ou avec vomissement des aliments; Gastralgie; Coliques flatulentes; Bubons scrofuleux?; Ténia; Constipation ou diarrhée chroniques; Souffrances hémorrhoïdales; Hydrocèle; Induration des testicules; Impuissance?; Satyriasis; Dysménorrhée, surtout celle provenant de stagnation dans le système de la veine porte; Cancer de la matrice; Aménorrhée; Exceriation des mamelons; Excoriations des enfants; Asthme spasmodique?; Catarrhe suffoquant; Difformité des ongles, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs crampoides, *crampes et contractions de diverses parties. - Tension dans quelques parties, comme par raccourcissement des tendons. - Tressaillement et distorsion des membres. - *Tiraillements arthritiques et déchirement dans les membres et les articulations, surtout dans les parties ulcérées. — Nodosités arthritiques. — Disposition à se donner un tour de reins. — *Engourdissement facile des membres. -Roideur et inflexibilité complète des articulations. — Gonflements durs, avec douleurs lancinantes. - Douleurs nocturnes que l'on ressent même pendant le sommeil. — Les symptômes se dissipent après une promenade en plein air. - Varices avec élancements, tension et prurit. — *Gonflement et dureté des glandes. — Douleurs pendant le changement de temps. — Malaise général qui force à gémir, sans aucune sensation de douleur distincte. - Forte pulsation dans tout le corps, et surtout au cœur, augmentée par le moindre mouvement. - Tiraillement dans tout le corps, avec besoin d'étendre les membres. — Sensation d'un tremblement dans tout le corps, avec tressaillement des membres. — *Grand amaigrissement. — *Forte disposition à se refroidir, et crainte du grand air et des courants d'air. - Lassitude générale. -Chute rapide des forces. - Augmentation des souffrances en prenant froid.

Peau. — Sécheresse opiniâtre de la peau, et absence de transpiration. — Éphélides. — Taches rouges sur la peau, comme des piqures de puces. — *Inflammations érysipélateuses. — Érysipèle vésiculeux et semblable au zona, au ventre et au dos. — *Dartres et autres éruptions humides ou croûteuses, parfois avec sécrétion de sérosités corrosives, ou avec démangeaison le soir et la nuit. — *Tumeurs enkystées. — *Vésicules rongeantes. — *Excoriation de la peau, surtout chez les enfants. — *Peau maladive; toute lésion tend à s'ulcérer. — Chair luxuriante et pus fétide dans les ulcères, avec douleurs déchirantes, brûlantes et lancinantes. — *Difformité et épaisseur des ongles.

Semmell. - Forte envie de dormir, le jour et le soir de bonne



GRAPHITES.

330

heure.—*Difficulté de s'endormir. — Sommeil agité la nuit, avec réveil fréquent. — Sommeil nocturne, incomplet, comme si l'on ne faisait que sommeiller. — Sommeil non réparateur, et suivi, le matin, d'un sommeil comateux. — La nuit, affluence d'idées quelquefois pénibles. — *Grande agitation, la nuit, avec réves anxieux et effrayants, oppression et étouffement. — *Pendant le sommeil, sursauts avec effroi. — Rèves de morts, de feu; réves avec réflexions. — La nuit, idées pénibles, angoisse, chaleur, inquiétude, tressaillements, souffrances gastriques, et beaucoup d'autres incommodités.

Fièvre. — Frissons, le matin et le soir, avec ou sans chaleur, et suivis de sueur. — Sueur, souvent très-fétide, au moindre mouvement ou à la moindre fatigue, même en parlant. — Sueur noc-

turne, quelquefois fétide.

Moral. — *Abattement, tristesse et chagrin profond, avec découragement et pleurs abondants. — Agitation, serrement de cœur et angoisse, comme si on allait mourir ou qu'on fût menacé d'un grand malheur, souvent avec mal à la tête, vertige, nausées et sueur. — *Agitation anxieuse, quelquefois en travaillant assis, ou la nuit, avec besoin de quitter le lit. — *Agitation et inquiétude le matin. — Caractère peureux. — Détermination lente et hésitation. — Trop grande impressionnabilité. — Disposition à s'effrayer. — Irascibilité. — *Horreur du travail. — Distraction.

- On se trompe en parlant ou en écrivant.

Tôte. — °Fatigue à la suite d'un travail intellectuel. — Sensation de torpeur dans la tête. — **Ivresse et vertiges, surtout le matin en se levant, ou en se réveillant; ainsi que le soir avec envie de se coucher. — **Embarras à la tête. — Accès de maux de tête, quelquefois semi-latéraux, avec nausées et vomissements acides. — Maux de tête violents le matin, jusqu'à faire venir la sueur froide et à faire tomber de faiblesse. — Mal de tête par le mouvement de la voiture, ainsi qu'en remuant la tête; ou pendant et après le repas. — Maux de tête du côté sur lequel on est couché. — Tension et constriction pressive à l'occiput, avec roideur de la nuque. — Embarras et contraction dans le front. — Douleur compressive dans le vertex, après midi, avec roulement dans la tête. — *Déchirement et tiraillement au cuir chevelu, —dans les dents et les glandes du cou. — **Prurit au cuir chevelu. — **Croûtes humides sur la tête. — **Sueur à la tête pendant la marche au grand air. — Desquamation abondante du cuir chevelu. — **Chute des cheveux, même sur les côtés de la tête. — Grisonnement des cheveux.

Yeux. — Paupières lourdes, et s'affaissant comme paralysées. —
 *Pression dans les yeux et les paupières, comme si des grains de sable s'y étaient introduits. — * Elancements dans les yeux. — Chaleur et sensation brûlante dans les yeux, surtout aux



lumières. — *Inflammation des yeux, avec rougeur de la sclérotique, injection des veines, gonflement et sécrétion muqueuse abondante des paupières. — Orgelet avec douleur tractive. — *Chassie sèche aux paupières et dans les cils. — *Agglutination des paupières, et larmoiement. — *Obscurcissement de la vue, en se baissant. — *Myopie. — Confusion des caractères en lisant. — *Scintillement devant les yeux. — *Photophobie, le jour surtout.

Corelles. — Élancements et battements dans les oreilles. — Sé
Cheresse de l'oreille inférieure. — Odeur fétide et écoulement

de sang *et de pus par les oreilles. — *Croûtes, dartres, suintement et excoriation derrière les oreilles. — *Dureté de l'ouïe,

améliorée par le mouvement de la voiture. — *Chant, tintement, bourdonnement et roulement comme celui du tonnerre


dans les oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles, la nuit. —

Sensation comme si l'air s'engouffrait dans la trompe d'Eustache. — Osifilement dans les oreilles.

Nez. — Gonflement du nez. — Sensation de tension dans l'intérieur du nez. — Pores noirs au nez. — *Croûtes sèches dans le nes. — *Narines excoriées, gercées et ulcérées. — *Odeur fétide par le nez. — Mouchement de sang et épistaxis surtout le soir et la nuit, avec congestion à la tête et chaleur du visage. — Écoulement d'un pus fétide par le nez. — Exaltation de l'odorat. — *Obturation et sécheresse pénible du nez. — °Coryza quotidien, en se refroidissant. — *Coryza sec, avec maux de tête, et "avec nausées qui forcent à se coucher. — *Écoulement par le nez de mucosités liquides ou jaunâtres et épaisses "avec odeur putride. — Coryza fluent avec catarrhe.

Visage. — Teint jaune pâle, avec yeux cernés. — Chaleur fugace au visage. — *Inflammation érysipélateuse et gonflement du visage, avec éruptions de vésicules. — Tumeur enkystée à la joue. — Sensation continuelle, comme si la face était recouverte d'une toile d'araignée. — *Paralysie semi-latérale et distorsion des muscles de la face, avec parole difficile. — Douleurs tractives et déchirantes dans les os du visage. — *Éruption à la face, d'un aspect comme si la peau était à vif. — *Croûtes et *boutons suintants à la face. — °Éphélides. — °Chute des poils de la barbe. — *Ulcères à la face interne des lèvres. — *Commissures des lèvres ulcérées. — Lèvres gercées. — *Éruptions croûteuses au menton et autour de la bouche. — °Nodosités douloureuses à la mâchoire inférieure. — Gonflement et dureté des glandes sousmavillaires

Dents. — Maux de dents la nuit, ou le soir au lit, aggravés par la chaleur, et parfois avec chaleur de la face et gonfiement de la joue. — Douleurs dans les dents molaires, en serrant les mâchoires. — *Maux de dents lancinants et tractifs, surtout après avoir bis froid. — Douleur d'excoriation dans les dents et les



GRAPHITES.

gencives pendant et surtout après le repas. — *Saignement facile et gonflement des gencires. — Sortie d'un sang noir et aigre par les dents.

Bouche. — Sécheresse de la bouche, le matin. — Odeur putride et urineuse de la bouche, des gencives et du nez. — Douleur d'excoriation, vésicules et ulcères sur la langue. — Salivation abondante et accumulation de mucosités dans le palais et la gorge. — Parole gênée par la paralysie des muscles.


Gorge. — Mal de gorge presque continuel, en avalant, généralement lancinant, avec étranglement. — *Mal à la gorge, même la nuit, comme s'il y avait une cheville en dedans, ou comme si les aliments s'y étaient arrêtés. — Crampes dans la gorge, avec étranglement. — Apreté et grattement dans la gorge.

Appétit. — Goût amer ou acide, avec aigreur dans la bouche et la gorge. — Forte soif le matin et après le repas. — *Faim immodérée. — *Répugnance pour les aliments cuits et la viande, ainsi que pour les choses salées ou sucrées. — *Faiblesse de lu digestion, avec envie de dormir, maux de tête, douleurs d'esto-mac, plénitude et ballonnement du rentre après le repas.

Estomac. — Renvois fréquents et quelquesois avortés. — Renvois aigres, avec amertume dans la bouche. — Régurgitation aigre des aliments. — Régurgitations amères et vertes. — Hoquet fréquent. surtout après le repas. — *Nausées surtout le matin, ou après chaque repas, avec envie de vomir. — Écoulement d'eau, comme des pituites, la nuit. — *Vomissement opinidire des aliments. — Vomissement après le moindre dégoût, avec fortes nausées et pincements dans le ventre. — Vomiturition de mucosités. — Vomissements acides. — *Pression à l'estomac, parfois avec vomissement, soulagée par la position couchée et par la chaleur du lit. — *Douleurs crampoïdes, ou serrement comme par des griffes à l'estomac. — La nuit, pincement dans l'estomac, avec souillement dans la poitrine. — Douleur brûlante à l'estomac, qui force à manger.

Ventre. — Dans les hypocondres, tension, élancements et battements. — Douleurs hépatiques après le déjeuner, qui forcent à se coucher. — *Plénitude et *pesunteur dans le ventre. — *Ventre gros, tendu, ballonné. — *Dureté dans le bas-ventre. — Douleur nocturne, crampoide, dans tous les intestins, avec manque de sécrétion d'urines. — *Incarcération et *accumulation de flatuosités dans le ventre. — *Expulsion immodérée de flatuosités fétides, précédée de pincements. — *Sensibilité douloureuse des aines. — Gonflement douloureux des glandes inguinales. — •Inflammation érysipélateuse avec grosses vésicules, près du nombril.

Selles. — *Constipation opiniatre, avec selles dures et durcté dans la région hépatique. — Selles dures, noueuses, d'un moule trop volumineux et *insuffisantes. — *Selles trop molles. — Sortie de beaucoup de glaires avec les selles. — Selles d'une odeur



GRAPHITES.

putride, acide, ou de mucosités sanguinolentes. — Diarrhée avec ventre tendu. — Selle d'un moule extrêmement mince, comme un ver. — Lombrics et ascarides. — oTénia. — Prurit, sensation d'excoriation et gonfiement de l'anus. — *Boutons hémorrhoidaux volumineux à l'anus, avec douleur d'excoriation, surtout après les selles. — oCrevasses douloureuses et brûlantes entre les boutons hémorrhoidaux.

Urines. — Envie pressante, anxieuse et douloureuse d'uriner, avec émission goutte à goutte. — Sécrétion rare d'une urine foncée, se troublant promptement, avec sédiment blanc ou rougeâtre. — Urine d'odeur âcre, acide. — Jet d'urine mince, comme par rétrécissement de l'urèthre. — Émission involontaire des urines. — *Émission d'urine la nuit. — Pissement au lit. — En urinant,

douleur dans le coccyx.

Parties viriles. — Tension et douleurs crampoldes dans les parties génitales, avec idées voluptueuses importunes. — Éruption de boutons au prépuce et à la verge. — Gonflement hydropique du prépuce. — *Gonflement hydropique des testicules. — Irritations voluptueuses dans les parties génitales. — *Assoupissement ou exaltation effrénée de l'appétit vénérien. — Absence d'érections le matin. — *Écoulement de sperme presque involontaire, sans érection. — Absence de l'émission de sperme pendant le coît. — Jouissance trop faible pendant le coît. — Pendant l'excitation

des parties génitales, pour le coît, coliques flatulentes.

Règles. — Vésicules et boutons à la vulve. — *Excoriation à la vulve et entre les cuisses. — Gonflement douloureux des ovaires. -Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales.--*Règles trop tardives, trop peu abondantes et trop pâles. — *Suppression des règles. — A l'apparition des règles, tranchées. - Pendant les règles, écoulement de sang par l'anus, douleurs dans les membres, ulcères empirés, gonflement des joues et des pieds, catarrhe avec enrouement et coryza, mal aux dents, ou crampes et tranchées violentes dans le ventre, maux de tête, nausées, douleurs à la poitrine et faiblesse. — *Leucorrhée blanche, liquide, comme de l'eau, avec tension du ventre. — Leucorrhée avant et après les règles. -- oCancer de la matrice, avec tubercules et excroissances comme des choux-fleurs au col de la matrice. — Sensibilité douloureuse et excoriation des mamelons, avec éruption de phlyctènes suintantes. — Engorgement et induration des glandes mammaires.

Larynx. — Sensibilité du larynx. — Raucité catarrhale et enrouement, avec sensation d'excoriation, douleur brûlante et *grattement dans la gorge, coryza et embarras de la poitrine. — °Voi.c fausse (pour le chant). — Accumulation de glaires dans la poitrine. — Toux produite par la raucité de la gorge. — *Toux la nuit, -ou le soir, au lit, provoquée en respirant profondément,

avec oppression de poitrine.



GRAPHITES.

Poitrine. — *Gêne de la respiration et oppression de poitrine. — *Accès de suffocation la nuit, en dormant, ou en se promenant au grand air. — Respiration sibilante. — Douleur de poitrine en montant, en allant à cheval, en bàillant, ou en portant la main sur la poitrine. — Douleur pressive crampoide dans la poitrine. — oSpasmes de poitrine. — Élancements dans la poitrine au moindre mouvement. — Battements de cœur au moindre mouvement.

Tronc. — Douleur de meurtrissure aux reins, ou maux de reins violents comme un serrement par des griffes, ou comme un tournoiement. — Douleur contractive dans le dos. — Sensation de fourmillement dans le dos. — Roideur de la nuque. — *Douleur violente dans la nuque et les épaules, en baissant la tête et en levant les bras, comme une incision déchirante. — Ampoules au con. — *Gonfiement des glandes du cou. — Déchirement dans

les glandes du cou.

334

Bras. — Déchirement ou lancination dans les épaules. — Sensation de raccourcissement dans l'articulation du coude, en étendant le bras. — *Crampe et déchirement dans les mains. — Amaigrissement des mains. — Érysipèle, durillons, peau sèche et crevasses aux mains. — Douleur de luxation dans l'articulation du pouce. — Gonflement et inflexibilité, roideur et distorsion des doigts. Éruption granulée et vésicules rongeantes aux doigts. — *Nodosités arthritiques aux doigts. — *Excoriation dartreuse entre

les doigts. - Epaisseur des ongles des doigts.

Jambes. - Pesanteur, lassitude et engourdissement des jambes au grand air. - *Excoriation entre les jambes. - Déchirement arthritique dans l'articulation coxo-fémorale, les pieds et les orteils. - *Torpeur et roideur des cuisses et des orteils. - *Inquiétudes dans les jambes. - *Dartres aux cuisses, aux jarrets et sur le tibia. - Sensation de raccourcissement dans les tendons du jurret et dans le tendon d'Achille. - Tension dans les varices en étendant les jambes. - Roideur et manque de flexibilité aux genoux, qui ne permettent pas de s'accroupir. — Crampes et tressaillement des muscles dans les mollets. — Congestion aux jambes et aux pieds, en étant debout. - *Ulcères aux jambes.-Gonflement des jambes et des pieds, avec dureté et douleur lancinante. - Roideur du cou-de-pied. - Douleur lancinante, comme d'un ulcère dans le talon et la plante des pieds, en se levant de son siége. - *Pieds froids même le soir au lit. - *Pieds brûlants. - Sueur fétide des pieds. - *Gonflement et distorsion des orteils. — *Peau calleuse, vésicules rongeantes et ulcères aux orteils. — Excoriation dartreuse entre les orteils. — *Épaisseur et difformité des ongles des orteils.



GRATIOLA OFFICINALIS.

RRK

GRATIOLA OFFICINALIS.

GRAT. — Gratiole, herbe à pauvre homme. — HARTLAUB et TRINKS. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 221. — Dozes usitées : 6, 9, 32, 50. — Médicament encore peu connu, et qui, jusqu'ici, n'a été employé que contre des Afactions hypocondriaques, quelques cas de Gastralgie et quelques espèces de Constipation.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement dans les membres. - Tétanos, avec pleine connaissance. — La plupart des symptomes apparaissent la nuit, ainsi qu'en étant assis, en se levant de son siège et en plein air; le contact les améliore. — Prurit, avec sensation brûlante après s'être gratté. — Éruptions suintantes et corrosives, qui ressemble à la gale. — Forte envie de dormir, avec bâillements fréquents et besoin de se coucher, surtout l'aprèsmidi. — Forte disposition aux frissons. — Morosité hypocondriaque, et mauvaise humeur. — Caprices hystériques. — Anxieté. — Humeur grave, et concentration en soi-même. — Grande loquacité et gaieté.

Tôte. - Vertige tournoyant en fermant les yeux. - Vertige en lisant et en étant assis, comme si la tête se balançait. — Maux de tête, avec envie de vomir et sommeil. — Sensation de plénitude dans la tête. — Maux de tête pressifs, surtout dans le front et l'occiput. — Maux de tête lancinants et pulsatifs. — Sensation comme si la tête se rapetissait par une contraction du cerveau. — Résonnement dans la tête qui prive de la vue et de l'ouïe. — Les maux de tête sont aggravés en se levant de son siége, pendant le

mouvement et la marche en plein air.

Yeux et Dents. — Prurit, frémissement et sensation de faiblesse dans les paupières. — Douleur brûlante et pression dans les yeux. — Yeux larmoyants et abattus en lisant. — Myopis en lisant. — Déchirement et élancements dans les oreilles. — Eternuments fréquents avec élancements dans le côté gauche de la poitrine et des hypocondres. — Obturation du nez. — Tension, fourmillement et sensation de gonstement au visage. — Déchi-rement d'un seul côté du visage. — Chalcur brûte et rougeur du visage. — Déchirement ou térébration nocturne dans les dents molaires. — Sensation de froid dans les dents.

Bouche et Gorge. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Pression dans la gorge, comme par des mucosités épaisses. — Accumulation de mucosités dans la gorge. — Raucité fourmillante et grattement dans la gorge. — Bouche amère, ou pâteuse. — Haleine fétide le matin, après le réveil.

Estomac. - Renrois amers ou douceatres. - Efforts inutiles



336 GRATIOLA OFFICINALIS. — GUAIACUM OFFICINALE.

d'éructation, avec pression depuis l'estomac jusqu'à la gorge, qui suspend la respiration. — Régurgitation d'une eau amère. -Faim, parfois avec dégoût et horreur pour tous les aliments. -Soif augmentée. - Nausées continuelles, avec vomiturition. -Nausées avec froid dans le ventre. - Vomissement avec obturation du nez. - Vomissement bilieux ou de matières aigres ou amères. - Malaise et sensation de plénitude dans l'estomac. *Pression à l'estomac, après le repas, avec nausées. - Fouillement et creusement dans l'estomac, avec envie de vomir. Pression à l'épigastre après le repas, comme par une pierre. — Les souffrances à l'estomac et de l'épigastre sont souvent accompagnées de nausées ou d'efforts inutiles d'éructation.

Ventre. — Douleur's lancinantes dans l'abdomen. — Battements dans l'hypocondre gauche. - Mal de ventre pressif, avec envie de vomir. - Maux de ventre avec pincements, qui forcent à se replier sur soi-même. - Ballonnement dur du ventre par des flatuosités. - Colique flatulente et pressive, avec nausées et renvois

désagréables.

Selles. - Besoin pressant et inutile d'aller à la selle. - *Constipation. - Selles dures, rares et tenaces, expulsées avec de grands efforts. - Diarrhée muqueuse la nuit, avec ténesmes. -Douleur d'excoriation au rectum. — Douleur brûlante au rectum pendant et après les selles. — Élancements, prurit, cuisson, et battement à l'anus. - Hémorrhoïdes aveugles.

Urines et Parties génitales. — Diminution de la sécrétion d'urine. - Urine rougeatre qui se trouble en reposant, avec un sédiment nuageux. - Elancements depuis le cordon spermatique jusqu'à la poitrine. - Après les pollutions, roideur douloureuse de la verge. - Règles trop hâtives et de trop longue durée. - Élancements aux seins. - Nymphomanie avec démangeaison aux parties.

Poitrine et Membres. — Toux sèche, provoquée par une sensation de raucité dans la poitrine, surtout le matin ou la nuit. — Toux nocturne, avec douleur d'excoriation dans la trachée-artère, oppression de poitrine et frissons. — Etouffement en montant. — Oppression de poitrine, avec battements de cœur. - Pression à la poitrine. - Elancements dans les côtés de la poitrine en inspirant. - Boutons sur la poitrine, qui brûlent après avoir gratté. Battements de cœur. — Elancements dans les jambes et les pieds.

GUAIACUM OFFICINALE.

UAI — Résine de Gaïac. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 222. — Dose usitée: 0, 30. — Durée d'action : jusqu'a 20 jours dans les affections chroniques. COMPARER AVEG : Graph, merc, n-voin,



CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble du symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques; Contracture arthritique des membres; Anévrismes?; Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Migraine; Pneumonie chronique (Phthisie pulmonaire?), etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTONES GENERAUX. — Douleurs rhumatismales dans les articulations. —*Douleurs arthritiques dans les membres, arec élancements et déchirements, et contractions des parties affectées. — Douleurs ostéocopes fourmillantes. — *Les douleurs sont provoquées par le moindre mouvement, et accompagnées de chaleur dans les parties affectées. — Engourdissement des membres. — Courbature et faiblesse dans les bras et les cuisses, avec horreur du mouvement. — Besoin fréquent de bâiller et d'allonger les membres, provenant d'une sensation de malaise général. — La plupart des symptômes se manifestent en étant assis, ainsi que le matin après le lever, ou le soir avant de se coucher. — Gonfiement des os. — Consomption. — Grande sensibilité des parties malades au toucher.

sibilité des parties malades au toucher.

Semmeil. — Forte envie de dormir après midi. — Sommeil tardif et réveil de bonne heure. — Réveil fréquent, avec effroi, quelquefois en s'endormant. — Jactation inquiète, la nuit. — Cauchemar en étant couché sur le dos. — Le matin, il semble que

Pon n'a pas assez dormi.

Pièvre. — Frissonnement, frisson et horripilation, même auprès du feu. — Frissons sans soif, le matin et le soir. — Sueur matutinale. — Sueur abondante, surtout à la tête, pendant la promenade au grand air. — Pouls accéléré.

Meral. — Opiniatreté. — Forte envie de critique, et de mépriser tout. — Paresse et horreur du mouvement. — Faiblesse de la mémoire et oubli excessif, surtout pour les noms. — Regard fixe

et absence d'idées, surtout le matin.

Tête. — Pression étendue et douloureuse, ou traction et déchirement dans le sinciput et les tempes. — Lancinations violentes et étendues, dans le cerveau. — *Déchirement dans un seul côté de la tête, jusque dans la joue. — Pulsations, battements (et élancements) dans les tempes, avec sensation, comme si la tête était enflée, et que les vaisseaux sanguins fussent engorgés.

Yeux, Face. — Sensation de gonflement, ou *gonflement réel des paupières, -avec sensation, comme si les yeux allaient sortir de la tête et que les paupières fussent trop courtes. — Pupilles dilatées. — Amaurose. — Boutons dans les sourcils. — Déchirement et *étreintes dans les oreilles. — Élancements dans les pommettes et les muscles des joues.

Dents, Appétit. - Douleur pressive dans les dents, en les ser-



GUAIACUM. — HAMAMELIS VIRGINICA.

rant,—Tiraillement et déchirement dans les dents, se terminant par des élancements. — Douleur brûlante dans la gorge. — Goût fade, avec absence d'appétit et dégoût pour toutes choses, accompagné d'expuition de mucosités. — Renvois à vide. — Faim immodérée. — "Nausées provoquées par une sensation comme si la gorge était pleine de glaires. — "Répugnance pour le lait.

Estomao, Urines. — Sensation de constriction anxieuse dans la région de l'estomac, qui gêne la respiration. — Pincement dans le ventre, comme par incarcération de flatuosités. — Sensation de vacuité, avec borborygmes et grondement dans le ventre. — Douleur comme par une hernie dans les aines. — Tressaillement des muscles du ventre. — *Constipation. — Selle dure, brisée. — Envie continuelle d'uriner, avec émission abondante. — Douleurs incisives dans l'urèthre, en urinant. — Envie inutile d'uriner, avec élancements dans le col de la vessie.


Poitrine et Membres. — Toux sèche, avec sensation dans l'épigastre comme d'un manque d'air. — Toux avec expectoration d'un pus fétide. — *Élancements dans la poitrine, aggravés en inspirant. — Pression dans les vertèbres du cou. — Roideur de la nuque. — Roideur tout le long du dos, d'un seul côté. — Déchirement et élancements dans un seul côté du dos. — Douleur contractive entre les omoplates. — Frissons dans le dos. — Faiblesse dans les bras. — Déchirement et élancements dans les omoplates et les avant-bras. — *Douleurs ostéocopes, pressives et fourmillantes, dans les cuisses, étant assis. — Tension paralytique dans les cuisses, en marchant. — Faiblesse dans les cuisses.

HAMAMELIS VIRGINICA.

HAMAM. - Hamamélie de Virginie. -- Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé jusqu'ici avec succès contre:

Rhumatismes tant musculaires qu'articulaires, avec endolorissement excessif des parties affectées. — Epistaxis avec hémoptysie. — Hémoptysie, véneuse, avec sang qui, sans effort, arrive
dans la bouche comme un courant chaud, et avec goût de soufre
dans la bouche. — Hématémèse avec selles sanguinolentes, précédées de douleurs et plénitude dans le ventre, accès fébriles, sueur
froide, abondante, pouls faible et accéléré. — Dyssenterie avec
sang coulant, comme une hémorrhagic, par petits caillots de couleur foncée, mêlés aux mucosités. — Hémorrhoïdes, avec écoulement de sang abondant, avec brûlement, endolorissement, pléni-



tude, pesanteur, anus écorché et sensation comme si le dos allait se briser. - Ovarite, à la suite d'un coup aussi, avec endolorissement pénible, répandu par tout le ventre, menstrues irrégulières, trèsdouloureuses, rétention d'urine, et aggravation de toutes les souffrances au moment de l'époque. — Métrorrhagies passices avec anémie. - Aménorrhée avec épistaxis ou hématémèse, constipation opiniatre et varices aux jambes. - Dysménorrhée avec douleurs violentes, traversant les hanches et le ventre jusqu'aux cuisses; sensation de plénitude dans les intestins et le cerveau, avec douleurs violentes dans toute la tête, suivie de stupeur et sommeil profond. — Mamelons saignants, avec endolorissement excessif.

HELLEBORUS NIGER.

ELL. — Ellébore noir. — Hannemann. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmae. homosop., p. 225. — Doses usitées: 9, 12, 30. — Durée d'action: 4 à 5 semaines, dans quelques affections chroniques. ANTIDOTES : Camph. chin.

COMPARES AVEC: Ars. bell. bry. cham. chin. dig. ign. op. phos. stann. stram. veratr. — C'est surtout après: Rell. bry. chin. que l'elleb. se montre efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections hydropiques, surtout quelques espèces d'anasarque, et principalement celles provenant de la répercussion des exanthèmes, telles que la miliaire pourprée, la scarlatine, etc.; Coma?; Fièvres nerveuses lentes; Mélancolie douce; Imbécillité; Teigne avec engorgement des glandes du cou; Hypocondrie?; Encéphalite?; Hydrocephale aigue?; Ascite; Hydrothorax, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs lancinantes et térébrantes à diverses parties et surtout dans le périoste, aggravées par l'air frais, la fatigue corporelle, le boire et le manger. — Tiraillements et déchirements dans les membres. - Douleurs lancinantes dans les articulations. - Relachement subit de tous les muscles. - Les muscles se refusent à faire leur service, à moins qu'on n'y prête une attention soutenue; on chancelle en marchant, on laisse tomber les objets que l'on tient en main, etc. — On se trouve mieux en plein air et l'on y éprouve la même sensation que si l'on sortait d'une longue maladie; tout paraît rajeuni.



HELLEBORUS NIGER.

340

Convulsions. - Crampes. - Syncope. - *Gonflements hydropiques. - Chute des cheveux et des ongles.

Peau. — Pâleur de la peau. — Eruptions miliaires. — Gonflement leucoflegmatique de la peau de tout le corps. — Desquamation de la peau de tout le corps.

Sommeil. - *Somnolence, avec yeux à demi ouverts et pupilles tournées en l'air. — Rêves confus, anxieux, et dont on ne conserve pas le souvenir. — Insomnie. — Jactation dans le lit.

Fièvre. - Frissons alternant avec douleurs lancinantes dans les membres. - Froid de tout le corps et surtout des membres avec chaleur dans la tête. - Frisson général avec chair de poule et sensibilité douloureuse du cuir chevelu au toucher ou en remuant la tête, tiraillements et déchirements dans les membres, lancinations dans les articulations et absence de soif. — Le soir, après s'être couché, chaleur brûlante par tout le corps, et principalement à la tête, avec horripilation intérieure et frissons sans soif; les boissons répugnent. - Sueur nocturne vers le matin.

Moral. - * Mélancolie taciturne avec soupirs continuels. - Angoisse excessive et presque mortelle. - Nostalgie. - Humeur hypocondriaque. - Paresse. - Pleurs sanglotants. - Silence opiniâtre. Défiance. — Emoussement du sens interne. — Stupidité et irréflexion, avec fixité du regard sur un seul point. - Faiblesse de la mémoire. - Faiblesse de l'activité involontaire du cerveau ; les muscles refusent leur service dès que l'attention se porte

ailleurs.

Tête. — Douleur stupéfiante et sensation de meurtrissure dans la tête. - Mal de tête pressif et étourdissant. - Pesanteur douloureuse de la tête, avec chaleur brûlante dans cette partie, froid aux doigts, sensation de frisson général et pâleur du visage. Chaleur brûlante de la tête, avec face pâle. - Les maux de tête sont plus supportables lorsqu'on prend sur soi de reposer tranquillement et de sommeiller. — Sensibilité douloureuse à l'extérieur de la tête et surtout à l'occiput, comme s'il était meurtri, en y touchant ou en remuant la tête. - Tressaillement dans les téguments de la tête, pendant le mouvement, en se baissant ou en montant un escalier. - Besoin d'enfoncer la tête dans l'oreiller en dormant. — Tumeurs dans la peau du front, avec dou-leur de meurtrissure. — Croûtes suintantes au cuir chevelu.

Yeux et Oreilles. — Douleur dans les yeux, comme si un clou était enfoncé sur les bords de l'orbite. - Pesanteur pressive dans les yeux, de haut en bas. - Fixité involontaire du regard sur un seul point. - Photophobie le jour. - Élancements dans les

oreilles, le jour et la nuit, avec térébration fouillante.
Visage et Dents. — Face pâle, quelquefois jaunâtre. — *Gonflement pâle et œdémateux du visage. — Front ridé. — Vésicules blanches sur les lèvres qui sont gonflées. — Douleur ostéocope, sourde, à la pommette. — Maux de dents, la nuit, avec dou-



HELLEBORUS NIGER. - HEPAR SULFURIS. 342

hanches. — Manque de solidité dans les jambes, avec fléchissement des genoux. - Roideur et tension dans les cuisses et les jarrets. - Lancinations obtuses et térébrantes dans les articulations des genoux et des pieds.

HEPAR SULFURIS.


HEP. — Foie de soufre, Calcaire. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 405. — Doses usitées: 3, 30 — Durée d'action: jusqu'à 60 jours, dans les dernières dilutions et dans les affections chroniques.

ANTIDOTES : Acetum, bell. - On l'emploie comme antidote de : Ars. ant.

ANTIDOTES: Acctum, Ben.—On templos comments in bell, cupr, fer, iod, merc, nitr-ac, sil, zinc,
COMPARER AVEC: Amm, ant, arn, ars, bell, bry, cham, chin, cin, cupr,
dros, ferr, lach, merc, mitr-ac, plumb, spong, zil, zinc, — C'est surtout
après: Bell, lach, sil, spong, zinc, que l'hep-sulf, se montre efficace,
lesselles al Après le propriement guelque fois; lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. - Après hep., conviennent quelquefois : Bell. merc. nitr-ac. spong. sil.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections arthritiques, avec gonflement inflammatoire; Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Engorgement, inflammation et suppuration des glandes; Inflammations flegmoneuses; Affections rhumatismales; Atrophie des enfants?; Affections scrofuleuses; Ictère?; Érusipèles simples, flegmoneux et vésiculeux; Éruptions urticaires; Dartres, surtout à la face; Rhagades, surtout celles provenant de l'abus du mercure; Ulcères invétérés, putrides, carcinomateux; Surexcitation nerveuse, surtout celles par l'abus du mercure; Migraine; Calvitie, surtout celle provenant de l'abus du mercure, ou à la suite de fortes maladies aigues, ou de maux de tête hystériques, etc., etc.; Teigne; Dartres aux oreilles; Éruptions et dartres à la face; Ophthalmies scrofuleuses, arthritiques, traumatiques, catarrhales, etc.; Ulcères de la cornée; Otite, avec otorrhée purulente; Gonflement scrofuleux du nez?; Salivation avec ulcération dans la bouche, par suite de l'abus de mercure; Amygdalite et autres angines flegmoneuses; Bubons scrofuleux; Diarrhées et dyssenteries; Chancres mous et phagédéniques; Lochies maladives; Cancer au sein?; Croup (période exsudatoire passée); Laryngites aiguës et chroniques (phthisie laryngée); Phthisie pulmonaire; Rhagades aux mains; Panaris, etc., etc.

Voir la note, page 15.



paralytiques dans les membres, surtout le matin, en s'éveillant.

— *Douleurs d'excoriation ou de meurtrissure au toucher, à diverses parties. — Élancements dans les articulations. — *Gonfiements arthritiques, avec chaleur, rougeur et douleurs de luxation. — *Gonfiement, inflammation et ulcération des glandes. — *Apparition ou aggravation des douleurs, la nuit, surtout pendant les frissons. — Surexcitation nerveuse excessive, avec sensibilité douloureuse au moindre contact, ainsi qu'au grand air, qui cauen beaucoup de souffrances. — *Amaigrissement, °parfois avec angoisse, irritabilité, frisson au dos, rougeur des joues avoir fumé du table, "ou en marchant au grand air, avec chaleur et anxiété. — Aosts d'évanouissement, surtout le soir, même par des douleurs peu violentes.

Poll. — *Inflammations érysipélateuses, même avec gonfiement et vésicules. — Couleur jaunâtre de la peau, surtout au visage, avec couleur jaunâtre de la sclérotique, et urines couleur rouge de sang. — Démangeaison brûlante au corps, avec vésicules blanches après s'être gratté. — *Éruptions uritcaires. — °Éruptions de boutons et de tubérosités, douloureux au toucher. — *Peau maladire, toute lésion tend à s'ulcérer. — *Gerçures de la peau. — *Ulcères putrides, répandant une odeur de fromage fort, et saignant facilement, avec élancements, sensation de rougement (surtout la nuit), ou avec douleurs brûlantes et pulsatives. — Ulcères carcinomateux. — °Tuméfactions chaudes et rouges, avec

douleur de foulure. — «Suppurations. — *Panaris.

Semmeil. — Forte envie de dormir, le matin et le soir, avec bâillements convulsifs. — *Sommeil inquiet, avec tête renversée en arrière. — Sommeil prolongé, avec étourdissement, comme dans le coma vigil. — Insomnie à cause d'une grande affluence d'idées. — Rêves d'incendies, de maladies, de dangers, de coups de fusil, etc. — *La nuit, souffrances gastriques, mal à la tête, agitation, tressaillement des membres et chaleur sèche. — *Sursauts la nuit pendant le sommeil, comme si l'on manquait d'air,

avec pleurs et grandes angoisses.

Pièvre. — *Horripilation et frissons, surtout au grand air, ou la nuit, avec douleurs opposées. — Frissons, avec claquement des dents et froid aux pieds et aux mains, suivis de chaleur et de sueur, surtout à la poitrine et au front, avec peu de soif. — D'abord amertume de la bouche, puis frissons avec soif; une heure après, chaleur avec sommeil, après quoi vomissement et céphalaigie. — *Chaleur sèche la nuit, avec mal à la tête, soif et divagations. — *Chaleur fugace, avec sueur. — *Chaleur fébrile ardente, avec rougeur du visage et forte soif. — *Grande disposition à transpirer, le jour, au moindre effort et au moindre mouvement. — Sueur nocturne. — Sueur matutinale, — Sueur visqueuse, acide,



HEPAR SULFURIS.

Moral. — Tristesse et envie de pleurer. — *Angoisses et appréhensions extrêmes, surtout le soir, et parfois au point de se suicider.
— Mauvaise humeur; on n'aime pas même à voir les siens. —
Irritabilité excessive. — Dépit et emportement, avec parole précipitée et faiblesse excessive de la mémoire. — Visions le matin,

au lit. - Emportement jusqu'à pouvoir tuer les gens.

Tête. - Vertige en remuant la tête, ainsi que par le mouvement de la voiture, ou le soir, avec nausées. - Vertige, avec perte de connaissance et obscurcissement de la vue. - Maux de tête, le matin, provoqués par une secousse quelconque. - Maux de tête la nuit, en remuant les yeux; il semble que le front va être arra-- Mal à la tête, comme si un clou y était enfoncé. - Pression dans les tempes et au vertex, avec battements de cœur le soir. - Tension au-dessus de la racine du nez. - *Douleur d'ulcération dans la tête, immédiatement au-dessus des yeux, tous les soirs, ou bien la nuit, au lit. - Elancements dans la tête, surtout après avoir été au grand air, et en se baissant, ou la nuit comme si la tête allait éclater. - * Térébration dans la tête, surtout dans la racine du nez, tous les matins. - *Chute des cheveux et plaques chauves. - Sueur froide à la tête. - *Tubérosités à la tête avec douleur d'excoriation au toucher. - Croûtes humides à la tête.

Yeux. — Douleur, comme si on enfonçait les yeux dans la tête. —
Mouvement des yeux douloureux et difficile. — Ardeur, pression
et élancements dans les yeux. — Douleur d'ulcération, immédiatement au-dessus de l'œil, chaque soir. — *Inflammation des
yeux et des paupières, quelquefois même érysipélateuse, avec
douleur de meurtrissure et d'excoriation au toucher. — Boutons
au-dessus des yeux et sur les paupières. — °Taches et ulcères de
la cornée. — *Larmoiement et agglutination nocturne des paupières. — *Occlusion spasmodique des paupières, la nuit. —
Yeux proéminents. — Obscurcissement de la vue, en lisant. —
*Photophobie, le jour et aux lumières. — °Trouble de la vue, le
soir, à la lumière des bougies, alternant avec lucidité de la vue.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, en se mouchant. — Chaleur, rougeur et prurit dans les oreilles. — *Écoulement par les oreilles d'un pus qui parfois est fétide. — °Croûtes derrière et sur les oreilles. — Dureté de l'ouïe, avec pulsation et bourdon-

nement dans l'oreille, surtout le soir, au lit.

Nez. — Inflammation, rougeur et gonflement du nez. — Douleur de meurtrissure et d'excoriation du nez au toucher. — Douleur d'ulcération brûlante et croûtes dans les narines. — Épistaxis, le matin et après avoir chanté. — Manque ou exaltation de l'odorat. — Coryza, principalement d'un seul côté, avec raucité dans la gorge, gonflement inflammatoire du nez, fièvre et courbature dans tous les membres.

Visage. - Face jaune avec cercles bleus autour des yeux. -



HEPAR SULFURIS.

ments dans le ventre, surtout du côté gauche. — Gonflement et suppuration des glandes inguinales. — Incarcération et émission difficile de flatuosités, surtout le matin.

Selles. — Selles dures et sèches. — *Émission difficile d'excréments rares et mous, avec besoin pressant et ténesme. — Diarrhées de matières stercorales, avec tranchées. — *Diarrhée blanchátre, d'odeur acidulée, surtout chez les enfants. — *Selles dyssentériques, verdâtres ou couleur d'argile, avec évacuation de muco-sités sanguinolentes. — Après la selle, douleur d'excoriation et écoulement sanieux par l'anus. — Sorties de boutons hémorrhoi-

daux du rectum. - Sueur au périnée.

Urines. — Urines tardives, troubles, avec sédiment blanchâtre. —

•Faiblesse de la vessie, avec écoulément lent des urines. — Sécrétion abondante d'une urine pâle, avec pression sur la vessie. —

Urine âcre, corrosive, ou pâle et aqueuse, ou *rouge foncé et chaude. — *Emission d'urine la nuit. — •Pissement au lit. —

Pissement de sang, après avoir uriné. — Rougeur et inflammation de l'orifice de l'urèthre. — •Écoulement muqueux par l'urèthre. — Pellicule irisée sur les urines.

Parties viriles. — Faiblesse des parties génitales. — Cuisson, excoriation et suintement entre les cuisses et le scrotum. — *Ulcère chancreux au prépuce. — Érections douloureuses, crampoïdes et tensives. — *Absence de désirs vénériens et d'érections. — Érections sans énergie, pendant le coît. — Excitation des parties génitales, comme par l'éjaculation. — *Écoulement de liqueur prostatique, surtout après avoir uriné, et pendant une selle difficile.

Règles. — Exceriation à la vulve et entre les cuisses. — Congestion à l'utérus. — Écoulement de sang, hors le temps des règles, avec ballonnement du ventre. — *Règles trop tardives.— Leucorrhée, avec cuisson à la vulve. — °Ulcère carcinomateux au sein.

Larynx.— Enrouement. — Douleur et grande sensibilité du larynx, avec voix faible et rauque, amaigrissement, fièvre hectique et insomnie. — Douleur permanente au larynx, aggravée par la pression, par la parole, en toussant et en respirant. — Faiblesse des organes de la parole et de la poitrine, qui empèche de parler à haute voix. — Toux provoquée par une irritation ou une douleur dans le larynx. — Toux profonde, sourde, provoquée par une gêne de la respiration. — *Toux suffoquante, violente, avec vomiturition. — Toux semblable à la coqueluche. — Toux après avoir bu. — *Toux sèche, le soir, après avoir en froid à une partie du corps, ou en étant couché dans le lit. — *Accès de toux, sèche, rauque et creuse, avec angoisse et suffocation, se terminant souvent par des pleurs. — oToux aboyante. — Toux avec crachement de sang. — *Toux avec expectoration abondante de mucosités, râle muqueux. — Pendant la toux, résonnement et

346



HEPAR SULFURIS. - HIPPOMANES.

347

douleur dans la tête, comme si elle allait éclater. - Après la toux, éternument.

Poitrine. - Respiration anxieuse, enrouée, sifflante avec péril de suffocation lorsqu'on est couché. - Accès de suffocation qui forcent à renverser la tête. - Haleine courte. - Besoin fréquent de respirer profondément, comme après avoir couru. - Elancements dans la poitrine en respirant et en marchant. -- Boutons et furoncles sur la poitrine, avec lancinations et douleur d'excoriation au toucher.

Tronc. — Douleur brûlante, lancinante dans la région des reins. ___ Douleur de meurtrissure aux reins et jusque dans les cuisses. - Elancements et *tiraillement dans le dos, -entre les omoplates et dans les muscles du cou. — Tension nocturne dans le

selles. — Suppuration des glandes axillaires. — Bosses su cou, douleureuses au toucher.

Bras. — Douleur de meurtrissure dans les ce du bras. — Gonflement arthritique de la main, des doigts et des articulations des doigts, avec chaleur, rougeur et douleur de luxation pendant le mouvement. - *Peau des mains gercée, rapeuse et sèche. -Eruption granulée aux mains et aux poignets. - *Eruption urticaire aux mains et aux deigts. — Luxation et déboitement facile des doigts. - Doigts morts. - Panaris.

Jambes. — Douleur aux fesses en s'asseyant. — Furoncles aux fesses. — Douleur de meurtrissure dans les cuisses. — Tension douloureuse dans les cuisses, et qui empêche de dormir. - Fréquemment, lassitude subite dans les jambes, en marchant. -Gonstement des genoux. — Crampes dans les mollets, la plante des pieds et des orteils. — Pieds brûlants. — Gonstement des pieds et des malléoles, avec gêne de la respiration. - Gonflement rouge, rhumatismal aux malléoles, avec douleur qui augmente la nuit. - Crevasses aux pieds. - Elancements dans les cors.

HIPPOMANES.

HIPP. — Hippomanes. — HERING. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 330. — Études pathogénésiques de l'Amerique du Nord. homosop., p. 330. — Etu Compann: Caus. oxal-ac.

CLINIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas dans lesquels on pourra l'administrer avec auccès contre l'une ou l'autre des affections suivantes: - Convulsions et épilepsie des enfants; Affections morales et



HIPPOMANES.

affections mentales avec le caractère de la dépression, surtout dans l'âge de la puberté, ou avec exaltation de l'appétit vénérien; Souffrances des femmes à l'age critique; Eruptions de diverses nutures; Maux de tête qui affectent surtout le moral et l'intellect; Affections du cœur; Paralysie des mains; Douleur de luxation dans l'articulation des mains; (Rétrécissement de l'urèthre?; Gonflement de la prostate?).

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande lassitude avec besoin de se coucher, sans que cela soulage; lourdeur dans les membres; grand abattement et faiblesse, avec face pâle; faiblesse physique et intellectuelle. — La plupart des souffrances se montrent dans la position assise. Le côté gauche paraît être affecté de préférence. - Douleurs déchirantes dans les extrémités supérieures et infé-

rieures, en les étendant.

345

Pean. — Prurit, avec sensation agréable après s'être frotté, principalement à la poitrine et entre les épaules. — Taches urticaires très-pruriteuses, à plusieurs endroits; boutons et petites pustules; éruptions sèches, comme des dartres; excroissances sèches, tuberculeuses; ofuroncles. — oCarcinome.

Sommeil. — Bâillement fréquent, presque spasmodique; envie continuelle de dormir, sans que le sommeil délasse. - Insomnie nocturne. — Réves fréquents; pénibles, effrayants; rêves lascifs.

Fièvre. — Frissonnement et grande frilosité, même dans la chaleur de l'été ; frisson qui commence dans le dos. — Chaleur fébrile vers le soir, avec renouvellement de toutes les souffrances.

Moral et Intellect. — Humeur maussade, mécontente, hycocondriaque; humeur colère, portant à vouloir battre tout le monde; le soir, aggravation de la mauvaise humeur avec chaleur; dégoût de la vie jusqu'au suicide; ogémissement, la nuit, en s'agitant dans le lit. - Nostalgie. - Inquiétude qui fait courir cà et là; peur de l'avenir; radoteries. — Imagination lascive. — Horreur du travail et incapacité de méditer; faiblesse intellectuelle et physique. — Sensation de légèreté et fourmillement dans la tête, au point d'en devenir fou. - Frayeur facile au moindre bruit, granduit mal à la tête.

- Mal de téte avec vertige et stupeur, précédé de chalen à la tête; puis, frissonnement, flatuosités, dégoût du tabac, suif, mauvaise humeur, envie de dormir et baillement. — Maux de téte violents, comme une pesanteur; douleurs pressives, principalement au front et dans les tempes ; fourmillement, fouillement et battement dans le front. — Maux de tête continuels, tant dans la chambre qu'au grand air. — Aggravation des maux de tête en marchant la face tournée au soleil; amélioration à l'ombre. La nuit, disposition à enfoncer la tête dans l'oreiller. — La tête



se trouve mieux étant couchée du côté douloureux. — Sensation de légèreté et de fourmillement dans la tête. — Coups électriques qui traversent le cerveau. —Les cheveux se dessèchent, blanchissent et tombent.

Youx. — Endolorissement des yeux en les remuant, avec mal à la tête; brûlement dans les yeux et larmoiement. — Regard fixe. — La flamme de la bougie paraît bleue; en marchant dans la rée, taches rouges, bleues, vertes, devant les yeux; en rentrant à la chambre, obscurcissement de la vue.

Oreilles. — Sensation comme s'il y allait se former un écoulement à l'oreille (droite) forçant à y enfoncer le doigt. — Élancements, térébration et déchirement dans l'oreille (gauche). — Le bruit

effraye facilement.

Hes. — Sensation de froid dans les narines, en respirant. — Épistaxis, le matin ; sortie de petits morceaux de sang par le nez et la bouche. — Vibrations, fremissements légers dans la pointe du nez.

Pace. — Pâleur, pendant la lassitude. — Chaleur de la face, avec

aggravation des symptômes du moral.

Bouche et Gerge. — Douleur d'excoriation dans la bouche. —
Salive abondante, pendant le mal de tête et le mal de gorge. —
Langue chargée de blanc, avec point rouge. — Sensation douloureuse comme par une pelote dans la gorge, en parlant et en
avalant; endolorissement des amygdales. — Le matin, mucosités
tenaces dans la gorge.

tenaces dans la gorge.

Gastricisme. — Goet amer dans la bouche. — Manque d'appétit, dégoût des aliments; répugnance pour le tabac. — Désir de choses acides, piquantes, avec dégoût des choses sucrées et langue

blanche. — Nausées, lorsqu'il survient un courant d'air.

Bstomac et Ventre. — Sensation de froid glacial dans la région de l'estomac et le côté gauche, aux côtés et au ventre. — Sensation de vide dans le ventre et la tête; Ventre dur, sans soulagement par les garde-robes; Douleurs violentes autour du nombril, avec ou sans émission abondante de vents fétides. — Beaucoup de vents.

Selles et Anus. — Selles molles, avec écoulement de liqueur (prostatique?) de l'urèthre après avoir uriné. — Selles dures, volumineuses, noueuses. — Spasme du sphincter de l'anus.

Urines. — Émission fréquente d'urines aqueuses. — Tiraillement de l'anus le long de l'urithre; jet d'urine gênée, comme s'il était retenu par une enflure.

Parties viriles. — Tiraillement, tension et fourmillement dans les testicules. — Appétit vénérien fortement augmenté, avec érections et pollutions.

Règles. — Les règles paraissent favorisées dans l'époque du retour. — Règles de quinze jours en avant, et sans nulle souffrance. Larynx et Toux. — Larynx comme à vif, comme si l'air qu'on

JAHR. -8 édit., Ire part., t. I.



350 HIPPOMANES. — HYDRASTIS CANADENSIS

respire était trop froid; chatouillement dans la gorge, en respirant, forçant à tousser. — Toux, pendant le sommeil, sans réveil; toux aboyante. — Expectoration muqueuse des poumons, surtout le matin.

Poitrine et Respiration. — Élancements, surtout dans le côté gauche de la poitrine; douleurs tressaillantes, de bas en haut, au côté gauche de la poitrine; pression et tiraillement de bas en haut, de l'hypocondre droit jusque dans l'épaule gauche. — Fréquemment, en marchant, douleur au cœur, comme si cet organe lut arraché; souvent des pulsations dures et violentes du cœur, surtout à chaque tour du corps et en se levant de son siège.

Tronc. — Douleur dans le des ; comme dans la moelle épinière ; sous l'omoplate gauche ; le long de la colonne vertébrale, entre les omoplates ; dans la région des vertèbres lombaires ; entre l'omoplate gauche et la colonne, en avalant, en respirant profondément et se courbant du côté gauche. — Faiblesse de la nuque qui per-

met à peine de tenir la tête droite.

Membres thoraciques. — Pesanteur à l'épaule gauche, comme s'il y avait un poids dessus; le bras est quelquefois comme paralyse dans l'épaule. — Dans la main droite, fournillement et captation; faiblesse paralytique, roideur et lourdeur des articulations carpiennes, surtout le matin au lit; grande faiblesse dans les mains, qui ne permet de rien tenir; sensation de luxation et de

foulure dans l'articulation carpienne gauche.

Membres pelviens. — Fatigue et lassitude douloureuse, surtout dans les cuisses. — Sensation de luxation ou de foulure dans le genou, avec grande lassitude, surtout en se tenant debout. — Crampes et douleurs crampoïdes dans la plante des pieds; faiblesse et sécheresse dans les articulations et la plante des pieds, an point de craindre d'appuyer le pied. — Paralysie, tension et tiraillement dans l'articulation du pied (droit). — Pieds froids.

HYDRASTIS CANADENSIS.

HYDRAS. - Hydrastis. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé jusqu'ici avec succès contre:

Variole et Varioloïdes avec gonflement prononcé, rougeur et fort prurit, avec mal de gorge violent. — (Tumeurs squirreuses, Lupus, Rhagades, Intertrigo et autres Dermatoses.) — Scorbut avec grande prostration des forces, et ulcères aux jambes. — Jaunisse, avec catarrhe gastro-duodenal, sensation de faiblesse dans l'épigastre et palpitations de cœur, violents et opiniatres. — Ulcères



HYDRASTIS. - HYDROCYANI ACIDUM.

à la gorge. — Catarrhe gastrique aigu, avec aigreurs, constipation, douleur sourde dans l'estomac et sensation de défaillance dans l'épigastre. — Constipation, avec mal de tête, hémorrhoïdes, coliques accompagnées de défaillance et de chaleur dans les intestins, et, après chaque selle, douleur persistante dans l'anus et le rectum. — Gonorrhée, avec sensation de défaillance, après chaque selle. — Leucorrhée, avec écoulement visqueux, érosions ulcérées au col de l'utérus et dans le vagin, sensation d'une grande prostration et battements de cœur violents. — Bronchite des vieillards, avec grande faiblesse, état cachectique, manque d'appétit, et expectoration abondante, épaisse, jaunâtre, visqueuse et filante. — Bquirre ou sein, tumeur dure, lourde, adhérent à la peau, avec clancements comme par des couteaux.


HYDROCYANI ACIDUM.

HYDROC. — Acide prussique. — HARTLAUB et TRINKS. — Hist, nat. et prép. Voy. Pharmae, homosop., p. 406. Compares: Lauree.

des membres, surtout des cuisses; faiblesse et lassitude extrêmes; faiblesse nerveuse. — Spasmes; spasmes au dos; spasmes de la face et des mâchoires: convulsions. — Paralysie des extrémités inférieures, puis supérieures; perte de la sensation, puis roideur de ces parties; tremblement et chancellement, immobilité, insensibilité, roideur du corps. — Accès cataleptiques; grande flexibilité des membres; pulsations du cœur toujours plus lentes, plus petites, plus insensibles, jusqu'à la léthargie; diminution de la chaleur vitale. — Excitation de l'activité des sens; sensation intérieure de bien-être; douce langueur avec sensation de lassitude bienfaisante. — Émoussement des sens et insensibilité aux influences extérieures; disparition de-toute douleur; insensibilité; pette de connaissance. — Erreur des sens; frisson et lassitude.

Pean. — Prurit à différentes parties, surtout entre le menton et les lèvres. — Petites pustules rouges à la hanche; vésicules brûlantes, pruriantes, aux extrémités supérieures et au cou. — Sécheresse de la peau. — Pâleur générale, avec teinte bleuâtre.

Sommeil. — Baillement frequent, quelquefois avec horripilation et spasmes à la peau. — Envie de dormir, quelquefois insurmontable, ou bien après le repas; sommeil lourd le matin; envie continuelle de dormir; coma vigil; somnolence. — Insomnie; sommeil difficile, presque impossible; reveil frequent. — «Rêres vifs, sans suite; anxieux, pénibles, de mort.



HYDROCYANI ACIDUM.

Fièvre. — Frilosité, horripilations fréquentes, après minuit ou le matin; horripilation avec bâillements ou avec soif. — Froid des membres; sensation de froid intérieur et extérieur. — Fièvre, horripilation, puis chaleur brûlante; alternation de violent frisson et de chaleur brûlante; chaleur à la tête, avec extrémités froides, chaleur et sueur par tout le corps, l'après-midi; agitation fébrile générale, avec excitation violente; accès de chaleur et mou-

vements du cœur très-prompts, désordonnés. — Pendant le frisson, étourdissement à la tête et vertige; pendant l'horripilation,

brouillard devant la vue.

352

Moral. — Accablement; découragement. — Angoisse et oppression; angoisse dans le creux de l'estomac; crainte de maux imaginaires. — Irritabilité très-grande; humeur fâcheuse; humeur

chagrine ; incapacité de travailler.


Tête. - Paresse de la pensée, avec hébétude dans la tête ; impossibilité de réfléchir, et de rassembler ses idées; mémoire trèsaffaiblie; répugnance contre toute fatigue morale. - Tête entreprise et pesante; étourdissement, avec affaissement du corps; étourdissement, quelquefois avec sensation d'ivresse. - Obscurcissement des sens, quelquefois avec vacillement des objets, et voile devant la vue, et avec difficulté de se tenir sur ses jambes en se redressant après s'être baissé, en se levant de son siège, aggravé au grand air. - Vertige, quelquefois avec chancellement; sensation comme si quelque chose se mouvait dans l'air et l'entraînait avec soi, ou bien comme si tout tournait autour de soi. -Céphalalgie avec vertige; céphalalgie étourdissante, douleur sourde dans le front, partant des tempes. — Tête lourde et hébétude. — Céphalalgie pressive dans le front, ou bien à l'occiput, à gauche, vers la région frontale; forte dans le sinciput et l'occiput, depuis le vertex jusque dans le front et les orbites des yeux; dans le côté de la tête (droit ou gauche), surtout dans le vertex et le front; à diverses parties de la tête. - Tension dans la région frontale; élancements, tantôt par-ci, tantôt par-là, dans la tête.

Yeux. — Yeux demi-ouverts; renversés; sortant de la tête; fixes; immobiles; difficulté de mouvoir le globe des yeux. — Pupilles dilatées et immobiles; insensibles à la clarté. — Paupières grandes ouvertes; immobiles; comme paralysées; tressaillement spasmodique dans les paupières supérieures. — Obscurcissement de la vue; trouble et brouillard devant la vue; cécité amaurotique.

Oreilles. — Pression dans l'intérieur des deux oreilles, quelquefois avec bruit et résonnement. — Dureté de l'ouïe.

Nez. — Cuisson dans le haut des narines; dilatation des ailes du nez qui ont une teinte bleuâtre. — Sécheresse dans le nez.

Face. — Bouffissure de la face; visage have; visage caduc, pale et bleuatre; teint terreux et gris; expression de béatitude dans les traits. — Contorsion des coins de la bouche; trismus; contractions effroyables des muscles de la face.



HYDROCYANI ACIDUM.

358

Bencha, Gorgo. — Sécheresse de la bouche. — Sécrétion de salive augmentée. — Langue chargée, quelquefois blanche, ensuite foncée et sale; contraction à la racine; sensation de froid sur la langue; brûlement au bout de la langue; paralysie et roideur de la langue, qui souvent sort de la bouche; perte de la parole. — Douleurs dans le palais; inflammation du palais. — Spasmes dans Parrière-gorge et l'asophage; grattement dans la gorge et le gosier; grattement pénible dans la gorge; ardeur dans la gorge et dans l'asophage; brûlement dans le palais, le gosier et l'asophage, inflammation du gosier et de l'asophage.

Bymptames gastriques. — Goût douceâtre, fétide, âcre et irritant; beaucoup de gaz dans la bouche, avec goût d'acide prussique. — Anorexie, répugnance pour les aliments. — Adipsie, avec chaleur dans tout le corps; soif ardente. — Dégoût, envie de vomir;

vomissements d'un liquide noir.

Estomac, Selles. — Maux d'estomac; sensation de froid dans l'estomac, quelquefois avec élancements; pression et serrement dans le creux de l'estomac, avec forte oppression; contractions spasmodiques dans l'estomac; ardeur et brûlement, ou bien aussi inflammation de l'estomac et des intestins; douleur pulsative dans les précords. — Froid dans tout le ventre, quelquefois alternant avec brûlement; grondement et borborygmes dans le bas-ventre; gonfiement mou du ventre, sans tension. — Selle involontaire.

Urines. — Rétention d'urine. — Émission fréquente d'urines; émission abondante d'une urine aqueuse, pâle ou jaune pâle, déposant un nuage trouble. — Urine, avec sédiment épais et rougeatre. — Émission involontaire des urines. — Brûlement dans

l'urèthre.

Laryax, Toux. — Grattement douloureux et brûlement dans le larynx; inflammation du larynx; sensation comme de gonflement du larynx; constriction de la gorge; chatouillement dans le larynx; quelquefois élancements et tiraillements; raucité et enrouement de la voix. — Forte voix; tussiculation fréquente,

par cuisson dans le larynx; hémoptysie.

Poitrine, Respiration. — Respiration ralante, gémissante, lente, très-difficile, avec rale muqueux; gêne de la respiration, à cause d'élancements dans le larynx; besoin de respirer profondément; respiration profonde, fréquente et ronflante; respiration anxieuse; paralysie des poumons; oppression de poitrine, asthme, quelquefois pénible; sensation d'étouffement, avec douleurs pénibles dans la poitrine; forte oppression et constriction de poitrine. — Douleurs vives dans la poitrine; pression dans le côté droit de la poitrine; élancements dans le côté gauche, au-dessous du cartilage inférieur du sternum ou près de cette partie, dans la poitrine, en respirant profondément. — Dans la région du cœur, douleurs et pression; palpitations de cœur; mouvements irréguliers du cœur; battements du cœur faibles.



HYOSCYAMUS NIGER.

HYOSCYAMUS NIGER.

HYOS. — Jusquiame — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p 227. — Doses usitées: 42, 30. — Durée d'action : 8 à 45 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Bell, camph. chin. - On l'emploie comme antidote de Bell.

354

plumb.

COMPARER AVEC: Acon. arn. bell. camph. cham. chin. dros. graph. ign. lach. n-vom. op. phos. plat. plumb. rhus. rut. stram. veratr. — C est surtout après bell., que l'hyosc. convient lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections par suite d'un refroidissement, d'une frayeur avec angoisse, ou d'une contrariété; Convulsions, crampes, spasmes-hystériques, épilepsie, danse de Saint-Guy et autres affections spasmodiques, principalement chez les femmes enceintes ou en couches, ainsi que chez les enfants et par suite de vers; Inflammations avec symptômes nerveux; Surexcitation nerveuse avec insomnie; Fièvre typhoïde, aussi à la suite du choléra; Fièvres intermittentes; Fièvre avec affections vermineuses?; Imbécillité; Delirium tremens; Vésanie, manie, rage et autres aliénations mentales; Hydrophobie; Encéphalite; Hydrocéphale aiguë?; Migraine; Amblyopie amaurotique avec héméralopie; Presbyopie; Odontalgie par suite de re-froidissement; Hoquet spasmodique; Dyspepsie avec vomissement des aliments, aussi chez les enfants; Hématémèse, même par suite d'un refroidissement; Gastrite?; Entérite?; Coliques spasmodiques; Diarrhée, surtout chez les femmes en couches; Paralysie du sphincter de l'anus; Paralysie de la vessie; Spasmes, diarrhée et autres affections des femmes enceintes ou en couches; Crampes de la matrice?; Fièvre puerpérale; Convulsions, vomissement et autres affections des nouveau-nés; Toux chez les vieillards, aussi à la suite des morbilles; Toux convulsive; Crampes de poitrine?; Pneumonie avec phénomènes nerveux?; Phthisie commençante; Affections organiques du cœur, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement incisif et tiraillement sourd dans les membres et les articulations. — Membres froids, tremblotants; engourdis .- *Mouvements convulsifs et secousses de quelques membres ou de tout le corps, parfois, pour peu que l'on essaye d'avaler les liquides. — Jactation des pieds et des mains. - *Attaques d'épilepsie, quelquefois avec

de tête comme par ébranlement du cerveau. — Douleur pressive et étourdissante dans le front, surtout après le repas. — Embarras constrictif dans le front. — Sensation de fluctuation ou de commotion au cerveau, surtout en marchant. — Chaleur et fourmillement dans la tête. — Mal de tête alternant avec douleur à la nuqué. — Balancement de la tête de côté et d'autre.

Youx. — Yeux abattus et ternes. — *Yeux ronges, fixes, conculsés et profininents. — *Mouvements spasmodiques des yeux. — Rougeur de la selérotique. — Gonflement des paupières. — *Strabisme. — *Occlusion spasmodique des paupières. — *Pupilles dilatées. — Trouble de la vue. — Myopie ou presbyopie. — Erreurs de la vue. — Diplopie. — Les objets semblent être beaucoup plus grands qu'ils ne sont en effet, ou bien colorés en rouge. — *Cécaté nocturne. — Faiblesse de la vue comme par une amaurose commençante.

Oreilles et Nez. — Bourdonnement dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe comme par étourdissement. — Épistaxis. — Pression cram-

poïde à la racine du nez. - Perte de l'odorat.

Visage. — *Visage froid, pâle, bleuâtre, ou bouffi et rouge comme du sang. — Pression crampoïde à la pommette. — Sécheresse

des lèvres. - *Crampe de la mâchoire.

Dents. — *Douleurs pulsatives et déchirantes dans les dents, se faisant ressentir depuis la joue jusque dans le front, surtout après un refroidissement à l'air froid, ou le matin, et souvent avec congestion à la tête, chaleur et rougeur de la face, gonflement des gencives et spasmes dans la gorge. — Déchirement dans les gencives, avec bourdonnement et sensation de vacillement des dents. — Serrement des dents. — Dents enduites de mucosités. — Sensation d'allongement des dents.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche. — Salivation d'un goût salé. — Salive sanguinolente. — *Écume à la bouche. — Exhalaison fétide par la bouche, dont on s'aperçoit soi-même. — Ardeur et torpeur de la langue, comme si elle était brûlée. — olangue sèche, chargée d'un enduit brunâtre. — *Rougeur de gue. — Paralysie de la langue. — *Perte de la parole. — resse et chaleur brûlante de la gorge. — *Constriction de gue et impossibilité d'avaler les liquides. — Gonflement

écissement de la gorge.

et Estomac. — Perte du goût. — Boulimie avec forte Horreur des boissons. — *Hoquet, surtout après le repas. se le repas, mal à la tête, ivresse, forte augoisse et tristesse. Es avoir bu, convulsions. — Nausées en appuyant sur l'él. — *Vomiturition et vomissements avec translées ani à crier. — Vomissement aqueux, avec ut de mucosités (sanguinolentes) oet de elquefois avec convulsions, étouffement nac, grand épuisement et froid aux n.



358 HYOSCYAMUS NIGER. - IATROPHA CURCAS.

qui font contracter les jambes. — Taches gangréneuses et vésicules aux jambes. — Roideur et abattement dans les articulations du genou. — Gonflement des pieds. — Contraction des orteils en marchant et en montant.

IATROPHA CURCAS.

IAT. — Gros pignon d'Inde, Figue infernale, Ricin d'Amérique. — Herisc. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 236. — Médicament encore très-peu connu.

CLINIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas où l'on pourra le consulter avec succès contre les affections suivantes : Éruptions diverses; Contractures; Douleurs rhumatismales dans les membres et les articulations; Surdité; Vomissement des femmes enceintes; Gastrite; Coliques; Entérite; Choléra asiatique; Lombrics et Ascarides.

Voy. la note, page 15.

**SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs en divers endroits;

**douleurs rhumatismales dans les muscles et les articulations :
douleurs musculaires alternant avec coliques; endolorissement
des muscles dans la position assise; courbature après avoir marché. — Convulsions; **spasmes tomiques, avec vomissement et
diarrhée. — Grand affaissement général des forces. — Éruptions;
gonflements. — Souffrances nocturnes: angoisse dans la poitrine; battement de cœur; rêves abondants; sécheresse de la
bouche; sueur en dormant. — Froid général du corps; froid au
dos; horripilations et frissonnements; frissonnement dans les vertèbres lombaires; sueur avec faiblesse; sueurs visqueuses. —

**L'eun froide soulage. — Angoisse nocturne dans la poitrine;
**grande anxiété; colère dans les rêves; extase.

Tête — Oreilles. — Congestion à la tête; chaleur dans la tête; avec pesanteur, embarras, oreilles brûlantes, bâillement et dégoût; chaleur dans l'occiput, chaleur dans le sinciput; tête chaude, avec horripilation au dos. — Bourdonnement d'oreilles; dans les oreilles, douleurs, élancements, brûlement. — Prurit au

nez, en mangeant.

Organes de la digestion. — Bouche sèche, sans soif, avec chaleur et brûlement; sensation comme brûlé, jusque dans la gorge; salive abondante, avec nausées. — *Vomissement facile et trèsabondant de matières aqueuses, comme albumincuses, avec diar-



IATROPHA CURCAS. — IGNATIA AMARA.

359

Dans l'estomac : chaleur, ardeur, brûlement, pression contraction crampoide, douleur incisive; sensibilité à la pression; sensation d'un affaissement dans l'estomac et le creux stomacal. *Grande anxiété à l'estomac ; inflammation de l'estomac et des intestins. - Ventre ballonné et douloureux ; douleurs dans la région ombilicale, à gauche (en haut) et le long de la colonne vertébrale; borborygmes et douleurs dans le ventre; *gloussement comme par des liquides, avant, mais surtout après les selles diarrhéiques. - * Diarrhées aqueuses, sortant comme une chute d'eau; avant la selle diarrhéique, frissonnement dans la profondeur des vertèbres lombaires. - Dans le rectum, brûlement, clancements, fourmillement, prurit. - Après la douleur ombilicale et les nausées, crampes et élancements au col de la vessie.

Poitrine, Tronc et Membres. - Douleur lancinante derrière le sternum; élancements dans la région du cœur; pulsations du cœur plus fortes; douleur dans la clavicule gauche, le long du nerf ulnaire. — Dans les muscles lombaires : pression, élancements, roideur; douleurs venant du ventre. — Dans l'épine dorsale : douleurs; chaleur qui passe aux vertebres; frissonnement dans la profondeur de l'épine. - Roideur de la nuque. - Dans les doigts : endolorissement, douleurs, prurit. — Dans les genoux : lassitude, courbature, pression, déchirements. — Dans les mollets : *crampes; pression, tiraillements, élancements, roideur, courbature, pulsations. - Douleurs crampoides aux jambes, avec distorsion des mollets jusqu'au tibia. — Dans les pieds : douleurs, tiraille-ments, élancements, fourmillement. — Prurit aux orteils.

IGNATIA AMARA.

IGN. — Fève Saint-Ignace. — HANSMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 229. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 9 jours quelquefois.

ANTIBETES: Ara. cham. cocc. coff. puls. — On l'emploie comme l'antidote de . Cham coff. puls. zinc.

de: Cham. coff. pais. zinc.

Comparer avec: Alum. arn. calad. caps. cans. cham. ein. cocc. coff. croc. hyos. ipec. mes. mosch. natr-m. n-mosch. n-rom. par. phos-ac. pais. rhus. rut. sahad. sec. sep. stans. staph. suif. tart. valer. verstr. zinc. ut après ipec., qu'iyn. convient quelquefois, lorsqu'elle est d'ailleurs indiquée.

CLIFIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections principalement des personnes sensibles, d'un tempérament nerveux et portées à concentrer en elles-mêmes les chagrins qu'eiles éprouvent; Affections du sexe féminin et surtout des femmes




IGNATIA AMARA.

hystériques; Suites fácheuses d'une affliction, d'un chagrin concentré, d'un amour malheureux, etc.; Suites facheuses de l'abus du café ou de la camomille; Accès de défaillance, et de faiblesse hystérique; Crampes, convulsions, épilepsie et autres affections spasmodiques, surtout par suite d'une frayeur ou d'une contrariété, et principalement chez les femmes hystériques ou chez les enfants pendant la dentition; Fièvres intermittentes; Fièvres catarrhales et rhumatismales; Fièvres lentes?; Mélancolie et autres affections morales par suite d'une affliction; Hystérie; Migraines et céphalalgies nerveuses et hystériques; Céphalalgie et chute des cheveux par suite de chagrins; Ophthalmie et photophobie scrofuleuses; Coryza chronique; Odontalgie, surtout chez les femmes hystériques; Dentition difficile des enfants avec convulsions; Amygdalite et autres angines, à la suite de la scarlatine aussi; Gastralgie; Gastrite, dyspepsie et autres affections gastriques; Affections bilieuses; Splénalgie; Coliques, surtout chez les femmes hystériques; Affections vermineuses; Chute du rectum, chez les enfants aussi; Dysménorrhée; Chlorose?; Crampes de matrice; Convulsions et autres affections spasmodiques des femmes en couches et des nouveau-nés; Ecorchure des enfants, surtout celle qui provient de l'abus de la camomille, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs simples et violentes seulement au toucher, à diverses parties. - Pression incisive ou aiguë et quelquefois dure dans les membres et autres parties. Elancements comme par des couteaux. — *Sensation d'écartement ou de constriction dans les organes internes. - Déchirement arthritique dans les membres. — Douleur de luxation ou de foulure dans les articulations. — *Douleurs de contusion ou de meurtrissure, surtout dans le périoste, et principalement étant couché sur le côté. - Engourdissement fourmillant des membres. — Lourdeur et engourdissement formicant des membres. – *Attaques de crampes et de convulsions, equelquefois avec anxiété, accès de suffocation, renversement de la tête, visage bleuatre ou rouge, spasmes de la gorge, perte de connaissance, etc. - ºConvulsions épileptiques avec écume à la bouche, báillements fréquents, yeux convulsés, rétraction des pouces, face rouge ou alternativement pâle et rouge, etc. - Mouvements involontaires des membres, comme dans la danse de Saint-Guy. - Après les convulsions, soupirs profonds ou sommeil soporeux. — Forte susceptibilité au grand air. - Convulsions avec cris et rires. - Tétanos. *Faiblesse hystérique et accès d'évanouissement. — *Les symptômes se manifestent surtout immédiatement après le repas, ainsi que le soir, après s'être couché, ou le matin lorsqu'on vient de se lever. - *Le café, le tabac, l'eau-de-vie et le bruit



aggravent aussi bien des douleurs. — *Les douleurs se dissipent, soit en étant couché sur le dos, soit en se couchant sur la partie affectée ou sur le côté sain, mais toujours par le changement de position. - *Douleurs nocturnes, qui troublent le sommeil.

Pean. — Prurit qui se dissipe facilement en se grattant. gelures. - *Excoriation de la peau. - Prurit en s'échauffant en plein air. — Eruption urticaire sur tout le corps avec prurit

violent (pendant la fièvre).

Sommeil. — Sommeil profond et comateux, non réparateur, avec respiration ronflante. Bâillements spasmodiques violents, surtout le matin ou après la sieste. — Sommeil très-léger. — Sommeil agité avec gémissements, plaintes, beaucoup de paroles, cauchemar, ou sursauts et rêves fréquents. - Tressaillement des membres en s'endormant. — *Rêves avec réflexions et raisonnements, ou avec idées fixes. — Sursauts avec effroi en s'endormant.

Fièvre. — Frissonnement fébrile, surtout au dos et aux bras, avec soif d'eau froide, et quelquefois avec mausées et vomissements.---•Frissonnement avec aggravation des douleurs. — Soulagement du froid par la chaleur extérieure. — *Chaleur universelle, surtout à la tête, avec rougeur, principalement de l'une des joues, et adipsie, quelquefois avec horripilation intérieure, froid aux pieds, élancements dans les membres, et mal à la tête. — Accès subits de chaleur fugace par tout le corps. — Sensation pénible de chaleur, quelquefois avec sueur. - *Absence de soif pendant la chaleur et la transpiration, ou dans l'apyrexie. — Chaleur et rougeur de la peau, avec insupportabilité de la chaleur extérieure. - **•Fièvre avec mal à la téte et au creux de l'estomac, gr**and : fatigue, pâleur de la face ou pâleur et rougeur alternatives. lèvres sèches et gercées, éruption urticaire, langue blanche, sommeil profond avec ronflement, etc. — Sueur avec elancements et bourdonnements dans les oreilles. — Sueurs pendant le repas.

Moral. — *Tristesse et chagrin concentré, avec soupirs. — Irresolution. — Impatience. — *Forte disposition a s'effrayer. — *Humeur morose et chagrine; on pense malgré soi à des choses pénibles et désagréables. — Effronterie. — Caractère tendre et conscience délicate. — Inconstance. — *Alternation de gaieté folle et de tristesse avec pleurs. — *Laconisme. — *Grande faiblesse de la mémoire. — *Amour de la solitude. — *Angoisse, osurtout le matin, au réveil, ou la nuit, quelquefois avec battement de cœur. - *Humeur pleureuse et indifférente, avec horreur pour le travail. — *Chagrin de cœur rongeant. — *On desespère de se guérir. — La moindre contradiction irrite jusqu'à la colère et à l'emportement, avec rougeur de la face. — Crainte de voleurs, la nuit. — Cris et découragement total pour la moindre chose. — Humeur excessivement variable.

Tête. — *Vertiges, oavec scintillement devant les yeux. — Grande JAHR. - 80 6dit., Ire part., t. 1.



pesanteur de la tête, comme si elle était pleine de sang. - Mal de tête pressif, surtout au-dessus de la racine du nez, et souvent accompagné d'envie de vomir, aggravé ou soulagé en se baissant. - *Pression crampoïde dans le front et l'occiput, °avec obscurcissement de la vue, rougeur de la face et larmoiement. - *Sensation d'expansion douloureuse à la tête, comme si le crâne allait éclater, surtout en causant, en lisant ou en entendant parler. -Douleur de meurtrissure à la tête, surtout le matin en s'éveillant. --- *Les maux de tête sont aggravés par le café, l'eau-de-vie, la fumée de tabac, le bruit et les odeurs fortes. — *Mal de tête comme si un clou était enfoncé dans le cerveau. - Déchirements térébrants et lancinants, profondément dans le cerveau et dans le front, soulagés en se couchant. --- Mal de tête pressif, tressaillant. - Tremblement de la tête. - Renversement de la tête en arrière. — *Chute des cheveux.

Yeux. -- *Pression dans les yeux, quelquesois comme si du sable s'y était introduit. - *Inflammation des yeux. - - •Rougeur des yeux. - Agglutination des paupières. - *Larmoiement, osurtout à la clarté du soleil. — Gonflement de la paupière supérieure, avec engorgement des veines. - Inflammation de la partie supérieure du globe de l'œil. - Mouvements convulsifs des yeux et des paupières. Fixité du regard, avec dilatation des pupilles. *Photophobie. - *Vue trouble, comme à travers un brouillard.

Oreilles. -- Of ontlement des parotides avec douleur lancinante. --Rougeur et chaleur brûlante de l'une des oreilles. — *Dureté de l'ouïe, excepté pour la voix humaine.

Nez. — Prurit dans le nez. — Narines excoriées, ulcérées, avec gonflement du nez. — Épistaxis. — Coryza sec, avec mal de tête sourd et surexcitation nerveuse. - Sécheresse du nez.

Visage. — Face pâle, rouge ou bleue, ou terreuse et hâve. — Sueur seulement au visage. - Alternatives de pâleur et de rougeur. -*Rougeur et chaleur brûlante de l'une des joues. — • Tressaillements convulsifs et distorsion des muscles de la face. — Eruption à la face. — Lèrres sèches, gercées et saignantes. — Douleur d'excoriation à la face interne de la lèvre inférieure. --Croûtes aux commissures des lèvres et aux lèvres. — Douleurs dans les glandes sous-maxillaires. — o Tressaillements convulsifs des coins de la bouche. -- *Serrement spasmodique des máchoires.

Dents. -- Odontalgie, comme si les dents étaient brisées. -- Vacillement des dents. — Les maux de dents se font ressentir vers la

fin du repas et s'aggravent encore après.

Bouche. — Inflammation et rougeur de la bouche et du palais. -*Mucosités continuelles ou accumulation d'une salire acide dans la bouche. -- *On se mord facilement la langue en mâchant ou en parlant. - Langue humide, chargée d'un enduit blanc. -



Élancement dans le voile du palais jusque dans l'oreille. — • Écume à la bouche. — Voix faible, chevrotante.

Harge. — Mal de gorge comme s'il y avait dedans une cheville, hors le temps de la déglutition. — Palais rouge et enflammé, avec sensation comme si ce qu'on avale passait sur une tumeur brâlante et excoriée. — *Elancements dans la gorge, s'étendant quelquefois jusqu'à l'oreille, principalement hors le temps de la déglutition. — Inflammation, gonflement et induration des amygdales, avec petits ulcères. — Déglutition génée (des boissons). — Constriction du gosier, avec rapports sanglotants.

Appétit. — *Répugnance pour les aliments et les boissons, surtout pour le lait, la viande, les aliments cuits et la fumée du tabac. — *Manque d'appétit et prompte satiété. — *Goût fade comme de la craie, dans la bouche. — Faiblesse et difficulté de la digestion. — Goût amer et putride des aliments, surtout de la bière. — Dégoût ou fort désir de choses acides, dégoût du vin et de l'eau-de-vie. — Après le repas, ballonnement douloureux du ventre. — Désir de diverses choses dont on ne se soucie plus dès qu'on les a obtenues. — Insipidité des aliments. — Le lait qu'on a pris le matin laisse longtemps un arrière-goût. — Après avoir fumé, hoquet, nausées, sueurs et coliques.

**Hoquet toutes les fois que l'on a bu ou mangé. — Renvois acides. — Nausées avec agitation et angoisse. — *Vomissement des aliments, ¬même la nuit. — °Vomissement de bile et de mucosités. — *Accès périodiques de crampes d'estomac, qui troublent le sommeil de nuit, et sont aggravées en pressant sur la partie affectée. — Pression sourde ou élancements à l'épigastre. — Froid ou sensation de brûlure à l'estomac, surtout après avoir pris de l'eau-de-vie. — *Sensation de vacuité et de fuiblesse à l'épigastre. — Sensibilité douloureuse du creux de l'estomac, au toucher.

Ventre. — Sensation de plénitude et ballonnement des hypocondres, avec gêne de la respiration. — *Douleur à l'hypocondre gauche, °aggravée par la pression et la marche. — Élancement, sensation de brûlter et pression ou gonflement et dureté dans la région de la rate. — Douleur expansive dans le ventre, comme si les intestins allaient éclater. — Ballonnement du ventre. — Tranchées dans la région ombilicale. — Pression violente dans le ventre. — Tournoiement autour du nombril. — Les maux de ventre s'aggravent après avoir pris du café, de l'eau-de-vie ou des choses sucrées. — *Élancements et pincements dans le ventre, surtout dans les côtés. — °Douleurs crampoïdes périodiques dans le ventre. — Pressions crampoïdes dans la région inguinale. — Battement dans le ventre. — Gargouillement et borborygmes dans les intestins. — *Coliques venteuses, surtout



IGNATIA AMARA.

364

la nuit. - Sensation de faiblesse et tremblement dans le ventre

avec respiration suspirieuse.

Selles. — *Selles dures avec envie fréquente et inutile. — Selles jaunes, blanchâtres, d'un moule très-volumineux et difficiles à évacuer. — *Diarrhée de mucosités sanguinolentes, avec gargouillement dans le ventre. — Selles muqueuses, accompagnées de coliques. — Écoulement de sang par l'anus. — °Chute du rectum pendant les selles. — Prurit et fourmillement à l'anus. — Ascarides du rectum. — Rétrécissement de l'anus. — Douleur contractive d'excoriation à l'anus, après les selles. — Élancements depuis l'anus jusque bien avant dans le rectum. — Cuisson dans le rectum, pendant les selles diarrhéiques.

Urines. — Émission fréquente et abondante d'une urine aqueuse.
 Urine jaune citron. — Émission involontaire des urines. —
 Besoin pressant et irrésistible d'uriner. — Après avoir pris du café, besoin continuel d'uriner. — En urinant, sensation de brû-

lure et cuisson dans l'urèthre.

Parties viriles. — Fort prurit aux parties génitales et à la verge, le soir, après s'être couché, se dissipant en grattant. — Douleur d'excoriation et d'ulcération sur les bords du prépuce. — Étranglement et pression dans les testicules, surtout le soir, après s'être couché. — Sueur au scrotum. — Lascivité et images voluptueuses, avec faiblesse de la puissance génitale. — Absence de l'appétit vénérien. — Érections avec gêne douloureuse et pres-

sion au pubis. - Érections pendant toutes les selles.

Règles.—*Règles trop hâtives et trop fortes, tous les 10 à 15 jours.

— Sang des règles noir, mêlé de caillots. — Pendant les règles, pesanteur, chaleur et douleurs à la tête, photophobie, coliques avec douleurs contractives, anxiété, battement de cœur et grande fatigue jusqu'à la défaillance. — *Douleurs crampoïdes et compressives dans la région de l'utérus, avec étouffement; la pression et le coucher sur le dos soulagent la douleur. — *Crampes de matrice pendant les règles. — Leucorrhée corrosive et puru-

lente, précédée de pression contractive à la matrice.

Larynx. — Voix faible, impossibilité de parler haut. — Catarrhe, avec coryza et mal à la tête. — Toux provoquée par une sensation de constriction dans la fossette du cou, comme par la vapeur du soufre. — Toux nocturne, opiniàtre. — Toux sèche, parfois avec coryza fluent. — Toux continuant également le jour et la nuit. — Toux sèche, rauque. — Toux spasmodique ébranlante. — Toux courte, comme si l'on avait du duvet dans la gorge, d'autant plus forte que l'on tousse davantage. — Toux rauque, sèche, provoquée par un chatouillement au-dessus de l'estomac.

Poitrine. — Gêne de la respiration et oppression de la poitrine, surtout la nuit. — Respiration difficile, comme s'il y avait sur la poitrine un poids qui l'empêchât.—Manque d'haleine en mar-



IGNATIA AMARA. — INDIGO.

chant, et toux des qu'on reste tranquille. - *Respiration suspirieuse. - Étouffement en courant. - Pression à la poitrine. Constriction de la poitrine. - Élancements dans la poitrine et dans les côtés, provoqués par des flatuosités. - Battements de cœur, la nuit, avec élancements au cœur, ou bien le matin en s'éveillant, ainsi qu'en méditant et pendant le repos. - Battement dans la poitrine.

Tronc. - Douleurs violentes aux reins, comme des élancements, des tiraillements on le serrement d'une griffe. - Renversement du dos en arrière (par les convulsions). — Élancements comme par des couteaux, depuis les reins jusque dans les cuisses. - Roideur de la nuque. — Douleur pressive dans les glandes du cou.

— Glandes engorgées, comme des nodosités, au cou.

Bras. — *Douleurs insupportables dans les os et les articulations des bras, comme si la chair était décollée, ou avec sensation paralytique et douleur de luxation. - o Tressaillements convulsifs dans les bras et les doigts. — Déchirement dans les bras, provoqué par l'air froid. — Tension dans le poignet. — Sueur chaude des mains. — Sensation de torpeur et fouillement dans les bras, la nuit, au lit.

Jambes — Douleurs déchirantes, incisires, à la face postérieure des cuisses, en fatigant les muscles. — Pesanteur des jambes et des pieds, avec tension dans les jambes et les mollets en marchant. — Chaleur du genou, avec nez froid. — o Tressaillements convulsifs des jambes. — Roideur des genoux et des pieds. — Sensibilité douloureuse de la plante des pieds, en marchant. — Élancements et douleur d'ulcération à la plante des pieds. -Sensation de brûlure dans les talons, la nuit, en les rapprochaut l'un de l'autre. — Sensation de brûlure dans les cors.

INDIGO.

IND. — Indigofera tinctoria; indigo. — Annales de TRINKS. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 231. — Remède encore très-peu connu.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs qui se dissipent entièrement, ou du moins ne reparaissent que très-diminuées, après avoir appuyé sur la partie affectée ou avoir gratté. — Douleurs lancinantes et déchirantes dans les membres, après midi et le soir. - Furoncles. - Envie de dormir le soir, et sommeil agité la nuit. — La nuit, réveil anxieux et en sursaut. — Rêves anxieux. — Prédominance du froid. - On est mal disposé, d'humeur chagrine, et-paresseux.



INDIGO. — IODIUM.

366

Tête — Selles. — Sensation comme si la tête était plus volumineuse et qu'elle occupat plus d'espace. — Douleurs lancinantes et déchirantes, profondément dans le cerveau. - Bruit et battement dans la tête. - Chaleur et bouillonnement dans l'occiput, comme produit par l'eau bouillante. - Sensation au vertex, comme si l'on tirait les cheveux. - Tressaillements convulsifs et frémissement des paupières, qui empêchent de voir. - Déchirement dans et derrière les oreilles, ainsi que dans la mâchoire inférieure. -Douleurs déchirantes, térébrantes et rongeantes dans les os du visage, et surtout dans la mâchoire inférieure. - Congestion à la face, avec joues brûlantes. - Epistaxis, avec perte de la vue. Déchirement et douleurs incisives dans les os et les cartilages du nez. — Torpeur de l'intérieur de la bouche, le matin après le réveil. — Sensation de brûlure sur la langue et au fond du palais. - Crachement de salive sanguinolente. - Renvois à vide. - Renvois avec goût d'encre. - Renvois douceâtres. -Sensation dans l'estomac, comme si l'on était à jeun. Selles diar-

rhéiques, avec pincements dans le ventre envie d'aller à la selle. Poitrine — Membres. — Toux suffocante, forçant à vomir, le soir avant et après le coucher. - Gargouillement et grondement dans la poitrine à chaque inspiratien. - Douleurs lancinantes dans et autour des seins. - Douleurs déchirantes dans l'avantbras, depuis le coude jusque dans les doigts, et qui changent de place par le mouvement. - Tressaillements convulsifs dans les bras. — Veines des mains rouges, enflées et tendues. — Douleurs lancinantes et déchirantes dans les membres supérieurs. -Déchirement dans les membres inférieurs, surtout dans les orteils. Grande lassitude des membres inférieurs, le soir, et se faisant


sentir même après qu'on s'est couché.

IODIUM.

10D. — Iode. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. ho-mœop., p. 407. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 7 semaines dans quelques cas.
ANTIDOTES: Ars.? camph. chin. coff. hep. phos. spong. sulf. 10D. - Iode. -

COMPARER : Ars. cocc. coff. con. cupr. dig. merc. phos. spong. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où ce médicament pourra être consulté contre : -Arthrite invétérée; Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Affections scrofuleuses et lymphatiques; Engorgement et induration des glandes; Atrophie des enfants scrofuleux; Affections rachitiques; Affections rhumatismales; Dartres; Ophthalmie et Otitescrofuleu-



ses; Blépharophthalmie; Croûte de lait?; Salivation, avec ulcères de la bouche, par l'abus du mercure ; Carreau ; Phthisie abdominale; Bubons scrofuleux et arthritiques; Dyspepsie; Aménorrhée?; Flueurs blanches; Galactorrhée; Laryngite chronique avec ulcération (Phthisie laryngee); Catarrhe chronique; Grippe; Coqueluche; Gonflement inflammatoire du genou; Goitre; Tumeur blanche: Hydrartre, etc.

Vog. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs erratiques dans les articulations. - *Déchirement dans les membres, et surtout dans les articulations, la nuit principalement. — Sensation de torpeur dans les membres. — Tressaillements convulsifs et soubresauts des tendons. — *Déviation des os. — Douleurs ostéocopes nocturnes. — Ce médicament agit d'une manière excitante sur le système glandulaire, l'estomae, le foie, etc., et provoque dans ces organes la sécrétion. — *Gonstement et dureté des glandes, après des contusions aussi. — Hémorrhagies par différents organes. — Forte surexcitation de tout le système nerveux. — Bouillennement de sang, et pulsation dans tout le corps, augmentés par le plus léger effort. — Franblement des membres. Marche chancelante. — *Grande faiblesse; la parole même provoque la sueur. — Atrophie et amaigrissement jusqu'à l'état de squelette. — Gonflement ædémateux, même de tout le corps.

Peau. — Peau sèche, ou visqueuse, moite, et d'un jaune sale. — Dartres. — Panaris. — Anasarque.

Sommeil. — Rêves agités. — *Sueur nocturne.

Fièvre. — Frissonnement même dans un appartement chaud. — Augmentation de la chaleur du corps. — Chaleur fugace. — Transpiration acide, le matin. — Pouls accéléré, petit, dur. —

Fièvre avec consomption. — Sueur acide, le matin.

Meral. — Disposition pleureuse et accablement moral. — Mélancolie, hypocondrie, tristesse, cœur serré et anxieux. — Appréhension anxieuse. - Agitation inquiète, qui ne permet ni de rester assis, ni de dormir. - Surexcitation morale, avec grande susceptibilité. - Illusions de sentiment. - Loquacité et gaieté immodérées. — Hésitation et irrésolution. — Paresse d'esprit, avec grande répugnance pour tout travail intellectuel. - Fixité, immobilité de la pensée. — Délire.

Tête. — Embarras de la tête. — *Le matin, étourdissement. — Mal de tête à l'air chaud, ainsi que par le mouvement prolongé de la voiture, ou par une marche forcée, et aggravé par le bruit et la parole. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau, avec manque de force dans le corps, comme par paralysie. — Douleurs pressives aiguës dans le front. — Congestion à la tête, avec



368 . IODIUM.

battement dans le cerveau. — °Mal de tête comme par un bandeau serré.

Yeux. — Douleurs dans les orbites. — Sensation d'abattement audessus des yeux, comme s'ils étaient profondément enfoncés, le soir. — Douleur d'excoriation dans les yeux. — Inflammation des yeux, quelquefois après un refroidissement. — Gonflement des paupières. — Couleur jaune sale de la sclérotique. — Larmoiement. — Mouvements convulsifs et tremblement des paupières. — Vue affaiblie. — Diplopie. — Étincelles et scintillement devant les yeux.

Oreilles. - Bourdonnement dans les oreilles. - Dureté de l'ouïe.

- Sensibilité au bruit.

Nez. — Épistaxis. — Tache rouge, brûlante, au nez, au-dessus de l'œil. — Obturation du nez, ou sécrétion plus abondante de mucosités.

Visage. — *Teint pâle, jaunâtre, ou brunissant promptement. —
Rougeur fréquente et subite du visage, avec sensation de brûlure
aux oreilles. — Visage défait avec yeux abattus. — Tressaillement
des muscles de la face. — Ulcère à la joue, avec gonflement des
glandes voisines. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Douleurs pressives dans les dents molaires. — Dents jounes et enduites de mucosités, le matin. — Gonflement inflammatoire et saignement des gencives, avec gonflement de la joue.

*Ramollissement des geneives.

Bouche. — Aphthes dans la bouche. — *Ulcères dans la bouche.
— Douleur et gonfiement des glandes de l'intérieur de la bouche.
— Exhalaison d'une odeur putride par la bouche. — *Salivation.

Langue chargée d'un enduit épais.


Gorge. — Mal de gorge, avec douleur pressive, hors le temps de la déglutition. — Constriction permanente dans le gosier, et déglutition empêchée. — Inflammation du gosier, avec sensation de brûlure et grattement.

Appétit. — Goût désagréable, comme du savon, ou amer salé. — Augmentation de la soif. — Appétit variable, tantôt *boulimie, tantôt absence d'appétit. — Faim inaccoutumée, avec améliora-

tion après le repas. — Grande faiblesse de la digestion.

Estomac. — Renvois généralement acides, avec sensation brûlante. — *Pyrosis, surtout après des aliments indigestes. — *Nausées fréquentes. — Vomissements violents, renouvelés par le manger. — Vomissement de matières bilieuses, ou de nucosités jaunâtres. — Douleurs d'estomac des plus violentes, avec évacuations bilieuses. — Pression à l'estomac, après chaque repas. — Douleurs d'estomac, crampoïdes, rongeantes et brûlantes. — Inflammation d'estomac. — Pulsation dans l'épigastre.

Ventre. — Douleurs abdominales qui se renouvellent après chaque repas. — Ballonnement du ventre. — Grosseur du ventre, qui ne permet pas de se coucher, sous péril de suffocation. — Gonfle-



ment dur de la rate. — Douleurs crampoïdes dans le ventre. —
*Coliques violentes. — Douleurs dans le ventre, comme celles de l'enfantement. — Gonflement et inflammation des glandes du mésentère. — Tremblotement dans le ventre, depuis le creux de l'estomac jusqu'à la périphérie, avec augmentation de chaleur. — Gonflement et induration squirreuse des glandes inguinales.

- *Incarcération de flatuosités.

Selles. — Selles dures, noueuses. — *Constipation. — Selles diarrhéiques, molles, quelquefois blanchâtres, *alternant avec constipation. — Selles de la consistance de la bouillie. — Diarrhées violentes, écumeuses, ou de mucosités sanguinolentes. — Selles dyssentériques de mucosités épaisses, ou purulentes, avec rétention des matières stercorales. — Le soir, sensation de brûlure à l'anus.

Urines. — Suppression de la sécrétion d'urine. — Urines abondantes et fréquentes. — *Émission des urines, la nuit. — Urines de couleur foncée, ou vert jaunâtre, ou laiteuse, ou âcre et cor-

rosive. — Pellicule irisée sur les urines.

Parties viriles. — Appétit rénérien exalté. — Tiraillement douloureux dans la partie antérieure de la verge. — Gonflement et dureté des testicules. — Dureté de la prostate.

Règles. — *Règles, tantôt en retard, tantôt trop hâtives. — Métrorrhagies. — Faiblesse, battement de cœur et beaucoup de souffrances, avant, pendant et après les règles. — Induration (et cancer?) de l'utérus. — Leucorrhée rongeante. — Flaccidité et

atrophie des mamelles.

Iaryux. — Enrouement et fourmillement insupportables dans la gorge, surtout le matin. — *Inflammation de la gorge et de la trachée-artère avec douleur contractive d'excoriation. — Sécrétion plus abondante de mucosités dans la trachée-artère, avec renàclement fréquent. — *Toux sèche, avec pression, élancement et sensation de brûlure dans la poitrine. — *Toux matutinale. — *Toux, avec expectoration de mucosités abondantes et quelquefois sanguinolentes, odouleurs dans la poitrine et fièvre. — oToux ressemblant à la coqueluche, excitée par un chatouillement insupportable dans la poitrine, avec angoisse avant la quinte, et amaigrissement excessif.

Poitrine. — *Géne de la respiration et dyspnée. — Suffocation. —
°En respirant, élancements dans le côté gauche. — °Perte de la respiration, surtout en montant un escalier. — Faiblesse de la poitrine. — Congestion à la poitrine. — *Battements de cœur violents, crampoïdes, portés au plus haut degré par le moindre effort. — Tension brûlante, lancinante dans les téguments de la

poitrine.

Trons. — Crampes dans le dos. — Tension dans le cou. — *Gonflement à l'extérieur du cou. — Gonflement du cou en parlant. *Gonflement des glandes du cou, de la nuque et des aisselles.



IODIUM. — IPECACUANHA.

-Goitres durs et volumineux. - Sensation de constriction continuelle dans le goître. - Taches jaunâtres sur le cou, et rougeur

370

comme par ecchymose.

Bras. — Douleurs ostéocopes dans le bras, aggravées lorsqu'on est couché dessus, et troublant le sommeil. - Lassitude dans les bras, le matin au lit. - Mouvements convulsifs et tremblement des bras, des mains et des doigts. - Engourdissement des doigts. - Douleurs déchirantes dans les doigts. - Soubresauts des tendons dans les doigts. - Panaris. - Froid continuel aux mains, qui se couvrent d'une sueur froide pendant le travail. Carphologie.

Jambes. — Douleur crampoïde dans les jambes, seulement en étant assis. — Pesanteur, gonflement, tremblement et paralysie des jambes. - Tiraillements rhumatismaux dans les cuisses et les genoux. — Gonflement inflammatoire du genou, avec douleurs déchirantes et suppuration. — Gonflement hydropique du genou. Tumeur blanche. — Crampes dans les pieds, surtout la nuit.
 Soubresauts des tendons, aux pieds. — Sueur acre et corrosive aux pieds.


IPECACUANHA.

IPEC. – Ipécacuanha. – HAHNEMANN. – Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 232. – Doses usitées: 3, 9, 30. – Durée d'action: jusqu'à 5 jours quelquefois.

ANTIDOTES: Arn. ars. chin. — On l'emploie comme antidote de : Alum. arn. ars. chin. cupr. dulc. fer. laur. op. tabac. tart.

COMPARER AVEC : Acon. alum. arn. ars. cale. carb-veg. cham. chin. cin. cocc. croc.? eupr. dros. dulc. fer. ign. lour. n-vom. op. phos. puls. sabin. sulf. tart. veratr.— C'est surtout après : Acon. ara. ars. et veratr., que l'ipec. convient quelquefois, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. Après l'ipec., conviennent quelquefois : Arn. ars. chin. cocc. ign. n-vom.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des enfants et des personnes blondes (et au tempérament sensuel); Suites fâcheuses de l'abus du quinquina ou de la graisse de porc; Affections par suite d'un refroidissement, d'une indigestion, ou d'une débauche; Crampes et convulsions, tétanos et autres affections spasmodiques, surtout chez les enfants et les personnes hystériques; Hémorrhagies; Éruptions miliaires (surtout chez les femmes en couches), et suites fâcheuses de la répercussion de cette éruption; Suites fâcheuses d'une apoplexie; Fièvres gastriques et bilieuses; Fièvres intermittentes; Fièvres lentes; Migraine; Embarras gastrique, surtout à la suite d'une



IPECACUANHA.

indigestion, ou par l'abus du café ou de la graisse de porc; Choléra asiatique et sporadique; Hématémèse; Mélsena; Affections gastriques, avec vomissement et diarrhée; Entérite?; Gastrite?; Spasmes abdominaux hystériques; Diarrhée, surtout chez les enfants; Affections gastriques des femmes enceintes; Fièvre puerpérale; Métrorrhagies; Laryngite?; Grippe?; Toux convulsive ou suffoquante; Coqueluche; Catarrhe suffoquant; Asthme de Millar et autres affections asthmatiques; Crampes de la poitrine, surtout celles qui proviennent de la vapeur de l'arsenic ou du cuivre, etc., etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTONES GÉNÉRAUX. — Douleur de meurtrissure dans tous les os. — Fourmillement, comme d'engourdissement, dans les articulations. — Accès de malaise avec dégoût de tous les aliments et faiblesse excessive et subite. — *Saignement par divers organes, avec sang rouge vif. — oSensibilité trop grande au froid et à la chaleur. *Tétanos, oaccès de spasmes et convulsions de différente nature, *quelquefois avec renversement de la tête oet distorsion des traits, ou avec perte de connaissance, face pâle et bouffie, yeux à demi fermés, mouvements convulsifs des muscles de la face, des lèvres, des paupières et des membres, ou bien encore avec cris, envie de vomir et râle muqueux dans la poitrine. — Amaigrissement excessif.

Peau. — °Éruptions miliaires. — Prurit violent à la peau (des cuisses et des bras). — Pendant les nausées, on est forcé de se

gratter, jusqu'à ce que l'on vomisse.

Sommeil. — Sommeil, avec yeux à demi ouverts. — Sommeil agité avec gémissements. — Pendant le sommeil, tressaillement des membres. — Rêves effrayants, avec sursauts fréquents et effroi

Fièvre. — Horripilation, avec froid des membres et du visage. -

pendant le sommeil.

Froid, surtout des mains et des pieds, avec sueur froide et abondante de ces parties. — Aggravation des frissons par la chaleur extérieure. — Avant les frissons, malaise, pandiculation et lassitude, avec sueur froide au front ou froid ou frisson aux oreilles. — Chaleur subite dans l'appartement, avec sueur et vertiges. — — Soif seulement pendant les frissons ou le froid. — Fièvre se manifestant par beaucoup de frissons, avec peu de chaleur, ou par beaucoup de chaleur, avec peu de frissons un avec nausées, vomissements et autres symptômes gastriques, angue nette ou chargée, et oppression constrictive de la poitrine. — Fièvre le soir, avec grande inquiétude, chaleur sèche et pénible, paume des mains brûlante et sueur nocturne.

Moral. — Cris et hurlements (des enfants). — Anxiété et crainte de la mort. — Maussaderie avec dédain pour toute chose. — Hu-



IPECACUANHA.

- Désir d'une foule de choses sans savoir au meur méprisante. juste lesquelles. - Irritabilité et disposition à se facher. - Im-

patience. - Lenteur de la conception.

Tête. - Vertige en marchant, avec vacillement et chancellement. *Douleur, comme si le crâne était meurtri, dans tous les os de la tête, jusqu'à la racine de la langue. - *Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements. - Déchirement dans le front, provoqué ou aggravé par le toucher. - Mal de tête lancinant, avec pesanteur de la tête. — Pression douloureuse au front. Yeux et Nez. — Yeux rouges et enflammés. — Chassie dans les

angles des yeux. - Tremblement des paupières. - Pupilles dilatées. — Trouble de la vue. — Epistaxis. — Perte de l'odorat. —

*Coryza, avec obturation du nez. — Froid et frissons aux oreilles. Visage et Dents. — *Couleur pâle, terreuse ou jaunâtre de la face, qui est bouffie, avec yeux cernés. — °Tressaillement convulsif dans les muscles de la face. — Lèvres couvertes de petits aphthes et d'éruptions. — Douleurs d'excoriation aux lèvres. - Tressaillement's convulsif's dans les lèvres. - Rougeur de la peau autour de la bouche. — Odontalgie par accès, comme si on arrachait la dent.


Bouche et Gorge. — Sensibilité douloureuse de toutes les parties de la bouche. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. - *Langue chargée d'un enduit blanc ou jaunâtre. Mal de gorge pendant la déglutition, comme par gonflement du pharynx. - Déglutition difficile, comme par paralysie de la

langue et du gosier.

Appétit. — *Goût fade ou pâteux ou oamer, surtout le matin. -Goût douceâtre, comme si on avait du sang dans la bouche. — Appétence seulement pour les friandises et les choses sucrées. Adipsie. - Goût insipide de la bière. - Le tabac à fumer a un goût nauséabond et fait vomir. - *Grande répugnance et dégoût

pour tous les aliments. - Pituites de l'estomac.

Estomac. — *Nausées, comme provenant de l'estomac, avec accumulation abondante de salive, prurit violent à la peau et renvois à vide. - *Vomiturition, surtout après avoir bu froid ou après avoir fumé. - *Vomissement des boissons ou des aliments ingérés, ou bien de matières bilieuses, verdâtres, ou acides, ou mu-queuses, gélatineuses, souvent avec douleur à l'estomac, et parfois immédiatement après le repas. - Vomissement de sang. -Vomissement avec sueur, chaleur, haleine fétide et soif. — Vomissement avec diarrhée. — Vomissements dès qu'on se baisse. - Vomissement de matières noires comme de la poix. -*Sensation d'un malaise excessif à l'estomac et à l'épigastre. *Sensation comme si l'estomac était vide et flasque. - Gonflement de la région stomacale. - Pincement autour de l'épigastre et dans la région des hypocondres. — Pression à l'estomac, avec vomissements.



373

Ventre. — Pincements dans le ventre, aggravés au plus haut point par le mouvement et améliorés dans le repos. — Douleur d'excoriation dans le ventre. — Coliques, avec agitation, jactation et cris (chez les enfants). — Coliques avec douleurs crampoïdes. — Douleurs incisives dans la région ombilicale, avec horripilation. — Colique flatulente.

Belles. — *Selles diarrhéiques, semblables à des matières en fermentation. — Diarrhées opiniâtres. — *Selles diarrhéiques, verdâtres ou jaune citron, d'odeur putride, ou sanguinolentes, bilieuses et muqueuses. — *Selles diarrhéiques séreuses. — *Oiarrhée avec nausées, coliques (et vomissement). — *Selles dyssentériques, avec flocons blancs, et suivies de ténesme. — °Évacua-

tion de matières noires comme de la poix.

Urines. — Urines troubles avec sédiment couleur de brique. —
Urine rouge et rare. — *Urine sanguinolente, °avec douleurs
dans la région de la vessie et à l'ombilic, sensation brûlante dans
l'urèthre, envie de vomir, et douleur dans les reins et au creux
de l'estomac. — Écoulement de pus par l'urèthre, avec douleur
mordicante.

Parties génitales. — Sensation pénible, comme si tout affluait vers les parties génitales et vers l'anus. — *Métrorrhagies, -avec écoulement d'un sang rouge vif et coagulé. — Règles trop hâti-

ves et trop fortes.

Intynx. — *Toux surtout la nuit, avec coups douloureux dans la tête et l'estomac, et avec dégoût, romiturition et romissements. — *Toux sèche, provoquée par un chatouillement contractif dans le larynx et jusqu'à l'extrémité des bronches, surtout en étant couché sur le côté gauche. — *Toux qui ressemble à la coqueluche, avec saignement par le nez et la bouche, et vomissement des aliments. — Toux, avec crachement de sang. provoqué par le moindre effort. — *Toux spasmodique, sèche, ébranlante, avec accès de suffocation, roidissement du corps et visage bleuâtre.

Poitrine. — *Respiration anxieuse et courte. — *Asthme spasmodique, avec contraction dans le larynx, et respiration haletante. — Râle muqueux dans la poitrine. — Respiration suspirieuse. — Oppression de poitrine et haleine courte, comme si
on avalait beaucoup de poussière. — *Perte d'haleine au moindre mouvement. — Spasmes de poitrine. — Douleur d'excoriation dans la poitrine. — Battement de cœur. — Taches
rouges pruriantes sur la poitrine, avec brûlement après avoir
gratté.

Tronc et Membres. — *Roideur tétanique et renversement du dos, soit en avant, soit en arrière. — Gonflement et suppuration à la fossette du cou. — °Tressaillements convulsifs des jambes et des pieds. — Douleur de luxation à l'articulation coxo-fémorale dès qu'on s'assied. — Crampes nocturnes dans les muscles de la



374 IRIS VERSICOLOR. — KALI BICHROMATICUM.

cuisse. — Prurit violent aux mollets. — Ulcères, avec fond noir, aux jambes.

IRIS VERSICOLOR.

IRIS. - Iris d'Amérique. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Employé jusqu'ici avec succès contre :

Prosopalgie avec douleur dans la tête, les tempes et les yeux, et vomissement excessivement pénible de mucosités douceâtres, mêlées parfois de traces de bile. — Gastrite, avec brûlement violent dans l'épigastre, brûlement dans la bouche, le pharynx et l'esophage, vomissement, diarrhée et grande prostration. — Catarrhe intestinal, avec brûlement dans le rectum et l'anus après la selle, évacuations douloureuses, verdâtres, et se manifestant chaque nuit, entre deux et trois heures. — Choléra, avec brûlement violent dans l'estomac ou autour du nombril après chaque évacuation, et aggravation régulière entre 2 et 3 heures du matin. — Spermatorrhée, avec face pâle, yeux enfoncés, moral abattu, marche traînante et appétit vénérien facile à exciter. — Grippe, avec éternument continuel, douleurs violentes et constrictives dans les tempes, et diarrhée indolore, féculente, couleur claire.

KALI BICHROMATICUM.

KAL-BI. — Bichromate de potasse. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 408.—Durée d'action ?
ANTIDOTES: Camph. coff. merc. nitr-sp.
COMPARER AVEC: Ars. carb-veg. coff. lyc. merc. natr-m. nitr-ac. phos. puls.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement, tiraillement, térébration et douleurs de meurtrissure dans les membres. — Déchirement dans les os longs des membres. — °Rhumatismes chroniques. — Lourdeur et fatigue dans les membres. — Grande faiblesse et aspect maladif, cachectique de la figure. — Grande sensibilité au grand air. — *Douleurs qui passent rapidement d'une partie à l'autre. — Endolorissement de tout le corps, surtout le matin, en se levant. — *Les douleurs rhumatismales alternent avec des symptômes gastriques, et les douleurs ostéocopes avec des affections de la gorge. — *Beaucoup de



KALI BICHROMATICUM.

375

souffrances s'aggravent par un temps chaud; d'autres apparaissent ou augmentent principalement le matin. - Amaigrissement général.

Peau et Lésions extérieures. — Peau chaude, sèche et rouge. Éruption comme la rougeole. — *Pustules varioloïdes, parsois avec croûte noire au centre. — *Prurit brûlant dans la peau. - Furoncles. — Éruptions pustuleuses confluentes. — Pustules par le centre desquelles passe un poil. — *Ulcères gangréneux, secs, ovoides, rongeant en profondeur, avec auréole rose et enflammée, bords renversés, tache noirâtre au centre et laissant des cicatrices enfoncées. — oUlcères et éruptions syphilitiques, avec croûtes épaisses et pus jaunâtre. - Pustules ecthymateuses. — • Eczéma impétigineux, avec ulcères variqueux.

Sommeil. — Envie de dormir, le soir, de bonne heure. — Sommeil tardif, par surexcitation nerveuse. - Sommeil non réparateur. — Rêves vifs, effroyables. — Sommeil dérangé par beaucoup de souffrances, mais surtout par des maux de tête.

Fièvre. — Sensation fébrile, la nuit et le matin. — Horripilations qui se répandent par tout le corps, en partant des jambes. — Frissonnements aux extrémités inférieures, alternant avec chaleur fugace. — • Fièvre rhumatismale.

Moral et Intellect. — Abattement, morosité, paresse et horreur du travail. - *Grande indifférence. - Mélancolie et tristesse. -Irritabilité irascible. — Anthropophobie et morosité jusqu'au

dégoût de la vie.

Tête. - Accès fréquents de vertiges. - Vertiges à faire tomber, arec sensation comme si tout tournait en cercle. — Sensation vertigineuse qui traverse le front. — Vertiges avec nausées et vomissement. - Tête embarrassée, avec nausées, angoisse et hébétude. — Céphalalgie avec douleurs des yeux et otalgie. — Céphalalgie semi-latérale, principalement au front, au-dessus d'un æil. — Aggravation des maux de tête par l'air froid et le mouvement. - Mal de tête aux tempes. - Bouillonnement de sang remontant à la tête. - Elancements tranchants dans la tête comme par des couteaux. — °Migraine, maux de tête hystériques, cépha-lalgie congestive? — Douleur d'excoriation au vertex, avec hérissement des cheveux. - Tiraillement et sensibilité aux os du crâne. — Chute des cheveux.

Yeux.—Pression dans les yeux comme du sable. — Prurit et brûlement des yeux avec larmoiement. - Inflammation, gonflement, prurit et rougeur des paupières, avec sensation de rugosité et d'épaississement à la surface interne. - Inflammation des yeux, parfois avec photophobie, perte de la vue et écoulement abondant de larmes. — Vue trouble comme par un voile jaune devant les yeux. — Amblyopie amaurotique. — Taches volantes et étincelantes devant les yeux. — Couleur jaune de la sclérotique.

Taches roses et ecchymoses dans le blanc des yeux. — Taches



KALI BICHROMATICUM.

376

sanguinolentes et pustules sur la cornée. — Taie blanche sur la cornée. — Ophthalmies catarrhales et scrofuleuses.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles jusque dans le côté de la tête et du cou, avec glandes engorgées. — Claquement et chant dans les oreilles. — Oreilles bouchées.

Nez. — Sensation de froid dans les narines, en inspirant l'air. — Douleur d'excoriation dans les narines. — Petits ulcères brûlants à l'entrée des narines. — Brûlement et croûtes dans les narines.

- Saignement de nez fréquent, avec sang épais et rouge foncé. - Ecoulement abondant de sérosités par les narines, avec grande sensibilité du nez. - OSécrétion abondante d'un mucus purulent, avec obturation continuelle des narines. - Polypes du nez. - OUlcération et destruction de la cloison du nez. Mouchement de masses roides, verdâtres, ou de bouchons durs, élastiques, d'une odeur nauséabonde.-Gonflement du nez, avec endolorissement de la cloison. - Endolorissement des cartilages du nez. — Battements et pulsations dans la racine du nez, qui paraît chaude au toucher, avec gonflement sans rougeur. - Sensation de plénitude et de grosseur dans la partie supérieure du nez, avec besoin fréquent de se moucher. — Pesanteur du nez.— Fétidité devant le nez.—Perte de l'odorat.—Excoriation, brûlement et sécheresse pénible du nez. - *Obturation fréquente ou opiniâtre du nez. - Éternument fréquent, violent et ébranlant. - Coryza sec, avec narines ulcérées, éternument fréquent et accès de toux.

Face. — Couleur pâle, maladive, jaune, terreuse ou gris cendré de la face. — Yeux creux et cernés. — Douleur de meurtrissure et sensibilité des os de la face. — Tension dans les muscles de la face. —Éruption, comme scorbutique, à la face. — Prurit et brûlement à la peau de la face et du front. — Prurit dans les favoris. — Éruption de vésicules aux lèvres, avec fort prurit en desséchant. — °Croûtes syphilitiques à la joue, depuis la racine du nez jusqu'à la lèvre. — Sueur à la lèvre supérieure. — Lèvre inférieure gonflée et gercée.

Dents. — Odontalgie avec salivation abondante. — Déchirement tractif dans les dents gauches, parfois jusque dans l'oreille, la tempe, le cou et la tête, avec_engorgement des glandes du cou, et suivi de gonflement des gencives. — Inflammation et ulcéra-

tion des gencives. - Gencives livides.

Bouche. — Grande sécheresse de la bouche et des lèvres. — Vésicules, aphthes et ulcères à la surface interne de la bouche. — Langue molle, rouge et gercée. — Ulcère douloureux sur la langue, de longue durée. — Langue chargée de mucosités épaisses, jaunâtres. — Salive jaunâtre. — Accumulation abondante d'eau à la bouche. — Sensation comme d'un cheveu à la racine de la langue et au voile du palais. — Ulcère croûteux au palais, laissant une cicatrice déprimée.



KALI BICHROMATICUM.

377

Gorge. — Grande sécheresse de la langue, forçant à avaler continuellement de la salive. —Elancements pressifs dans la gorge, en avalant et en parlant. — Pendant la déglutition de substances sèches, sensation fréquente comme s'il en restait quelque chose dans la gorge. — Sensation comme s'il y avait un corps étranger dans la gorge, quelquefois jusque dans l'estomac, comme si les aliments s'y étaient arrêtés, surtout en rendant des rapports. Grattement et rugosité dans la gorge. - Brûlement dans la gorge et l'œsophage. - Rougeur cuivrée ou érythémateuse, opiniâtre, de la gorge et du palais. — Ramollissement de la paroi postérieure du pharynx, avec rougeur foncée, brillante, vaisseaux injectés et petites gerçures qui suintent du sang. - Rougeur et gonflement douloureux des amygdales et de la luette, suivis d'ulcération comme syphilitique. — Ulcères de la gorge, au voile du palais et à la luette, avec auréole rouge et suppuration jaunâtre. •Ulcères syphilitiques dans la gorge.

Goût et Appétit. — Goût douceâtre, métallique, cuirré, particulièrement aussi en fumant du tabac. — Goût de la bouche aigre, amer ou salé. — Goût désagréable de l'eau. — Appétit nul, surtout le matin. — Répugnance pour les aliments, la viande et la fumée du tabac. — Soif prononcée, continuelle et même inextinguible. — Désir de bière ou de boissons acidulées. — Même après des repas pris avec plaisir, sensation comme si la digestion était nulle et que les aliments pesassent sur l'estomac comme un poids. — Souffrances d'estomac, même après les repas les plus légers. — Souffrances par l'usage du thé de Chine.

Gastricisme. — Rapports d'air fréquents. — Hoquet fréquent. —
Nausées fréquentes ou continuelles, particulièrement aussi en
marchant, la nuit ou le matin, avec sensation de lourdeur dans
la tête et les yeux. — Le manger diminue les nausées, mais les
liquides paraissent les provoquer. — Pyrosis, surtout après avoir
pris du thé. — Nausées avec romissements, le plus souvent muqueux ou bilieux, amers et jaunâtres. — Vomissement de mucosités et de sang. — Vomissement des aliments ingérés, particulièrement aussi après le déjeuner. — Pendant les vomissements,
vertiges, brûlement dans l'estomac et sueur d'angoisse.

Estomac. — Pression, plénitude et ballonnement de l'estomac, surtout après le repas. — Grand malaise dans l'estomac, avec dégoût, inquiétude, nausées et chaleur. — Gastralgie nocturne. — Inflammation de la muqueuse de l'estomac, avec plaques rouge brunâtre. — Ulcères, suppurations et désorganisations

gangréneuses dans l'estomac.

Ventre. — Pression et élancements dans la région hépatique. —
Inflammation et ramollissement du foie. — Élancements forts
dans la région splénique. — Colique crampoide, constrictive,
avec nausées et suivie de selles en forme de bouillie. — Tournoiement ét tortillement dans le ventre, par le moindre courant d'air.



KALI BICHROMATICUM.

— Coliques avec douleurs comme si l'on perçait les intestins. — Ventre ballonné, tendu. — Flatuosités abondantes. — Inflammation, ulcères, suppuration et ramollissement de la muqueuse des intestins.

Selies et Anus. — Constipation continuelle, opiniâtre, parfois avec coliques. — Selles rares, dures, noueuses, avec chute du rectum. — Selles pâles, couleur d'argile, avec douleurs hépatiques. — Diarrhée aqueuse, comme un torrent, suivie de ténesme et de vomiturition violente, avec brûlement dans le ventre. — Selles dyssentériques, avec évacuations sanguinolentes, ou avec selles aqueuses, brunâtres et écumeuses, accompagnées de ténesme, vomiturition et coliques. — Ténesme fréquent et épreintes dans l'anus, avec soulagement par l'émission de vents. — Douleur violente, comme par une cheville, dans l'anus. — Douleur d'excoriation dans l'anus, rendant la marche très-douloureuse.

Voies urinaires. — Brûlement dans l'urèthre, pendant et hors le temps de la miction. — Inflammation, ramollissement, ulcération, suppuration et autres lésions organiques des reins. — Envie fréquente d'uriner. — Miction nocturne, abondante. — Urines rouges, parfois avec douleurs qui traversent le dos. — Dépôt blanchatre, ou épais et muqueux, dans les urines. — Émission des urines complétement supprimée, jusqu'à la mort.

Parties viriles. — Prurit dans les poils, avec éruption de petites pustules très-serrées sur une petite plaque circonscrite. — Croûtes sur la gland

sur le gland.

378

Règles et Parties de la femme. — Douleur d'excoriation, rougeur érythémateuse et gonflement du vagin. — Règles en avance, avec vertiges, dégoût, sensation fébrile et mal à la tête. — Leucorrhée jaunâtre, épaisse, avec douleur et faiblesse aux reins et malaise

dans l'épigastre.

Larynx. — Enrouement et raucité, particulièrement aussi le soir et le matin au réveil. - Douleur d'excoriation au larynx. -Beaucoup de chaleur dans la gorge avec excitation à la toux. Toux par chatouillement dans le larynx, le plus souvent avec expectoration épaisse, abondante, ou avec crachement de sang. — Expectoration épaisse, blanche ou blanc bleuâtre, par la toux. — Toux excitée par le manger. — Bronchite chronique, à la suite de respiration de vapeurs arsénicales. — °Toux matutinale, avec expectoration visqueuse. - *Toux opiniâtre avec expectoration muqueuse et râle dans la poitrine. — Avant la toux, ballonnement dans l'estomac et nausées. — En toussant, douleur dans les côtés et les lombes. - Expectoration jaunatre, d'un goût de pus, douceâtre. - Après avoir toussé, vertige violent avec douleur dans le sinciput. - Masses polypeuses dans les bronches. - Fausses membranes dans le larynx et la trachéeartère. - *Toux avec douleur dans un point de la poitrine, comme par un ulcère.



KALI BICHROMATICUM. — KALI CARBONICUM.

Poitrine. — Dyspnée, parfois avec douleur de poitrine et toux forte. - Haleine courte, comme par une constriction de l'épigastre qui couperait la respiration. — Endolorissement de la poitrine en respirant profondément. — Pression et pesanteur sur la poitrine, comme par un poids, particulièrement aussi en se réveillant. — Pression dans la région du cœur. — Douleur fixe dans la région de la pointe du cœur. — Battement de cœur violent, avec pression pénible. — Hypertrophie du cœur.

Tronc. — Douleurs violentes dans le coccyx, ainsi que dans les lombes et le sacrum, augmentées parfois par la toux, la respiration et le mouvement. — Élancements dans la région néphritique. - Pustules et furoncles au dos. — Roideur de la nuque. Déchirement et tiraillements dans un côté du cou, venant de la

tête.

Extrémités supérieures. — Douleur rhumatismale dans les épaules. — Pustules aux bras. — Brûlement aux avant-bras, comme par l'eau bouillante. — Déchirement et tiraillement dans les os de l'avant-bras et de la main. — Grande faiblesse, comme paralytique, dans les mains. — Douleurs rhumatismales dans les doigts. — Pustules à la naissance des ongles, se répandant de là

sur le dos des doigts et des mains.

Extrémités inférieures. — Douleurs rhumatismales dans les hanches, surtout pendant le jour et le mouvement. - Fortes douleurs dans les articulations des genoux. Déchirement dans la jambe, avec tressaillement des membres. — Douleur ostéocope dans le tibis. - Gonflement du tendon d'Achille. - Douleur de luxation dans l'articulation du doigt. — Douleur au talon en marchant. - Ampoules faciles, en marchant. - Brûlement des pieds, surtout à la plante. - Douleur d'excoriation au gros orteil, à l'endroit où l'ongle touche la chair.

KALI CARBONICUM.

KAL. — Sous-carbonate de potasse, sel de tartre. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac. homœop., p. 409. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 30 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDUTES: Camph. coff. nitr-spir.

COMPANER AVEC: Amm. amm m. ars. bov. bry. calc. camph. carb-veg. cham. chin: coff. graph. laur. magn. natr-m. nitr-ac. n-vom. phos. puls. rhus. sil. sulf. — C'est surtout après: Lyc. natr-m. nitr-ac., que le kali se montre parfois efficace, s'il est d'ailleurs indiqué. — Après le kali conviennent parfois: Carb-veg. phos. et beaucoup d'autres.

on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hydropiques; Anasarque; Affections rhumatismales et arthritiques; Paralysies; Engorgement des glandes; Accès d'évanouissement et de faiblesse hystérique; Faiblesse par suite de pertes débilitantes; Fièvres lentes ?; Migraine; Teigne; Loupes à la tête ?; Ophthalmie; Amblyopie amaurotique; Perotite; Pureté de l'ouie; Otite et otorrhée; Prosopalgie; Dyspepsie, même avec vomissement des aliments; Gastralgie; Douleurs hépatiques vomissement des aliments; Gastralgie; Douleurs hépatiques; Aseite; Aménocrhée et dysménie des jeunes filles (apres natr. mur.); Plearésie; phthisie tuberculeuse; Hydrothorax; Hémoptysie; Asthme spasmodique; Maux de reins par suite d'une chute; Prodromes et suites d'avortement; Affections du cœur.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Sensibilité douloureuse des membres, quelque position qu'on leur fasse prendre. - Douleurs pressives dans les articulations. - *Contraction spasmodique de quelques parties. - *Douleurs tractives et déchirantes dans les membres, surtout pendant le repos, avec gonflement des parties affectées et avec grande faiblesse et frissons après l'accès, Douleurs lancinantes dans les articulations, les muscles et les organes internes. - Gonflement et dureté des glandes. - *Souffrances hydropiques des organes internes, ou de toute la peau du corps. — *Les douleurs se manifestent souvent vers 2 heures du matin, et sont plus fortes alors que le jour, pendant le mouvement. - Le séjour au grand air aggrave beaucoup de souffrances (surtout les symptômes fébriles), tandis que quelques autres s'y trouvent soulagées. - Accès de spasmes et tressaillements convulsifs des membres et des muscles. - Attaques d'épilepsie, par accès nocturnes. — Facilité à se donner des tours de reins. — Disposition des membres à s'engourdir, lorsqu'on est couché dessus. - Paralysies. - Sensation générale de vacuité dans tout le corps, comme s'il était creux. - Pesanteur et paresse. - Faiblesse comme si on allait perdre connaissance, et tremblement surtout après une promenade. - Accès de faiblesse, avec nausées, sensation de chaleur et de lassitude au creux de l'estomac, vertiges et étourdissement. - Fort bouillonnement du sang, avec battement dans toutes les artères. - Horreur excessive du grand air et des courants d'air. - *Grande disposition à se refroidir, surtout après un exercice échauffant. - Sensibilité douloureuse de la peau, comme si elle était

ulcérée. — Peau sèche, avec impossibilité de transpirer. — Sensation de brûlure, ou prurit brûlant et lancinant à la peau. — *Taches pruriantes, brûlantes, jaunes ou rouges sur le corps

- Miliaire urti-

quelquefois avec suintement après s'être gratté. -



KALI CARBONICUM.

381

caire. — Vésicules rongeantes. — Engelures d'un bleu rougeatre. — *Verrues. — Dartres. — Saignement des ulcères, surtout la nuit.

Sommeil. — *Forte encie de dormir le jour et le soir de bonne heure. — Demi-sommeil, la nuit. — On s'endort tard. — *Pendant le sommeil, tressaillement, pleurs, paroles et sursauts avec effroi. — *Sommeil agité, avec rèves fréquents, auxieux et effrayants. — Rêves de brigands, de morts, de dangers, de serpents, de maladies, de spectres, de diables, etc. — La nuit, accès d'angoisse, souffrances gastriques, douleur à l'estomac et à la région précordiale, coliques, flatuosités, diarrhée, érections et pollutions fréquentes, souffrances asthmatiques, cauchemar et crampes dans les mollets.

Pièvre. — Prisson, le soir, avec soif, souvent accompagné de maux de dents. — Prisson immédiatement après les douleurs. — Horripilation fréquente, le jour. — Chaleur le matin, au lit, avec douleurs aux reins et dans la poitrine. — Manque de transpiration et impossibilité de transpirer; ou bien forte disposition à transpirer pendant un travail intellectuel, ou pendant la marche. —

Sueurs nocturnes.

Moral. — Tristesse avec pleurs. — Appréhension anxieuse et inquiétude, surtout sur sa santé, avec crainte de ne pas guérir. — Irrésolution, timidité et caractère peureux. — Peur le soir, au lit. — Humeur acariàtre, mécontentement et impatience. — Humeur changeante: tantôt douceur et tranquillité, tantôt emportement et colère. — *Disposition à s'effrayer. — *Humeur iras-

cible et colère. — *Perte de la mémoire. — On se trompe de mots et de syllabes. — Perte subite de connaissance.

Tête. - *Embarras et hébétude à la tête. - Vertiges le matin, le soir et après le repas, ainsi qu'en tournant promptement la tête ou le corps. — Vertige avec chancellement. — °Vertige qui semble provenir de l'estomac. - *Mal de téte par le mouvement de la voiture, en éternuant, en toussant, ou le matin. - *Mal de tête semi-latéral, avec nausées et vomissements, aggravé jusqu'à de-venir insupportable au mouvement le plus léger. — Mal de tête violent à travers les yeux. - *Maux de tête pressifs à l'occiput, surtout pendant la promenade, avec irritabilité, ou bien dans le front avec photophobie. - Douleurs déchirantes et tractives dans la tête. — Maux de téte lancinants, principalement dans les tempes. —*Congestion à la tête, avec battement et bourdonnement. — Tremblement dans la tête, et sensation comme si elle contenait quelque chose de mobile. - Les maux de tête sont soulagés en appuyant le front. - Sensation, comme d'un coup dans la tête, qui la fait pencher de côté, avec étourdissement. *Forte disposition à se refroidir la tête. — Tumeurs douloureuses et purulentes au cuir chevelu. - ºEruption croûteuse au cuir chevelu. - *Chute et sécheresse des cheveux. - °Le matin,



382 KALI CARBONICUM.

sueur au front. — Grande tache jaunâtre et furfuracée au front.

Yeux. — Douleur pressive et déchirante dans les yeux. — Sensation mordicante, cuisson, sensation de brûlure et élancements dans les yeux. — °Sensation de froid aux paupières. — Rongeur et inflammation des yeux, avec douleurs en lisant à la lumière des bougies. — *Gonflement des yeux et des paupières, avec difficulté de les ouvrir. — *Gonflement comme un sac, au-dessus des yeux, entre les sourcils et les paupières. — Excoriation et suppuration aux angles des yeux. — *Agglutination des paupières, le matin surtout. — *Larmoiement. — Yeux ternes, abattus. — Propension à la fixité du regard. — *Taches voltigeantes devant lu vue, en lisant et en regardant en plein air. — Couleurs d'arc-enciel, taches et étincelles devant la vue. — Clarté vive et douloureuse dans les yeux, lorsqu'ils sont fermés, s'étendant profondément dans le cerveau, le soir, après s'être couché. — Photophobie. — *Eblouissement des yeux par la lumière.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, quelquefois du dedans au dehors. — Oreilles froides. — Gonflement inflammatoire des oreilles, avec éconlement de pus ou de cérumen liquide. — Ulcère dans les oreilles. — Excoriation et suppuration derrière les oreilles. — *Inflammation et gonflement des parotides. — Acuité excessive de l'ouïe, le soir en se couchant. — *Ouïe faible et confuse. — Chant, tintement et bourdonnement dans


les oreilles.

Nez. — Gonflement du nez, avec rougeur et douleur brûlante. —
Nez rouge, couvert de boutons. — *Ulcération de l'intérieur du
nez. — Epistaxis, le matin. — *Odorat émoussé. — *Coryza et
obturation du nez, quelquefois avec sécrétion de mucosités vert
jaunâtre, et manque continuel d'air. — Coryza fluent, avec sécrétion de mucosités sanguinolentes. — Sécrétion de mucosités puru-

lentes par le nez. - Sécheresse du nez.

Visage. — *Couleur de la face, jaune ou pâle et maladive, avec yeux abattus et cernés. — Forte rougeur de la face, alternant avec pâleur. — *Pouleur tractive à la face. — Déchirement dans les os de la face. — *Chaleur fugace à la face. — *Bouffissure à la face. — Éruption de boutons à la face, avec gonflement et rougeur des joues. — *Gonflement entre les sourcils et les paupières. — *Boutons dans les sourcils. — *Verrues à la face. — Éphélides. — Lèvres épaisses et ulcérées. — Lèvres crevassées et qui s'exfolient. — Lèvres pâles. — Sensation crampoïde dans les lèvres. — Crampes de la mâchoire. —Gonflement de la mâchoire inférieure et des glandes sous-maxillaires.

Dents. — *Odontalgie seulement en mangeant, ou le matin, en se réveillant, ou bien provoquée par les choses froides (l'eau). — Odontalgie avec endolorissement des os de la face, et douleurs tractives, tressaillantes, ou déchirantes, surtout le soir au lit. —



383

*Maux de dents lancinants, -avec gonflement de la joue. - Fouillement, térébration, picotement et rongement dans les dents. Gonflement inflammatoire et ulcération des gencives.

Bouche. — Exhalaison fétide par la bouche. — Sensation de sécheresse dans la bouche, avec accumulation abondante de salive. -Excoriation et vésicules dans l'intérieur de la bouche et sur la langue. - Gonflement de la langue.

Gorge. — Mal de gorge avec douleur lancinante, en avalant. Déglutition empêchée, comme par inertie des muscles du gosier. *Accumulation de mucosités abondantes au palais et dans

la gorge. — *Renáclement de mucosités.

Appétit. — *Goût amer ou acide. — *Mauvais goût dans la bouche, comme par dérangement de l'estomac. — Goût putride, douceâtre, ou comme si l'on avait du sang dans la bouche. - Boulimie. — *Forte appétence pour le sucre ou les acides. — Horreur du pain noir; il pèse sur l'estomac. — Le lait ne convient pas. -Après le repas, envie de dormir, pâleur du visage, frisson, mal de tête, mauvaise humeur, nausées, renvois aigres et pyrosis, coliques, ballonnement du ventre et flatuosités. — Après avoir pris des aliments chauds (de la pâtisserie ou de la soupe), pincements et inquiétude dans le ventre.

Estomac. — Renvois fréquents. — *Renvois et régurgitations aigres. - Pyrosis. - Nausées, jusqu'à faire perdre connaissance, quelquefois pendant le repas. — *Nausées anxieuses avec envie de vomir, surtout après le repas, ou après une émotion morale. - Vomiturition le soir. - Vomissement des aliments et de matières acides, avec prostration des forces comme si l'on allait tomber en défaillance. — Vomissement nocturne des aliments. -*Plénitude d'estomac, surtout après le repas. — Pression à l'épigastre. - Tension au-dessus de l'estomac. - Crampes d'estomac, contractives, renouvelées par tous les aliments et toutes les boissons, ou bien la nuit avec vomissement. — *Pincement, fouillement et élancement à l'estomac. — Lancinations à l'épigastre et dans les hypocondres, qui suspendent la respiration. Pulsations à l'épigastre.

Ventre. — Douleur au foie en se baissant, comme s'il était foulé. – Douleur brûlante, pression et élancements dans le foie.` – Pression et élancements dans la région des reins. — Maux de ventre avec renvois fréquents. — *Pression dans le bas-ventre, osurtout en se baissant. - Fort ballonnement du ventre, surtout après le repas. — oInquiétudes et *pesanteur dans le rentre. - Spasmes abdominaux, contractifs et spasmodiques. — Coliques ressemblant aux douleurs de l'enfantement, quelquefois avec maux de reins. — Élancements dans tout le ventre. •Inertie et *froid dans le ventre. — •Gonflement hydropique du ventre. — Traction et élancements dans les aines. — Production abendante et *incarcération de flatuosités. — Emission de



KALI CARBONICUM.

384

flatuosités nulles ou *immodérée, quelquefois précedée de douleur pressive dans le rectum.

Selles. — *Constipation, quelquefois tous les deux jours. — *Resserrement du ventre, et évacuation difficile d'excréments d'un moule trop volumineux. — *Inactivité du rectum. — Envie inutile d'aller à la selle et selle insuffisante. — Diarrhées, le plus souvent le soir et la nuit avec tranchées et grand accablement physique. — Écoulement de mucosités ou de sang pendant les selles. — Sortie de ténia et de lombrics. — Avant la selle, anxiété. — *Prurit à l'anus. — Douleurs déchirantes, lancinantes, incisives et brûlantes à l'anus (et au rectum), surtout après les selles. — *Boutons hémorrhoïdaux de l'anus, douloureux, saignants et avec douleur lancinante. — Excoriation et éruption pustuleuse à l'anus.

Urines. — *Envie fréquente d'uriner et émission peu abondante d'une urine enflammée. — *Émission fréquente d'urine, jour et nuit. — Douleurs incisives dans la vessie, de droite à gauche. — Sensation brûlante dans l'urèthre, surtout en urinant.

Parties viriles. — Tension, déchirement et tiraillement dans le gland et la verge. — Prurit et douleur de meurtrissure au scrotum. — *Gonfiement chaud des testicules — et du cordon spermatique. — *Exaltation excessive ou absence de l'appétit vénérien. — *Répugnance pour le coît. — *Défaut d'érections ou érections par trop fréquentes et douloureuses. — *Absence de pollutions ou pollutions immodérées. — *Après le coït et les pollutions,

faiblesse du corps, omais surtout des yeux.

Régles. — Répugnance pour le coît chez la femme. — Pendant le coît, pincement et douleur d'excoriation dans le vagin. — Sensation continuelle comme si tout se portait vers les parties génitales. — Douleur brûlante et élancements dans le vulve. — °Erosion, *prurit et rongement aux parties génitales et à l'intérieur des parties. — *Règles trop hâtives ou trop faibles. — *Suppression des règles. — Écoulement de sang chez les femmes enceintes. — *Sang menstruel, corrosif. — *Pendant les règles, éruption pruriante et excoriation entre les cuisses. — Symptômes gastriques et sommeil agité et anxieux, pendant les règles. — *Leucorrhée, quelquefois avec maux de reins violents et douleurs comme celles de l'enfantement. — Leucorrhée jaunâtre avec prurit et sensation de brûlure à la vulve.

Larynx. —*Enrouement et raucité dans la gorge, avec éternument violent. — Aphonie. — Enrouement facile. — Sensation comme s'il y avait une cheville dans le larynx. — Toux en remuant les bras (en jouant du violon). — Toux provoquée par un chatouillement. — Toux sèche, surtout la nuit et le soir; le matin, avec expectoration. — Toux crampoïde, avec vomiturition et vomissement surtout le matin. En toussant, élancements dans la gorge ou



KALI CARBONICUM.

385

la poitrine. — Expectoration difficile par la toux. — Respectoration purulente par la toux. — Coqueluche.

Poitrine. — *Respiration difficile. — Haleine courte, le matin. — *Respiration génée en marchant vite ou le matin. — *Asthme spasmodique. — Oppression anxieuse de la poitrine. — Suspension de la respiration, la nuit. — *Sifflement dans la poitrine. — *Oppression de poitrine, comme par hydrothorax. — Douleur dans la poitrine, en parlant. — *Crampe de poitrine, equelquefois en toussant. — Sensation dans la poitrine, comme si le cœur se contractait. — Pression, douleur brûlante et élancements à la poitrine, quelquefois en respirant. — Douleurs incisives dans la poitrine. — Battement de cœur (quelquefois avec angoisse), surtout le matin, en se réveillant avec ébullition de sang.

Tronc. — *Maux de reins, °aussi après une chute. — Douleur de meurtrissure dans le dos, pendant le repas. — *Douleur tractive dans le dos, qui souvent provient des reins. — *Roideur entre les omoplates. — *Roideur de la nuque. — °Faiblesse des muscles du cou. — °Goître. — Gonstement dur des glandes axillaires et de celles du cou. — Sueur sous les

aisselles.

Bras. — Gonflement de l'épaule, avec douleurs. — *Pression sur l'épaule. — Tension, déchirement, tiraillement dans les muscles et les articulations des épaules, des bras, des mains et des doigts. — Froid, enroidissement et *engourdissement des bras, surtout au froid, ou après un exercice violent. — *Manque d'énergie dans les bras — et les mains, surtout le matin, au lit. — Tressaillement fréquent dans les bras. — *Roideur de l'articulation du coude. — Douleur paralytique dans le poignet. — Élancements dans le poignet et les doigts, pendant le mouvement. — *Tremblement des mains en écrivant. — Mains froides. — Peau des mains ràpeuse et gercée. — Torpeur et engourdissement du bout des doigts. — Douleur brûlante dans le bout des doigts. — Vésicules rongeantes aux doigts. — Tressaillements dans les doigts en cousant.

Jambes. — *Tiraillements aigus, surtout la nuit, dans les articulations et les os des hanches, des jambes, des pieds et des orteils. — *Tiraillements pressifs et déchirements dans les jambes. — Tressaillement des muscles dans les fesses et les cuisses. — *Douleur brûlante et élancements dans les jambes et les pieds. — Inquiétudes dans les jambes, le soir. — Torpeur et engourdissement des jambes. — °Horripilation fourmillante sur le tibia. — °Gonflement des jambes et *des pieds. — *Roideur de l'articulation du pied. — Élancements dans les articulations du pied. — *Froid aux pieds, même le soir, au lit. — Engourdissement des pieds après le repas. — *Sueur °fétide des pieds. — Douleur brûlante et *élancements dans la partie charnue du gros orteil. — *Cors aux pieds, douloureux au toucher.

JARR. - Schit., Im part., t. I.



KALI CHLORICUM.

386

KALI CHLORICUM.

KAL-CH. — Chlorate de potasse; muriate oxygéné de potasse. — Archives de Stapf. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 141. — Doses usitées: 4, 5, 30. — Durée d'action: plusieurs semaines, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES: Bell. puls.? COMPARER AVEC: Amm. arn. bell. calc. cocc. kal. natr-m. nitr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections scorbutiques; Obstructions dans les viscères abdominaux et souffrances hémorrhoïdales?; Prosopalgie; Mélancolie?; Souffrances asthmatiques?; etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Tiraillement et douleurs déchirantes dans les membres. - Tressaillements fréquents au corps, et surtout à la tête. - Grande faiblesse et lassitude. - Prurit par tout le corps, surtout le soir au lit. - Éruptions miliaires. - Boutons pruriteux. - Forte disposition frileuse, frissons continuels et horripilation, parfois avec enroidissement des mains. - Froid continuel aux pieds. - Pouls fréquent et acceléré. Sommeil agité, parfois avec ronflement bruyant, forte gêne de la respiration et couché sur le dos. — Rêves lourds, anxieux ou pénibles. - Rêves de prédiction de la mort ou d'une mort par suite d'une fièvre typhoïde; rêves lascifs, avec pollutions. Mauvaise humeur et anxiété, avec tension à la région précordiale, améliorée après avoir saigné par le nez .- Humeur triste, apathique, avec dégoût de la vie et frissonnement, surtout le soir. Tête - Nez. - Tête entreprise et embarrassée. - Vertige avec congestion de sang à la tête, après des exercices forcés. - La bière et le vin enivrent facilement; un seul verre suffit pour faire perdre la raison. - Maux de tête continus, surtout le soir. -Mal à la tête, avec vertiges. — Douleurs dans les tempes ou à l'occiput, se propageant parfois jusqu'aux machoires. — Tension dans le front, suivie parfois de coryza et d'éternument. - Congestion de sang aux yeux. - Pression, élancements et crampes

nez, même la nuit. Face — Dents. — *Douleurs tractives, crampoïdes, tensives, pressives et tiraillantes dans les muscles et les os de la face. - Élancements dans la face. - Chaleur passagère au visage.

dans les yeux. - Flammes et étincelles devant les yeux, en toussant et en éternuant. - Coryza violent, avec éternument fréquent, et sécrétion abondante de mucosités. - Saignement de



KALI CHLORICUM. — KALI HYDRIODICUM.

387

- Éruptions de boutons à la face, au front et entre la lèvre et le menton. — Gonflement des lèvres. — Agacement des dents. -Mal aux dents de la mâchoire supérieure. - Saignement des gen-

cives. — Gencives d'un rouge pâle. Bouche — Estomac. — Sensation de froid à la langue et dans la gorge. - Langue chargée d'un enduit blanc. - Sécrétion abondante de salive et de mucosités dans la bouche. - Salive acidulée. — Sécheresse, grattement et âpreté dans la gorge. — Déglutition difficile. — Goût de la bouche acide, amer, salé, ou empyreumatique. — Accès de boulimie, soulagés parfois en buvant de l'eau froide. - Renvois d'air fréquents.-Renvois aigres. -Pression dans l'estomac et la région précordiale, parsois avec besoin de faire des renvois ou avec humeur apathique et frissonnement. — Sensation de chaleur ou de froid dans l'estomac. — Douleurs incisives dons la région stomacale.

Ventre-Parties génitales. - Mouvements fréquents dans le ventre, avec disposition à la diarrhée. — Flatuosités abondantes. - Selles tardives, dures et sèches. — Selles liquides, diarrhéiques, parfois muqueuses. — Diarrhées douloureuses. — Envie fréquente d'uriner. — Urines troubles. — Érections fréquentes, violentes. — Pollutions fréquentes, avec rêves lascifs. — Prurit

au scrotum et dans l'urèthre.

Poitrine - Membres. - Enrouement. - Toux violente, parfois avec coryza. — Toux, comme provoquée par la vapeur du soufre, avec sécheresse dans la gorge et dans la poitrine. — Oppression de poitrine, avec sensation de constriction. — Congestion de sang à la poitrine. — Battement violent de cœur, parfois avec oppression de poitrine et froid aux pieds, ou avec sensation de froid dans la région du cœur. - Douleurs tractives et déchirements dans les avant-bras et les poignets. Froid extraordinaire au bras. — Envies enflammées aux ongles. — Phlyctènes et boutons pruriteux au dos des mains. - Douleurs lancinantes, violentes, au genou.

KALI HYDRIODICUM.

AL-H. — Hydriodate de potasse.—HARTLAUB et TRINKS. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 412. — Médicament encore très-peu

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs déchirantes dans les membres. — La plupart des symptômes se manifestent pendant le repos et se dissipent par le mouvement. - Baillements trèsfréquents. — Insomnie. — Nuits agitées, avec réveil en sursant et effroi. - Prédominance de froid ou frissons, avec soif. -



KALI HYDRIODICUM.

Inquiétude le soir, avec envie de pleurer, comme si l'on s'attendait à quelque malheur. — Disposition à s'effrayer. — Irascibi-

lité, emportements et humeur querelleuse.

388

Tête — Nez. — Pesanteur de la tête, avec humeur chagrine; on ne sait où reposer la tête. — Violents maux de tête, compressifs ou expansifs, avec sensation de froid à la partie douloureuse, qui est chaude cependant. — Creusement ou battement d'un seul côté du front. — Douleur d'ulcération au cuir chevelu, en grattant. — Douleur brûlante dans les yeux, avec photophobie. — Vue indistincte. — Otalgie avec douleurs lancinantes, déchirement et grande sensibilité de l'oreille. — Douleurs déchirantes dans le visage, avec gonflement de la joue. — Pâleur du visage. — Dartres sèches, pruriantes sur la joue. — Grande sensibilité des narines. — Déchirement et douleur brûlante dans les narines. — Épistaxis. — Obturation du nez, avec écoulement de sérosités corrosives et brûlantes.

Face — Appétit. — Lèvres sèches, gercées et enduites, le matin, de mucosités visqueuses. — Douleur d'ulcération dans les dents, la nuit. — Odontalgie aggravée par le contact de quelque chose de froid, soulagée par les choses chaudes. — Gencives gonflées, avec douleur d'ulcération lancinante. — Vésicules brûlantes et douloureuses sur la langue. — Salive sanguinolente, avec bouche mauvaise. — Exhalaison par la bouche d'une odeur fétide, comme celle de l'oignon. — Mal de gorge lancinant pendant la déglutition, tantôt avec pression, tantôt avec douleur d'ulcération. — Amertume, ou amertume douceâtre dans la bouche. — Goût rance, après tout aliment et toute boisson. — Insipidité des aliments. — Disposition continuelle à rendre de l'eau par la bouche, comme des pituites, avec répugnance pour tous les aliments.

Estomac et Ventre. — Sensation de vacuité et de fadeur dans l'estomac; qui ne s'apaise pas par les aliments. — Gloussement, sorte de cris et borborygmes dans l'estomac. — Pression brûlante à l'estomac, qui ne se laisse pas soulager par des renvois. — Douleurs abdominales, brûlantes, incisives, dans la région ombilicale avec sensation de fadeur dans l'estomac et renvois, en rentrant de la promenade au grand air. — Ballonnement douloureux du ventre. — Borborygmes dans le ventre, comme par quelque chose de vivant. — Pression et sensation comme si tout se portait vers les aines, ou serrement comme par une griffe à ces parties, comme si quelque chose allait sortir par le vagin. — Traction dans la région lombaire, comme s'il y avait dedans quelque chose de vivant.

Selles — Règles. — Selles dures, tenaces, difficiles à évacuer. — Diarrhée avec maux de reins, comme s'ils étaient brisés, ou comme si les règles allaient paraître. —Envie pressante d'uriner, avec émission abondante jour et nuit, — Règles plus abondantes.

Leucorrhée âcre, qui excorie la peau.

Larynx et Membres. - Toux sèche, provoquée par une irritation



KALMIA LATIFOLIA.

390

des symptômes de la tête vers le soir. - Mal de tête avec ver-

tiges et nausées.

Yeux.—Obscurcissement fréquent des yeux, surtout en regardant en bas, avec nausées et renvois. — Vue trouble. — Pression, élancements et prurit dans les yeux; les yeux souffrent plus le soir.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles. — Tintement d'oreilles. Nez. — Nez souvent bouché, surtout le soir. — Écoulement du nez

avec éternument fréquent et odorat très-sensible.

Face. — Pâleur de la face. — Peau rugueuse des joues, chaque été: la nuit, prurit à la face. — *Déchirements et élancements dans les os de la face et les mâchoires; oprosopalgie de Fothergill. — Lèvres: sèches et gonflées, roides, le matin; gercées, avec sécheresse de la peau du corps.

Dents. — Douleurs surtout dans les dents supérieures; douleurs qui, de la tête, passent dans les molaires supérieures et les œil-

lères.

Bouche et Gorge. — Langue blanche, sèche. — Élancements dans la langue.—Inflammation des glandes sublinguaires; salive augmentée; immédiatement après le repas, fourmillement dans les glandes salivaires, avec fermentation dans le gosier. — Dans la gorge: ascension continuelle de mucosités; sensation d'une boule qui remonte ou d'un gonflement; grattement et âpreté, avec endolorissement en avalant et battement dans les amygdales; pression avec nausées et élancements dans les yeux; déglutition difficile, parfois avec gorge sèche et soif.

Gastricisme. — Nausées; avec vertiges et mal à la tête; avec obscurcissement des yeux; pendant la douleur à la gorge, les flatuosités incarcérées, l'oppression de poitrine et les douleurs dans les membres. — Régurgitation comme une sorte de rumination, avec beaucoup de bile. — Vomiturition continuelle. (Souffrances

gastriques et délire.)

Estomac. — Estomac embarrassé, avec sensation de chaleur intérieure, picotement dans la peau, sueur modérée, puis envie de dormir, vertige et vue obscurcie; sensation de contraction dans l'estomac, et d'une boule remontant la gorge, avec reuvois; brûlement dans la région stomacale. — Dans le creux de l'estomac, pression, aggravée en étant assis courbé, améliorée en étant assis droit, avec la sensation comme si, au-dessus du creux, quelque chose allait être écrasé.

Ventre. — Dans la région hépatique, douleur et pression. — Douleurs dans le côté droit du ventre. — Incarcération des flatuosités, avec nausées. — Sensation de faiblesse dans le ventre, comme dans la matrice, remontant jusqu'à la gorge, et disparaissant

quelquefois par des renvois.

Selles et Anus. — Selles molles. — Diarrhées?. — Dyssenteries?. Urines. — Émission fréquente d'urines jaunâtres, plus abondantes.



KALMIA LATIFOLIA. - KREOSOTUM.

391

Bègles. — Menstrues insuffisantes et tardives, avec douleurs dans le dos, les lombes et les cuisses. — Leucorrhée jaunâtre.

Larynx. — Chatouillement dans la trachée; bruit, en respirant, comme par un spasme dans la glotte. — Toux jour et nuit, excitée par un grattement dans la gorge; avec expectoration muqueuse, le soir; avec expectoration facile, de matières grisâtres, lisses comme de la graisse, d'un goût putride et sale, et tombant en morceaux, en les étendant.

Poitrine. — Oppression de la poitrine et dyspnée, surtout pendant les douleurs rhumatismales, ou les nausées; oppression et courte haleine, forçant involontairement à respirer vite. — Élancements dans la partie inférieure de la poitrine. — °Affections chroniques et aigués des poumons. — Battement de cœur; hypertrophie du cœur, avec épaississement des valvules, par suite de rhumatismes aigus.

Tronc. — Sensation de paralysie douloureuse dans la région sacrale, le soir, au lit. — *Douleurs violentes dans le dos, les lombes, l'épine dorsale et les vertèbres. — Pression, élancements et tiraillement, dans les côtés du cou; douleur dans les vertèbres de la nuque.

Mombres thoraciques. — Douleurs, pression, déchirement dans les bras, les épaules, les mains, surtout à gauche; douleur para-

lytique dans la main, tant à gauche qu'à droite.

Membres pelviens. — Douleurs surtout dans les genoux et autour. — Douleur de foulure dans les pieds. — Élancements dans la plante des pieds et les orteils.

KRE080TUM.

KRE. — Kréosole. — Wahlé. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. hombeop., p. 114. — Doses usitées : 6, 50. — Durée d'action : 4 à 5 jours. ANTIDOTES : N-vom. iod.? Cham. COMPARER AVEC : Arn. cham. chin. hep. iod. merc. mur-ac. nitr-ac. n-vom. petr. phos-ac. puls. sil. sulf.

CLINIQUE. -- Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra conserver ce médicament contre :

-- Affections rhumatismales et arthritiques, même avec gonflement?; Affections scrofuleuses; Hémorrhagies; Éruptions galeuses?; Suppurations?; Ulcères gangréneux, carcinomateux, putrides, etc.?; Blessures?; Excoriations?; Écorchure des malades alités?; Dartres farineuses et pustuleuses; Teigne?; Plique polonaise??; Blépharophthalmie; Ophthalmies; Couperose; Dartres faciales; Odontalgies; Affections scorbutiques des gencives?; Hémorrhagies nasales et buccales?; Angines, avec ulcération??; An-



392

gines syphilitiques??; Mal de mer; Dyspepsie?; Gastralgie?; Dyssenteries?; Pissement au lit, par suite d'un sommeil trop profond; Nausées des femmes enceintes; Souffrances à la suite d'un cancer à la matrice; Métrorrhagies; Dysménorrhée; Leucorrhées; Disposition à l'avortement; Catarrhes chroniques, principalement chez les personnes âgées; Grippe; Souffrances phthisiques?; Hémoptysie?; Phthisie laryngée?; Maladies de cœur?; Maux de reins; Coxalgie, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleur d'excoriation et d'ulceration; sensation paralytique douloureuse; douleurs tiraillantes et lancinantes. — Douleurs pinçantes et *élancements, surtout dans les articulations. — Lassitude, lourdeur et *courbature dans tous les membres, surtout aux jambes. — Secousses dans les membres, surtout la nuit en dormant. — *Douleurs nocturnes. — Accès d'évanouissement, le matin au réveil. — Disposition à la défaillance dans une chambre chaude, avec chaleur du visage et haleine courte. — Accès de torpeur, avec pâleur et froid dans plusieurs parties, qui semblent alors comme mortes. — Douleurs de meurtrissure ou de contusion. — Surexcitation de tout le corps. — Inquiétude par tout le corps, surtout pendant le repos. — Les douleurs paraissent plus fortes pendant le repos.

Peau. — Prurit violent par tout le corps, surtout vers le soir et avec sensation brûlante aux bras et aux jambes, après s'être gratté. — Prurit brûlant, nocturne, et chaleur par tout le corps. — Éruptions urticaires. — Éruptions de tubérosités semblables aux piqures de punaises, avec prurit violent, surtout le soir. — Dartres farineuses et pustuleuses, sèches ou humides, mais avec

prurit violent à presque toutes les parties du corps.

Sommeil. — *Forte envie de dormir, avec bâillements fréquents, —parfois avec goût putride dans la bouche et manque d'appétit. —Accès de bâillement, avec frissons, larmoiement, douleurs pressives au front, ou lassitude. — *Besoin continuel de dormir. — Difficulté de s'endormir, par suite d'inquiétudes dans tout le corps, ou d'une sensation de fatigue, avec douleurs dans tous les membres. — *Sommeil agité, —avec jactation. — Réveil fréquent la nuit. — Sommeil non réparateur, avec sensation paralytique dans tous les membres, au réveil. — La nuit, maux de reins, frissons intérieurs, pulsations à la tête, inquiétudes dans tout le corps, douleurs pressives et brûlantes dans les yeux, agglutination des paupières, etc. — En dormant, sursaut avec effroi. — *Réves fréquents, —anxieux, rêves de neige, de chute, de poursuites, d'empoisonnement, d'amaigrissement, de feu, d'érections, d'envie d'uriner et de linge sale et dégoûtant.



394

trouble comme à travers un voile, ou comme s'il y avait du du-

vet devant les yeux.

Oreilles. — Chalcur et rougeur brûlante des oreilles. — Gonflement inflammatoire de l'oreille, avec douleurs tensives, brûlantes, ou même avec roideur douloureuse du cou au côté affecté; douleurs jusque dans l'épaule et le bras, chalcur au front et pression au-dessus des yeux. — Tiraillements et élancements dans les oreilles, ou douleurs crampoïdes, pressives et expansives. — Bourdonnement des oreilles, avec dureté de l'ouïe, alternant avec tintement et sifflement dans la tête. — Dartres humides aux oreilles.

Nez. — Mauvaise odeur et fétidité devant le nez, parfois avec manque d'appétit. — Le nez est constamment humide. — Saignement de nez, même le matin; le sang est d'un rouge clair ou séreux, ou épais et noir. — *Éternument fréquent, surtout le matin. — Coryza fluent avec sensibilité douloureuse des fosses nasales, en respirant l'air. — Coryza, avec sensation d'érosion sous le sternum. — *Coryza sec, avec éternument fréquent.

Face. — Chaleur fréquente et même continuelle du visage, parfois avec pulsation dans les joues et le front, et avec rougeur foncée de toute la face, envie fréquente d'uriner. — © Couperose. — Couleur grisâtre, terreuse, du visage. — Dartres furfuracées aux joues, aux paupières et autour de la bouche. — Douleur tractive, aiguë, au côté droit du visage, depuis la mâchoire jusqu'à la tempe. — Sécheresse des lèvres, comme par une chaleur intérieure. — Boutons pustuleux au menton et à la joue; ils se couvrent de croûtes jaunâtres.

Dents. — *Douleurs tractives et tiraillements successifs dans les dents, même le matin au réveil, et parfois avec douleurs dans le côté malade du visage, jusqu'à la tempe. — Allongement des

dents. - Rougeur inflammatoire des gencives.

Bouche et Gorge. — Langue pâle et flasque, avec accumulation d'une salive séreuse dans la bouche. — Sécheresse continuelle dans la gorge, avec soif ardente et fréquente. — Grattement et âpreté dans la gorge. — Douleur d'excoriation ou pression dans la gorge, en avalant. — Sensation d'étranglement douloureux au

fond du gosier jusque dans la poitrine et le dos.

Appétit et Estomac. — Goût amer, surtout dans la gorge, et en avalant les aliments. — Goût fade de la bouche. — Perte entière de l'appétit, parfois avec langue pâle et flasque, accumulation de salive dans la bouche et soif ardente. — Renvois d'air et rapports aigres. — Nausées avec envie de vomir, salivation et frissons par tout le corps, ou avec sensation brûlante dans la bouche. — *Vomiturition surtout le matin, à jeun, comme dans la grossesse, et parfois avec vomissement d'eau et de mucosités, sécheresse du nez, chaleur et douleur pressive au front, soif et froid aux mains et aux pieds. — Vomissement d'eaux douceatres le matin à jeun.



Larynx. — *Grattement et raucité dans la gorge, avec voix rauque et enrouée. — Toux sèche, excitée par un grattement dans la gorge, ou par un chatouillement dans les bronches. — *Toux sèche, sibilante. — *Toux avec haleine courte. — *Toux, le soir, oau lit. — Toux continuelle, avec sommeil et frissons, suivis de chaleur sèche. — Toux convulsive avec vomiturition, surtout le matin. — *Toux continuelle, rauque et creuse, excitée par une

le matin. — *Toux continuelle, rauque et creuse, excitée par une accumulation de mucosités dans la gorge, et avec expectoration facile de mucosités blanchâtres, °ou jaunâtres, et épaisses. — Les mucosités expectorées ont parfois un goût douceâtre. — *En toussant, émission involontaire d'urines, et ébranlement dans le ventre.

Poitrine. — *Haleine courte, parfois avec sensation de lourdeur dans la poitrine, et besoin de respirer profondément, ou avec douleur de meurtrissure dans la poitrine, en respirant. — *Respiration difficile, anxieuse. — *Elancements violents dans la poitrine, à la région du cœur, dans les côtés et dans les muscles intercostaux, parfois en respirant, ou avec suspension de la respiration; ces élancements se manifestent même la nuit. — Douleur brûlante dans la poitrine, comme après avoir bu de l'eau-de-vie; la douleur s'étend depuis le centre de la poitrine jusqu'a la gorge et la langue, et est accompagnée de chaleur, rougeur et tension

au visage.

396

Tronc et Membres. - *Maux de reins comme dans les douleurs d'enfantement spasmodiques, avec forte envie d'uriner et d'aller à la selle, –ou avec flueurs blanches. — Douleurs d'ulcération dans les vertèbres lombaires. - *Douleurs nocturnes au dos, plus fortes pendant le repos. — Élancements dans les muscles et les articulations des épaules, — Douleur de contusion aux bras. — Sensation paralytique douloureuse aux avant-bras et aux doigts. - Douleurs crampoïdes dans les coudes et les avant-bras. - Les mains sont roides, avec peau gercée. — Boutons à la main, avec prurit violent, surtout le soir au lit. — °Dartres au coude, aux mains et aux doigts. - Douleur de luxation aux pouces. - Doigts morts. - Engourdissement des doigts. - Douleurs de fatigue dans les hanches et les jambes. - Douleurs tractives et lancinantes dans les cuisses, aggravées par le mouvement. - Douleurs de contusion et taches bleuatres aux cuisses. - Douleurs dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. -Lourdeur dans les jambes. — Douleurs tractives et lancinantes dans les jambes, alternant avec souffrances des yeux. - Douleurs de luxation dans les articulations des genoux et des pieds. -Dans le jarret, peau rouge, râpeuse, comme une dartre. — Tension et crampes aux mollets. - *Douleurs d'ulcération et sensation brulante à la plante des pieds. — *Gonflement œdémateux des pieds depuis les orteils jusqu'aux mollets. - Froid aux pieds. -- Sueur des pieds. - Dartres aux malléoles.



396

Larynx. — *Grattement et raucité dans la gorge, avec voix rauque et enrouée. — Toux sèche, excitée par un grattement dans la gorge, ou par un chatouillement dans les bronches. — *Toux sèche, sibilante. — *Toux avec haleine courte. — *Toux, le soir, vau lit. — Toux continuelle, avec sommeil et frissons, suivis de chaleur sèche. — Toux convulsive avec vomiturition, —surtout le matin. — *Toux continuelle, rauque et creuse, excitée par une accumulation de mucosités dans la gorge, et avec expectoration facile de mucosités blanchâtres, vou jaunâtres, et épaisses. — Les mucosités expectorées ont parfois un goût douceâtre. — *En toussant, émission involontaire d'urines, et ébranlement dans le ventre.

Poitrine. — *Haleine courte, parfois avec sensation de lourdeur dans la poitrine, et besoin de respirer profondément, ou avec douleur de meurtrissure dans la poitrine, en respirant. — *Respiration difficile, anxieuse. — *Élancements violents dans la poitrine, à la région du cœur, dans les côtés et dans les muscles intercostaux, parfois en respirant, ou avec suspension de la respiration; ces élancements se manifestent même la nuit. — Douleur brûlante dans la poitrine, comme après avoir bu de l'eau-de-vie; la douleur s'étend depuis le centre de la poitrine jusqu'à la gorge et la langue, et est accompagnée de chaleur, rougeur et tension

au visage.

Tronc et Membres. - *Maux de reins comme dans les douleurs d'enfantement spasmodiques, avec forte envie d'uriner et d'aller à la selle, -ou avec flueurs blanches. — Douleurs d'ulcération dans les vertebres lombaires. - *Douleurs nocturnes au dos, plus fortes pendant le repos. — Élancements dans les muscles et les articulations des épaules. — Douleur de contusion aux bras. — Sensation paralytique douloureuse aux avant-bras et aux doigts. - Douleurs crampoïdes dans les coudes et les avant-bras. — Les mains sont roides, avec peau gercée. — Boutons à la main, avec prurit violent, surtout le soir au lit. — Dartres au coude, aux mains et aux doigts. - Douleur de luxation aux pouces. - Doigts morts. - Engourdissement des doigts. - Douleurs de fatigue dans les hanches et les jambes. - Douleurs tractives et lancinantes dans les cuisses, aggravées par le mouvement. - Douleurs de contusion et taches bleuâtres aux cuisses. - Douleurs dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. — Lourdeur dans les jambes. — Douleurs tractives et lancinantes dans les jambes, alternant avec souffrances des yeux. - Douleurs de luxation dans les articulations des genoux et des pieds. -Dans le jarret, peau rouge, râpeuse, comme une dartre. — Tension et crampes aux mollets. - *Douleurs d'ulcération et sensation brûlante à la plante des pieds. — *Gonflement œdémateux des pieds depuis les orteils jusqu'aux mollets. — Froid aux pieds. -- Sueur des pieds. - Dartres aux malléoles.



MÉDECINE HOMŒOPATHIQUE

PREMIÈRE PARTIE

MANUEL DE MATIÈRE MÉDICALE

RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX EFFETS DES MÉDICAMENTS HOMEOPATHIQUES

AVEC INDICATIONS DES OBSERVATIONS CLINIQUES

PAR

LE DOCTEUR G. H. G. JAHR

BUITIÈME ÉDITION REVUE ET CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE

TOME SECOND


PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS
LIBRAIRES DE L'ACADÉNIE DE MÉDECINE
Rue Hautefeuille, 19.

Legine, Buillikk, Tedeli and Cot. | Beiris, MHLT-Buillikk,
BRUXELLES, MERCH MARCHAUX — OUSTAVE MAYOCKE.

Droits do traduction et de reproduction récervés.

1872



PERSONAL PROPERTY.

BREINE HOMEOPATHIQUE

NAME OF TAXABLE PARTY.

man wat was seen to

GENERAL SPRING

TARRS:

THE PARTY OF STREET, P. LEWIS CO., LANSING.



MATIÈRE MÉDICALE HOMŒOPATHIQUE

LACHESIS.

LACH. — Le venin dentaire du Trigonocéphale à losanges. — Héring. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 331. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : plusieurs semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Alum. ars. bell. caps. cham. chin. cocc. hep. merc. natr-m. nitr. n-mos. a-vom. phos-ac. rhus. samb. veratr. — Contre la suite de la

morsure: Ars. bell. caps. natr-m. samb.

COMPARER AVEC: Alum. ars. bell. bry. caps. carb-v. caus. cham. cocc. con. dulc. hep. byos lyc. merc. natr-m. nitr-ac. n-mos. n-vom. phos-ac. puls rhus, samb selen, sulf, veratr. — C'est surtout après Ars, con, hep. lyc. merc. nitr-ac. n-vom, que le lachesis fait du bien lorsqu'il est indiqué. — Après le lachesis conviennent quelquesois : Alum, ars, bell. carb-v caus. con. dulc. merc. n-vom. phos-ac

CLINIQUE. —Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre:-Affections des personnes maigres, épuisées, d'un tempérament mélancolique, ou colérique, avec teint maladif; Souffrances par un temps chaud et humide, ainsi que par les changements du temps et le vent; Suites facheuses d'un chagrin, d'une affliction (mortification) et d'une frayeur?; Souffrances des ivrognes; Souffrances par l'abus du mercure; Rhumatismes aigus et chroniques; Affections arthritiques; Douleurs ostéocopes; Paralysies; Faiblesses par perte d'humeurs (pollutions, hémorrhagies)?; Accès d'évanouissement; Syncope et asphyxie?; Atrophie; Anévrisme; Convulsions et accès de tétanos, principalement chez les enfants et les jeunes gens; Épilepsies chroniques; Hémorrhagies; Anévrisme; Gale; Lèpre; Erysipèles simples, flegmoneux et vésiculeux; Scarlatine maligne?; Panaris; Ulcères carcinomateux; Gangrène?; Ulcères mercuriels; Fièvre des enfants; Fièvres quotidiennes et tierces; Mélancolie; Folie religieuse; Aliénation mentale à la suite d'études forcées; Imbécillité?; Hydrophobie?; Accès d'apoplexie (dans l'âge viril); Congestion cérébrale avec perte de connaissance; Affections cérébrales des enfants; Encephalite?; Hydrocsphale?; Suites d'un coup de soleil?; Fatigue nerveuse par des travaux de tête; Céphalalgies



398

nerveuses, hystériques, congestives; Ophthalmies aigues et chroniques?; Obscurcissement et ulcères de la cornée; Amblyopie amaurotique?; Ozène?; Coryza chronique avec obturation du nez; Coryza supprimé par des émotions morales?; Erysipèle à la face; Prosopalgies et odontalgies congestives et nerveuses (principalement chez les jeunes filles); Angines aiguës (principalement chez les enfants); Angines mercurielles, avec ulceration; Boulimie; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Affections gastrico-bilieuses?; Hématémèse?; Vomissement des femmes enceintes, des ivrognes?; Choléra?; Affections hépatiques, aussi chez les ivrognes; Abcès hépatiques; Ramollissement du foie; Ictère; Fièvre jaune; Coliques spasmodiques; Coliques des femmes enceintes?; Tympanite?; Disposition chronique à la constipation; Diarrhées de plusieurs espèces; Dyssenteries?; Lienterie?; Affections vermineuses des enfants; Coliques hémorrhoïdales; Hémorrhoïdes fluentes, ou avec flux muqueux; Indurations dans le ventre avec selles purulentes, sanguinolentes; Hémorrhagie intestinale?; Impuissance?; Dysmenorrhée et autres souffrances dans l'âge critique; Souffrances hystériques; Avortement; Induration et ulcération des ovaires; Affections catarrhales (et inflammatoires) des voies aériennes; Coqueluche; Croup; Dyspnée; Souffrances asthmatiques; Asthme de Millar?; Asthme thymique de Kopp?; Pleurésie; Pneumonie?; Grippe; Phthisie?; Hémoptysie; Hydrothorax; Orthopnée paralytique?; Battements chroniques du cœur, principalement chez des jeunes filles; Anévrismes, polypes, inflammation et autres maladies du cœur?; Cyanose?; Coxalgie; Ulcères aux jambes; Panaris, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Douleurs voluptueuses, on épouvantables, ou fortement pressives, à plusieurs parties du corps. - Sensation de luxation et de paralysie dans les articulations. - *Roideur et tension dans les muscles, comme s'ils étaient trop courts. - *Douleurs ostéocopes. - *Douleurs rhumatismales vives et tractives aux membres, ou douleurs rongeantes, avec sensation de meurtrissure en se remuant. - Douleurs nocturnes qui paraissent insupportables et ne permettent pas de rester au - Les douleurs affectent alternativement l'un ou l'autre côté du corps, ou tantôt les membres, tantôt le corps, et se montrent souvent en croix. - *Souffrances intermittentes et périodiques, *souffrances accompagnées de péril de suffocation, et souffrances avec besoin de se coucher. - *Aggraration et renouvellement des souffrances après le sommeil, ou la nuit, et principalement avant minuit, ou quelques heures après le repas, ou par un temps humide et chaud, ainsi que par les changements de temps et le vent; soulagement de beaucoup de souffrances par



le grand air. - Les émotions morales, telles que les contrariétés,

399

la peur, la frayeur, etc., renouvellent souvent toutes les souffrances. — *Paralysie avec lourdeur et roideur des membres; *paralysie semi-latérale. - *Grande faiblesse de corps et d'esprit; -épuisement comme après une perte de sang; chute rapide des forces; relachement des forces musculaires. — *Accès de défaillance, avec dyspnée, nausées, sueur froide, -vertige, pâleur du visage, vomissements, étourdissements, obscurcissement des yeux, douleurs et point dans la région du cœur, convulsions et épistaxis. - *Accès d'asphyxie et de syncope, -avec perte des sens et du mouvement, insensibilité comme dans la mort, serrement des dents, roideur et gonflement du corps, pouls tremblant et sans nul battement. — Tremblement des membres, palpitations musculaires et tressaillement dans plusieurs parties du corps. *Accès de convulsionss et d'épilepsie, avec cris, mouvements des membres, chute saus connaissance, yeux convulsés, écume devant la bouche, poings fermés; avant l'accès, pieds froids, rapports, pâleur du visage, vertiges, tête lourde et douloureuse, battements de cœur, ballonnement du ventre; après l'accès, sommeil. — Accès de tétanos avec distorsion des membres. — *Hémorrhagie et -extravasation du sang dans différents organes. Peau.—Ecchymoses; saignement fucile et abondant des plaies et des ulcères; sortie de masses de sang par les pores de la peau.-Tumeurs variqueuses. — Gonflement hydropique de tout le corps. — Tuméfactions dures et pâles. — *Peau jaune, verte, plombée, ou rouge bleuâtre, ou noirâtre, principalement autour des plaies et des ulcères. — *Taches jaunes, rouges, cuivrées. — Taches pales, livides, avec accès de défaillance. — Gale sèche, miliaire, avec éruption de grosses vésicules jaunes, ou d'un noir bleuâtre, avec gonflement des parties affectées, et douleurs qui poussent au désespoir. - Eruption miliaire qui, par la suite, devient semblable aux urticaires, à la scarlatine, aux morbilles. Erysipèle et éruptions vésiculeuses, avec auréole rouge. —. Plaques excoriées, avec douleurs brûlantes en les touchant. Ulcères entourés de boutons, de vésicules et d'autres petits ulcères. - *Ulcères superficiels à fond sale, avec auréole rouge. Ulcération carcinomateuse (des plaies), ou putréfaction de la chair qui se détache des os et tombe en lambeaux. — Gangrène des plaies, avec fièvre inflammatoire, pouls faible, accéléré et intermittent; défaillance, nausées, vomissements spasmodiques et bilieux, convulsions et sueurs froides. - Papules; verrues; *tumeurs dures. - *Panaris. — Bosses et tubérosités rouges et pruriantes.

Sommeil. — Grande envie de dormir le jour, et somnolence principalement après le repas. — Insomnie, principalement avant minuit, avec surexcitation nerveuse. — Somnolence et insomnie alternatives, tous les deux jours. — *Sommeil léger, avec réceil



fréquent et facile, agitation et jactation, gémissements et soupirs, sursauts et effroi. — *Réves continuels et fréquents, tant poétiques et méditatifs, que voluptueux; rêves de querelles, de choses horribles, de spectres et de mort. — *La nuit, chaleur, agitation, brûlement à la paume des mains et à la plante des pieds, douleurs ostéocopes, ou rhumatismales, diarrhée, émission d'urine, exaltation mentale et beaucoup d'autres souffrances. — Après le sommeil, sensation de roideur et de courbature dans les membres, érections avec désir vénérien, douleurs au dos et aux reins, congestion de sang, lourdeur et douleur de tête, pression à l'estomac, mal à la gorge, bâillement nerveux et aggrava-

tion de toutes les souffrances.

400

Fièvre. - Froid glacial de la peau ou des membres, ou seulement des pieds, avec grand désir du feu, et quelquefois avec perte de sentiment, sueur visqueuse, faiblesse et grande fréquence du pouls. - Frissons, quelquefois seulement partiels, souvent avec douleurs dans les membres, maux de reins, agitation et jactation, coliques, trismus et mouvements convulsifs des membres, douleur à la poitrine, soif, claquement de dents.-*Horripilation pendant la chaleur et principalement en soulevant la couverture du lit. - Frissons, principalement après les repas ou dans l'aprèsmidi. - Chaleur sèche, principalement la nuit ou le soir, et surtout aux pieds et aux mains, accompagnée souvent d'agitation et de jactation, de mal à la tête, délires, soif inextinguible, rapports, vomissements bilieux, cris, gémissements, sécheresse de la bouche et de la gorge, et °selles fréquentes. — *Chaleur de la bouche et de la gorge, et eselles fréquentes. — *Chaleur alternant avec froid, frissons ou horripilation. — *Fièvres nocturnes ou vespertines, par accès *quotidiens, tierces, oou quartes, et accompagnées souvent de mal à la tête, chute rapide des forces et faiblesse qui force à se coucher, manque d'appétit, hoquet, vomissement, sensibilité du cou au toucher, palpitations du cœur. angoisse, urines jaunes, diarrhée, douleurs aux membres, au dos, aux reins, bâillements nerveux et spasmodiques, pandiculaisons, gonflement du corps, taches et ulcères. — *Fièvres chroniques; fièvres lentes; fièvres typhoïdes .- Renouvellement des fièvres par des aliments acides. — *Sueur fébrile, principalement après la chaleur, vers le matin; sueurs abondantes; sueurs fétides; *sueurs froides; sueurs sanguinolentes. - *Pouls intermittent, ou faible et fréquent, ou irrégulier, ou à peine sensible, ou tremblant.

Moral. — Grande angoisse, anxiété insupportable et inquiétude qui porte à chercher le grand air. — Crainte et pressentiment de la mort. —*Accablement moral et mélancolie, avec appréhensions, inquiétude sur sa maladic, trop grande disposition à s'abandonner au chagrin, à voir tout en noir, et à se croire persécuté, haï et méprisé des siens. — *Tristesse et dégoût de la vie. — *Méfiance, soupçons et grande disposition à prendre tout en mal,



401

à contredire et à critiquer.—Jalousie frénétique. — Paresse avec *déplaisir et inaptitude à un travail quelconque de corps ou d'esprit. — *Caractère peureux, avec incertitude et indécision. — *Grande apathie et faiblesse de mémoire extraordinaire; — tout ce que l'on entend est comme effacé; on ne se rappelle plus mème l'orthographe, et on oublie jusqu'à ce que l'on allait dire. — On se trompe en parlant et en écrivant, ainsi que sur les heures du jour et les jours de la semaine. — *Imbécillité et perte de toutes les facultés de l'esprit. — *Surexcitation et trop grande irritabilité nerveuse, avec disposition à s'effrayer, état d'extase et d'exaltation qui va jusqu'aux pleurs, besoin de méditer et de composer des travaux intellectuels, °avec une sorte d'orgueil. — *Loquacité frénétique, avec discours sublimes, mots choisis, et idées qui passent rapidement et constamment d'un sujet à un autre. — *Délires nocturnes avec beaucoup de paroles ou avec

murmures. — Démence et perte de connaissance.

Tête. — Fatigue de la tête par des travaux intellectuels. — *Vertiges principalement le matin au réveil, ainsi que le soir, après s'être couché, en allant au grand air, en levant les bras, et souvent arec défaillance, pâleur du visage, nausées, vomissements, congestion à la tête, saignement de nez et lassitude des membres. — Ivresse, stupeur et perte de connaissance. — *Accès d'apoplexie, -avec face bleuâtre, mouvements convulsifs des membres et extravasation de sang dans le cerveau. - Ramollissement du cerveau et de ses membranes. — Douleur violente à la tête avec face jaune et rougeur des joues. — *Mal de tête, avec congestion de sang, scintillement devant les yeux, somnolence, frissons et besoin de se coucher, "ou avec nausées et vomissements; océphalalgie par la chaleur du soleil; *douleurs profondes dans le cerveau, -ou dans les orbites, *ou au-dessus des yeux, ou à l'occiput, avec roideur de la nuque. - Douleur de meurtrissure dans le vertex, ou *sensation de térébration, avec coups et battements en remuant la tête. - *Pesanteur et pression à la tête, comme si elle allait éclater; ou *tension comme par des fils tirés de l'occiput vers les yeux, ou élancements comme par des couteaux dans différentes parties de la tête et jusqu'aux yeux. - Douleurs qui de l'intérieur de la tête se propagent jusqu'aux oreilles, au nez et au cou. - *Maux de tête tous les matins au réceil, ou toutes les après-dinées, -on bien à tout changement de temps. - Gonflement de la tête; palpitations musculaires aux tempes, tension à l'occiput jusqu'à la nuque; sensibilité douloureuse du cuir chevelu, avec prurit pénible, forte desquamation et chute des cheveux.

Yeux. — Yeux jaunes, ou troubles, ternes et abattus, ou brillants et convulsés, avec regard fixe. — Pupilles très-dilatées. — Ecchymose et hémorrhagie des yeux. — Sécheresse des yeux, comme s'ils étaient pleins de poussière; ou *écoulement de larmes qui,



402 LACHESIS,

quelquefois, paraissent froides.—Photophobie.—Prurit et élancements comme par des couteaux dans les yeux, ou *pression violente comme si le globe allait sortir de l'orbite, aggravée en remuant les yeux.—Yeux rouges, enflammés, avec rougeur de la conjonctive et de la sclérotique, chalcur brûlante et larmoiement.—Sensation comme si les yeux étaient trop gros ou les orbites trop petits.—Gonflement et inflammation des paupières, ou de leurs bords.—Convulsions, pesanteur et paralysie des paupières.—Faiblesse de la vue et presbyopie.—Confusion des caractères en lisant.—Trouble de la vue comme par un voile.—Obscurcissement et perte de la vue.—Flammes et étincelles, ou voile bleu devant les yeux, ou cercles bleus autour de la chandelle.—Yeux petits et sans expression.

Oreilles. — Oreilles froides, sensibles au vent. — Gonflement douloureux de l'intérieur de l'oreille. — *Sécheresse des oreilles. —
*Cérumen trop peu abondant, trop dur et trop pâle, ou comme de
la bouillie, *et blanc avec diminution de l'ouie. — Battements
très-désagréables, °résonnement, *bruissement, tintement, craquement, bourdonnement et roulement, ou bruit comme si on
battait le tambour, dans les oreilles. — Oreilles comme bouchées.
— Sensibilité excessive ou dureté de l'ouie. — Hémorrhagie par
les oreilles. —Gonflement des parotides. — °Exceriation et croûte


derrière les oreilles.

Nez. — Douleurs nocturnes au dos du nez. — Obturation du nez comme par un gonflement intérieur, principalement le matin, ou avec le coryza. — Gonflement, *rougeur et excoriation des bords du nez avec croûtes dans les narines. — Mouchement de sang. — Saignement abondant par le nez, d'un sang rouge clair ou épais et noir. — Écoulement de pus par le nez. — *Coryza sec, chronique, avec obturation du nez; ou fluent, avec écoulement abondant de mucosités séreuses, larmoiement, éternument fréquent et inflammation et érosion des narines. — °Coryza incomplet, avec beaucoup de souffrances de la tête et de l'esprit. qui disparaissent toutes dès que le flux catarrhal s'est établi.

- *Boutons chroniques rouges sur le nez.

Visage. — *Face pâle, maladire, défaite, cadavéreuse; teint plombé, ou terreux, décoloré, jaunâtre. — *Rougeur circonscrite des joues, avec couleur jaune de la face. — Cercle bleu, autour des yeux. — Petites veines rouges sur les joues. — Bouffissure, quelquefois effroyable, tension et gonflement rouge du visage. — Chaleur et rougeur du visage (pendant le délire). — *Erysipèle à la face, quelquefois avec prurit, boutons ou vésicules, gerçures et suintement corrosif, douleurs brûlantes et gonflement. — Miliaire et boutons au visage. — *Dartre avec croûtes épaisses dans la région des favoris. — Douleurs tensives et formicantes au visage; douleurs dans les os de la face; prosopalgie avec vomissements des aliments. — Lèvres sèches et gonflées:






boutons aux lèvres; tremblement des lèvres. - Faiblesse et paralysie de la mâchoire inférieure, avec distorsion des traits. - Trismus, avec serrement et grincement des dents; claquement des dents.

Dents. — Douleurs térébrantes dans les dents cariées, principalement après le diner, et quelquesois avec gonflement des joues et sensation comme si les dents étaient trop longues. — Maux de dents, tous les matins après le réveil ou toutes les aprèsdinées, avec douleurs déchirantes, tractives et lancinantes dans la racine des dents (de la mâchoire inférieure). - *Mal aux dents, avec douleurs à la tête, frissons, chaleur et jambes lourdes. Les douleurs de dents se propagent jusqu'aux oreilles. --Agacement et vacillement des dents; les dents cariées se ramollissent et s'ébrèchent. — Gonflement et sensibilité douloureuse des gencives. — Les boissons chaudes et froides renouvellent les douleurs.

Bouche. -- Gonflement inflammatoire de la cavité buccale. -Bouche et palais excoriés et très-douloureux. — *Sécheresse de la bouche et de la langue, ou accumulation d'eau dans la bouche, et *salivation. - Langue luisante, rouge et fendillée; ou enflammée, gonflée, brunâtre ou noirâtre. — Roideur, immobilité et paralysie de la langue. — Aphonie ou parole confuse, indistincte; voix nasillarde; difficulté de prononcer telle ou telle lettre et tel ou tel mot; parole plus haute et plus paécipitée qu'on ne le vou-

drait. — Begayement.

Gorge. — *Chatouillement continuel dans la gorge, comme par une miette de pain, ou quelque chose de semblable qui s'y serait arrêté. - *Sécheresse partielle ou générale de la gorge, s'étendant souvent jusqu'aux oreilles, au nez et à la poitrine. — Brûlement et douleur d'excoriation à la gorge, principalement en avalant. - *Excoriation douloureuse et gonflement inflammatoire de la gorge, avec rougeur des parties affectées, comme par du cinabre. — Gonflement des amygdales. — Grandes et *petites tumeurs dans la gorge, qui empêchent la déglutition. - *Besoin continuel d'avaler, et sensation en avalant, comme s'il y avait une tumeur, un morceau, ou un tampon dans la gorge. — Sensation de rétrécissement, de strangulation et de constriction à la gorge. - Gorge comme roide et paralysée. - Convulsions et spasmes dans la gorge. — *Déglutition empéchée, avec horreur des boissons, qui souvent sortent par les narines. — Hydrophobie. - Aggravation des maux de gorge par le plus léger contact et la moindre pression du cou, ainsi qu'après avoir dormi, et en avalant la salive; soulagement en mangeant. - .* Maux de gorge qui n'affectent qu'une petile partie, ou qui, au contraire, se propagent jusqu'aux oreilles, au larynx, à la langue, aux gencives. souvent avec dyspnée et péril de suffocation, saliration et renaclement de mucosités. — *Accumulation abondante de mucosités




404

tenaces dans la gorge. - Maux de gorge alternant avec obturation du nez, ou avec souffrances en parlant. - OUlcères au palais, dans l'arrière-bouche et à la gorge, avec odeur fétide, suppuration abondante, et vives douleurs en avalant les aliments.

Appétit. — Goût désagréable ou sucré, acide, âpre, astringent ou métallique. - *Manque d'appétit et de faim ; inappétence complète pour les aliments ou les boissons. - Répugnance pour le pain, qu'on ne peut pas avaler. - *Appétit irrégulier, tantôt anorexie, tantôt boulimie. — *Faim maladive, avec nausées, bâillements convulsifs et accès de défaillance, si l'on ne mange pas de suite, ou avec pression rongeante dans l'estomac, se renouvelant peu après avoir mangé. — Soif inextinguible. — Désir de vin ou de lait, qui l'un et l'autre cependant incommodent. — *Après avoir mangé, pression à l'estomac, rapports, vertiges, flatuosités, envie de vomir, ou vomissement des aliments, faiblesse dans les genoux, paresse et lourdeur du corps, fatigue de l'esprit, malaise, régurgitation, diarrhée, gêne de la respiration, mal à la tête et aux dents, et exacerbation de toutes les souffrances.

Estomac. — Hoquet après avoir bu, ou fumé du tabac. — Rapports à vide, violents, avec péril de suffocation. — *Rapports qui soulagent les souffrances. — Renvois acides, avec goût des aliments. — Pyrosis depuis la gorge, comme si tout l'œsophage était plein de choses rances. — Nausées et envie de vomir, principalement le matin, ou après le repas, ainsi qu'à la suite de beaucoup d'autres souffrances. - Vomissements violents et convulsifs de tout ce que l'on prend, ou de matières bilieuses, amères, verdâtres. — Vomissement de sang pur, ou de mucosités sanguino-lentes. — Vomissements avec diarrhée, obscurcissement des veux, douleurs d'estomac et diurèse. - *Sensibilité excessive de la région précordiale au moindre contact; les vêtements serrés sont insupportables, et la moindre pression est très-douloureuse. - *Grande faiblesse de l'estomac; il ne peut supporter ni les aliments ni les boissons. - Sensation comme si quelque chose embarrassait le cardia, et empêchait la déglutition. - Pression dans l'estomac et jusque dans la poitrine, et sensation comme si un ver s'y remuait et le rongeait. - (Tous les soirs) crampes et douleurs violentes à l'estomac, avec rapports, vomiturition et vomissement de glaires.

Ventre. — Douleurs hépatiques, brûlantes, tractives, ou încisives. Inflammation et ramollissement du foie. — Abcès hépatiques. - Douleurs et points douloureux dans la région splénique, quelquefois en allant en voiture, ou en marchant. — Grosseur du ventre chez les jeunes filles. — Sensation de vide dans le ventre. - Douleurs abdominales à la suite d'un tour de reins. — *Douleurs généralement pressives, dans la ré-gion ombilicale, quelquefois avec gêne de la respiration, aggra-



405

vation une heure après le repas, et soulagement par les rapports. — Tranchées violentes à rendre fou, ou *tiraillements aigus, avec contraction du ventre. — Brûlement dans le ventre, avec pression sur la vessie. — Inflammation des intestins. — Extravasation de sang au péritoine. — *Ventre ballonné, dur, avec coliques flatulentes, mal au dos, vomissement, diarrhée et diurèse. — Émission fréquente de vents; les vents pénètrent quelquefois dans l'anneau inguinal. — Douleur comme si une hernie allait sortir.

Selles. — Selles tardives. —*Constipation opiniâtre, avec selles dures, difficiles. — Selles petites, insuffisantes et tenaces. — *Constipation alternant avec diarrhée. — Diarrhées arec coliques violentes, nausées, vomissements, angoisse, douleurs au rectum pendant le passage des selles, ténesme et excoriation de l'anus. - *Selles diarrhéiques, principalement la nuit, ou après le repas, ou par un temps chaud (et humide), ou pour avoir pris des fruits et des acides. - Selles involontaires et sans qu'on s'en aperçoive. - Évacuation de matières fétides, ou de selles molles, de la consistance de la bouillie, ou liquides ou gluantes, comme de la poix, ou sanguinolentes et purulentes, ou de matières non digérées, ou de sang pur, ou de mucosités sanguinolentes. Pendant les selles, douleur, ténesme et brûlement à l'anus; après la selle, congestion de sang à la tête, vertiges, faiblesse, douleurs et battements à l'anus.—Constriction douloureuse de l'anus et du rectum. - Chute du rectum pendant la selle. - Sortie de mucosités et de sang par le rectum, quelquefois avec coliques violentes. - *Hémorrhoïdes avec coliques, ou avec brûlement et tranchées dans le rectum, ou avec congestion sanguine à l'anus et diarrhée. — *Hémorrhoïdes saignantes.

Urines. — *Pression sur la vessie, avec envie d'uriner, -ou avec tranchées et brûlement dans le ventre. — *Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante, même la nuit. — Douleur violente, comme si une balle roulait dans la vessie, et de là dans l'urèthre. — Ténesme violent, avec urines peu abondantes. — Paralysie de la vessie. — Élancements incisifs, contiènels, dans l'urèthre. — Petite tumeur de l'urèthre, avec rétention d'urine. — *Urines troubles et brunes, ou rouges, ou jaune foncé, et quelquefois avec émission fréquente, mais peu abondante, ou avec sédiment brun et sablonneux, ou rouge, ou couleur de brique. — Urines écumeuses. — Émission involontaire et inaperçue des urines. — Pendant le besoin d'uriner, douleurs au dos et aux reins. — *Em urinant, sensation de brûlure dans l'urèthre, et beaucoup d'autres souffrances qui viennent toutes par le mouvement de la voiture et après avoir bu du vin. — Douleur d'excoriation à l'urèthre et au gland. — Pissement après la selle et

après avoir uriné.

Parties viriles. — Pression sur les testicules, comme si une her-



nie allait sortir, en faisant des efforts pour uriner. — Boutons aux parties velues. — Beaucoup de désirs vénériens, sans besoin physique et avec flaccidité de la verge. — Érection sans désirs vénériens. — Pollutions nocturnes et diurnes, quelquefois avec faiblesse et sueur. — Écoulement de liqueur prostatique en urinant ou après avoir uriné. — Sperme d'une odeur pénétrante. — Dans le coît, l'éjaculation tarde à avoir lieu, ou manque entièrement. — Sécrétion abondante derrière le gland. — Taches et boutons rouges sur le gland et sur la couronne. — Amincissement du scrotum et durcté des testicules. — Épaississement du

prépuce.

Règles. — Sensation d'une boule qui monte du ventre à la poitrine, comme dans l'hystérie. — Douleurs depuis l'ovaire jusqu'à
l'utérus, avec évacuation de pus pendant les selles. — Enflure
des parties, avec prurit et désirs vénériens. — *Règles faibles,
tardives et de trop courte durée, souvent avec hémorrhoïdes et
beaucoup d'autres souffrances. — *Spasmes abdominaux pendant
les règles. — Avant les règles, douleurs et battements dans la
tête, vertiges, épistaxis, pression à l'estomac, renvois, tranchées
dans l'hypogastre, écoulement muqueux par l'urèthre et crampes
de poitrine. — *Avant et après les règles, diarrhée avec fortes
coliques. — *A l'apparition des règles, maux de reins, avec douleur de brisement dans les hanches et la poitrine. — Pendant
les règles, maux de reins, comme pour l'enfantement, battements
à la tête et tranchées. — Avortement. — Le lait des personnes

mordues par ce serpent devient venimeux et se caille.

Larynx. — Catarrhe, avec toux, coryza, douleurs lancinantes à la tête, roideur de la nuque et affection de poitrine. — Enrouement continuel, avec sensation, comme s'il y avait quelque chose dans la gorge qui empêchât de parler et qui ne pût se détacher. - Etranglement et constriction du larynx, avec sensation de gonflement et de tension. - Sensibilité douloureuse du larynx et du cou, au toucher et à la plus légère pression, avec péril de suffocation en tâtant le gosier et en renversant la tête. -Sensation de pulsation et d'étouffement entre le larynx et la poitrine. - Sécheresse, brûlement et douleur d'excoriation au larynx. - Sensation d'une boule dans le arynx. - Voix faible, creuse, nasillarde. — *Toux souvent fatigante, dont tous les efforts ne peuvent rien détacher, excitée le plus souvent par un chatouillement dans le larynx, dans la poitrine et au creux de l'estomac, ou par la pression du gosier, ainsi que par la conversation, la marche et tout ce qui peut augmenter la sécheresse de la gorge. - *Toux toujours après avoir dormi, ou la nuit, en dormant, ou le soir, après s'être couché, ainsi qu'en se levant-de la position couchée. - *Toux sèche et courte, suffoquante et croassante, quelquefois avec vomissement. - Crachats muqueux, tenaces ou acides, et d'un goût désagréable, ou sanguinolents.-



LACHESIS.

407

Hémoptysie. — En toussant, accumulation d'eau dans la bouche, douleurs vives au creux de l'estomac, secousses dans la tête et

tension aux yeux.

Poitrine. — Respiration courte, fréquente, ou convulsive, ou râlante, ronflante et croassante, ou suspirieuse, gémissante et profonde. — Besoin fréquent de respirer profondément. — *Dyspnée et oppression de poitrine, avec de grands efforts pour respirer. -*Haleine courte, principalement après le repas, en marchant, après un effort des bras, et quelquefois avec tristesse, ou avec toux asthmatique. - *Accès d'asthme, et gêne de la respiration, principalement après avoir mangé, ou le soir en se couchant. ou la nuit, pendant le sommeil, et quelquefois avec angoisse, soif, nausées, vomissement, défaillance et sueur froide. — *Accès de suffocation, surtout en étant couché, le soir ou la nuit au lit, et principalement lorsque quelque chose vient se placer devant le nez ou la bouche. — Orthopnée paralytique. — Haleine d'une odeur très-désagréable. - Pression à la poitrine, comme par un poids, ou comme si elle était remplie de vents, et principalement la nuit. — Douleurs violentes, avec grande angoisse et mouvements continuels dans la poitrine. — Brûlement et douleur d'excoriation dans la poitrine, comme si tout était à vif, principalement après le repas. — Points dans le côté et dans la poitrine, aggravés en respirant, et quelquefois avec toux et crachats sanguinolents. — Extravasation de sang dans les poumons. — Gangrène des poumons. - *Battements de cœur, avec anxiété, excités quelquefois par des douleurs crampoïdes avec toux et accès d'étou mement. - Spasmes au cœur (avec anévrisme de la carotide droite) et pulsation désagréable aux oreilles. — Points dans la région du cœur. avec haleine courte, accès d'évanouissement, et sueur froide.

Tronc. — Enflure et bouffissure des téguments de la poitrine. —
Prurit, plaques rouges et éruptions miliaires à la poitrine. —
Nuque et cou excessivement sensibles à la moindre pression.
— Roideur rhumatismale de la nuque et du cou. — Points au dos et entre les épaules. — Petite tumeur près de l'épine dorsale. —
Brûlement au dos. — Spannes des muscles du dos. — *Roideur douloureuse depuis les reins, jusqu'à la hanche, comme si les muscles étaient trop courts. — Douleurs nocturnes, insupportables, au dos, aux reins, à la hanche et au genou. — Manque de force dans le dos et les genoux, qui force à marcher courbé. —
Douleur de luxation dans les reins, comme après des efforts. —
Papules, vésicules, dartres, boutons et taches écarlates sur le dos et les omoplates.

Bras. — Douleurs rhumatismales, arthritiques et ostéocopes, aux bras, aux mains, aux doigts et aux poignets. — Olicère malin au haut da bras. — Tension comme par raccourcissement des tendons, depuis le coude jusqu'aux doigts.—Inflammation érysipéla-



408 LACHESIS. — LACHNANTHES TINCTORIA.

teuse au coude. — Élevures aux bras, après avoir gratté. — Sensation de fatigue ou de paralysie, et douleur de luxation dans les bras. — Paralysie des mains. — *Tremblement des mains. — Mains sèches et brûlantes. — Bouts des doigts engourdis, douloureux. — *Piqûres au bout des doigts. — Prurit, *éruptions galeuses, — plaques rouges avec vésicules, furoncles, excroissances et verrues aux mains et aux doigts. — *Gonflement noir, bleuâtre, dur et froid, au dos de la main et des doigts. — *Gonflement dur de la main jusqu'au coude, avec douleurs excessives. — *Panaris.

Jambes. — *Sensation de raccourcissement, et raccourcissement des tendons du jarret. — Douleurs nocturnes dans la hanche et la cuisse. — Douleurs vives et tractives aux jambes pendant les changements de temps et un temps venteux. — Furoncles aux cuisses. — Sensation de pesanteur, de paralysie, d'engourdissement, et tremblement aux cuisses et aux genoux. — Genoux comme disloqués, roides et faibles. — Crampes et douleurs dans les mollets. — Elevures rouges aux cuisses et aux jambes après s'être gratté. — Plaques excoriées et ulcères superficiels à fond sale aux jambes. — *Gonflement douloureux, rouge ou bleudtre, des pieds et des jambes. — Pesanteur, engourdissement, froid glacial, sueur des pieds. — Prurit, *éruptions galeuses, papules et taches de brûlure aux pieds et aux jambes. — Gerçures et rhagades entre les orteils. — Abcès aux talons.

LACHNANTHES TINCTORIA.

LACHN. - Lachnanthes. - Voy. HALE, Remèdes américains.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — La plupart des souffrances s'aggravent dans la position couchée, et s'améliorent en marchant; Aggravation de la plupart des symptômes dans l'après-midi, et de la fièvre, la nuit, de 1 à 2 heures. — Sensation d'une grande faiblesse, comme à la suite d'une perte d'humeurs. — Somnolence avec bàillements et paupières lourdes. — Froid dans le dos, entre les omoplates, comme s'il y avait là un morceau de glace, puis sensation d'une secousse avec froid par tout le corps et chair de poule, le tout se renouvelant par le mouvement; fièvre avec délire violent, rougeur circonscrite des joues, yeux étincelants et aggravation, de 6 heures du soir à minuit; fièvre avec somnolence; sueur froide, au front surtout. — Prurit et brûlement par toute la peau du corps, plus fort après s'être gratté. — Grande loqua-cité, suivie de stupidité et d'irritabilité.



410 LACHNANTHES TINCTORIA, - LACTUCA VIROSA.

de couteau, dans le côté droit de la poitrine. — Bouillonnement dans la région du cœur, avec ascension vers la tête, vertige et sueur; sensation de chaleur dans la région du cœur; élancements au cœur, avec inquiétude; palpitations fréquentes et violentes; chaque coup est double, l'un dur et plein, l'autre mou et

petit; tremblement du cœur, avec grande faiblesse.

Tronc et Membres. - Dans la nuque, roideur et douleur, se répandant par toute la tête jusqu'au nez, avec sensation comme si les narines fussent contractées; sensation de luxation de la nuque, en tournant ou en renversant la tête; roideur du cou qui tire la tête de côté (comme à la suite de la scarlatine ou de la dyphthérite). Sensation de froid entre les épaules, comme s'il y avait la un morceau de glace ou qu'on y fut mouillé par de la sueur froide; brûlement dans la région du rein droit, se répandant vers le côté gauche; brûlement dans l'os sacrum. - Déchirement : dans l'articulation des coudes; dans les condyles des doigts, ou depuis les épaules jusque dans les articulations des doigts. -Déchirement dans le genou droit; brûlement et élancements, au dessus, au dessous et en dedans de la rotule; petites vésicules sur les fesses, laissant suinter une humeur aqueuse après s'être gratté; fourmillement dans les deux extrémités inférieures, pire dans la chaleur; brûlement dans la plante des pieds et la paume des mains; crampe dans les pieds, la nuit.

LACTUCA VIROSA.

LACTUCA. — Laitue vireuse. — Journal fur arznei mittel lehre, t. II, 4. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 237. — Durée d'action: jusqu'à 24 heures.

ANTIDOTES: Les acides végétaux et le café.

N. B. Les symptômes suivis d'un (s) appartiennent au lactucarium, préparé avec du loctuca sativa.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Semble agir de préférence sur les organes de la respiration. — Tiraillements dans les membres et le dos, ou bien périodiques à diverses parties (s); déchirements qui royagent d'abord dans l'articulation de l'épaule et du coude droit, puis tantôt dans le poignet, tantôt dans les genoux, la cuisse, l'articulation du pied, à la nuque, dans les tempes, etc.; bouillonnement douloureux dans les membres, l'après-midi, en étant assis tranquillement; tressaillement aigu, crampoïde, près des articulations (à la nuque, les hypocondres, les coudes, les hanches), le plus souvent le soir, et dans le repos, quelquefois aussi pire le matin, et surtout du côté des extenseurs; douleurs crampoïdes, qui reparaissent bientôt à d'autres parties et gènent



411

l'usage de ces parties (surtout aux coudes, aux mains, aux doigts aux jambes); brisement de tous les membres; forçant à passer tout le jour au lit. — Démarche mal assurée, on bronche en marchant (s); convulsions dangereuses chez les femmes (s). — Abattement général, quelquefois avec lassitude et immobilité; forte fatigue, grande lassitude (aussi s); quelquefois avec besoin de dormir; ou bien le matin, après s'être levé, avec inaptitude au travail; après la moindre occupation, irritation et lassitude, comme après de grandes fatigues. — Sensation indicible de légèreté dans le corps (s); sensation de force vivifiante chez une personne hystérique (s); besoin de se tenir droit, en étant assis. — Au grand air, bien-être plus grand et surtout la poitrine plus libre; légèreté inaccoutumée dans le corps (s); allégement des symptômes, surtout par le mouvement au grand air; désir du grand air.

Peau. — Pincement lancinant et cuisson sous-cutanée çà et là, ou bien aussi élancements. — Inflammation et éruption (par des applications sur des parties délicates de la peau). — Gonflement adémateux de tout le corps, avec affections asthmatiques, tête entreprise, position sur le dos pénible, horripilation, absence

d'appetit, toux courte et pouls petit et plein.

Sommeil. — Baillements fréquents; baillements et pandiculations (s); Grande envie de dormir pendant le jour (s aussi); avec fatigue et lassitude; avec baillements fréquents (s aussi), le soir de bonne heure obligeant à se coucher tôt; sommeil invincible (s); on s'endort en travaillant; coma, quelquefois avec dégoût (s); envie de dormir sans pouvoir s'endormir; sommeil profond de plusieurs heures, quelquefois même avec pouls un peu fréquent. Sommeil nocturne : paisible, réparateur (s aussi); solide, rempli de rêves, ou bien aussi sans rêves; solide, avec écoulement de sperme inaperçu (s); sommeil nocturne étourdissant, avec difficulté de se réveiller le matin ; agité, non réparateur (s aussi): sommeil long, agité (s); réveil fréquent, presque tous les quarts d'heure. - Impossibilité presque complète d'être couché sur le dos (à cause des symptômes asthmatiques) et en même temps tension dans le creux de l'estomac; on aime à être couché la tête haute et du côté droit. - La nuit au lit : forte oppression de poitrine, qui réveille pendant le sommeil et oblige à se mettre promptement sur son séant, avec anxiété, sensation de grande fatigue le matin (s); gêne de la respiration, avec douleurs pressives et saisissantes dans la poitrine, qui ne permettent que peu de sommeil; egêne de la respiration qui empêche de dormir, avec battement pulsatif dans la tête, et en même temps, battement de cœur, suivi de douleurs déchirantes dans la tête, avec pesanteur et hébétude, douleurs de tête; toux spasmodique et chaleur fébrile, avec rèves dont on n'a pas conscience et sommeil agité. — Réves : fantastiques, pendant un sommeil agité;



LACTUCA VIROSA.

vifs et quelquefois anxieux (de suicide par arme à feu), pendant un sommeil profond; vers le matin, quelquefois singulier et comme s'il décrivait un cercle en tournant sur un pied; sommeil toute la nuit avec une foule de rêves. — Le matin au réveil: sensation comme si la tête était vide; difficulté à chasser le sommeil; grande lassitude, après un sommeil agité, avec oppres-

sion (s).

412

Fièvre. -Froid parcourant souvent le dos et la tête (s aussi). quelquefois avec chaleur de la face (s), ou bien avec frisson dans la chambre chaude, et froid aux pieds et aux mains ; frisson facile pendant la journée, même dans la chambre chaude; horripilation, qui quelquefois semble glisser sous les cheveux. — Fièvre, avec fortes douleurs de tête, sensibilité douloureuse du cuir chevelu au toucher, déchirements dans les articulations des membres (de même que dans la nuque et la face), grande pesanteur de la tête, le soir, qui force à la pencher en avant, chaleur pénible et très-sèche à la tête et à la partie supérieure du corps, avec froid gla-cial des pieds, et en même temps ardeur et larmoiement des yeux, quintes d'une toux sèche, suffoquante et spasmodique, avec ébranlement violent dans la poitrine et la tête et contractions spasmodiques et douloureuses des vertèbres lombaires et de la région des hypocondres. - Sensation de chaleur, d'une sécheresse insupportable, surtout aux jambes, qui sont douloureuses, comme après une très-grande course, le matin de 3 à 6 heures. Pouls lent (s aussi); lent et tendu; rare, même jusqu'à 10, 12 pulsations (s), - Transpirations abondantes; fortes sueurs (s); sueur nocturne générale et douce (s).

Moral. — Humeur mélancolique, chagrine; semble favoriser la tristesse, avec idées exaltées et exagérées, de telle sorte que de la chose la plus simple, il redoute les conséquences les plus terribles et les plus inquiétantes; après un chagrin, le soir, douleur étour-dissante dans le front et contractions violentes dans la gorge, avec envie continuelle de pleurer. — Angoisse et agitation intérieure. — Mauvaise humeur excessive, à la moindre contrariété; mauvaise humeur, humeur chagrine, avec inaptitude au travail et impossibilité de rester au lit; humeur acariâtre, la moindre

chose suffit pour le monter.

Tête. — Difficulté de réfléchir (s), inaptitude aux travaux de l'intelligence, parce que les idées s'embrouillent et qu'il lui est impossible d'embrasser l'idée générale; il cherche de côté et d'autre avant de trouver quelque chose. — Embarras de la tête: le matin, quelquefois avec pesanteur, comme par plénitude; dans le front, quelquefois avec sensation de chaleur de cette partie, quelquefois dans la bosse frontale droîte, quelquefois dans la gauche (extérieurement), avec élancement qui traverse celle de gauche, en se baissant; sensation d'étourdissement et de vertige; tête embrouillée, quelquefois le matin, en se levant, — Sensation



yeux, surtout aux paupières (quelquefois seulement le jour en écrivant, ou bien surtout à l'œil droit, avec trouble de la vue et pupilles dilatées). — Rougeur de la conjonctive, avec augmentation de la sécrétion muqueuse, chez des hommes d'un âge avancé, avec pléthore abdominale. — Paupières recouvertes de chassie. — Pupilles dilatées (s). — Trouble de la vue; vue faible, quelquefois avec ardeur dans les yeux; vue faible, trouble (s); vue empêchée, comme par un nuage on un voile qui quelquefois se dissipe en fixant attentivement un objet, mouches volant devant les yeux, en se baissant, après le repas.

Oreilles. — Tiraillement dans les oreilles; élancements suivis de tension dans l'oreille gauche. — Bourdonnement dans les oreilles;

résonnement devant les oreilles, le soir, au lit.

414

Nez. — Sensation d'écartement dans le bout du nez. — Odeur spécifique devant le nez et goût analogue dans la bouche. — Éternument fréquent, avec aggravation des symptômes de la poitrine, ou bien avec poitrine douloureuse (quelquefois comme par une exceriation qui plus tard se transforme en pression). — Coryza qui laisse de l'exceriation et de la sécheresse dans le nez.

Face. — Mauvaise mine (s); visage pâle, défait; chaleur de la face, avec tremblement et sensation de gonflement des lèvres (s). — Fourmillement tensif dans la face; tiraillement picotant depuis la glande sous-maxiliaire droite jusque dans l'oreille et la langue; élancements au menton, à la sortie du nerf sous-maxillaire. — Dans les lèvres : frémissement; gonflement des glandes lymphatiques.

Dents. — Douleur rapide dans les molaires gauches de la mâchoire inférieure, comme si on tournait la dent affectée. — Gencive

douloureuse, en mâchant à la place où était une dent.

Bouche. — Sensation de tension dans le fond de la bouche et au palais, qui force à cracher constamment; accumulation de salive plus abondante, quelquefois d'un goût acidulé; sécheresse de la bouche, sans soif. — Langue : chargée d'un enduit blanc (s aussi); enduite de mucosités épaisses (s); douloureuse comme si elle était brûlée à la pointe; contraction au-dessous de la langue.

Gorge. — Brûlement léger dans la gorge, quelquefois le soir; sensation dans la gorge comme si cette partie était exposée à la chaleur d'un feu ardent. — Déglutition gênée, avec sensation comme si la luette était à vif, avec brûlement, ou bien comme si les muscles du pharynx refusaient leur service. — Accumulation de mucosités dans la gorge; mucosités visqueuses dans la gorge.

le matin (s aussi).

Appétit — Goût: — Goût: fade dans la bouche (s); amer, quel-quefois après avoir mangé des tartines de beurre; amer, comme du fiel, dans la gorge. — Absence d'appétit (s aussi); l'appétit est nul à midi, le manger répugne; appétit nul pour le pain et la



416

dant et après le repas, jusqu'à forcer à se tordre. - Douleurs incisives dans le ventre (tranchées): à diverses parties, avec pincements; dans tout le ventre, avec borborygmes douloureux et suivis d'une selle diarrhéique muqueuse. - Sensation de chaleur désagréable dans le ventre, bouillonnement fréquent, remontant du ventre dans la poitrine. - Sensation de pesanteur dans le ventre qui presse vers le bas, après le déjeuner; sensation comme si on avait un fardeau sur le ventre, principalement sur l'ombilic et le creux de l'estomac, pire étant debout. — *Affections du système de la veine-porte? — Hydropisie abdominale (à la suite d'une fièvre intermittente avec constipation), avec gonflement très-volumineux du ventre, des pieds et de la face; oou bien avec induration du foie et asthme. — Sensation de plénitude dans le ventre, quelquefois avec borborygmes et émission de vents; sensation de plénitude dans le côté droit, avec gêne de la respiration et soulagement par des renvois et l'émission de vents (s); tension du ventre, surtout dans la région hépatique, le soir. Mouvement de flatuosités dans le ventre; borborygmes abondants dans le ventre, quelquefois pendant le repas, ou bien après (avec élancements au-dessous du précord, ou bien avec pincement dans le ventre), ou encore principalement dans la région ombilicale; émission de vents abondants, quelquefois fétides (à la suite de borborygmes), ou bien le soir, précédée de pincements.

Selles et Anus. — Constipation; point de selle le premier jour, ou bien elle ne vient que plus tard et est dure; °la constipation habituelle diminue. — Selle seulement à la suite de besoins et de pincement; besoin d'aller à la selle, avec sensation de lassitude extrême, et avec évacuation difficile et rare; selle précédée de ténesme, dure, et ne s'évacuant qu'avec effort, avec douleur persistante de meurtrissure à l'anus; selle insuffisante. - Selles dures; dures et tardives, sèches, dures, difficiles, et seulement avec efforts; dures, noueuses, avec brûlement à l'anus, à la suite d'une constipation de deux jours; selles au total plus rares et plus fermes. - Provoque des selles faciles (s ?), facilite les évacuations intestinales (s?); selles molles, ou bien aussi en bouillie les premiers jours; évacuations fréquentes, en bouillie (s); Diarrhée (s); quelquefois diarrhée, une fois constipation (s). — Pendant la selle: lassitude générale, fatigue au point de s'endormir, bâillement et accumulation d'eau dans la bouche; après la selle (molle), pression à l'anus. - A l'anus : tiraillement ; picotement, vers le soir : boutons hémorrhoïdaux autour de l'anus, avec ténesme dans le rectum et nouvelle évacuation d'une selle liquide, après chaque selle ferme.

Voies urinaires. — Besoin d'uriner, avec tiraillements fréquents dans le gland qui parcourent tout le corps. — Sécrétion d'urine augmentée (s aussi); émission d'urine plus fréquente et plus abondante; il faut se lever la nuit pour uriner; pression sur la



417

vessie, vers le matin, par l'accumulation de l'urine, qui est plus abondante. — *Urine claire comme de l'eau*. et en même temps plus abondante et plus fréquente; jaune clair, avec odeur de violette; brune, chaude et brûlante dans l'urèthre. — *Dans l'urèthre*, sensation continuelle, en étant assis, comme si une goutte y coulait; ardeur à l'orifice. — *Dans la région de la vessie*,

pression comme par besoin d'uriner.

Parties génitales. — Dans la verge, gonflement d'un vaisseau lymphatique à la suite d'érections matutinales; tiraillements à la naissance de la verge, ou bien aussi au cordon spermatique droit et le long de la face interne de la cuisse. — Appétit vénérien diminué; chasse la lascivité et les rêves voluptueux (s); érections douloureuses, dans le sommeil du matin; pollutions, quelquefois pendant les rêves lascifs dans le sommeil du matin, ou bien deux, dans une nuit, sans en avoir conscience, pendant un sommeil profond. — Règles trop hâtives, de 6 jours, ou bien de 4 (avec douleurs crampoïdes dans le ventre). — Favorise les règles (s). —

Augmente le lait dans les seins (s). Larynx et Toux. — Voix beaucoup plus étendue. — Rudesse dans la gorge : après la lecture à haute voix; dans le pharynx; dans le larynx, forçant à respirer profondément; avec grattement dans la gorge (s); sécheresse et grattement dans le pharynx et dans le haut de la poitrine; enrouement, le soir, ou bien aussi le matin, avec rudesse dans la gorge; sensation de plénitude dans le larynx, diminuée en renversant le tronc en arrière ; besoin fréquent de toussoter; OSensation continuelle de plénitude dans le larynx, avec irritation de toux suffoquante, parole gênée et toux fréquente avec expectoration. - Toux par chatouillement dans la gorge: quelquefois avec sensation d'oppression de la poitrine; avec sensation de sécheresse brulante dans la gorge; fréquente; sèche de temps en temps, ou bien par mouvements courts, avec ébranle-ment de la poitrine, de même que du ventre et de l'occiput; sèche, aboyante, douloureuse, provenant d'une toux déjà existante, avec expectoration facile à détacher; spasmodique, creuse et sèche, ou bien excessive et menaçant de briser la poitrine, provoquée par un chatouillement dans le gosier ; ola toux sèche provenant d'une toux déjà existante et paraissant surtout selon les variations de l'atmosphère, disparaît complétement. — Excrétion de mucosités par la toux (qui était sèche auparavant?) et les mouvements sont plus vigoureux et plus longs; expectoration abondante de mucosités par une toux courte. - Pendant la toux ou la tussiculation, aggravation des douleurs de poitrine; otoux suffoquante sèche chez une personne hystérique, avec insomnie persistante et sensation rongeante de froid, dans l'estomac et le creux de l'estomac.

Poitrine et Respiration. — Dyspnée; respiration courte, gênée (s); géne de la respiration, avec élancements dans l'aile du poumon gauche, on bien avec pression dans le creux de l'estomac;



respiration rapide, par affluence et bouillonnement dans la poi-

trine; besoin fréquent de respirer profondément, surtout en étant assis replié sur soi-même; respiration comme insuffisante, en marchant et en se tenant debout, à cause d'une constriction spasmodique dans les régions ombilicale et précordiale, avec besoin fréquent de respirer profondément; en respirant profondément, sensation comme si la respiration ne remplissait pas la poitrine. Asthme, gêne de la respiration ou de la poitrine (s aussi): comme si le bas de la poitrine était trop étroit, avec crainte de respirer profondément, parce qu'alors on éprouve chaque fois une secousse; forte, la nuit, tirant du sommeil, et forçant à se mettre promptement sur son séant, avec angoisse (s); fréquente, avec pesanteur sur la poitrine, besoin de respirer profondément et soulagement momentané en baillant et en s'étirant; comme par des exhalaisons corrosives, le soir au lit, avec toux suffocative, creuse; oavec besoin continuel de se replier sur soi-même en étant assis, parce que sans cela tout gêne comme si c'était trop étroit; comme si le thorax était trop étroit, comprimé ou resserré. surtout en étant assis replié sur soi-même, ou bien avec fréquente gêne constrictive dans la partie inférieure de la poitrine; sensation de constriction spasmodique dans la région des hypocondres, surtout à droite. - Oppression de poitrine, ou gene de la respiration (s aussi): obligeant à respirer profondément (s aussi), quelquefois avec besoin de bâiller et anxiété, ou bien soulagée en se levant après avoir été assis plié ou en effaçant le haut du corps; avec douleur sourde au-dessous du sternum; forte, avec gêne fréquente à des parties circonscrites de la poi-trine; légère des deux côtés et au-dessous du sternum, suivie de sensation de chaleur à la paroi opposée de la poitrine.—Sensation de plénitude dans la poitrine : anxieuse ; aggravée vers le soir ; au-dessous du sternum et vers la clavicule gauche, avec besoin de respirer profondement; dans toute la poitrine avec tressaillement léger et douleur de brisement dans la poitrine. - Sensation de pesanteur sur la poitrine : avec gene de la respiration ; comme si on avait un quintal sur la poitrine, avec besoin d'écarter les vétements; le soir, avec sensation de plénitude dans le pharynx; en se promenant au grand air, comme si on avait un fardeau étranger sur la poitrine; périodique, augmentant et diminuant, avec serrement, oppression et augmentation de chaleur dans la poitrine. — Les symptômes de la poitrine sont soulagés lorsqu'ou se met sur son séant, on ne peut supporter rien de serré sur le thorax (parce que cela gêne la respiration). - Asthme convul-

sif, quelquefois dans une affection organique du cœur ; °accès de suffocation, dans une hydropisie de poirtine ; °hydropisie de poitrine, avec gonflement général, anxiété, manque de respiration en étant couché, forçant à se mettre sur son séant; toux courte, sèche, grande faiblesse, envie de dormir irrésistible après midi et



LACTUCA VIROSA. — LAUROCERASUS.

420

l'articulation de l'épaule et du coude droit, et plus tard tantôt dans le poignet, tantôt à d'autres parties; élancements déliés au-dessous du droit. — Grande fatigue du bras droit : — Dans le haut du bras, tiraillement et sensation de faiblesse; douleur crampoîde à l'extrémité inférieure; douleur de luxation au muscle triangulaire gauche, seulement lorsque le bras est plié. - Dans le coude, tiraillement sourd à la pointe. - A l'avant-bras droit, déchirement, suivi de sensation paralytique du petit doigt. — Dans les mains, tressaillement douloureux; tiraillement dans la gauche, quelquefois spasmodique dans l'articulation; tremblement des mains (s). - Dans les doigts, sensation de chaleur. suivie de faiblesse persistante de ces parties; déchirements dans le métacarpe des deux mains, prurit fourmillant aux doigts de la

main gauche. Extrémités inférieures. - Dans les jambes : grande fatigue; tremblement et lassitude; lourdeur, quelquefois surtout en marchant, avec tension dans les jarrets; elles s'endorment fréquem-ment, quelquefois en étant assis. — Dans les cuisses, brisement avec tension dans les jarrets, en se levant de son siège; tressaillement dans la cuisse gauche. - Dans les jambes : sensation de stagnation de sang, quelquefois en étant assis, avec lourdeur ou bien seulement dans la droite pendant le repos et avec tiraillements; douleur tiraillante dans la droite avec sensation de roidissement, quelquefois remontant jusqu'à la hanche; tremblement dans la jambe gauche, l'après-midi; crampe dans le mollet gauche, en marchant. - Dans les pieds : douleur à la plante du pied gauche, pendant le repos, comme s'il avait sauté sur une pierre, se dissipant en appuyant le pied; froid aux pieds. - Aux orteils : prurit formicant (au pied gauche) ; douleur dans le gros orteil gauche, comme s'il était difforme et renversé en arrière, en appuyant le pied; douleur comme d'ulcération sous-cutanée, audessous de l'ongle (le 4me).

LAUROCERASUS.

Voy. Pharmac. homosop., p. 238. — Doses usitées: 3, 30. — Durée d'action: 6 à 8 jours quelquefois.

Antidotes: Camph. coff. ipec. op.

COMPARER AVEC. Appr. coff.

COMPARER AVEC : Amm. canth. chin. coff. ipec. kal. merc. n-vom. op. rhus. sec. spig. veratr.

CLINIQUE. - On n'a jusqu'ici encore employé ce remède que contre : Cyanose (?); Phthisie florissante et Choléra. Voy. la note, page 15.



LAUROCERASUS.

421

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tressuillements conculsifs et spasmes par accès. — Inflammation des organes internes. — Tremblement, surtout des mains et des pieds, pendant l'exercice en plein air. — Faiblesse subite, avec accablement nerveux, excessif. — (Apoplexie avec paralysie des membres.) — Évanouissements. — Douleurs tractives et déchirement dans les membres. — Manque d'énergie de la force vitale. — Convulsions épileptiques avec écume à la bouche. — Tétanos. — Aggravation des souffrances, le soir; amélioration la nuit, et au grand air.

Sommeil. — Bâillements fréquents, souvent accompagnés d'horripilation avec chair de poule. — Envie de dormir insurmontable, le jour et le soir de bonne heure. — Somnolence, parfois comme un coma vigil. — Insomnie par surexcitation et accès de chaleur.

-Réves pénibles et agités.

Fièvre. — Frissonnement et frissons fébriles, ne se dissipant ni à la chaleur du feu ni à celle du lit. — Horripilation avec chair de poule, suivie de chaleur brûlante. — Froid de tout le corps, mais surtout des pieds, principalement au grand air. — Manque de

chaleur naturelle. - Pouls faible, lent et irrégulier.

Moral. — Abattement moral. — Forte anxiété, appréhension et agitation, qui ne permettent de rester nulle part, ni de s'endormir le soir, mais qui se dissipent au grand air. — Répugnance pour le travail de l'esprit. — Promptitude et précipitation morale. — Faiblesse de la mémoire. — Incapacité intellectuelle. —

Esprit obtus et perte de connaissance.

Tête. — Étourdissement avec chute et perte de connaissance.

Ivresse et vertige, avec envie de dormir. — Vertiges en se relevant après s'être baissé, ou en se levant de son siège, avec un voile devant la vue, ou avec sensation comme si tous les objets tournaient en rond. — Mal de tête stupéfiant et gravatif avec sensation, comme si, en se baissant, le cerveau tombait en avant et se heurtait contre le crâne. — Mal de tête pressif, très-violent dans l'appartement. — Froid continuel dans la tête. — Congestion à la tête avec chaleur et battement. — Les maux de tête se dissipent par une sensation de froid au vertex, dans le front, la nuque et jusque dans les reins.

Teux. — Douleur brùlante dans les yeux. — Sécheresse des yeux. — Yeux largement ouverts ou à demi fermés, convulsés, proéminents et fixes. — Pupilles dilatées, immobiles. — Obscurcissement de la vue. — Tous les objets paraissent plus gros qu'ils

ne le sont en effet.

Visage. — Teint pâle, blafard et gris. — Visage have, ou boufli et gonflé. — Distorsion des traits. — Crampes de la mâchoire. — Tressaillements des muscles de la face. — Éruption autour de la bouche

Bouche. — Bouche sèche et pâteuse. — Écume à la bouche. — Sensation de froid sur la langue. — Perte de la parole.

JAHR. - 8º édit., Ire part., t. II.



LAUROCERASUS.

122

Gorge. — Mal de gorge, avec sensation douloureuse comme si elle était tirée en bas, pendant et hors le temps de la déglutition. — Crampes dans le gosier et l'æsophage. — On entend le bruit que font les boissons pendant qu'elles descendent. — Déglutition empêchée ou gênée. — Sensation de froid, ou chaleur et douleur brûlante dans la gorge et dans le fond du palais.

Appétit. — Goût douceâtre, ou âcre et excitant. — Soif ardente, avec sécheresse de la bouche. — Absence d'appétit avec répu-

gnance pour tous les aliments. - Faim excessive.

Estomac. — Renvois à vide violents, ou avec goût des aliments. —
Fort dégoût, nausées et vomissement, même des aliments. —
Vomissement de matières noires. — Pression à l'estomac. —
Maux d'estomac jusqu'à faire évanouir. — Grande angoisse
dans la région précordiale. — Sensation de froid ou brûlement
dans l'estomac et l'épigastre. — (Inflammation de l'estomac).

Ventre. — Coliques au-dessous de l'ombilic comme si on coupait les intestins. — Sensation d'un gonflement de la grosseur d'une noix, dans le côté gauche du bas-ventre. — Tranchées, crampes et contractions dans le ventre. — Sensation de froid, ou chaleur et brûlement dans le ventre. — (Inflammation des intestins.)— Coliques flatulentes. — Borborygmes, grondement et gargouillement dans le ventre et l'estomac. — Pincement dans la région ombilicale.

Selles. — Constipation. — Selles dures, tenaces, avec efforts. — Diarrhées avec ténesme, douleurs incisives et brûlement à l'anus. Diarrhées de mucosités verdâtres, avec contraction dans les aines. Selles involontaires. — Paralysie du sphincter de l'anus.

Urines. — Rétention d'urines. — Urine aqueuse, jaune pâle. — Urine écumeuse, âcre. — Sédiment épais, rougeâtre, dans les urines. — Émission involontaire des urines. — Paralysie de la vessie. — Pendant l'émission des urines, douleur dans la région de l'estomac.

Parties génitales. — Exaltation de l'appetit vénérien. — Gangrène des parties génitales. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Pendant les règles, déchirement dans la tête, odontal-

gie et tranchées.

Larynx. — Enrouement, âpreté et grattement dans la gorge et le pharynx. — Sensation de gonflement du pharynx. — Voix grave de basse-taille. — Constriction spasmodique de la trachée-artère. — Petite toux courte, provoquée par un chatouillement et un grattement dans la gorge. — Expectoration gélatineuse, abondante, avec petits points de sang.

Poitrine. — Respiration lente, faible, anxieuse. — Respiration râlante, ronflante. — La respiration est arrêtée dans la région de l'estomac. — Respiration asthmatique, comme si les poumons ne pouvaient pas assez se dilater, ou comme par paralysie des poumons. — Pression à la poitrine. — Constriction de poitrine.



LAUROCERASUS. — LEDUM PALUSTRE.

423

avec oppression. - Brûlement et élancements dans la poitrine. - Douleurs dans la région du cœur. - Battement du cœur,

irrégulier et lent.

Membres. — Tiraillements aigus et élancements dans les épaules et les bras. - Sensation brûlante dans les mains, avec gonflement des veines à ces parties. — Tremblement des mains. — Peau sèche et râpeuse, entre les doigts. — Tiraillements aigus et élancements dans les genoux. - Engourdissement des pieds.

LEDUM PALUSTRE.

LED. — Romarin sauvage. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 239. — Doses usitées : 45, 30. — Darée d'action : 6 à 7 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTE: Camph.

COMPARER AVEC: Alum. ars. bry. canth. cham. lyc. merc. puls. rhus. sep. thui. — Ce médicament convient quelquefois après lyc. — Après ledum conviennent quelquefois: Chin. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : —
Affections arthritiques et rhumatismales; Nodosités arthritiques; Affections hydropiques; Dartres et autres éruptions chroniques; Anasarque; Furoncles; Coma somnolent?; Céphalalgie congestive ou rhumatismale?; Ophthalmies rhumatismales et arthritiques?; Dureté de l'ouie (par refroidissement de la tête pour s'êtrefait couper inopportunément les cheveux); Dartres et autres éruptions à la face; Hémorrhagie nasale et buccale ?; Ascite?; Diabète?; Gonorrhée chronique?; Laryngite chronique (Phthisie laryngée)?; Toux convulsive; Coqueluche?; Phthisie pulmonaire?; Pneunomie chronique?; Podagra?, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs arthritiques pressives, et tiraillantes aiguës, ou simplement pressives, dans les membres, aggravées le soir à la chaleur du lit.-Engourdissement et sensation de torpeur dans quelques membres. - Douleurs dans les articulations, déchirantes ou lancinantes pulsatives et paralytiques, aggravées par le mouvement. - Les douleurs dans les articulations sont les seules qui s'aggravent par le mouvement; il n'en est pas de même des autres. - Nodosités goutteuses dans les articulations. - Gonflements durs, chauds, tendus, avec douleurs déchirantes. -*Gonflements hydropiques de quelques



LEDUM PALUSTRE.

424

parties, ou de toute la peau du corps. - Froid et manque de chaleur vitale. - La chaleur du lit est insupportable, et provoque de la chaleur et un brûlement dans les membres.

Peau. — Prurit et rongement à la peau, avec brûlement après s'être gratté. - Démangeaison rongeante, comme par des poux. - Éruptions miliaires. - Eruptions comme la clavelée, avec desquamation. Taches bleuâtres sur le corps, comme des pétéchies. — *Dartres

sèches, furfuracées, excessivement pruriantes. — *Furoncles.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, comme si on était ivre; sorte de somnolence, avec grand désir de se coucher. — Insomnie nocturne, avec jactation inquiète, tressaillements, visions et images fantastiques en fermant les yeux. - Rêves agités, anxieux. - Rêves lascifs, avec émission de sperme.

Fièvre. - Frisson violent et horripilation avec froid des membres. - Chaleur aux pieds et aux mains, le soir. - Fièvre le soir, avec douleur dans la tête et les yeux, - Sensation de forte chaleur, alternant avec sueurs. - Sueur facilement excitée par la marche, surtout au front, et parfois d'une odeur acide.

Moral. — Anxiété. — Dispositions à s'effrayer. — Dispositions à se facher et à s'emporter. — Sérieux imperturbable. — Humeur morose et chagrine. — Misanthropie. — Démence.

Tête. — Ivresse. — Vertige étourdissant, capable de faire tomber en avant ou en arrière, aggravé en se baissant ou en se promenant au grand air. - Tête entreprise, avec ébranlement douloureux du cerveau en faisant un faux pas. - *Maux de tête stupéfiants. - Mal de tête pressif, comme s'il y avait un poids qui déprimât tout le cerveau. — Déchirement dans la tête et les yeux, qui sont enflammés, avec fièvre le soir. — *Violentes douleurs pulsatives dans la tête. — Impossibilité de supporter une coiffure quelconque. — Démangeaison comme si des poux rampaient sur le cuir chevelu et le front. - Refroidissement facile des téguments de la tête.

Yeux. — Prurit dans les angles internes des yeux. — Pression dans les yeux, surtout le soir, parfois avec brûlement. - Inflammation des yeux, avec agglutination et douleurs déchirantes. -Larmoiement brûlant des yeux. — Pupilles dilatées. — Trouble de la vue, avec scintillement devant les yeux.

Oreilles. - Bruit dans les oreilles. - Tintement dans les oreilles. - *Dureté de l'ouïe, comme par obturation des oreilles.

Nez. — Nez douloureux au toucher. — Brûlement violent dans le

nez. - Saignement de nez.

Visage. — Paleur du visage. - Face bouffie, tantôt rouge, tantôt pale. - *Rougeur et éruption tubéreuse au visage et au front, comme chez les ivrognes, avec douleurs lancinantes au toucher. -- *Dartres sèches et furfuracées, au visage, avec brûlement au grand air. - *Boutons et furoncles au front. - Douleurs violentes et déchirantes dans le visage, la nuit, alternant avec



LEDUM PALUSTRE.

425

lancinations dans une dent, et se terminant par horripilation, suivie d'un profond sommeil. — Glande engorgée, au-dessous du menton.

Bouche et Gorge. — Exhalaison d'une odeur fétide par la bouche. — Hémorrhagie buccale. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, pendant et hors le temps de la déglutition. — Sensation comme s'il y avait une cheville dans la gorge, avec élancements en avalant.

Appétit. — Goût de moisi, ou amertume dans la bouche. — Forte soif d'eau froide. — Absence d'appétit et prompte satiété. — En mangeant vite, douleur contractive dans le sternum. — Nausées avec envie de vomir en crachant. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, avec douleurs crampoïdes dans le ventre.

Estomac — Urines. — Pression à l'estomac pour peu qu'on ait mangé. — Maux de ventre comme si les intestins étaient meurtris. — Douleur tractive dans le ventre. — Tranchées dans le ventre, le soir. — Maux de ventre dyssentériques. — Expulsion fréquente de vents. — Constipation. — Diarrhée d'excréments mêlés de mucosités et de sang. — Envie fréquente d'uriner, avec émission peu abondante. — Diminution de la sécrétion des urines. — Émission fréquente et abondante d'urines. — Gonflement de l'urèthre.

Parties génitales. — Érections violentes et de longue durée. — Pollutions de sperme sanguinolent ou séreux. — Inflammation du gland. — Règles trop hâtives, et trop abondantes.

Larynx.—Chatouillement au larynx.—Toux précédée de suspension suffoquante de la respiration. — Toux spasmodique, fatigante, qui ressemble à la coqueluche.—Toux avec expectoration purulente, surtout le matin ou la nuit. — Expectoration verdâtre et d'odeur fétide, par la toux. — *Toux creuse, ébranlante,

avec expectoration d'un sang rouge vif.

Poitrine. — Respiration gênée et douloureuse. — Respiration spasmodique et sanglotante, comme après avoir pleuré amèrement. — Respiration génée eu montant un escalier. — *Oppression constrictive de la poitrine, aggravée par le mouvement et la marche. — Douleur dans la poitrine en respirant, comme s'il y avait dedans quelque chose de vivant. — Élancements dans la poitrine, surtout en élevant les bras ou en les remuant. — Éruption sur la poitrine, ressemblant à la clavelée. — *Démangeaison rongeante à la poitrine, avec taches rouges, et miliaires. — *Douleur d'excoriation sous le sternum.

Tronc. — Roideur douloureuse dans le dos et les lombes, après avoir été assis. — Déchirement depuis les reins jusque dans l'occiput, surtout le soir. — Violente douleur crampoide au-dessus des hanches, le soir, avec suspension de la respiration.

Bras. - Déchirement et tiraillement pressif dans les brass

ON

26

Elancements dans l'épaule, en élevant les bras ou en les remuant. Douleur pressire dans les articulations de l'épaule et du conde, aggraree par le mouvement. - Eruption comme la clavelee, aux bras. Douleurs déchirantes dans les mains et les

Nodosités arthritiques aux articulations des mains et des doigts. — Moiteur de la paume des mains. — Miliaire pruriante au poignet. — Tremblement des mains en les remuant ou doigts

Jambes. *Douleur rhumatismale, paralytique, a l'articulation coxo-fémorale. — Douleur de brisement et d'execciation dans le périoste de la cuisse et dans les genoux. - Roideur tensice du genou, avec craquement et fléchissement en marchant. Tengenore, arec crapa mente et les mollets et les talons. - Faission crampoïde dans les genoux, les mollets et les talons. - Fais blesse et tremblement des genoux, en étant assis et en marchant. *Gonslement dur et tendu du genou, avec élancements et dou-

leurs nocturnes, pressives et déchirantes, et dureté de toute la jambe. — Gonflement de la jambe, au dessus et au dessous du genou, avec chalcur et douleur lancinante, tractive. — Roideur des pieds. — Douleur à la plante des pieds, en marchant, comme si elle était écorchée. - *Gonslement inslammatoire, ou même adémateux des jambes et des pieds.— Douleur incisive dans les orteils, la nuit, pendant le sommeil.— Gonflement de la partie charnue du gros orteil, avec douleur en appuyant le pied.

LEPTANDRA VIRGINICA.

Leptandre. — Voy. HALE, Remêdes américains.

IS CLINIQUES. — Les principales affections contre lesquelles dicament, encore peu connu dans ses symptômes, a été jusrecommandé ou employé avec succès, sont les suivants : stralgie, avec tranchées violentes dans la partie inférieure de astre, venant par accès en dehors d'une douleur continuelle, e et pénible dans la même partie, s'aggravant par les boissons es, ainsi qu'en se levant et s'accompagnant d'envie pressante er à la selle, qu'il est impossible de retenir un seul instant. natite et autres affections du foie, avec selles très-foncées, sque noiratres, urines brun foncé, douleur dans la région du , langue chargée d'un enduit jaune, na ophie aigue, jaunatre, du foie, avec i, peau sèche et chaude, extrémités ir anne de la poix, langue chargée d'un end ire au milieu. - Ictère, avec douleur e



LEPTANDRA VIRGINICA. — LYCOPODIUM.

dans la région de la vésicule bilieuse, chaleur et douleur dans le foie jusqu'à l'épine dorsale, frissonnement le long du dos, et selles comme de l'argile. — *Diarrhée* par refroidissement, pendant un froid humide, évacuations aqueuses, abondantes, avec tranchées violentes dans l'intestin grêle. - Hémorrhoïdes saignant fréquemment, avec constipation et douleurs violentes au-dessous de l'os sacrum.

LYCOPODIUM.

LYC. — Lycopode, Pied-de-loup. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homeop., p. 241. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 40 jours, dans plusieurs cas de maladies chroniques.

Antidotes: Camph. puls.

COMPARER AVEC: Ambr. amm. ars. bell. bry. calc. eanth. caps. carb-veg. caus. cham. cic. con. graph. led. magn. mag-n. mag-m. merc. mur-ac. natr-m nitr-ac. n-vom. plat. phos. phos-ac. puls. rhod. rhus. sep. sil. staph. sulf. thui. — C'est surtout après: Calc. et silic. que co médicament convient, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le lycopode, conviennent quelquesois: Graph. Led. phos. puls. silic. nent quelquefois : Graph . led. phos. puls. silic.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Affections, principalement des personnes (et surtout des femmes) d'un caractère doux, portées à la mélancolie, ou d'une constitution lymphatique, ou même leucoflegmatique, avec disposition à prendre des rhumes de cerveau, des catarrhes pulmonaires et autres écoulements muqueux; Engorgement des glandes; Suites fâcheuses de l'abus du mercure; affections rhumatismales et arthritiques, même avec gonflement et nodosités goutteuses; inflammations aiguës et chroniques; crampes et convulsions?; Épilepsie?; Affections scrofuleuses et rachitiques; Inflammation, deviation, carie et autres maladies des os, même celles provenant de l'abus du mercure; Paralysie?; Affections hydropiques; Atrophie (des enfants scrofuleux); Excoriation de la peau; Dartres et autres éruptions chroniques de différentes espèces; Ulcères invétérés et fistuleux; Anasarque; Varices; Anévrismes; Ulcères par l'abus du mercure; Furoncles; Fièvre typhoïde; Céphalalgie même à la suite d'une colère; Céphalalgie rhumatismale; Migraine?; Teigne; Calvitie; Ophthalmies scrofuleuses?, rhumatismales?, arthritiques?; Amblyopie amaurotique; Fongus médullaire aux yeux?; Coryza chronique ou aigu; Otite et otorrhée, surtout à la suite de la scarlatine, ou chez des individus scrofuleux; Névralgie faciale; Disposition à des érysipèles à la face; Dartres et autres éruptions faciales; Croûte de lait?; Angines chroniques, même avec ulcération, et même après avoir fait abus



LYCOPODIUM.

du mercure; Odontalgies rhumatismales; Fistules aux gencives?: Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques; Squirre (cancer) de l'estomac; Hépatite chronique; Coliques flatulentes; Ascite?; Inertie des intestins et constipation opiniatre; Calculs rénaux et gravelle; Hématurie, Incontinence d'urine; Orchite; Induration des testicules?, Gonorrhée secondaire?; Dysménorrhée; Souffrances chlorotiques, Varices et constipations des femmes enceintes, Dispositions à l'avortement, avec varices au parties?; Excoriation et constipation des nouveau-nés; Catarrhe chronique; Grippe: Pneumonie chronique; Souffrances phthisiques; (Phthisie tuberculeuse;) Hémoptysie; Affections organiques du cœur, surtout hypertrophie; Goître; Goutte aux mains; Goutte arthritique, ou scrofuleuse; Tumeur blanche?, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

428

SYMPTOMES GENÉRAUX. -- *Tractions et déchirements dans les membres, le plus souvent la nuit et pendant le repos, quelquefois aussi l'après-midi, tous les deux jours, et surtout par un temps venteux ou pluvieux, soulagés par la chaleur. - *Douleurs lancinantes dans les parties internes ou externes. - *Roideur douloureuse des muscles et des articulations, souvent avec torpeur et insensibilité des membres. - *Engourdissement des membres. oGrande facilité à se donner un tour de reins, qui souvent est suivi de roideur de la nuque. - . *Crampes et contraction des membres. - Extension et rétraction spusmodiques et involontaires de quelques muscles ou de quelques membres. ---*Secousses et tressuillement de quelques membres et de tout le corps, pendant le sommeil et la veille. -- Crampes dans les par-ties internes et externes, même la nuit. -- Attaques d'épilepsie. quelquefois avec cris, écume à la bouche et grande angoisse de cœur. -- Oconflements hydropiques et inflammatoires. -- Va-- *Nodosités arthritiques. — Gonflement des glandes. - Inflammation des os, avec douleurs nocturnes. — Déviation et ramollissement des os. - OUlcération des os. - Les symptômes sont aggravés fréquemment vers quatre heures après midi, et recommencent à s'améliorer vers huit heures du soir, à la faiblesse près. — Affections périodiques. — Bouillonnement de sang par tout le corps, surtout le soir, avec agitation et tremblement. --- Sensation comme si la circulation du sang était suspendue. - Fuiblesse intérieure. - Grande susceptibilité nerveuse. -- *Faiblesse et lassitude dans les membres, sensible principalement pendant le repos, ou le matin, au réveil. - Après une promenade très-courte, fatigue, surtout dans les jambes, et sensation brûlante aux pieds. - Crainte de mouvement et désir continuel d'être couché. - Prostration totale des forces, avec machoire pendante, yeux voilés et à demi fermés, et respiration lente par



LYCOPODIUM.

429

la bouche. — *Grand amaigrissement, aussi chez les enfants. — Accès de défaillance, surtout le soir, et quelquefois même en étant couché, avec perte des sens, obscurcissement de la vue et grande indifférence. — Tremblement des membres. — *Manque de chaleur vitale. — Grand désir ou forte répugnance pour le grand air, avec sensibilité excessive à l'air frais. — Forte dis-

position à se refroidir.

Peau. — *Rongement et prurit, le jour, en s'échauffant, ou le soir avant de se coucher. — Tendance de la peau à se gercer facilement. — *Eruptions douloureuses. — Éruptions urticaires. — Grandes taches rouges sur la peau. — Taches hépatiques, pruriantes. — *Éphélides abondantes. — *Dartres insensibles d'un brun jaunâtre, ridées ou humides, purulentes, pleines de crevasses profondes et de croûtes épaisses. — *Gros furoncles, qui reviennent périodiquement. — *Ulcères saignants, avec douleur lancinante et brûlement pendant le pansement, ou avec déchirements nocturnes et prurit. — Ulcères fistuleux à bords calleux, rouges, renversés et luisants, quelquefois avec inflammation et gonflement de la partie affectée. — *Plaques excoriées à la peau, chez les enfants. — *Verrues, *surtout celles à queue. — Engelures. — *Grande sécheresse de la peau. — *Anasarque, avec grande inactivité des intestins et de la peau.

Sommeil. — *Bâillements fréquents et quelquefois avortés. — *Envie de dormir le jour, ¬et le soir de bonne heure; avec sommeil tardif; par affluence d'idées et forte surexcitation nerveuse. — Sommeil agité et inquiet, avec réves anxieux, effrayants, et réveil fréquent avec effroi. — Rèves voluptueux, vifs, tristes; rêves de meurtres ou des occupations de la journée, etc. — Tressaillements, cris, sursauts avec effroi, ou éclats de rire, ou pleurs et gémissements pendant le sommeil. — *La nuit, tressaillement et inquiétudes dans les jambes, mal à la tête, -angoisse, cauchemar, ébullition de sang et battement du cœur, mal à l'estomac, coliques, souffrances asthmatiques, etc. — Difficulté de rester couché sur le côté gauche, à cause de battements de cœur et d'élancements. — Impossibilité de rester couché, la nuit, parce

qu'on ne se trouve bien dans aucune position.

Fiévre. — Frisson le soir, quelquefois d'un seul côté, ou tous les deux jours, avec chaleur, ou suivi de sueur sans chaleur. — *Manque de chaleur vitale. — °Fièvre tierce, avec vomissements acides et bouffissure de la face et des mains après le frisson. — Chaleur fugace. — Chaleur brûlante, avec respiration courte. — °Fièvre maligne, avec méchanceté et mauvaise humeur en s'éveillant, ou avec surexcitation nerveuse, sans chaleur à la tête ni rougeur du visage, rougeur circonscrite des joues, grande faiblesse, sueurs qui ne soulagent pas, langue rouge et sèche et constipation. —°Fièvre lente, avec sueurs nocturnes, visqueuses. — Fièvre avec prostration de toutes les forces, mâchoire inférieure pendante, yeux voi-



LYCOPODIUM.

430

lés et à demi fermés, et respiration lente avec bouche ouverte. — Sueur, principalement à la face, facile à exciter le jour par un léger exercice. — Sueur fébrile le jour. — Sueur nocturne, souvent fétide ou gluante, principalement à la poitrine et au dos.

Moral. — *Mélancolie taciturne et humeur chagrine; on désespère de son salut éternel. — *Angoisse, surtout dans la région de l'épigastre, avec mélancolie et disposition à pleurer, surtout après s'être fâché, on à l'approche d'autres personnes. — Misanthropie. — *Crainte de la solitude. — *Irritabilité et susceptibilité avec pleurs. — Irascibilité. — *Opiniatreté. — Aliénation et fureur, qui se manifestent par l'envie, les reproches, l'arrogance et le despotisme. — oCaractère doux, soumis. — Indifférence complète. — Aversion pour la parole. — *Fatigue par des efforts intellectuels et impossibilité de se livrer à des travaux de tête. — Étourdissement. — Impossibilité de s'exprimer correctement; on se trompe de mots et de syllabes. — Parole embrouillée.

Tête. — Étourdissement et vertiges, comme par ivresse. — *Vertige tournoyant, surtout en se buissant, ou dans un appartement chaud, avec envie de vomir. — °Mal de tête à la suite d'une émotion ficheuse. - Mal de tête avec disposition à s'évanouir et grande agitation. — *Mal à la tête avec vertiges. — *Pesanteur de la tête. - Mal à la tête en la secouant, et en la tournant, comme aussi à chaque pas que l'on fait. - Céphalalgie au-dessus des yeux, immédiatement après le déjeuner. - Mal de tête sémilatéral le soir, aggravé jusqu'à devenir insupportable, par le travail intellectuel. - *Maux de téte pressifs, quelquefois comme si on enfonçait un clou dans la tête, ou avec tension qui augmente en étant couché. — *Maux de tête déchirants, surtout l'après-midi ou la nuit, principalement dans le front, mais souvent aussi dans toute la tête, les yeux, le nez, et jusque dans les dents, avec besoin de se coucher. - Maux de tête lancinants. - Battement dans la tête, le soir, après s'être couché. - *Congestion à la tête, avec chaleur de cette partie, quelquefois le matin en se redressant dans le lit. — Commotion et résonnement dans le cerveau, à chaque pas. — Térébration, râclement et déchirement au cuir chevelu, surtout la nuit. - Mouvements involontaires et tremblements convulsifs de la tête. - Forte disposition à se refroidir la tête. — *Éruption à la tête, °avec suppuration abondante et fétide, *quelquefois avec engorgement des glandes de la nuque et du cou. - Les cheveux deviennent gris. - *Calvitie.

Yeux. — Pression dans les yeux. — *Brûlement rongeant et élancements dans les yeux (et les paupières), surtout le soir, à la lumière. — °Cuisson dans les yeux. — Sensation de froid dans les yeux, le soir. — *Inflammation des yeux et des paupières. — Orgelet. — *Agglutination des paupières, surtout la nuit, et



LYCOPODIUM.

432

térieur de la bouche et de la langue. - Exhalaison d'une odeur putride par la bouche. - Hémorrhagie buccale. - *Langue sale, chargée. — Mouvements involontaires de la langue. — Bégayement, seulement pour le dernier mot de chaque phrase.

Gorge. - Sensation d'étranglement dans la gorge, avec déglutition empêchée. - *Sécheresse dans la gorge. - Douleur d'excoriation dans la gorge. - *Douleur brûlante dans la gorge, avec soif nocturne. - Sensation comme si une boule montait du creux de l'estomac dans la gorge. - Inflammation de la gorge et du palais avec douleur lancinante, qui empêche la déglutition.

— Gonflement et suppuration des amygdales. — Ulcères semblables aux chancres, aux tonsilles. - *Renâclement de mucosités. - Enduit lardacé couvrant tout le voile du palais et le palais même, avec ou sans cause syphilitique évidente. — Dartres sy-

philitiques dans la gorge.

Appétit. - Perte du goût. - *Bouche pâteuse ou amère, surtout le matin, souvent avec nausées. - *Aigreurs dans la bouche, surtout le matin, ou goût aigre des aliments. - Absence de soif ou soif ardente. — Soif nocturne. — *Perte de l'appétit, quel-quéfois à la première bouchée. — *Faim immodérée. — Boulimie. - *Répugnance pour les aliments cuit, ou chauds, pour le pain de seigle, la viande, le café et la fumée de tabac. — Appétence excessive pour les douceurs. — Impossibilité de digérer les aliments lourds.—Après le repas, douleurs hépatiques, oppression et plénitude dans la poitrine et le ventre, nausées, chaleur à la tête, rougeur de la face, pulsation et tremblement dans tout le corps, mains chaudes, battements de cœur, coliques, etc.

*Après avoir pris du lait, aigreurs et diarrhée.

Estomac. — *Renvois violents après midi. — *Renvois aigres brûlants, gras ou ¬amers. — Régurgitation aigre des aliments, surtout du lait. — *Pyrosis, ¬surtout après le repas. — Hoquet violent, par accès, surtout après le repas. — Nausées dans l'appartement, se dissipant au grand air, et vice versa. - *Nausées fréquentes, continuelles, surtout le matin, avec amertume de la bouche. — °Nausées par le mouvement de la voiture. — °Sensation de fadeur à l'estomac, le matin. - *Pituites de l'estomac, quelquefois tous les deux jours, avec écoulement d'une eau amère. - *Vomissement des aliments et de bile, surtout la nuit ou le matin, à jeun. - *Vomissements de matières verdâtres, amères. Vomissement de sang. — Douleurs d'estomac avec frissons et mains mortes, après s'être légèrement refroidi. — Douleurs d'estomac périodiques, soulagées à la chaleur du lit. - *Pression à l'estomac, le soir, et après chaque repas, quelquefois avec amertume de la bouche. - Douleurs compressives et contractives à l'estomac. - Les douleurs d'estomac se manifestent principalement le matin, au grand air, après le repas, ou après avoir bu du vin ; elles diminuent quelquefois le soir, et sont souvent accom-



434

LYCOPODIUM.

- Après le coît et les pollutions, lassitude. - Écoulement de

liqueur prostatique.

Règles. — Prurit, *brûlement et rongement à la vulve. — °Pression vers le dehors, au-dessus de la vulve et jusque dans le vagin, en se baissant. — °Expulsion de vents par le vagin. — °Sécheresse chronique du vagin. — *Pouleurs lancinantes dans les lèvres, en se couchant. — Excoriation entre les cuisses, à la vulve. — Pendant et après le coït, douleur brûlante dans le vagin. — *Règles (trop hâtives), trop abondantes et de trop longue durée. — °Règles faciles à supprimer pour longtemps, par une frayeur. — *Avant les règles, frissons, tristesse, mélancolie. — Pendant les règles, délires avec pleurs, maux de tête, aigreurs dans la bouche, maux de reins, gonflement des pieds, évanouissements, vomissement de matières aigres, tranchées, coliques et douleurs dans le dos. — *Leucorrhée —laiteuse, jaunâtre, rougeâtre, et rongeante, °quelquefois précédée de tranchées dans le bas-ventre. — Gonflement du sein avec nodosités. — °Excoriation et croûtes suintantes aux mamelons.

Larynx. — Grattement formicant dans la trachée-artère, la nuit. — °Catarrhes bronchiques des plus opiniâtres, avec expectoration de mucosités jaune citron et amères. — Enrouement, avec raucité et douleur d'excoriation dans la poitrine, après avoir parlé. — Accumulation de glaires dans la poitrine, avec râle muqueux. — °Voix faible et sourde. — *Toux après avoir bu. — °Toux matutinale opiniâtre et sèche. — *Toux nocturne, qui ébranle la tête, le diaphragme et l'estomac. — *Toux sèche jour et nuit. — *Toux provoquée par un chatouillement, ou comme produite par la vapeur du soufre, ou excitée en respirant profondément, généralement avec expectoration gris jaunâtre et salee, °quelquefois avec grande faiblesse d'estomac, fièvre, sueurs nocturnes et amaigrissement. — °Toux avec expectoration abondante de matières verdâtres. — *Expectoration abondante de pus, en toussant. — *Toux avec expectoration de sang. — *En toussant, coups dans la tête, respiration courte, cuisson et ébranlement dans la poitrine, ou douleurs à la région stomacale.

Poitrine. — Haleine courte pendant presque tout travail, même chez les enfants. — *Oppression de poitrine continuelle, aggravée par la promenade au grand air. — °Râle muqueux et ronflement en respirant. — En respirant, tressaillement et élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — *Douleur de meurtrissure dans la poitrine. — *Pression continuelle dans la poitrine. — Pesanteur dans la poitrine. — Tension à la partie antérieure de la poitrine. — *Lancinations dans la poitrine, surtout à gauche, et principalement en étermant, en toussant, en riant et au plus léger mouvement, quelquefois avec impossibilité de rester couché sur le côté malade, et gêne de la respiration. — °Douleur d'excoriation dans la poitrine, surtout après avoir



LYCOPODIUM. -- MAGNESIA CARBONICA. 436

ment des jambes, avec taches rouges brûlantes, étendues, et douleurs qui ne permettent pas d'appuyer le pied. — Paralysie des jambes, avec pissement de sang et constipation. - Dartres aux jambes et aux mollets. — o'Tumeur blanche au genou. — *Crampes ct douleurs crampoïdes dans les mollets, surtout en marchant, et la nuit. — Douleur brûlante aux jambes. — Ulcères aux jambes, avec déchirements nocturnes, prurit et douleur brûlante. — *Douleur à la plante des pieds, en marchant. — *Crampes dans les pieds et les orteils. — *Gonflement des pieds et des malléoles ou de la plante des pieds (avec douleur lancinante). — *Pieds froids. — Sueur froide aux pieds, parfois abondante et avec excoriation de la peau. - oFléchissement des orteils en marchant. - *Contraction des orteils. - *Cors aux pieds, quelquefois avec douleur lancinante.

MAGNESIA CARBONICA.

MAGN — Magnésie. carbonatée, carbonate (sous-) de magnésie. — Ilaune— MANN — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 115. — Dose usitée: 30. — Durée d'action : jusqu'a 50 jours, dans quelques cas de maladies chroniques.

COMPARER AVEC: Bar. bell bry. calc cham. con. graph. kal. lyc. magn-m. nitr-ac. n-vom. phos. puls. rhus sil. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptomes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: --Affections, principalement des enfants, ainsi que des femmes, et surtout des femmes hystériques ou mal réglées; Affections scrofuleuses?; Epilepsie; Atrophie des enfants?; Glandes engorgées?; Dartres?; Migraine; Céphalalgie hystérique?; Ophthalmies scrofulcuses?; Cataracte; Obscurcissement de la cornée: Dureté de l'ouïe; Odontalgies rhumatismales, ou chez les femmes enceintes; Névralgie faciale?: Gastralgie; Aigreurs des enfants; Diarrhées, surtout chez les enfants : Diabète??; Coliques spasmodiques ; Spasmes abdominaux hystériques; Odontalgies des femmes enceintes; Crampes de matrice; Dysménorrhée; Leucorrhée; Hernie scrotale, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensibilité douloureuse de tout le corps. — Traction et déchirement dans les membres. — Secousses douloureuses à diverses parties. - Chute fréquente, sans perte de connaissance, en marchant ou en stant debout. ---



Peau. — *Fort prurit et forte sécheresse de la peau. — Nodosités volumineuses, entre cuir et chair, avec douleurs lancinantes. -Petites dartres rouges, sans douleur, et qui finissent par s'ex-

folier. — Vésicules rongeantes. — Petits furoncles.

Sommeil. — Baillements fréquents et violents. — *Enrie de dormir le jour. — *Insomnie, quelquefois par oppression dans le bas-ventre ou par agitation anxieuse et chaleur intérieure, avec grande crainte de se découvrir. - Affluence de rêres anxieux; avec paroles, cris et sursauts avec effroi. — Rêves de feu, de déluge, de brigands, de querelles, d'argent, de plaisirs, de malheurs, etc. — Sommeil de nuit non réparateur, avec fatigue aussi grande le matin que le soir avant de se coucher, réveil de bonne heure et difficulté à se rendormir.

Fièvre. - Frissons le soir. - Le matin, sensation de chaleur sans transpiration et sans soif. -- Sueur nocturne, souvent fétide et grasse. — Sueur acide.

Moral. — Inquiétude et peur, avec tremblement et chaleur. -

Mauvaise humeur le soir.

Tôte. — Le soir, vertige avec évanouissement. — Fatigue de la tête par les travaux intellectuels. - Maux de tête, la nuit, au lit, même pendant le sommeil, soulagés en s'asseyant. - Douleur pressire au sommet de la tête, pendant un travail intellectuel, ou au milieu d'une assemblée. — Tension et tiraillements à l'occiput. comme par roideur de la nuque. - . Tractions dans le front avec nausées. - Mal de tête tressaillant, avec sensation de lourdeur après un accès de colère. — Douleurs lancinantes dans la tête, même la nuit, dans le côté sur lequel on repose. — Congestion à la tête, avec chaleur intérieure, surtout en fumant. - Desquamation du cuir chevelu, qui démange, surtout par un temps pluvieux. - Chute des cheveux.

Yeux. - Inflammation des yeux, avec rougeur, élancements, sensation de brûlure et trouble de la rue. — Gonflement du globe de l'œil. — *Agglutination des paupières, le matin. — Sécheresse des yeux ou fort larmoiement. - *Obscurcissement de la - *Taches noires devant la vue. — •Obscurcissement du cornée.

cristallin.

Oreilles. -- Inflammation de l'oreille extérieure, avec rougeur et douleur d'ulcération. — Grande susceptibilité de l'ouie au moindre bruit. - *Dureté de l'ouie, avec bourdonnement dans les oreilles, surtout dans l'appartement. - Tintement, gronde-



MAGNESIA CARBONICA.

438

ment et sensation comme si un oiseau battait des ailes, dans les oreilles.

Nez. - Epistaxis, le matin. - Éruption vésiculaire dans le nez, avec douleur pressive. - Obturation du nez. - *Coryza sec, qui ne

permet de respirer que par la bouche.

Visage. — Teint brouillé, pâle, terreux. — Rougeur et pâleur alternatives de la face. — Air maussade. — Tension à la face, comme si elle était enduite de blanc d'œuf desséché. — Douleurs nocturnes aux pommettes, fouillantes, térébrantes, déchirantes et insupportables pendant le repos, et forçant à aller d'un endroit à l'autre. — Gonflement de la pommette, avec douleur pulsative. — *Gonflement de la face et °bouffissure tubéreuse. — Eruption

dartreuse autour de la bouche.

Dents. - Maux de dents par le mouvement de la voiture. - *Douleurs nocturnes dans les dents, forçant à se lever et à se promener, insupportables dans le repos, et généralement brûlantes, térébrantes ou comme d'ulcération, ou déchirantes, tractives et tressaillantes, s'étendant jusqu'aux tempes, avec gonflement de la joue du côté affecté, roideur de la nuque et du cou, et tressaillements dans les doigts et les pieds.—Battements et élancements dans les dents, après le repas. — Maux de dents aggravés par le froid. - Vacillement des dents.

Bouche. - Sécheresse de la bouche, surtout la nuit et le matin.-Salive sanguinolente. - Éruption vésiculaire dans la bouche et sur la langue. - Petites tubérosités dans la bouche, qui saignent

et brûlent au plus léger contact.

Gorge. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, en parlant et en avalant. — Douleur brûlante dans la gorge et le palais, avec sécheresse et apreté, comme s'il y avait des barbes d'épis dedans.

Appétit. - Perte du goût. - Goût amer, avec langue blanche et mucosités visqueuses sur la langue et les dents. — Goût acide dans la bouche. - Forte soif (d'eau), surtout le soir et la nuit. - Grand désir de légumes, avec répugnance pour la viande, et

vice versa.
stomac. — Renvois acides. — Renvois fréquents, avec douleurs miturition et de vomissements d'une sérosité amère ou salée. Douleur pressive contractive à l'estomac, quelquefois avec renvois aigres. - Sensation de fadeur et de vide à l'estomac, avec nausées et envie de vomir. -- Douleur d'ulcération à l'es-

Ventre. — Induration et douleurs lancinantes dans la région hépatique. — Ballonnement excessif et tension du ventre, avec sensation de pesanteur. — Crampes abdominales, suivies de flueurs blanches. — Pincements, tranchées et tiraillements aigus dans le ventre. — 'Hernie inguinale.

Selles. — *Constipation. — Besoin fréquent et inutile d'aller à



MAGNESIA CARBONICA.

439

la selle, avec selles peu abondantes ou seulement émission de flatuosités. — Diarrhées verdâtres, écumeuses et muqueuses, avec tranchées. — °Diarrhée d'odeur aigre. — Expulsion d'ascarides et de lombrics. — Élancements dans l'anus et le rectum, surtout pendant les ténesmes.

Urines. — Sécrétion, plus abondante que de coutume, d'une urine pâle ou verdâtre. — Émission fréquente d'urine, même la nuit. — Émission fréquente des urines. — Sensation de brûlure et d'ex-

coriation en urinant.

Parties viriles. — Diminution de l'appétit vénérien. — Défaut d'érections. — Écoulement de liqueur prostatique pendant l'émission des flatuosités. — Hernie scrotale. — Pollutions fré-

quentes.

Règles. — Sensation, comme si tout se portait vers les aînes, comme pour les règles, avec tranchées dans le ventre. — *Règles trop tardives, ou complétement supprimées, ou règles trop tardives accompagnées de beaucoup de souffrances. — Règles avec écoulement d'un sang foncé, épais, gluant et comme de la poix. — Avant les règles, maux de reins, coliques, boulimies, renvois fréquents et mausées. — Pendant les règles, accablement, frissons, douleurs de tête, pâleur du visage, maux de reins et douleurs crampoïdes, pressives, dans le ventre, qui arrêtent le flux menstruel. — Écoulement de mucosités blanches et rongeantes par le vagin, quelquefois précédé de crampes dans le ventre.

Larynx. — Toux provoquée par un chatouillement dans la gorge, avec expectoration séreuse et salée. — Toux crampoide nocturne, — Toux matutinale, avec expectoration d'un pus jaunâtre. —

Expectoration de sang par la toux.

Poitrine. — Oppression de poitrine, avec sensation de constriction. — Oppression de poitrine, avec haleine courte, surtout en marchant. — Pression et sensation de pesanteur, ou douleurs incisives et lancinantes dans la poitrine. — Douleurs d'excoriation et élancements dans le côté gauche de la poitrine et dans la région du cœur.

Tronc. — Douleurs de brisement aux reins et dans le dos, la nuit. — *Roideur de la nuque. — Élancements aux reins. — Déchi-

rement et tiraillement successifs à la nuque.

Bras. — Douleur de luxation à l'articulation scapulaire, pendant le mouvement. — °Accès de déchirement dans l'épaule, °surtout la nuit, avec fourmillement jusque dans les doigts et impossibilité de remuer les bras, tant la douleur est vive. — Douleur tractive dans les bras et les mains. — °Gerçure de la peau des mains. Vésicules rongeantes aux mains et aux doigts, avec douleur lancinante. — Tension crampoide dans les articulations des doigts. — Chaleur aux doigts. — Gonflement rouge et inflammatoire des doigts.

Jambes. — Inquiétudes dans les jambes. — Douleur tractive dans



440 MAGNESIA CARBONICA. - MAGNESIA MURIATICA.

les jambes et les pieds. — Démangeaison aux fesses, avec taches rouges après s'être gratté. — Gonflement douloureux dans le jarret. — Crampes dans les mollets, la nuit. — Plaques brûlantes sur le tibia. — °Furoncles aux jambes.

MAGNESIA MURIATICA.

MAGN-M. — Muriate ou hydrochlorate de magnésie. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop. — Doses usitées: 12, 30. — Durée d'action: jusqu'à 7 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Camph. ars.?

COMPARER AVEC: Bar, bry. calc. cham. con. graph, magn. nitr-ac. n-vom. phos. puls. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections, principalement du sexe féminin, et surtout des femmes hystériques; Accès de spasmes et de faiblesse hystériques; Glandes engorgées?; Céphalalgies hystériques, rhumatismales et nerveuses?; Ozène scrofuleuse; Névralgie faciale?; Dentition difficile des enfants; Souffrances gastriques; Hépatite chronique; Coliques spasmodiques; Spasmes abdominaux, hystériques; Crampes de matrice; Nausées des femmes enceintes; Constipation des enfants pendant la dentition; Induration squirreuse de l'utérus; Leucorrhée, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs térébrantes ou contractives crampoïdes. — *Tractions et déchirements paralytiques dans les membres. — *Accès de spasmes et de faiblesse hystériques. — Disposition à se refroidir. — *Faiblesse du corps qui semble quelquefois provenir de l'estomac. — Sensation de malaise et de courbature dans tout le corps, avec grande sensibilité au moindre bruit. — La plupart des symptômes se manifestent en étant assis, ou la nuit, et sont généralement soulagés par le mouvement.

Peau. — Fourmillement à diverses parties de la peau. — Boutons pruritants, avec douleur brûlante après s'être gratté. — Éruption de pustules. — Éruptions de petites papules rouges. — Furoncles.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, avec bâillements et paresse. — Sommeil tardif et insomnie à cause de chaleur, avec soif, et grande agitation dans tout le corps, en fermant les yeux. — Rêves anxieux et effrayants, avec paroles et cris pendant le



MAGNESIA MURIATICA.

441

sommeil. - Sommeil non réparateur. - Secousses dans le corps.

la nuit, pendant la veille. — Cauchemar. Fièvre. — Frisson le soir, qui se dissipe dans le lit. — Sueur

après minuit.

Moral. - Inquiétude et humeur pleureuse. - Maussaderie et humeur chagrine. - Aversion pour la conversation. - Répugnance pour le travail. - Surimpressionnabilité nerveuse, avec

pleurs faciles.

Tête. - Hébétude dans la tête, comme si on était ivre. - Vertige le matin, en se levant et pendant le diner, se dissipant au grand air. - Lourdeur de la tête, avec étourdissement jusqu'à faire tomber. — Douleurs soulagées en enveloppant la tête. — Sensation de torpeur dans le front .- *Pression tensive, dans le front et le sinciput, avec confusion et obscurcissement dans la tête, principalement lorsqu'on vient de se réveiller. — Serrement comme par une griffe, et bruit dans les tempes, le soir, au lit, avec sensation, comme si on allait avoir un vertige et perdre connaissance. - Déchirements tressaillants, ou lancinants et pulsatifs, dans la tête. - Congestion à la tête, avec chaleur, bourdonnement et bouillonnement douloureux. - *Maux de tête quotidiens. -- Tiraillements névralgiques dans la tête et le visage, et jusque dans les dents, avec sensation d'embarras dans la tête.

Yeux. - Inflammation et douleur brûlante dans les yeux, avec rougeur de la sclérotique. - Larmoiement et brûlement dans les yeux, en regardant au grand jour. - Agglutination nocturne des paupières. - Couleur jaune de la sclérotique. - Auréole

verte autour de la lumière le soir.

Oreilles. - *Pulsation dans l'oreille. - Torpeur et dureté de l'ouïe, comme si un objet était appliqué sur l'oreille. - Élancements, tiraillements aigus et térébrations dans les oreilles.

Bourdonnement dans les oreilles.

Nez. — *Croûtes dans les narines, quelquefois avec sensibilité douloureuse du nez au toucher. — *Excoriation des narines. — °Écoulement de sérosités corrosives par le nez. — Obturation du nez, avec manque d'haleine. - Douleur d'excoriation et de brûlure dans le nez, - *Gonflement, rougeur, induration et chaleur de la partie inférieure du nez. avec aggravation le matin. - Sécheresse pénible du nez. — Obturation nocturne du nez. — Coryza, avec perte du goût et de l'odorat, et mouchement de mucosités jaunâtres et fétides. - Perte de l'odorat.

Visage. — Teint pâle, jounâtre, ou couleur terreuse de la face. — Douleurs tractives dans les nerfs de la face. —Tension de la face avec douleur crampoide dans les os du visage. - Eruption faciale. — Lèvres gercées. — Sensation d'apreté aux parois in-ternes des lèvres, lorsque la langue s'y porte. — Ampoules grosses

et transparentes sur la partie rouge des lèvres.



MAGNESIA MURIATICA.

Dents. - Mal de dents, porté au plus haut degré par le contact des aliments. - Sensation d'allongement des dents incisives supérieures. — Gonflement douloureux et saignement facile des gencives.

Bouche. — Sécheresse de la bouche, la nuit. — Accumulation abondante de salive séreuse dans la bouche. — Sensation dans l'intérieur de la bouche, comme si elle avaitété brûlée. — Brûle-

ment à la langue, comme par du feu.

442

Gorge. - Sensation comme si la gorge était excoriée et à vif. avec aggravation le soir et la nuit. - Mucosités visqueuses et épaisses dans la gorge, souvent mêlées de sang et difficiles à expulser.

Appétit. - Soif fréquente. - Boulimie et sensation de faim dans l'estomac, suivie de nausées. - Faim sans que l'on sache de quoi

on a envie. - Désir de friandises.

Estomac. — Régurgitation des aliments, pendant la marche, et, après le dîner, violent hoquet qui rend l'estomac douloureux. - Sensation d'une boule qui remonterait du ventre dans l'œsophage, se dissipant par des renvois. — Nausées surtout le matin, lorsqu'on vient de se lever. — Nausées fréquentes, avec évanouissement, jour et nuit. — *Nausées continuelles, avec couleur terreuse de la face, surexcitabilité nerveuse, et pleurs faciles. — Pression à l'estomac, avec nausées. — Tension et douleur d'ulcération et de meurtrissure à l'estomac, avec sensibilité excessive au contact. - Ebranlement douloureux dans l'estomac, en marchant et en appuyant le pied.

Ventre. — Tension et élancements dans la région hépatique. -Douleurs pressives au foie, même en marchant ou en appuyant dessus, aggravées lorsqu'on est couché sur le côté droit. - Ventre dur et tendu. — *Ballonnement du ventre, fort et continuel, avec constipation. — *Dureté douloureuse du ventre et surtout du côté droit. — *Douleurs crampoïdes dans le ventre, surtout le soir, et quelquefois suivies de leucorrhée. — Tranchées, pincements et tiraillements aigus dans le ventre. - Elancements

fourmillants dans les muscles abdominaux.

Selles. - * Selles dures, difficiles, lentes et insuffisantes. - * Selles noueuses, comme des crottes de mouton. - Fort ténesme, avec selle peu abondante, ou seulement émission de flatuosités. *Disposition chronique à la diarrhée. — Diarrhées violentes de mucosités et de sang. - Selles verdâtres, jaunâtres ou brunâtres. - Selles enduites de mucus et de sang. - *Sortie de

Urines. - Envie fréquente d'uriner, jour et nuit, avec émission peu abondante. — Emission des urines possibles seulement par contraction des muscles abdominaux. — Torpeur de l'urêthre. Parties viriles. —Fort prurit aux parties génitales et au scrotum.

- Erections fréquentes. - Après le coît, brûlement dans le dos.



MAJORANA - MANCINELLA

Sommeil souvent interrompu par des besoins d'uriner. — Réces vifs, anxieux, fantastiques, sensuels.

Moral triste, avec desespoir; dégoût de la vie, mécontentement de son sort; idées abondantes, grande vivacité et besoin d'exercice et de mouvement au grand air. — *Idées sensuelles, lascires en grande abondance. — Idées de mariage, avec gaieté folle, et abattement corporel.

Têto chaude, avec inquietude dedans; douleurs dans les tempes;

vertiges, le soir, en se couchant.

Nez saignant; sensation de contraction et de chatouillement au bout du nez.

Appétit perdu; hoquet; forte soif, la nuit.

Estomac et Ventre alternativement le siège de violentes douleurs, surtout la nuit, où elles interrompent le sommeil. — *Appétit rénérien fortement exalté. — *Désir violent du coît. — *Grande surexcitation sexuelle.

Mamelons gonflés, avec prurit.

Membres pris par des douleurs rhumatismales dans les pieds, la plante des pieds, la cuisse, les doigts et l'articulation du bras.

MANCINELLA.

MANC. — Hippomane mancinella. — Manceniller vénéneux. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p.244.
Antidote?.

SYMPTOMES GÉNÉBAUX. — Faiblesse générale, avec grand besoin de se coucher, et de rester couché. — *Élancement dans différentes parties. — Convulsions. — *Suites de la scarlatine. Augmentation des symptômes par la colère, ainsi qu'après avoir mangé, ou la nuit; amélioration en étant couché, ainsi que par la chaleur. — Peau rouge.

Sommeil profond pendant le jour; état comateux et somnolence continuelle; insomnie nocturne ou réveil fréquent. — *Sommeil interrompu par des secousses comme électriques dans la partie supérieure de la gorge, au-dessus du larynx; rèves de spectres, de fantômes; au réveil, une espèce de stupéfaction. — Fièrre nerveuse, typhoide, avec ballonnement et endolorissement de l'épigastre, augmentée en burant de l'eau; ochaleur fuguce, avec sensation comme si des flammes sortaient de l'épigastre; mains et pieds froids; sueur nocturne; sueur à la paume des mains.

Moral triste, morose; tout dégoûte et ennuie; tendresse et piété profondes; *timidité et taciturnité; gaieté, avec envie de chan-



MANCINELLA.

445

ter; maladresse dans les mains; grande activité, et disposition au travail; oubli prompt, en se levant pour prendre quelque chose, on ne sait déjà plus ce qu'on voulait; operte subite des pensées; frayeurs faciles.

Tête. — Étourdissements et vertiges, surtout en fixant longtemps quelque chose ou en lisant à haute voix. — *Sensation de vide et et légèreté dans la tête, en marchant dans la chambre. — Céphalalgie avec nausées et douleur au-dessous des hypocondres droits. — Céphalalgie gravative, avec envie de vomir et besoin de se coucher. — Élancements violents dans la tête. — Sensation comme si un clou était enfoncé au vertex. — Prurit au vertex.

Yeux — Nez. — Yeux cernés par un cercle bleuâtre; élancements sourds ou douleur tranchante dans le globe de l'œil; forte inflammation des yeux, avec photophobie; obrûlement dans les yeux et céphalalgie par la lumière des bougies; affections des yeux alternant avec ouïe dure. — Oreilles rouges et chaudes; bourdonnement et bruissement dans les oreilles. — Nez couvert de taches rouges; odeur de corne brûlée ou de fumier devant le nez; ovoix nasillarde.

Face. — *Face jaunâtre oet bouffie, ou avec peau rouge du corps. — Enflure de la face, avec picotement, feux brûlants, éruptions de petites vésicules jaunâtres, enfin desquamation, boutons nombreux au menton et autour de la bouche; lèvres pâles; chute

de la lèvre inférieure.

Bouche et Gorge. — Sécheresse, chaleur, brûlement et instammation de la cavité buccale et de la langue, ne permettant de rien
manger. — Sang dans la bouche. — °Langue chargée de blanccomme par des aphthes, ou avec plaques couvertes de cet enduit. — *Salivation fétide, jaunâtre. — Brûlement, excoriation
et cloches au palais. — Grande sécheresse, chaleur et brûlement dans la gorge. — °Luette très-allongée. — °Gonslement
fréquent des amygdales, avec péril de suffocation et respiration
sifflante. — °Angine scarlatineuse, même maligne. — Ulcères
brûlants, jaune blanchâtre, aux amygdales et au pharynx. —
Sensation de rétréissement et douleur d'ulcération dans la gorge,
diminuées par le bâillement. — °Sensation d'étranglement dans
la gorge, remontant de l'estomac dans la gorge, avec efforts
inutiles pour rendre des rapports, parole empêchée, faiblesse et
palpitations de cœur.

Goût, Appétit, Gastricisme. — Goût de sang ou *grande amertume dans la bouche. — *Manque d'appétit; Dégoût de la
riande; désir de pommes cuites. — Soif avec répugnance pour
le vin et les boissons alcooliques, mais avec *désir de l'eau froide
*que l'étranglement dans la gorge empêche cependant d'avaler.
— Malaise après avoir bu. — Renvois d'air continuels, comme
des bouffées d'air; rapports bruyants et sanglotants. — Vomis-

sements verdatres, aqueux ou noirs, - Vomissement des ali-



MANCINELLA.

ments suivi de violentes tranchées et de selles abondantes. — o Vomissement de matières aigres et grasses. — Vomissement par le nez et la bouche, précédé d'une sensation qui remonte de l'estomac, et suivi de soulagement des maux de tête.

Estomac. — *Brûlement dans le creux épigastrique. — *Sensation d'une boule qui paraît se contracter à l'épigastre. — *Gonflement de l'épigastre, avec grande sensibilité au toucher.

Ventre. — Élancements dans les hypocondres. — Douleur dans l'hypocondre gauche qui force à le comprimer avec la main. — Gargouillements très-désagréables et borborygmes dans le ventre, pendant la respiration et chaque mouvement. — Douleurs erratiques dans le ventre. — Maux de ventre après avoir bu de l'eau. — Elancements dans les intestins. —*Coliques avec diarrhée. — Émission fréquente de flatuosités. — Douleurs d'exco-

riation et de contusion dans les téguments du ventre.

Selles et Anus. — *Constipation. — Évacuations diarrhéiques noires et très-fétides. — *Diarrhée avec brûlement dans le ventre et à l'anus.— *Selles diarrhéiques excessivement fréquentes, avec coliques et évacuation de sang ou de matières verdâtres.— Avant les selles, face rouge. — Après la cessation de la diarrhée, douleur de meurtrissure dans les extrémités inférieures. — Après les selles, douleurs à l'anus. — Plénitude dans le rectum avec sensation de vacuité dans la tête. — Sphincter de l'anus comme paralysé. — Gonflement et couleur bleuâtre des hémorrhoïdes. — Écoulement d'un sang hémorrhoïdal foncé, très-fétide et se coagulant facilement.

Urines. — Miction rare. — Urines blanchâtres, plus ou moins abondantes. — °Urine brune qui devient blanchâtre en se troublant. — Avant l'émission des urines, élancements dans la

vessie.

446

Parties de la femme. — Sang des règles pâle. — Avant les règles, congestion à la tête; à leur apparition, tranchées. — Pendant les

règles, tristesse et crampes dans l'hypogastre.

Larynx. — Tension du larynx et sensation tranchante en dedans. — Toux violente au moindre effort. — *Toux après avoir bu ou plus forte la nuit. — Toux avec expectoration de mucosités sanguinolentes et goût douceatre dans la bouche. — Expectoration

blanche. - Besoin d'expectorer, avec nausées.

Poitrine. — ^oHaleine fétide dont on s'aperçoit soi-méme. — Râle muqueux pendant la respiration. — *Oppression de la poitrine, odiminuée par l'expectoration. — Gêne de la respiration et suffocations, au moment de parler, de rire ou de s'endormir. — Picotement comme par des aiguilles traversant le cœur. — Palpitations après avoir mangé, ou le soir. — Crampes dans le cœur. — o Douleur et élancements au milieu du sternum, augmentés en pressant dessus. — Taches jaunes sur là poitrine, contraction spasmodique des parois de la poitrine.



MANCINELLA. - MANGANUM CARBONICUM.

Tronc. — Sensation de faiblesse et de brisure dans les reins, avec besoin de frotter ces parties, pandiculation, frisson et froid des extrémités, suivis de chaleur brûlante, soif de besoin de se bien couvrir. — Sensation de roideur dans l'articulation sacrale, et dans celle des doigts, qui se laissent à peine ployer. Fourmillement dans le dos, comme par des insectes. — Faiblesse dans les muscles du dos. — Roideur douloureuse dans la nuque, surtout au réveil. — Douleur rhumatismale dans l'omoplate.

Membres supérieurs. — Dartre au bras droit. — Roideur et tremblement du bras. — Miliaire rouge, très-petite et pruriteuse, à l'avant-bras. — Douleur constrictive dans le poignet et le métacarpe. — Rougeur des mains avec enflure des veines. — Tremblement paralytique de la main. — • Mains pesantes, engourdies, et comme gonflées, au réveil. — Ongles des doigts bleuâtres.

Membres inférieurs. — *Accès de frémissement et de tressaillement dans les extrémités inférieures. — Tremblement des jambes. — Élancement dans les genoux. — Croûtes sur le tibis, et douleur d'excoristion. — °Brûlement, sensation de sécheresse et élancements aux talons. — °Desquamation de la plante des pieds, après la fièrre.

MANGANUM CARBONICUM.

MANG. — Manganèse. — HAHNEMANN. — His. nat. et prép. Pharmac. homosop., p. 117. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 7 semaines, dans quelques affections chroniques.


ANTIDOTE: Coff.

COMPARER AVEC : Amm. coff. con. lyc. plat. puls, thui. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections arthritiques; Rhumatisme articulaire; Douleurs ostéocopes; Migraine; Angines aiguës et chroniques; Odontalgies; Catarrhe chronique; Laryngite chronique (Phthisie laryngée), etc., etc.,

Voy. la note. page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élancements sourds, tressaillants, à diverses parties du corps. — Déchirement et tiraillement, surtout dans les membres. — Traction et tension dans les membres et les articulations, comme par raccourcissement des tendons, surtout en étendant la partie. — • Douleurs arthri-



MANGANUM CARBONICUM.

448

tiques dans les articulations, avec élancements, tressaillements et fouillement, aggravées le soir, souvent semi-latérales ou en croix. — Gonflement rouge et luisant des articulations, quelfois à la suite d'un refroidissement. — *Inflammation des os avec douleurs fouillantes et insupportables, la nuit. — Accablement et tremblement, surtout dans les articulations. — Sensation de malaise dans tout le corps, mais surtout dans l'estomac, avec humeur chagrine. — Au plus léger contact, sensibilité de tout le corps, comme s'il était ulcéré. — La plupart des symptômes se manifestent pendant la nuit. — Les symptômes qui se sont manifestés dans l'appartement, sont améliorés au grand air, et vice versa. — Plusieurs symptômes sont soulagés ou aggravés suivant le changement du temps en bon ou en mauvais.

Peaú. — Brûlement par toute la peau, le soir et en se levant du lit. — Dartres pruriantes. — Peau maladive; toute lésion tend à s'ulcérer. — Excoriation et gerçures dans le pli des articulations.

Sommeil. — Grande lassitude sommolente le soir, vers huit heures. — Affluence de rêves très-vifs, anxieux, et dont on garde un

souvenir distinct. - *Bâillements fréquents.

Fièvre. — Frissonnement le soir, avec mal de tête lancinant, saus soif. — Frissons, avec chaleur fugace à la tête. — Chaleur fébrile à la poitrine et aux joues, avec sensibilité douloureuse de tout le corps, au toucher. — Sueur nocturne, quelquefois seulement au cou et aux jambes et qui force à se gratter.

Moral. - Humeur chagrine, taciturne, avec concentration en soi-

même. - Distraction. - Émoussement des sens.

Tête. — Tête lourde, avec sensation comme si elle avait augmenté de volume. — Douleurs brûlantes et pressives à la tête, se dissipant en plein air. — Douleurs de tête tensives, lancinantes et tractives, au grand air, soulagées dans l'appartement. — Congestion à la tête, avec pulsation comme si le cerveau allait passer en suppuration, améliorée au grand air. — Ebranlement douloureux du cerveau pendant le mouvement. — Les maux de tête, qui se sont déclarés dans l'appartement, sont soulagés au grand air, et vice versa.

Yeux. — Pression dans les yeux en les fatigant, ou aux lumières du soir. — *Chaleur brûlante et sécheresse des yeux. — Paupières gouflées et douloureuses quand on les remue. — o'Agglutination des paupières, le matin. — Pupilles dilatées ou contractées. — o'Trouble de la vue. — Vue très-basse (myopie).

Oreilles. — Otalgie. — Douleurs tractives dans les oreilles, qui proviennent d'autres organes. — Élancements dans les oreilles en parlant, en avalant, en riant, et en marchant lourdement. — Dureté de l'oure comme par obturation des oreilles, se dissipant lorsqu'on se mouche, s'aggravant ou s'ameliorant selon les



MANGANUM CARBONICUM.

449

changements du temps. — Bourdonnement et grondement dans les oreilles. — Détonation dans les oreilles en se mouchant et en avalant; en bâillant, éclatement.

Nez. — Coryza sec et obturation du nez. — Coryza, avec perte de l'odorat et sécrétion de mucosités épaisses. — Rougeur, excoria-

tion et inflammation du nez, pendant le coryza.

Visage. — Visage pâle, abattu, hâve. — Déchirement violent et serrant, entre la racine du nez et les sourcils. — Élancements tressaillants depuis la mâchoire inférieure jusque dans les tempes, en riant. — Lèvres excessivement sèches. — Eruptions et ulcères aux commissures des lèvres. — Crampes de la mâchoire, après le repas.

Dents. — Sensibilité douloureuse des dents. — Douleurs violentes dans les dents, passant rapidement à d'autres parties. — Déchirement dans les dents molaires et les parties adjacentes, avec grand abattement et inquiétude, surtout le matin et le soir. — Douleurs d'ulcération dans les dents, aggravées jusqu'à devenir

insupportables par le contact de quelque chose de froid.

Bouche et Gorge. — Le matin, odeur d'argile dans la bouche. —
Tubercules et vésicules brûlantes sur la langue. — Mal de gorge
avec douleur incisive et d'excoriation, hors le temps de la
déglutition. — Élancements sourds de deux côtés du pharynx et
jusque dans les oreilles, en avalant. — Sécheresse et grattement dans
la gorge, avec sensation comme si une feuille obstruait le
larynx.

Appétit et Estomac. — Goût fade et huileux. — Absence de soif. — *Répugnance pour les aliments, par sensation de satiété. — Sensation d'aigreur brûlante remontant de l'estomac, comme pyrosis. — Chaleur et brûlement à l'estomac, remontant jusqu'à la poitrine, quelquefois avec grande agitation. — Tiraillements dans la région de l'estomac, comme si l'épigastre se dilatait,

accompagnés de nausées.

Ventre. — Pression dans les hypocondres. — Ventre gros et ballonné. — Douleur pressive d'excoriation dans le ventre et l'épigastre. — Contraction avec sensation de chaleur, depuis le milieu du ventre jusque dans la poitrine, avec nausées. — Tranchées dans la région ombilicale, en respirant profondément. — Commotion dans le ventre, comme si les intestins s'entrechoquaient. — eÉmission de flatuosités par trop abondantes.

Emission de flatuosités par trop abondantes.
 Selles. — Constipation. — *Selles difficiles, sèches, noueuses. —
 *Selles plusieurs fois par jour, de la consistance de la bouillie. —
 Grondement fréquent dans le rectum. — Pendant les selles, coliques et douleurs incisives dans le rectum. — Tiraillements successifs et déchirement dans le rectum. — Douleurs contractives

à l'anus.

Urines. — Envie fréquente d'uriner. — Sédiment couleur de violette et terreux dans les urines. — Lancination dans l'urèthre,



450 MANGANUM. — NENYANTHES TRIFOLIATA.

hors le temps de l'émission des urines. — Douleurs incisives dans la région de la vessie.

Parties génitales. — Sensation de faiblesse dans les parties génitales, avec brûlement et tractions tressaillantes dans le cordon spermatique et jusque dans le gland. — Prurit à la couronne du gland. — Règles trop hâtives. — Pression aux parties génitales. Leucorrhée.

Larynx. — *Enrouement et raucité opiniâtres, surtout le matin et au grand air, comme par inflammation chronique du larynx.-Sensation comme si le larynx était fermé. — *Catarrhe avec corvza et enrouement. — Toux avec enrouement. — Toux sèche, provoquée par la lecture à haute voix ou la parole soutenue, avec sécheresse pénible et âpreté dans le larynx. — Le matin, expectoration abondante de petits globules de mucosités vert jaunâtre, presque sans toux. — Crachement de sang.

Poitrine et Tronc. — Haleine chaude et brûlante, avec chaleur désagréable dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine et au sternum, qui la traversent du haut en bas. — Battement dans la poitrine. — *Coups subits au cœur -et dans les côtés de la poitrine depuis le haut jusqu'en bas. — Déchirement dans toute l'étendue de l'épine dorsale, pendant le repos et le mouvement.

— Roideur de la nuque.

Bras. — Tractions et déchirements partant de l'épaule et s'étendant jusque dans les bras, les mains et les doigts.— Douleurs tensives dans les articulations des bras et des mains. — Térébration et fouillement dans les os du bras, comme si c'était dans la moelle. - Tension dans l'articulation du coude, comme si les tendons étaient trop courts. — Dartre pruriante à l'avant-bras. — Douleurs crampoïdes dans les mains. - Gonflement inflammatoire et ulcération du petit doigt. — Gerçures dans le pli des articulations des doigts.

Jambes. — Tressaillements des muscles des jambes, au moindre mouvement. - Tractions crampoides ou élancements tressaillants dans les cuisses. — Douleur de roideur tensive dans les jambes. Déchirement autour du genou. — Manque de solidité et tremblement des genoux. — Gonflement et inflammation des malléoles, avec élancements jusque dans les jambes. — Brûlement à la plante des pieds. — Excoriation entre les orteils.

MENYANTHES TRIFOLIATA.

MEN. - Trèfie d'eau. - HAHNEMANN. - Hist. nat. et prép. Pharmac. homœop., p. 248. - Médicament encore très-peu connu, et qui, jusqu'ici, n'a été employé que contre quelques Fièvres intermittentes, des Georrhées à la suite d'exanthèmes, et des Affections spasmodiques.



452 MENYANT, TRIFOLIATA. -- MEPHITIS PUTORIUS.

— Pincements dans le ventre. — Constipation. — Selles dures avec pincements dans le ventre.

Urines et Parties génitales. — Envie fréquente d'uriner, avec évacuation peu abondante. — Exaltation de l'appétit vénérien,

sans excitation de l'imagination ni érections.

Larynx et Poitrine. — Voix enrouée et rauque, avec obturation des oreilles, comme si quelque chose s'y était introduit. — Rétrécissement spasmodique du larynx, avec excitation à la toux, en faisant des efforts pour respirer. — Compression lancinante des deux côtés de la poitrine. — Douleur pénible de brisement dans les reins, en étant assis et en se baissant. — Élancements sourds et térébrants sur l'omoplate gauche. — Déchirement entre les omoplates. — Roideur et lourdeur des muscles du cou et de la nuque.

Membres. — Déchirement paralytique et tractions crampoides, dans les bras, les mains et les doigts. — Roideur spasmodique du bras, avec rétraction involontaire des doigts. — Tressaillement douloureux dans le bras et le petit doigt. — Douleur de brisement dans les cuisses. — Secousses et mouvements convul-

sifs dans les cuisses.

MEPHITIS PUTORIUS.

MEPH. - Le suc fétide du putois. — HÉRING. — Hist. nat. et prép. Pharm. homœop., p. 334. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : peu de temps. ANTIDOTE : Camph., ne soulage que pour peu de temps.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs rhumatismales, qui changent de siège, avec envie d'uriner. — Quelquefois sensation comme si on était touché par des étincelles électriques. — Sensation de puralysie, surtout pendant les douleurs. — Grand abattement et lassitude, pendant lequel les muscles sont douloureux au toucher et au mouvement. — Paresse, avec besoin de s'étendre et pandiculations. — Agitation interne dans tout le corps, avec sensation de malaise indicible. — Vibration légère des nerfs, comme jusque dans l'intérieur des os. — Beaucoup de symptòmes se manifestent le matin.

Sommeil. — Forte envie de s'endormir, au point de dormir même en société. — Somnolence le jour, avec bon sommeil la nuit. — Baillement fréquent qui fait couler les larmes. — Réves très-vifs dont on conserve le souvenir. — Rêves d'eau, de feu, de pertes pénibles, de crachement de sang, etc. — Cauchemar. — Réveil la nuit, avec congestion de sang et chaleur dans les jambes. —



MEPHITIS PUTORIUS.

453

Engourdissement somnolent, le matin, avec brûlement dans les yeux et déchirement dans les membres; grand soulagement en changeant de position. — Réveil fréquent oet de bonne heure, souvent avec sensation de bien-être.

Fièvre. — Froid le soir, avec besoin d'uriner et coliques, comme pour la diarrhée. — Chaleur à la tête, aux parties génitales et aux jambes, la nuit. — Augmentation de la chaleur, surtout le matin, avec peau moins sensible au froid et à l'eau froide. — Les lotions froides paraissent très-agréables.

Moral. — Mauvaise humeur pour des bagatelles ou des peines imaginaires. — Inaptitude aux travaux intellectuels, à cause d'une trop grande vivacité de l'imagination. — Très-grande loquacité, comme si on avait trop bu. — Excitation avec chaleur à la tête.

Tête. — Vertiges en se baissant subitement, en étant assis, quand on remue la tête, en se retournant dans le lit, ou le soir. — Embarras sourd de la tête, comme si elle devenait plus volumineuse, accompagné de mauvaise humeur et de nausées. — Maux de tête violents, avec sensation de plénitude, comme une pesanteur ou une pression, surtout à l'occiput; sensation à diverses parties, comme si on y enfonçait le doigt. — Douleur au-dessus des yeux. — Maux de tête par le mouvement de la voiture, ou bien le soir.

Yeux.—Lancinations dans les yeux, comme des coups d'aiguilles.


— Douleurs dans les yeux en les tournant, comme si quelque objet s'y était introduit, ou qu'on les eût trop fatigués. — Chaleur, brûlement et pression dans les yeux, surtout le matin et le soir.—Pression sur les paupières et brûlement aux bords, comme s'il allait paraître un orgelet. — Injection des veines de la sclérotique.— Rougeur de la conjonctive, comme par ecchymose.— Myopie. — Confusion des caractères, en lisant. — Trouble de la vue: — Impossibilité de lire de petits caractères. — Cécité nocturne. — Généralement, pendant la faiblesse de la vue, douleurs dans les yeux ou dans la tête. — C'est surtout le soir que les yeux sont affectés.

les yeux sont affectés.

Oreilles — Dents. — Déchirement dans les oreilles ou dans la mâchoire et les dents. — Otalgie. — Prurit, chaleur, rougeur et érysipèle à l'oreille extérieure (droite). — Sécheresse du nez. — Épistaxis. — Besoin prolongé d'éternuer. — Coryza fluent, avec douleur d'excoriation dons la poitrinc. — Douleurs dans les dents cariées (molaires), surtout dans la mâchoire inférieure. — Secousses subites dans les racines des dents. — Traction et déchi-

rement dans les dents.

Appétit et Estomac. — Nausées, avec grattement dans la gorge et sensation comme si la tête était gonflée, à jeun. — Renvois sanglotants. — Renvois soulagés par des flatuosités. — Engouement facile en buvant et en parlant. — Besoin pénible et inutile de renâcler. — Goût métallique. — °Désir d'aliments salés. — Appé-



MEPHITIS PUTORIUS.

tit alternativement violent ou nul. - Le matin, absence d'appétit, et répugnance même pour la fumée du tabac. — Après le repas, courbature et envie de dormir.

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres; douleurs rhumatismales (du côté droit), ou comme par des flatuosités (du côté gauche). - Pression à l'estomac, avec coliques. — Sensation de vacuité dans l'estomac et nausées. - Coliques, comme pour une diarrhée, non suivies de selles. - Pression et mouvements dans le ventre, comme à la suite d'un refroidissement, avec sensation de froid. tremblement et besoin d'uriner, amélioré auprès du feu. - Maux de ventre, le soir.

Selles - Parties génitales. - Selles peu fréquentes, mais liquides. - Diarrhée. - Envie fréquente d'uriner, surtout la nuit, avec émission d'urine claire. — Après un accès de fièvre, le soir, urine trouble, avec dépôt. — Prurit au scrotum. — Chaleur des parties génitales. - Excoriation des parties génitales chez la femme

et gonflement des grandes lèvres.

454

Larynx et Poitrine. — Toux, en lisant à haute voix, en parlant et après s'être engoué en buvant. — Toux matutinale, avec expectoration à la suite d'un catarrhe. - Mucosités expulsées par un toussottement tous les matins. — Souffrances catarrhales. - Douleurs aux côtes (gauches), au toucher et à la pression, mais surtout en toussant et en éternuant. — Douleur d'excoriation à la partie postérieure des côtes et dans la poitrine, en res-

pirant profondément et en remuant le dos.

Tronc et Bras. -- Douleurs dans un côté du cou (droit). -- Tension dans les muscles de la nuque. — Douleur et sorte de paralysie dans le dos et dans tous les membres. — Lancination dans l'épine dorsale pendant le mouvement. -- Brisement dans les reins. le matin. - Douleurs rhumatismales dans les bras, avec tractions paralytiques, améliorées par le mouvement. - Déchirement ou sensation de brisement dans les os. — Inquiétude dans le bras, qui est comme insensible. — Tremblement dans les bras, en s'appuyant dessus. - oTressaillement de la main. - Sensation pénible dans la première phalange du doigt qui oblige à l'étendre et à le faire craquer.

Jambes. - Douleurs tractives et rhumatismales dans les cuisses. la hanche et le pied, mais principalement dans la jambe. - Brisement dans le genou. - Douleur crampoide et subite dans le pied, qui oblige à sautiller. -- oInquiétude dans les jumbes, comme si elles allaient s'engourdir. — Lancinations dans le pied. — Douleur dans le talon, comme la goutte. — Picotement ou sensation de pincement dans le gros orteil. - Brûlement dans le petit orteil. - Continuellement, douleurs et brûlement dans

les cors.



455

MERCURIUS.

MERC. — Mercure. — HAMMEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 149. — Doses milées: 3, 12, 30. — Durée d'action: 3 à 4 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques.


ANTIDOTES: Ara. 283. bell. camph. carb-v. chin. dulc. electr. hep. iod. lack. lyc. mez. nit-ac. op. 2835. sep. sil. sulf. — On temploie comme antidote de: Aur. bell. ant. chin. coff. cupr. diad. dulc. fer. lach. mez. op. sulf. valer.

COMPAPER AVEC: Acon. comp. coff. 2825. capp. des. copp. hell. her.

op. sult. valer.

Comparer avec: Acon. smm. ant. arg. arn. ars. asa. sur. bar. bell. bry. cale. carb. caus. cham. chin. clem. coll. colch. con. cupr. dig. dulc. euphorb. guai. hep. iod. luch. laur. lyc. mez. nitr-ac. n-wom. op. phosac. puls. rhus. sass. selen. sep. sil. staph stront. sulf. thui. valer. verst. — C'est surtout après: Bell. hep. lach. que le mercure est d'ailleurs indiqué. — Après le mercure conviennent quelquefois: Bell. chin. dulc. hep. lach. vienne seuf lach. nitr ac. sep. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Souffrances par suite d'un refroidissement, principalement à la fraîcheur du soir; Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement inflammatoire; Inflammations locales; Souffrances syphilitiques, scrofuleuses, rachitiques, hydropiques; Affections principalement des sujets lymphatiques, pléthoriques, on des personnes d'une constitution leucoflegmatique, d'une nutrition maladire, faibles de corps et d'esprit, disposées à se refroidir et à transpirer facilement, avec tempérament flegmatique et porté à la mélancolie; Accès de convulsions?, d'épilepsie?; Cachexie par l'abus du quinquina ou du soufre; Souffrances chroniques par l'abus du vin ou du café, ainsi que par suite d'excès vénéries, ou de l'onanisme; Congestions sanguines et hémorrhagies; Exostille, nécrose, carie et autres maladies des os; Arthrocace?; Gonflement et inflammation des glandes; Éruptions galeuses, miliaires, urticaires, purulentes et pustuleuses; Dartres sèches, furfuracées, ou vives, croûteuses et suppurantes; Érysipèles simple et slegmoneux; Taches et ulcères syphilitiques, et autres ulcérations et suppurations; Ictère; Scarlatine maligne; Petite vérole dans la période de suppuration; Fièrres inflammatoires, arec disposition à transpirer abondamment; Fièvres typhoides, avec caractère muqueux, ou bilieux, ou putride; Atrophie des enfants scrofuleux; Mélancolie; Nostalgie?; Ivrognerie; Congestion cérébrale, avec vertiges; Céphalalgie rhumatismale ou catarrhale; Céphalalgie nerveuse?; Apoplexie sanguine?, séreuse?; Commotion du cerveau; Encéphalite; Hydrocéphale aigue?; Teigne; Chute des cheveux; Ophthalmies scrofuleuses, rhumatismales, catarrhales (et arthritiques?); Ophthalmie syphilitique : Ulcères de la cornée; Amblyopie amaurotique : Héméralopie?;



156

Blépharophthalmie; Ectropion?; Otite; Otalgie rhumatismale et catarrhale; Dureté de l'ouïe après un refroidissement ou par suite d'angines tonsillaires; Otorrhée; Polype dans l'oreille; Ozène; Érysipèle flegmoneux du nez; Croûte de lait et dartres faciales; Dentition difficile des enfants, avec fièvre; Prosopalgies et odontalgies rhumatismales, avec fluxion; Trismus; Balbutiement?; Stomacace; Aphthes des enfants; Glossite; Grenouillette; Angines tonsillaires, pharyngées et palatines, avec flegmon; Ulcères syphilitiques à la gorge; Salivation; Affections gastrico-muqueuses et bilieuses, avec vomissement, diarrhée et fièvre; Choléra?; Hépatite; Carreau; Ictère; Entérite; Péritonite; Ascite; Coliques, arec diarrhée; Diarrhée après les morbilles, ou chez les nourrissons; Diarrhée pendant la dentition; Dyssenterie; Choléra asiatique avec selles dyssentériques; Chute du rectum; Souffrances vermineuses; Diarrhées muqueuses ou bilieuses; Hématurie; Diabète sucré?, Uréthrite et gonorrhée; Orchite; Chancres; Bubons scrofuleux et syphilitiques; Érysipèle au scrotum; Chute du vagin; Inflammation et hydropisie des ovaires?; Péritonite puerpérale?; Métrite; Cancer de l'utérus?; Dysménorrhée; Leucorrhée; Stérilité; Érysipèle; Excoriation et ulcération des mamelles; Affections catarrhales et inflammatoires des voies aériennes et des poumons; Aphonie; Grippe; Phthisie?; Asthme humide?; Hydrothorax; Crampes de poitrine par la vapeur de l'arsenic ou du cuivre; Coxalgie; Panaris.

Voy..la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs déchirantes et tractives ou lancinantes, aux membres, principalement la nuit, à la chaleur du lit, qui rend les douleurs insupportables. - • Gonflement inflammatoire d'un rouge luisant. — *Douleurs ostéocopes nocturnes. - Aggravation des souffrances la nuit, ou le soir, ainsi que par l'air frais (du soir). — Battements, sensation de luxation et *douleurs arthritiques dans les articulations, avec gontlement. - *Douleurs rhumatismales, avec sueur abondante, mais qui ne soulage point. - Le matin et dans le repos, et principalement en étant couché, on se trouve beaucoup mieux qu'en étant assis ou en marchant. - * Tout le corps est comme brisé, avec endolorissement de tous les os. - Principalement le soir, grande agitation dans les membres, avec douleurs dans les articulations. -- *Grande fatigue, faibles et chute rapide des forces, avec grand malaise du corps et de l'esprit. - Bouillonnement de sang et tremblements fréquents, même après le moindre effort. — *Congestions sanguines et hémorrhagies. — Grande disposition des membres à s'engourdir. — Crampes, omourements convulsifs et vaccès d'épilepsie nocturnes, avec cris, roideur du corps, ballonnement du ventre, prurit au nez et soif. — Spasmes toniques et



457

tétanos. — Roideur cataleptique du corps. — Accès d'évanouissement. — Paralysie de plusieurs membres. — Amaigrissement et atrophie de tout le corps. — *Surexcitation et surexcitabi-

lité de tous les organes.

Peau. - *Couleur jaune de la peau, avec transpiration qui colore le linge en jaune. - *Engorgement, inflammation et ulcération des glandes, avec douleurs pulsatives et lancinantes, goussement dur, rouge et luisant, ou sans altération notable de la peau. -*Eruptions miliaires, urticaires, boutonneuses, ou pustuleuses et purulentes. - Boutons pruriteux, avec brûlement après s'être gratté. - *Éruptions qui ressemblent à la gale, et qui saignent facilement. - Les plaies s'ulcèrent facilement (et passent à la gangrène). - Inflammation érysipélateuse. - Taches rouges, élevées, ou taches hépatiques, ou semblables aux taches scorbutiques. - Petits boutons très-pruriteux qui s'ulcèrent et se couvrent d'une croûte. - Taches dartreuses, excoriées et suintantes ou *dartres sèches, pruriteuses et farineuses. — Desquamation de la peau. — *Ulcères phagédéniques, -ou bleuâtres, fongueux et facilement saignants, ou superficiels et comme rongés par des insectes, ou sécrétant un pus ichoreux et corrosif. — *Ulcères chancreux. - Prurit violent et voluptueux par tout le corps, principalement le soir, ou la nuit, augmenté par la chaleur du lit, et quelquefois avec brûlement après s'être gratté. - Epaississement du périoste; *exostoses et carie; abcès dans les articulations; grande fragilité des os.

Sommeil. — *Disposition excessive au sommeil, le jour et la nuit; sommeil profond et prolongé. — Envie de dormir sans le pouvoir. — *Le soir, sommeil tardif, -et le matin, réveil de trop honne heure. — *Sommeil très-léger et agité, -avec réveils fréquents, sursauts et effroi. — Insomnie par surexcitation nerveuse. — Réves fréquents, anxieux, horribles, fantastiques, historiques, vifs, voluptueux; rèves de brigands, de chiens qui mordent, de révolte, de déluge, de coups de fusil, etc., etc. — *La nuit, inquiétude, anxiété, agitation et jactation, malaise, douleurs, chaleur ou sueur, ébullition de sang, cris, pleurs, battements de cœur, vertiges et beaucoup d'autres souffrances. — En s'endormant, aggravation des douleurs, sursauts et fantômes effrayants devant la vue; pendant le sommeil, paroles, gémissements, soupirs, respiration courte, avec bouche ouverte et mains froides; *au réveil, sueur, cris, pleurs et paroles incohérentes.

Fièvre. — Froid, frissons et horripitations par tout le corps, principalement après avoir dormi le jour ou la nuit, ainsi que la nuit ou le soir et le matin au lit, et quelquefois avec couleur bleuâtre de la peau, froid glacial des mains et des pieds, palpitations musculaires, mouvements convulsifs de la tête, des bras, des jambes, sensation de brisement dans les membres et besoin de se coucher, tremblement des membres, douleurs vives à la tête



458

envie d'uriner, somnolence, etc. — Chaleur du visage et de tête, avec rougeur et brûlement des joues et froid ou frisson ou horripilation par tout le corps; ou *chaleur mélée de fr sons ou de sueurs. — Pendant la chaleur, soif inextinguib grand désir de lait, et aggravation des douleurs en se découvra *Accès fébriles la nuit ou le soir; ofièvres avec sympton inflammatoires, ou avec un état putride; fièvres lentes et hec ques. - *Pouls irrégulier ou accéléré, fort et intermittent, faible, lent et tremblotant .- * Sueurs abondantes, excessives débilitantes tant le jour que la nuit, le matin, le soir après s'ét couché, et en mangeant, et quelquefois fétides ou acides, ou h leuses, colorant le linge en jaune. - Sueur avec nausées et env de vomir, grande fatigue, soif, anxiété, suspension de la respin tion, points de côté, etc.

- *Grande angoisse, inquiétude et agitation, avec peur perdre la raison, ou avec tourment intérieur, excessif, princip lement le soir ou la nuit au lit, comme si l'on avait commis qu que crime. - *Accablement moral, avec grande indifféren découragement, horreur du travail et dégoût de la vie. - App hensions. - Mauvaise humeur, disposition à se fâcher et à s'e porter, grande susceptibilité de caractère, humeur querelleu méfiance et soupçons. - *Morosité et répugnance pour la conve sation. - *Gémissements. - Surexcitation et grande irritabil morale, avec disposition à s'effrayer facilement. - Distraction inadvertance, conception difficile. - *Inaptitude à toute méd tation, et facilité à se tromper en parlant. - Faiblesse de mémoire. — Instabilité des idées, dont l'une chasse constamme l'autre. — Radoteries. — Accès de manie et de démence, av disposition aux pleurs.—Perte de connaissance et de la parole.

Fureur, avec horreur des liquides.

Tête. - *Obnubilation, - ivresse et étour dissement, principaleme le matin, au réveil ou en se levant. - * Vertiges, principaleme en se levant ou en redressant la tête, -ou étant assis, ou couc sur le dos, ainsi que pendant ou après la promenade au grand a ou le soir, et souvent avec nausées, obscurcissement des yeu chaleur anxieuse et besoin de se coucher. - Pesanteur, plénitu et pression dans la téte, comme si le front était serré par bandeau ou que le crane dût éclater. - (Le soir) sensibilité de loureuse du cerveau, avec fatigue de la tête par le bruit, amélio en appuyant la tête sur le bras. — Maux de tête excessifs of forcent à comprimer la tête des deux mains. - *Chaleur et brû ment, ou douleurs déchirantes et tractives, ou élancements da la tête, n'occupant souvent qu'un seul côté et se propageant ji qu'aux oreilles, aux dents et au cou. - Bouillonnement, té bration et fouillement, coups et battements dans la tête. leur et meurtrissure au cerveau, le matin au lit. - Céphalal nocturne. - Douleurs ostéocopes à la tête, et *exostoses au crai



459


— Gonflement de la tête; *endolorissement du cuir chevelu; douleurs vives et brûlantes au tégument du crâne. — Éruption sèche à la tête; petites croûtes dans les cheveux, quelquefois avec prurit brûlant; * croûtes suintantes, avec excoriation du cuir chevelu et destruction des cheveux. — Chute de cheveux. — *Sueur à la tête et au front, quelquefois froide et visqueuse.

Yeux. — Yeux troubles, ternes, cernés. — *Pression dans les yeux, comme par du sable, oprincipalement en s'efforçant de fixer un objet. - Elancements, *prurit, démangeaison, et brûlement aux yeux, principalement au grand air. - * Yeux rouges, enflammés, avec rougeur de la conjonctive ou de la sclérotique, et injection des veines de la sclérotique ou de l'angle externe des yeux. - *Larmoiement abondant des yeux, principalement le soir. - *Sensibilité excessive des yeux à la lumière et à l'éclat du feu. - Pustules sur la conjonctive et ulcères de la cornée. *Paupières rouges, enflammées, gonflées, oulcérées sur les bords, et couvertes de croûtes. — *Sensation sous la paupière, comme s'il y avait là un instrument tranchant. — Tumeur à la paupière, comme un orgelet. - *Agglutination nocturne des paupières. — *Occlusion spasmodique des paupières, avec difficulté de les ouvrir. - *Croûtes autour des yeux. - *Amblyopie et trouble de la vue, comme par un brouillard ; perte momentanée de la vue; points noirs, mouches volantes, flammes et étincelles devant les yeux. — Mobilité des caractères en lisant.

Oreilles. — *Douleurs déchirantes, lancinantes et tractives dans les oreilles, parfois avec sensation de froid, comme s'il y avait de la glace dans l'oreille, augmentées par la chaleur du lit. — L'oreille et le conduit auditif sont comme enflammés, avec douleurs crampoïdes et lancinantes. — *Excoriation et ulcération de la conque. — *Otorrhée purulente et °excroissances fongueuses dans l'oreille, *avec déchirement dans le côté affecté de la tête et du visage. — Écoulement de sang par les oreilles. — Écoulement de cérumen. — Tumeur sous-cutanée, et boutons furfuracés et suintants au lobe. — *Dureté de l'ouïe, quelquefois avec obturation des oreilles, qui cesse en avalant ou en se mouchant, ou avec retentissement extraordinaire de tous les sons dans l'oreille. — Tintement, *bruissement et bourdonnement dans les oreilles, principalement le soir. — Sensibilité douloureuse et gonflement

inflammatoire des parotides.

Nez. — *Gonflement des os du nez, avec sensibilité douloureuse au toucher. — Prurit au nez. — Tension, pression et sensation de pesanteur du nez. — °Couleur noirâtre du nez. — Gonflement inflammatoire et rougeur luisante du nez, avec prurit. — Croûtes dans les narines. — Écoulement d'un pus fétide et corrosif par les narines. — *Saignement de nez, fréquent et abondant, même pendant le sommeil, et quelquefois en toussant. — Obturation et °sécheresse du nez. — Éternument fréquent, —



460

°Coryza sec, avec obturation du nez, ou *coryza fluent, °avec écoulement abondant de sérosités corrosives. — Odeur putride

par le nez. - Pustule douloureuse au nez.

Visage. — *Face pâle, °ou jaunâtre, ~ou teint plombé, *ou terreux. — Traits décomposés, tirés. — Cercle d'un rouge bleuâtre autour des yeux. — Chaleur fébrile et rougeur des joues. — *Bouffissure et gonflement du visage, ~principalement autour des yeux. — *Gonflement de la joue. — *Déchirement dans les os et dans les muscles (d'un côté) du risage. — Pression et points dans l'os zygomatique. — Sensation de tension de la peau, au visage et à la tête. — Sueur du visage. — Taches rouges et dartreuses à la face. — *Croûte jaunâtre au visage, avec suintement d'une humeur fétide, prurit continuel le jour et la nuit, et saignement après s'être gratté. — *Lèvres rudes, sèches et °noirâtres, avec brûlement en les touchant. — Gonflement et ulcération des lèvres. — *Croûtes jaunâtres, ~pustules purulentes et petits ulcères aux lèvres et autour du menton. — *Gerçures, rhagades et ulcération aux coins de la bouche. — Distorsion de la bouche, et mouvements convulsifs des lèvres. — *Serrement et immobilité des mâchoires, ~avec gonflement inflammatoire de la mâchoire inférieure et *tension dans les muscles du cou. — °Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes sousmaxillaires, avec douleurs lancinantes ou pulsatives, ou sans douleurs. — Carie de la mâchoire.

Dents. — *Douleurs déchirantes, lancinantes, ou pulsatives, dans les dents cariées, ou dans les racines des dents, se propageant souvent jusqu'aux oreilles et dans toute la joue du côté affecte, quelquefois même avec gonfement douloureux de la joue ou des glandes sous-maxillaires, salivation et frissons. — *Apparition ou aggravation des maux de dents, principalement le soir, ou la nuit, à la chuleur du lit, où ils sont insupportables, renouvellement par l'air frais, ainsi qu'en mangeant et en prenant dans la bouche quelque chose de chaud ou de froid. — *Agacement, noirceur, vacillement et chute des dents. — *Prurit et rougeur des gencives. — Gencives fongueuses et saignant facilement. — *Décollement et gonflement des gencives, principalement la nuit, avec douleur brûlante et sensation d'excoriation en y touchant et en mangeant. — *Gencives livides, décolorées et très-sensibles. — *Ulcération des gencives.

Bouche. — *Odeur fétide, cadavéreuse, de la bouche. — Couleur bleuâtre, excoriation et *gonflement inflammatoire de l'intérieur de la bouche. — Douleur brûlante, vésicules, ampoules, *aphthes et ulcères dans la bouche. — Sensation de sécheresse dans la bouche et le palais, ou *accumulation de mucosités tenaces. — Ulcération de l'orifice des conduits salivaires, et *écoulement abondant d'une salive excessivement fétide, —et quelquefois même sanguinolente. — *Langue humide, chargée de mucosités






blanches et épaisses, ou sèche, obrune ou noirâtre. — *Dureté, gonflement inflammatoire et ulcération de la langue, avec douleurs lancinantes. — Roideur, insensibilité et immobilité de la langue.— *Sensation sur la langue, comme si elle était brûlée. — Tremblement de la langue. — *Parole accélérée et balbu-tiante; *perte entière de la parole. — Ulcération et carie du palais. Gorgo. — *Sécheresse douloureuse de la gorge, qui empêche de parler. — *Douleur d'excoriation et cuisson dans la gorge, ou sen-sation de chaleur qui remonte dans le gosier. — *Douleurs lancinantes dans la gorge et dans les tonsilles, principalement en aralant. — *Allongement et gonflement de la luette. — *Suppuration des amygdales. — Pression et douleurs d'excoriation et d'ulcération dans l'œsophage. — *Gonstement instammatoire et rougeur de toutes les parties de l'arrière-bouche et de la gorge. Accumulation de mucosités épaisses et tenaces dans la gorge. - *Sensation comme s'il y avait une tumeur ou quelque corps étranger dans la gorge qu'il fallût avaler. — *Besoin continuel d'avaler. — *Déglutition douloureuse, difficile, et quelquefois même spasmodique, avec péril de suffontion. — *Impossibilité d'avaler le moindre liquide, qui sort par les narines. — *Les maux de gorge s'étendent ordinairement jusqu'aux oreilles, aux parotides, aux glandes sous-maxillaires et à celles du cou; ils s'aggravent, pour la plupart, en avalant à vide, ainsi que la nuit à l'air frais et en parlant, et ils sont souvent accompagnés de salivation.

Appétit. — *Goût putride, salé, -douceûtre, ou métallique. — Gout amer, principalement le matin, à jeun. — Gout amer ou doutestre du pain de seigle. - *Goût acide et muqueux pendant et hors le temps des repas. - *Soif riolente, ardente, le jour et la nuit, avec désir de boissons froides, et principalement de lait et de dière. - *Désir de vin et d'eau-de-vie. - *Appétit et faim insatiables, avec insipidité des aliments. — Boulimie avec grande faiblesse. — *Manque d'appétit. — Nul désir d'aliments, qui cependant sont agréables au goût en les mangeant. — Soif plus prononcée que l'appétit. - Satiété prompte en mangeant. Dégoût de tous les aliments, principalement des aliments solides, de la viande, des sucreries, des aliments cuits et du café. -Grande faiblesse de la digestion avec faim continuelle, et pression dans l'estomac, rapports fréquents, pyrosis et beaucoup d'autres incommodités après le repas. — Le pain pèse sur l'estomac.

Estomac. — *Nausées et envie de vomir excessives, souvent arec douleurs incisives et pressives dans l'estomac, la poitrine et le ventre, anxiété et inquiétude, mal à la tête, vertiges, obscurcissement des yeux, et chaleur fugace. — Les nausées augmentent souvent après le repus, et sont accompagnées d'une sensation dans la gorge, comme si l'on avait mangé des choses sucrées.—




468

dantes de mucosités sanguinolentes. -- *Selles muqueuses ou bilieuses, ou putrides; ou acides, ou d'une couleur verdatre ou brunâtre, ou rougeâtre, ou jaune de soufre, ou d'un blanc grisâtre. — Selles de la consistance de la bouillie, ou écumeuses, ou comme des matières hachées. — *Évacuation de matières corrosires et brûlantes. — *Sortie de sang ou de mucosités par le rectum, même avec des selles non diarrhéiques, et hors le temps des selles, quelquefois avec ténesme à l'anus. — Sortie des hémorrhoïdes. — *Sortie d'ascarides et de lombrics. — Prurit, élancements et excoriation à l'anus. — °Chute du rectum, qui, à sa sortie, paraît noir et saignant. — °Selles de matières non digérées, ou noires et comme du goudron.

Urines. - Envie continuelle d'uriner le jour et la nuit, quelquefois avec des efforts inutiles, ou avec émission and abondante. Jet d'urine excessivement mince. — Éraculum fréquente et abondante d'urine, comme dans le diabète, avec amaigrissement excessif. - Envie pressante d'uriner, avec incontinence d'urine. Pissement nocturne. — Émission d'urine goutte Leoutte. --Urines de couleur foncée, ou rouges, ou brunes, ou blanches. comme mêlées de farine ou de craie, ou couleur de sang. *Urines fétides, troubles et formant un dépôt, ou sanguinolentes, ou d'une odeur acide. - *Urines corrosives et brûlantes. - Dépôt épais dans les urines. — Nuage blanc et floconneux dans les urines. - Sortie de mucosités dures ou de flocons et de filets blancs pendant ou après l'émission de l'urine. — *Écoulement de sang par l'urèthre. - Douleurs incisives et contractives dans la région rénale, la nuit. — Pulsations, douleurs incisires. brûlement et élancements dans l'urèthre, même hors le temps de l'émission des urines. - Inflammation de l'orifice de l'urêthre, et écoulement de matières épaisses, jaunâtres, ou séreuses, blanchâtres.

Parties viriles. — Exaltation de l'appétit vénérien et grande lascivité, avec éruptions et pollutions fréquentes. — Érections nocturnes douloureuses, et quelquesois pollutions sanguinolentes. — Verge petite, froide et sasque. — Prurit voluptueux, fourmillement, déchirement et élancements au gland et au prépuce. — Ensure ou gonstement instammatoire du prépuce, quelquesois avec douleurs brûlantes, gerçures, rhagades et éruptions. — Sécrétion purulente entre le prépuce et le gland, quelquesois avec gonstement; chaleur et rougeur dé la partie antérieure de la verge. — *Vésicules et ulcères phagédéniques à fond lardacé et à bords élerés, au gland et au prépuce. — Sensation de froid dans les testicules. — Testicules durs et gons siès, avec rougeur luisante du scrotum *et douleur tractive dans les testicules et le cordon spermatique. — Prurit, sourmillement et élancements dans les testicules. — Forte transpiration des parties en marchant. — Excoriation entre les partieu et les cuisses.



Règles. - *Suppression des règles. - Règles trop abondantes, avec inquiétudes et coliques. - Métrorrhagie. - *Avant les règles, chaleur sèche, avec ébullition de sang et congestion à la tête. - Pendant les règles, langue rouge, avec taches foncées et brûlement, goût salé de la bouche, dents agacées et gencives décolorées. - Flueurs blanches purulentes, corrosives, avec démangeaison aux parties. - Prurit, boutons et nodosités aux lèvres. - Gonflement inflammatoire du vagin, avec sensation comme si tout était à vif et excorié. - Gonflement des lèvres avec chaleur, dureté, rougeur luisante, grande sensibilité au toucher, et douleurs brûlantes, pulsatives et lancinantes. - *Chute du vagin. - Conception facile et certaine. - *Tuméfaction dure des mamelles, avec douleurs d'ulcérations, ou cavec suppuration et ulcération réelle. - *Excoriation des mamelles.

Larynx. - *Catarrhe, avec frissons fébriles, humeur hypocondriaque, dégoût de tous les aliments et constipation. - Enrouement continuel et perte de la voix. - Voix nasillarde. - Brûlement et chatouillement au larynx. - *Toux sèche, quelquefois fatigante et ébranlante, principalement le soir au lit, ou la nuit, même pendant le sommeil, et le matin, en se réveillant, excitée par un chatouillement ou une sensation de sécheresse dans la poitrine, et aggravée en parlant. - Toux comme par une irritation de l'estomac. - ºToux convulsive, avec vomiturition. - En toussant, douleurs à la tête et dans la poitrine, comme si ces parties devaient éclater, cou élancements à l'occiput, ou douleur d'excoriation dans la poitrine et mal aux reins. - Envie de vomir et accès d'étouffement en toussant. - Toux, avec expectoration de sang pur. - Toux rauque, avec sensation de séche-

resse et élancements dans la gorge.

Poitrine. — Respiration difficile, comme si l'haleine manquait, ou courte et bruyante. - *Haleine courte, en montant l'escalier et en marchant vite. - Oppression anxieuse de la poitrine, et géne de la respiration, avec besoin de respirer profondément, principalement après le repas, ou avec accès de suffocation la nuit, ou le soir au lit étant couché (sur le côté gauche). - Manque d'haleine, avec serrement et tension dans la poitrine, et sensation comme si, au moindre mouvement et à la moindre parole, la vie allait s'éteindre.-Pression dans la poitrine, quelquefois jusqu'au dos, avec impossibilité de respirer profondément. — Brûlement dans la poitrine, quelquefois jusque dans la gorge. — Élancements (comme par des couteaux) dans la poitrine et dans les côtés, ou jusqu'au dos, principalement en respirant, en éternuant et en toussant. — Sensation de meurtrissure et de gonflement, et dou-leur d'excoriation et d'ulcération dans la poitrine. — *Battements de cœur.

Tronc. — Douleurs vives et sensation de meurtrissure dans les muscles de la poitrine. - Elancements, manque de solidité et fai-



MERCURIUS. — MERCURIUS CORROSIVUS.

465

blesse aux reins. — Douleur de meurtrissure aux reins, au dos et aux omoplates. — Brûlement et *douleur tractive au dos et à la nuque. — Roideur et gonflement rhumatismal de la nuque et du cou. — Élancements dans les muscles du cou. — Engorgement et gonflement inflammatoire des glandes du cou, arec douleurs lancinantes et pressives.

Bras. — *Douleurs vives dans les épaules et les bras, principalement la nuit et en remuant ces parties. — Tressaillements dans les bras et les doigts. — Gonflement chaud et rouge du coude jusqu'à la main. — Miliaire pruriante aux bras. — *Dartres furfuracées et brûlantes à l'avant-bras et au poignet. — Craquement, faiblesse et sensation de paralysie de lu main. — Sueur à la paume des mains. — *Éruption galeuse aux mains. — *Contraction crampoïde des mains et des doigts. — Gonflement des articulations des doigts. — *Gerçures et rhagades profondes et saignantes aux mains et aux doigts. — Douleurs crampoïdes et enroidissement facile des mains, en travaillant. — Gonflement du poignet, avec douleur au toucher et en le remuant. —Roideur des poignets. — Ulcération aux ongles. — Exfoliation des doigts. — Doigts morts.

Jambes. — *Douleurs vives et lancinantes dans l'articulation coxo-fémorale, ainsi que dans les cuisses et les genoux. principalement la nuit, et pendant le mouvement, et souvent avec sensation de froid dans les parties malades. — Grande faiblesse, lourdeur et courbature dans les cuisses et les jambes. — Sensation de roideur, de torpeur et de crampes dans les cuisses. — Boutons pruriteux aux cuisses. — Gonflement ædémateux, transparent, des cuisses et des jambes. — Tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts. — Miliaire pruriante, aux jambes. — *Dartres aux cuisses et aux jambes. — Contraction des jambes, et crampes aux mollets et aux orteils. — Gonflement du cou-de-pied ou des talons, avec douleurs vives ou lancinantes. — Douleur de luxation au pied. — Froid et sueur aux pieds. — Gonflement douloureux des os du métatarse. — Gonflement des orteils. — Cleération des ongles.

MERCURIUS CORROSIVUS.

MERC-COR. — Mercurius sublimatus, mercure corrosif, sublimé corrosif. — Inree d'action: 3 à 5 semaines. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac. homosop., p. 425.

ANTIDOTES: Voy. Mercurius.



tous les membres, comme après une attaque de fièvre intermittente. — Violentes douleurs dans tous les membres. — Crampes continuelles dans les membres. — Membres engourdis et insensibles. — Roideur paralytique et paralysie des extrémités, parfois avec sensibilité très-douloureuse au moindre changement de position, céphalalgie à la racine du nez, yeux fixes et brillants, peau sèche et sueur au front. — Tremblement des membres. — Manque de forces et faiblesse générale excessive; accès de faiblesse subite. — *Grande agitation, avec anxiété, inquiétude et jactation continuelles. — *Accès fréquents de défaillance, syncope. — *Douleurs ostéocopes dans les membres et à la tête. — Grande faiblesse dans les articulations. — Convulsions des bras, des jambes et des muscles de la face. — Douleurs dans le corps, avec roideur générale et augmentation des douleurs par le mouvement. — Plusieurs symptômes s'aggravent par la promenade au grand air.

Peau — Peau sèche, chaude, brûlante et mordicante. — Prurit lacinant et brûlant. — Peau pâle, décolorée et couverte de sueur. — Fourmillement dans la peau, comme par engourdissement. — Éruption miliaire par tout le corps. — Taches par tout le corps, comme scorbutiques, et dans les intervalles éruptions scabiéiformes, dartres et furoncles; bulles aux bras et au ventre. — Gonflements glandulaires, très-douloureux, autour des mamelons.

Sommeil. — Insomnie continuelle. — En s'endormant, sursauts violents avec ébranlement de tout le corps. — La nuit, repos nulle part, par sensation de chaleur et anxiété. — Sommeil trop léger. — État comateux. — Réveil toutes les nuits à 3 heures du matin. — Réves effrayants d'incendies, d'assassinat. — Décubitus sur le dos, pendant le sommeil, les membres abandonnés à eux-mêmes.

Fièvre. — Froid, très-souvent, la nuit aussi. — Extrémités froides. — Tremblement de froid avec claquement des dents. — Peau et extrémités froides. — Frissons avec tranchées, au moindre mouvement et même en se levant de son siége; ou bien au grand air, avec ténesme. — Frissons à la tête. — Chaleur, surtout en se baissant, diminuée en se redressant. — Sueurs nocturnes. — Sueurs froides. — Fièvre avec céphalalgie violente, face rouge, peau brûlante, yeux brillants, pupille rétrécie, front couvert de gouttes de sueur, corps roide et très-douloureux au moindre mouvement.

Moral. — Mauvaise humeur et grande propension à la colère, alternant quelquesois avec hilarité. — *Etat de stupeur, comme dans la fièvre typhoïde aussi. — Compréhension affaiblie; il ne comprend pas ce qu'on lui dit et regarde tout hébété ceux qui lui parlent. — Idées confuses avec paroles sans liaison.

Tête. — Céphalalgie violente, aggravée en se découvrant la tête. — Accès de vertiges. — Congestion à la tête et à la face, avec joues



467

brûlantes et émission abondante de vents. — Douleurs lancinantes au front. — Céphalalgie frontale, surtout à la racine du nez. — Élancement, déchirement et pression au-dessus de l'œil gauche, comme dans l'os. — Froid à la tête, particulière-

ment aussi le soir, en se couchant.

Youx. — Contraction du muscle sourcilier. — Conjonctive rouge et injectée. — Yeux ternes, abattus, cernés d'un cercle bleuâtre, exprimant la souffunce et l'horreur d'une mort prochaine. — Yeux étincelants et très-mobiles, ou proéminents et fixes. — Regard qui exprime l'exaltation et la douleur. — Pupilles insensibles à la lumière. — °Pupille inégale. — *Les objets paraissent plus petits et plus éloignés qu'à l'ordinaire. — Photophobie en se promenant au soleil.

Oreilles et Nez.—Pulsation et élancements, surtout dans l'oreille gauche. — Oreilles comme bouchées. — Bruissement, comme de l'eau courante, dans les oreilles. — Narines sèches, surtout au

grand air. — Coryza très-violent.


Face. — Face pûle, amaigrie, décomposée, hâve; face jaune et ridée. — Face rouge et bouffie. — Tuméfaction de la partie inférieure de la face, d'une couleur rouge brunâtre. — Gonflement douloureux des parotides, des glandes sous-maxillaires et des glandes sublinguales, avec ou sans salivation. — Roideur des muscles masticateurs. — Lèvres très-gonflées et proéminentes, comme chez les singes. — Lèvres pâles. — Lèvres sèches et gercées.

Dents. — Douleurs déchirantes, brûlantes, dans les molaires superieures, jusqu'à l'œil gauche, avec douleurs rhumatismales dans d'autres parties du corps, coliques, diarrhée, sommeil empêché et angoisse nocturne. — Dents agacées et branlantes. — Inflammation et tuméfaction des gencives avec douleurs brû-

lantes.

Bouche. — Inflammation de la cavité buccale, avec gonflement brûlant et ulcération. — Odeur fétide de la bouche. — Sécheresse de la bouche. — Langue rouge et brûlante. — Langue humide et chargée de blanc ou de jaune. — Langue gonflée, parsois au point de remplir toute la cavité buccale. — Parole dissicile. — Salivation abondante, parsois avec douleur à la houche. — Écoulement abondant d'un mucus albumineux, par la bouche. — Gonssement spongieux du palais.

Gorge. — Douleurs brûlantes dans la gorge, le pharynx et l'æsophage jusque dans l'estomac, riolentes et atroces.—Grattement douloureux dans la gorge et le pharynx, avec parole difficile, déglutition pénible et douloureuse pour les liquides, forçant quelquesois à cracher souvent. — Sensation de constriction et de resserrement du pharynx, avec dysphagie. — Douleurs atroces au pharynx, et dans toute l'étendue du canal digestif. — Détachement, dans la gorge et la bouche, de mor-



468

ceaux d'épithélium amorti. - Déglutition difficile, très-douloureuse, et même entièrement impossible.

Goût et Appétit. - Goût de la bouche, métallique, astringent, on amer, ou salé. - Goût amer des aliments. -- Anorexie complète. - Soif violente, inextinguible, parfois avec nausées, vomituritions et vomissements après l'injection du moindre liquide.

Gastricisme. - Eructations douloureuses. — Hoquet fréquent et violent. - Vomissements abondants, fréquents, continuels, surtout la nuit, et quelquesois avec douleurs atroces à l'épigustre et à la région ombilicale. — Vomissements bilieux, verdâtres, amers, mélés quelquesois d'aliments ou de stries de sang. — Vomissements de matières muqueuses, blanchâtres ou bleuâtres, ou filandreuses, écumeuses ou sanguinolentes. — Vomissement des aliments. — Vomissements de sang pur. — Vomissements de matières noires, comme du marc de café, entremèlées de caillots de sang. — Vomissements avec diarrhée bilieuse.

Estomac. — Chaleur, brûlement et douleurs violentes, atroces, dans l'estomac et au creux épigastrique. — Pression pénible.

pincements douloureux et picotements dans l'estomac.

Ventre. - Élancements dans la région hépatique. — Grande sensibilité de l'épigastre à la moindre pression. — Douleurs violentes, atroces, dans les régions épigastrique et hépatique. —
Tranchées, pincements et fortes douleurs dans la région ombilicale. — Douleur de contusion dans la région du cœcum.
— Fortes coliques, déchirement, tranchées violentes et douleurs
atroces dans les intestins; quelquefois avec selles sanguinolentes.
— Tranchées après avoir mangé des pommes de terre. — Tranchées avec froid, frissons et sensibilité au grand air. — Ventre
ballonné, gonflé, météorisé et excessirement douloureux au
moindre contact. — Douleurs dans l'épigastre, arec crampes
dans les membres pelviens et ménostasie. — Peau de l'abdomen
froide sur tous les points. — Ventre excessirement douloureux
au toucher. — Sensation de gonflement dans les glandes inguinales.

Anus et Selles. - Suppression des éracuations alvines et urinaires. - Constipation opiniâtre et invincible. - Fréquents besoins d'aller à la selle, sans résultat, et très-fatigants. - Selles fréquentes en forme de bouillie, noirâtres et très-fétides. - Selles de diverses matières, rubanées, gluantes, argileuses. brunâtres et rougeatres, ou bleuâtres, en gruneaux et très-fétides. - Éracuations abondantes, muqueuses ou bilieuses. - Eracuations fréquentes, surtout la nuit, arec coliques et ténesme. - Envies excessivement pressantes d'aller à la selle. - Evacuations frés-douloureuses. - Diarrhées très-fétides, jaunâtres ou muqueuses. - Diarrhées avec ténesme. - Diarrhées sanguinolentes. - *Dyssenteries avec évacuation de mucosités sanguinolentes, coliques et tranchées continuelles, enries inces-



469

santes d'aller à la selle et ténesme des plus douloureux. — Évacuations involontaires de sang pur. — Douleurs brûlantes dans le rectum et l'anus.

Urines. — Suppression des urines. — Rétention d'urine. — Urines rares et rouges, avec émission difficile. — Urines trèstroubles, d'une couleur brun foncé. — Urine jaune pâle, avec dépôt grisâtre. — Prurit, brûlement et élancements au méat urinaire. — *Écoulement gonorrhéique de matières épaisses, avec cuisson en urinant et élancements le long de l'urèthre.

Parties viriles. — Élancements dans les testicules. — Fortes érections avec désir du coît. — Éjaculations rares pendant le coît. — Après le coît, élancement brûlant dans la partie antérieure de

l'urèthre.

Règles et Parties de la femme. — Suppression des règles, avec céphalalgie et tremblement des bras, des jambes et du cou. — Avant les règles, tremblement des membres. — Règles trop abondantes, comme une perte. — Métrorrhagie violente et de longue durée. — Douleur pressive au museau de tanche, en le touchant, pendant le coît. — Leucorrhée blanc jaunâtre, d'une odeur douceâtre et nauséabonde. — Gonflement douloureux des glandes autour des mamelons.

Larynx. — Élancements dans la partie supérieure du larynx, en avalant à vide. — Sécheresse du larynx, le soir. — Voix enrouée et faible. — Toux sèche, creuse et fatigante. — Toux spasmodique. — Expectoration de mucosités mêlées de sang. — Hémoptysie.

Poitrine.—Haleine fétide. — Respiration très-lente. — Oppression de poitrine et respiration génée. — Crampe dans le côté droit de la poitrine qui se dirige dans le bras. — Élancements qui traversent la poitrine. — Élancements pleurétiques. — Pleuropneumonie constatée, surtout du côté gauche. — Palpitations du cœur. — Battements irréguliers du cœur, ondulatoires et tremblotants.

Tronc. — Douleurs dans la région lombaire, se propageant dans l'hypogastre et les aines, et alternant avec convulsions et contractions musculaires générales. — Cou douloureux à la pression. —

Sensation de gonfiement dans les glandes axillaires.

Extrémités supérieures. — Crampes des extrémités supérieures. — Sensation de fatigue dans les deltoïdes. — Froid des mains et des pieds. — Douleurs dans les os du métacarpe. — Douleurs fortes dans les articulations du pouce. — Crampes dans les doigts et les mains.

Extrémités inférieures. — Sensation de fatigue, élancements et douleurs rhumatismales dans les extrémités inférieures. — Paralysie et insensibilité complète des extrémités inférieures. — Déchirements et élancements dans l'articulation coxo-fémorale. — Jambes engourdies. — Froid glacial des pieds. — Crampes



MEZEREUM.

470

MEZERBUM.

MEZ. — Bois gentil, Daphné mezéreum. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac. homœop., p. 246 — Doses niitees: 15, 30. — Durree d'action: jusqu'à 30 jours, dans quelques affections chroniques. Antidotes: Camph. merc. — On l'emploie comme antidote de: Merc. nitr-ac. avec: Euphor. hell. hyos. ignat. merc. nitr-ac. puls. staph. veratr. zinc.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Inflammation, ramollissement, carie et autres affections des os; Suites fácheuses de l'abus du mercure; Affections scrofuleuses aver glandes engorgées; Pachitisme?; Carreau?; Fièvres intermittentes; Teigne; Ophthalmies; Prosopalgie et odontalgie rhumatismales?; Hématurie; Flueurs blanches opiniatres; Raccourcissement des tendons de la jambe, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Tractions, déchirements rhumatismaux et tension dans les membres, avec faiblesse paralytique. Douleurs tressaillantes qui laissent longtemps après elles une sensation pénible. — Douleurs tractives dans un côté du corps, avec frissons. - *Accès de douleurs et autres souffrances accompagnées de frissons et d'horripilation. - Douleurs rongeantes d'excoriation dans les membranes muqueuses. - Brûlement dans les organes de la digestion. — Inflammation et gonflement des os. — Vicération des os. — Tressaillement et frémissement des muscles. — Tractions et sensation d'accable-ment dans les articulations. — Brisement et pesanteur dans tous les membres. - Lourdeur et paresse du corps. - Marche courbee. -- "Amaigrissement ou bouffissure du corps et du visage, avec ventre gros, chez les enfants. Glandes douloureuses. -Prédominance des souffrances d'un seul côté du corps. Exacerbation des symptomes le soir. — Douleurs aggracées en touchant la partie affectée et par le mouvement. - Grande susceptibilité à l'air froid.

Peau. — Desquamation générale de la peau du corps. — *Prurit, surtout la nuit, plus violent et plus douloureux après s'être gratté, et quelquefois avec gonflement de la partie qu'on a grattée. — Prurit rongeant, comme par de la vermine. — Éruptions miliuires, quelquefois chroniques. — Furoncles. — Ulcères





enflammés, avec brûlement et élancement, on avec douleur rongeante d'excoriation.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, avec sommeil agité et non réparateur, la nuit. — Secousses dans le corps pendant le sommeil. — Réveil de bonne heure (vers 2 ou 3 heures du matin),

par un cauchemar.

Fièvre. — *Frissonnement, frisson, et froid de tout le corps, surtout aux mains et aux pieds, avec soif violente, et quelquesois sans désir de se réchausser. — Après les frissons, sommeil avec sueur. — Fièvre, accompagnée de mal à la tête, pâleur du visage, région splénique douloureuse, gonsiée et dure, faiblesse, et *grande susceptibilité à l'air froid; otype tierce. — Fièvre inflammatoire, violente.

Moral. — Humeur hypocondriaque, avec tristesse et pleurs. —
Angoisse et inquiétude, surtout dans la solitude, avec désir de
la société. — Maussaderie. — Emportements. — Inaptitude
au travail. — Faiblesse de la mémoire. — Émoussement de
l'intelligence. — Conception lente. — Les idées ge perdent fré-

quemment.

Tête. — Embarras stupéfiant dans la tête, comme si on était ivre, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige à faire tomber de côté, avec scintillement devant les yeux. — Maux de tête, avec horripilation et frissons, aggravés en plein air. — Maux de tête pressifs et étoprélissants, d'un seul côté du cerveau. — Douleur d'écartement compressive ou crampoule dans la tête. — Violentes douleurs pulsatives et pressives dans toute la tête, le front, le nez et les dents, aggravées par le mouvement le plus léger. — Mal de tête martelant, avec vomissement de mucosités. — «Sensation de torpeur avec douleurs tractives dans un côté de la tête. — Douleurs ostéocopes dans le crâne, aggravées par le toucher. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu et des cheveux au toucher. — Prurit rongeant au cuir chevelu. — *Eruption pruviquée à la tête, parfois avec suintement.

*Eruption pruriante à la tête, parfois avec suintement.

Yeux. — Douleur comme si le globe des yeux était trop volumineux, avec pression. — Cuisson dans l'angle interne des yeux. — Inflammation des yeux. — Myopie ou presbyopie. — Étincelles

devant les yeux. - Pupilles contractées.

Greilles. — Ótalgie avec traction et tiraillements aigus. — Éruption pruriante et suintante derrière les oreilles. — Dureté de l'ouïe. — Sensation d'obturation des oreilles. — Tintement dans

les oreilles, quelquefois avec envie de dormir.

Nez. — Excoriation de l'intérieur du nez. — Diminution de l'odorat, avec sensation de sécheresse dans le nez, et quelquefois envie inutile d'éternuer. — Éternument fréquent, accompagne de douleur d'excoriation dans la poitrine. — Coryza fluent, avec sécrétion de mucosités liquides et jaunes, excoriation et brûlement dans le nez, et éruption aux lèvres.



472

MEZEREUM.

Visage. — *Pâleur du visage. — *Pression crampoïde et étourdissante, dans les os des joues, °quelquefois d'un seul côté, et
s'étendant jusqu'à l'œil, à la tempe, à l'oreille, aux dents, au cou
et dans l'épaule. — Tractions dans les os des mâchoires. — Tressaillement continuel et penible dans les joues et les paupières.—
Furoncles à la face. — Exceriation et brûlement aux lèvres et
aux commissures des lèvres. — Lèvres gonflées et gercées, avec
exfoliation. — Lèvre supérieure ulcérée avec douleur brûlante au
toucher. — Élancements dans les glandes sous-maxillaires.


Dents.—*Douleurs dans les dents cariées.— *Élancements tractifs, brûlants ou térébrants, dans les dents et jusque dans les os des joues et les tempes.— *Douleurs tressaillantes et déchirantes dans les dents.— *Sensation comme si les dents étaient agacées, et qu'elles fussent trop longues.— Les maux de dents sont aggravés par le toucher et le mouvement, ainsi que pendant les frissons, le soir.— Pendant les maux de dents, bouillonnement de sang à la tête, frissons et constipation.— Dents enduites de mucosités fétides.— Dents qui se carient promptement.— Vésicules brûlantes aux geneives.

Bouche et Gorge. — Vésicules brûlantes dans la bouche et sur la langue. — Brûlement continuel dans la bouche. — Parole embarrassée. — Douleur pressive dans la gorge en avalant. — Apreté, excoriation, grattement cuisant, et élancement dans la gorge et le palais. — Brûlement dans la gorge et dans l'œsophage. — Inflammation de la gorge. — Constriction et rétrécissement du pharynx.

Appétit et Estomac. — Goût amer de la bière, que l'on rejette. — Faim violente l'après-midi et le soir. — Répugnance pour la viande. — Revvois fréquents et à vide, surtout après avoir bu. — Nausées avec accumulation d'eau dans la bouche, horripilation et tremblement de tout le corps. — Vomissements violents de mucosités verdâtres et amères, accompagnés de maux de tête. Vomissement de sang. — Pression à l'estomac. — Brûlement et sensation de chaleur dans l'estomac. — Inflammation de l'estomac. — Contraction du diaphragme.

Ventre. — Ventre dur et tendu. — Douleurs abdominales, chroniques, crampoïdes, tiraillantes, aiguës, pressives, constrictives et lancinantes. — Pesanteur dans le ventre. — Sensation de chaleur et brûlement dans le ventre. — Inflammation des intestins. Pression expansive dans l'anneau inguinal. — Traction dans les glandes de l'aine. — Coliques flatulentes avec gargouillements et borborygmes dans le ventre, géne de la respiration et frissons.

Selles. — Évacuations alvines difficiles, de la consistance d'une bouillie épaisse, avec besoin pressant. — *Constipation. — Selles peu abondantes, molles, fréquentes. — Diarrhées violentes avec douleurs insupportables dans le ventre. — Après la selle, con-



MEZEREUM. - MILLEFOLIUM.

473

striction de l'anus qui se referme sur le rectum qui est sorti. — Avant et après la selle, froid et horripilation.

Urines. — Diminution de la sécrétion des urines. — Nuages floconneux et sédiment rougeâtre dans les urines. — *Pissement de sang. — Douleur d'excoriation dans l'urethre. — Écoulement de mucosités par l'urethre.

Parties génitales. — Déchirement, tressaillement et lancination dans la verge. — Lancinations déchirantes et brûlantes au bout du gland. — Sécrétion abondante du smegma derrière le gland comme une gonorrhée bâtarde. — Gonflement du scrotum. — *Leucorrhée chronique comme du blanc d'œuf; quelquefois aussi séreuse.

Larynx. — Enrouement, avec brûlement et sécheresse dans la gorge, irritation qui provoque la toux et gêne de la respiration. — *Toux violente en étant couché. — Toux sèche avec vomiturition et vomissement le soir et la nuit.

Poitrine. — Gêne de la respiration. — Douleurs dans la poitrine en inspirant, comme si les poumons étaient adhérents et la cavité de la poitrine trop resserrée. — Pression à la poitrine. — Tension douloureuse des muscles de la poitrine. — Douleur d'excoriation et brûlement sur le sternum. — Points dans la poitrine, aggravés en inspirant.

Tronc. — Douleurs aux reins. — Douleur contractive et tensive dans le dos et jusque dans le sacrum. — Élancements dans le dos. — Roideur douloureuse de la nuque et du cou. — Déchirements saccadés dans les côtés du cou. — Douleur d'excoriation dans les aisselles.

Bras. — Douleur dans l'articulation de l'épaule, comme si elle allait se déboiter. — Tension tractive et rhumatismale dans les bras, avec faiblesse paralytique. — Douleurs tressaillantes dans les épaules, les bras, les mains et les doigts. — Gonflement et chaleur du bras et de la main, avec tressaillement et picotement dans les muscles.

Jambes. — Tressaillement dans l'articulation coxo-fémorale, et jusque dans le genou. — °Raccourcissement de la jambe. — Douleurs ostéocopes dans les cuisses et les jambes. — Déchirement, tractions et tension dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils. — Tension et roideur dans les genoux. — Tressaillement et douleur pressive dans le tibia. — Gonfiement dur des mollets. — Douleur tressaillante dans les orteils.

MILLEFOLIUM.



MILLEFOLIUM.

474

usitées: 0, 30. — Médicament qui, jusqu'ici, n'avait été employé que contre des Hémorrhagies et surtout quelques espèces d'Hématurie et d'Hémoptysie (surtout chez les phthisiques, mais qui mérite hien d'être placé au rang de nos polychrestes).

CLINIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas où l'on pourra le consulter avec succès contre l'une ou l'autre des affections suivantes : - Affections rhumatismales et arthritiques, aiguës et chroniques; Contractures; Hystérie; Hypocondrie; Convulsions des personnes hystériques, des enfants, des femmes en couches; Epilepsies; Eclampsies. - Eruptions pustuleuses, scabéiformes et autres; Pourpre hémorrhagique; Varices des femmes enceintes; Ulcères de toute nature, fistuleuses, gangréneuses, atoniques, scorbutiques, carieuses; Contusions; plaies et blessures; Suites fâcheuses d'une chute; Morsures venimeuses. — Fièvres intermittentes, tierces, pernicieuses, pestilentielles. — Hémorrhagies de toute nature; Souffrances particulières de la vieillesse et du sexe féminin ; Blennorrhées. - Mélancolie; Céphalalgies; Blennorrhée des yeux et larmoiement; Taies de la cornée; Vue trouble; Otalgies; Maux de dents; Angines catarrhales. — Dyspepsies; Cardialgies; Coliques de diverses sortes, venteuses, hystériques, hémorrhoïdales; Ascite; Hernies incarcérées; Lombrics; Dyssenteries; Diarrhées muqueuses; Hémorrhagies intestinales; Hémorrhoïdes. — Hématurie; Gravelle et calculs vésicaux; Rétention d'urine; Gonorrhée; Condylômes. - Règles trop abondantes; Métrorrhagies; Suppression subite de règles ordinairement trop abondantes; Avortement imminent; Chlorose; Leucorrhée. - Diverses souffrances des femmes en couches, surtout affections spasmodiques, lochies trop fortes ou supprimées; Mamelons écorchés. - Toux et blennorrhée des poumons; Hémoptysies et hémorrhagies pulmonaires; Phthisie tuberculeuse et autres affections pulmonaires.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement, élancements dans les membres. — Faiblesse et sensation de malaise, avec pandiculations. — L'usage du café produit des congestions à la tête et des douleurs dans les membres. — °Convulsions; sursauts faciles à la moindre occasion. — Éruptions boutonneuses; °Carie des os. °Dans bien des cas de lésions traumatiques aussi important qu'Arnica (jahr). — *Hémorrhagie. — *Fièvres avec froid et horripilations, chaleur extérieure et intérieure; chaleur fébrile avec soif; °fièvres intermittentes. — Envie de dormir, avec bâillements et pandiculations; bâillements violents; accès de congestion au cerveau, pendant le somméil.

Moral et Tête. - Caractère violent et emporté; frayeur facile. -





Confusion et embarras dans la tête, avec sensation continuelle comme s'il avait oublié quelque chose, ne sait ni ce qu'il fait, ni ce qu'il veut, avec aggravation le soir, ainsi qu'après l'usage du vin et du café. — Stupeur, vertiges, ivresse; vertige à faire tomber à droite ou en arrière, à tout mouvement léger et en marchant, avec nausées en se baissant. — Congestion à la tête, avec douleur comme si le crâne allait éclater; tapage et sensation d'un courant de flammes dans la tête; douleurs dans l'occiput, au réveil surtout; sensation comme si un cordon entourait le front: "violente céphalaigie, avec tressaillement des paupières et des muscles du front. — Les chereux s'entortillent souvent et d'une manière extraordinaire; lors même qu'on les fait un peu raccourcir.

Yeux — Oreilles — Nes. — Vue trouble comme par un brouillard, mais dans le lointain seulement; yeux brillants. — Oreilles comme bouchées; tintement; sensation comme si de l'air froid ou de l'humidité sortait de l'oreille; *douleurs d'oreille surtout à gauche. — Dans le nez, élancements vers la racine, partant de

l'œil; *saignement du nez.

Face et Dents. — Rougeur de la face sans chaleur; teint frais et rose; lèvres gercées; petits ulcères au côté interne de la lèvre inférieure. — *Maux de dents, partant de la face; oulcère aux

gencives.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche; estomacace; langue sèche et gonflée; brûlement et sensation de contraction à la langue. — Au palais, douleur comme d'une coupure; erelâchement de la luette?. — Mal à la garge, pendant et hors le temps de la déglutition; mal à la gorge chaque soir; douleurs lancinantes, très-sensibles, passant cà et là à droite de la gorge, près du larynx; eulcères dans la gorge?.

Appétit et Souffrances gastriques. — Sensation de faim augmentée, avec rongement et fouillement dans l'estomac; *manque

d'appétit. - Renvois à vide et hoquet.

Estomac. — Sensation de plénitude dans l'estomac: estomac comme rembourré de terre astringente; crampe d'estomac, avec la sensation comme s'il y avait un liquide dedans qui se dirigeât vers les intestins et l'anus; douleurs violentes dans le creux de l'estomac;

*gastralgies; brûlement dans l'estomac.

Ventre. — Douleur, tiraillement et brûlement dans l'hypocondre droit; odouleur dans la région du foic. — Flatuosités, douleurs de ventre comme par des vents incarcérés, borborygmes et tranchées; sortie fréquente de vents fétides. — *Coliques renteuses: ocoliques traumatiques, par lésions mécaniques du ventre ?. - o'Ascite?. — o'Hernies incarcérées?.

Selles et Anus. — Petites selles molles, fréquentes; odyssenteries; odiarrhées muqueuses; flux cœliaque; lientérie?. — *Hémorrhoïdes saignantes, gonflées, douloureuses; ohémorrhagies intes-

tinales, surtout à la suite d'un effort. - «Lombrics?.



MILLEFOLIUM. — MOSCHUS.

476

Urines. — Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante; urines rouges et abondantes. — «Incontinence d'urine?. — *Hématuries. — «Catarrhe de la vessie?. — «Gravelle, calculs vésicaux et dysurie provenant de ces causes?.

Parties viriles. — °Gonorrhée?. — °Rétention du sperme dans le coīt. — °Condylômos?. — °Gonflement et induration des testicules?.

Règles et Parties de la femme. — *Règles trop abondantes; menstrues irrégulières, tantût trop faibles, tantût trop fortes; *métrorrhagies; *souffrances par suite de suppression des règles? — *Leucorrhée. — *Infertilité avec règles trop abondantes?: *ofausses couches imminentes?. — *Convulsions et autres souffrances des femmes en couches; *olochies trop abondantes. — *Ecorchure des mamelons?. — *Manque de lait avec lochies supprimées et fièvre?.

Laryax et Poitrine. — *Toux: -avec expectoration écumeuse: avec vomissement; *hémoptysie, opar suite d'une chute ou d'un coup sur la poitrine, ochez les personnes phthisiques. — oBlennorrhée des poumons; ophthisie tuberculeuse?. — *Dyspnée; souffrances asthmatiques. — Élancements dans la poitrine.

Trono et Membres. — Douleur dans la région du rein gauche, suivie de pissement de sang. — *Douleurs dans les bras; pression lancinante dans le bras droit; engourdissement, picotement et douleurs (ostéocopes?) dans le bras droit; bras droit comme paralysé. — Douleurs au-dessus de l'articulation de la main gauche: douleur pressive, pulsative, dans les os du métatarse; douleur comme d'un abcès sous l'ongle du pouce. — Douleur de contusion, comme à la suite d'une chute, à la fesse droite et au tendon d'Achille et dans le jarret; douleurs violentes, comme ostéocopes, dans le pied droit; fourmillement et sensation d'engourdissement dans les pieds.

MOSCHUS.

MOSCH. — Musc. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 335 — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 24 heures environ. ANTIDOTES: Camph. n-vom. Comparer avec: Asa. bry. cocc. coff. con. croc. ign. n-vom. op. puls. spig. staph. stram.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Convulsions; Syncope; Faiblesse hystérique; Différentes affections hystériques et hypocondriaques; Surexcitation nerveuse, avec



MOSCHUS.

477

insomnie; Céphalalgies hystériques et nerveuses; Migraine; Épistaxis; Impuissance?; Souffrances asthmatiques; Asthme de Millar?; Croup?; Spasmes pulmonaires, surtout ches les personnes hystériques, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Picotement dans les membres, quelquefois avec douleurs des parties affectées. — Douleurs crampoïdes dans les membres. — Tremblement et tressaillement par tout le corps. — Faiblesse que l'on ressent plutôt pendant le repos que dans le nouvement. — °Faiblesse jusqu'à tomber évanoui, avec froideur nocturne de toute la peau du corps. — Accès de défaillance, surtout la nuit, le soir ou au grand air, suivis de maux de tête. — Douleur de luxation et de brisement à la partie sur laquelle on est couché. — Les souffrances s'aggravent lorsque le corps se refroidit. — Forte susceptibilité au grand air. — Pincements, élancements et prurit qui force à se gratter, à différentes parties du corps. — Tétanos. — *Convulsions avec crampes de la poitrine. — Symptômes hystériques, même chez des hommes.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour, avec bâillements fréquents et profonds. — Somnolence. — La nuit, impossibilité de rester longtemps couché dans la même position; la partie sur laquelle on repose est douloureuse, comme si elle était luxée ou brisée. — Rêves vifs de choses infamantes, et dans lesquelles rien ne réusit. — *Insomnie pendant toute la nuit, par surexcitation

du système nerveux.

Pièrre. — Circulation du sang accélérée. — Sensation fréquente, comme s'il soufflait un air frais, surtout sur les parties découvertes. — Sensation de froid, le plus souvent à la colonne vertébrale, avec douleurs tractives. — Le grand air semble froid, on recherche le feu. — Horripilation fréquente et légère, partant de la tête et se répandant sur tout le corps. — Accès de chaleur

brûlante, le soir. — Tous les matins, sueur.

Moral. — Grande distraction et absence d'esprit, parsois avec paroles confuses. — Préoccupation, pendant laquelle on se parle à soi-même et on gesticule, comme si on avait perdu la tête. — Grande activité, avec faiblesse qui fait qu'on laisse tout tomber des mains. — Plaintes et lamentations à cause de souffrances excessives, sans que le malade puisse dire où est son mal; en le questionnant, il se plaint plus violemment encore, mais sans dire où il souffre. — Crainte de mourir et peur excessive de la mort. Anxiété hypocondriaque, quelquesois avec battements de cour. — Humeur excessivement querelleuse et grande iras-cibillé, avec emportement juage'à la fureur. — Perte de la mémoire.

£7. ~



MOSCHUS.

Tête. — Vertige et vacillement devant les yeux, au moindre mouvement de la tête. — Vertige jusqu'à faire perdre connaissance, ou avec évanouissement. — Vertige, avec sensation comme si l'on faisait une chute. — Vertiges avec nausées et vomissements, besoin de se concher, et désir de café à l'eau. — Étourdissement comme par l'ivresse. — Maux de tête, avec nausées et vomissements, qui forcent à se coucher. — Pesanteur de la tête. — Mal de tête compressif et étourdissant, surtout immédiatement au-dessus de la racine du nez. — *Traction crampoïde et tensive dans la tête, et surtout dans l'occiput, et jusque dans la nuque. — Con-

gestion à la tête. — Douleur pressive et térébrante dans la tête comme si un clou était enfoncé dans le cerveau.

Yeux. — Yeux ternes, avec douleur pressive dans les angles. —
 Larmoiement. — Yeux fixes, étincelants, avec une sorte d'étour-dissement et absence d'esprit. — Obscurcissement subit des yeux. —
 Petits boutons rouges sur les paupières supérieures. — Prurit dans les angles des yeux.

Oreilles. — Éruptions aux oreilles, avec douleur brûlante après s'être gratté. — Crépitation et craquement dans les oreilles. — Bruissement devant les oreilles. — Dureté de l'ouïe. — Écoulement

de cérumen par les oreilles.

478

Visage et Nez. — Chaleur du visage, quelquefois sans rougeur et avec yeux ternes. — Chaleur d'une joue sans rougeur, tandis que l'autre est rouge sans chaleur. — Teint terreux. — Tension dans les muscles de la face, comme s'ils étaient trop courts. — *Épistaxis. — Fourmillement au bout du nez, comme par des insectes.

- Exfoliation des lèvres.

Estomac. — Goût putride des aliments. — Rapports violents, quelquefois avec nausées. — Accès de nausées subites. — Nausées qui remontent de l'épigastre, avec rétraction du nombril et douleurs crampoïdes. — Vomissements violents surtout le matin, et souvent accompagnés de douleur à l'estomac et à la poitrine, et de ballonnement de l'épigastre. — Pression à l'estomac. — Sensation de plénitude et de géne dans la région de l'estomac et de l'épigastre, —quelquefois avec malaise, augmentée après avoir mangé modérément. — Sensation d'excoriation cuisante, brûlante, dans la région de l'estomac, après le repas.

Ventre. — Accès de contraction douloureuse dans la région ombilicale, avec suspension de la respiration. — Sensation de tension dans le ventre, comme si tous les vêtements étaient trop justes, accompagnée d'une anxiété qui ne permet de se livrer à aucun travail, ni de rester à la même place, mais oblige à courir constamment de côté et d'autre. — Incarcération de

flatuosités.

Selles. — Constipation, surtout après avoir pris du café. — Diarrhée, surtout la nuit, et quelquefois pendant le sommeil. Diarrhée avec tranchées violentes. — Les selles diarrhéiques sont



MOSCHUS. - MUREX PURPUREA.

479

toujours mêlées de matières stercorales. — Selle couleur de sépia. — Envie pressante et inutile d'aller à la selle.

Parties viriles. — Forte exaltation de l'appétit rénérien, quelquefois avec chatouillement insupportable dans les parties d' douleurs tensives à la verge. — Impuissance à la suite d'an froidissement. — Pollutions douloureuses, sans érection. — Érection avec douleur brûlante dans l'urèthre. — Après le coit, nausées et vomissements.

Règles. — Menstruation trop hâtire et trop abondante. — Traction et sensation comme si tout se portait vers le bas-ventre et

les parties génitales, pendant les règles.

Poitrine. — Constriction dans le larynx, comme par la vapeur du soufre. — Respiration difficile et haleine courte, avec élancements dans la poitrine. — Constriction crampoïde et suffocante de la poitrine, surtout lorsqu'on prend froid. — *Crampes de poitrine, odébutant quelquefois par un besoin de tousser, et s'aggravant ensuite jusqu'à porter au désespoir. — Douleur pressive dans la poitrine, qui va jusqu'à suspendre la respiration. — Élancements dans la poitrine et dans les côtés, quelquefois avec rougeur et bouffissure de la face, pupilles dilatées, langue rouge et sèche, et soif ardente. — La poitrine est fortement attaquée et douloureuse dans toutes les parties, avec toux violente et sèche. — Sensibilité douloureuse de la poitrine, sous les bras, surtout à la pression.— Battement de cœur anxieux.

Trono et Membres. — Tractions violentes dans la nuque et le dos, comme si tout était tendu. — Tractions dans toute l'étendue du bras, et surtout au poignet, comme par une crampe. — Brûlement avec sensation de froid aux dernières phalanges des doigts. — Gonflement des mains, avec douleurs lancinantes. — Mouvements convulsifs des mains et des doigts. — Inquiétude dans les jambes, avec faiblesse paralytique qui oblige à les remuer constamment. — Vibration dans les jambes, comme après une grande fatigue, en étant assis. — Faiblesse paralytique dans les jambes,

dès qu'on s'assied, après avoir marché.

MUREX PURPUREA.

MUR. — Pourpre antique, Murex à pourpre. — PETROZ. — Journal de Méd. homæop. — Hist. nut. et prep. Voy. Pharmac. homæop., p. 338.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grand journe les symptômes sont plus forts et ils coment quand on marche et reparat ; pendant plusieurs sie qu'en marchant; dand on est assis.— Peau sèche, comme si elle allait se gercer. — Envie de dormir, quelquefois avec tristesse; grand besoin de dormir, vers 9 heures du soir; sommeil interrompu par des douleurs, comme celles des règles; reveil avec effroi, avec fort besoin d'uriner et émission abondante; rèves pémbles, quelquefols avec rèveil en sursaut. — Moral, anxi ux, craintif, peurenx; grande tristesse vers le soir, avec reputguance pour la converse force desordre les idées,

Tête Nez. — Memare Chilèle, avec dimente de teouver les expressions. — Emberre et de la tête, avec et autétale au tracult; quelquefois avec envie de dermir en tête fourde; tête lourde, comme par un temps etentie, on bien frequente, alternant de temps en temps avec grande clarte des ides si céphedalaire, le matin au reveil, se dissipant lersqu'en se leve; decleur dans l'occipat, quelquefois tressvive; douleur dans le tempe gauche; douleur pressure dans le front, en bien ausci dans la tempe droite; serrement crampoïde au derrière de la tête, avec besoin d'y porter la main ou de renverser la tête, ce qui soulage. — Derrière les oreilles, serrement crampoïde, bruit dans les oreilles, avec aggravation de la pesanteur de la tête. — Nez froid tout le jour, très-pénible. — Brûlement dans une joue, la droite le soir, la gauche le matin.

Estomac — Selles. — Faim, quelquefois seulement le matin et absolument nulle pendant le repas. — Dans l'hypocondre droit, douleur tensive. — Coliques, douleur vive, comme un coup tranchant dans le côté gauche du bas-ventre, qui reste douloureux pendant toute la soirée. — Selles difficiles; constipation, pendant plus de 5 jours; pression sur l'anus, comme des Gance-

ments douloureux.

Voies urinaires. — Fréquent besoin d'uriner, le jour; la nuit, avec urine sans couleur. — Urine: fétide, avec sédiment blanc et écoulement d'un peu de mucosités après avoir uriné. — Écoulement d'un peu de sang en urinant.

Parties génitales (chez la femme). — Forte irritation des parties génitales, avec désir ardent du coît, presque jusqu'à la folie; le plus léger contact renouvelle le désir. — Dans la matrice, sensation de sécheresse et de constriction; pulsation; douleur incisive.

comme par des instruments tranchants; douleur violente dans le côté droit, traversant le ventre jusque dans le côté gauche; violent élancement à gauche, le soir. — Dans les grandes lèvres, sensation de pesanteur et d'extension; sensation de pesanteur dans le vagin, pendant les maux de ventre. — Leucorrhée: séreuse; verdâtra paisse; devenant sanguinolente; pendant la selle, réapparition d'une leucorrhée sanguinolente. — Dans les seins, douleurs violentes; élancements aigus.

Larynx — Poitrine. — Voix altérée, enrouement ; toux, l à jeun; sèche, rare, avec oppression de poitrine. — En re sifflement dans la poitrine, le soir. — Douleur de



MUREX PURPUREA. — MURIATIS ACIDUM.

comme si elle était brisée; élancements et brûlement au-dessous des petites côtes gauches, vers le dos. — Palpitations de cœur, et battement des artères.

481

Dos — Extrémités. — Lumbago, quelquefois brûlant et comme à vif; en étant allongé, surtout au lit, douleur dans les hanches et les lombes; douleurs dans la région du bassin. — A l'avant-bras, douleur au-dessous du coude; chaleur dans les mains. — Dans les jambes, grande faiblesse et fatigue, quelquefois fléchissement et besoin insurmontable de s'asseoir. — Dans les cuisses, forte douleur de meurtrissure; chaleur ardente, devant; douleur aiguë, devant, en se levant, ne supportant aucun contact; sensation de pulsation, devant.

MURIATIS ACIDUM.

MUR-AC.— Acide muriatique ou hydrochlorique.— HAHNEMANN.— Hist. nat. et prép. Voy. Pharmae. homosop., p. 127.— Doses usitées: 3, 30.— Durée d'action: jusqu'à 5 semaines, dans quelques affections chroniques. ANTIDOTES: Camph. bry. COMPARER AVEC : Ars. aur. bell. bry. calc. chin. lyc. natr-m. nitr-ac. n-vom.

phos. ac. puls. rhus. squill.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections hydropiques?; Eruptions, dartres et autres affections scrofuleuses; Fièvres typhoïdes, putrides: Surdité; Affections scorbutiques : Ivrognerie?; Hémorrhoïdes ; Impuissance, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement et douleurs incisives dans les membres pendant le repos, améliorés pendant le mouvement. — Douleurs de brisement dans toutes les articulations. - Sensibilité douloureuse du périoste dans tous les os, comme dans une fièvre intermittente. - Gonflements hydropiques. -Paresse et crainte de mouvement, avec désir de rester constamment assis. - Accablement excessif; dès que l'on s'assied, les paupières s'affaissent. - Marche chancelante des genoux. Grande sensibilité au temps humide.

Peau. - Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant, avec besoin de se gratter. — Éruptions croûteuses, qui démangent à la chaleur du lit. — Furonclaire de deux qui lancinante au toucher. — Utères putrides et deulonneux, avec brûlement sur les hords — Pretules poirce

bords. — Pustules noires.

ommeil. — Forte envie de dormir le jour, se dissipant dès qu'on prend de l'exercice. — Insomnie avant minuit. — Avant minuit, rentlement continuel, gémissement, jactation, paroles et dispositions à glisser en bas du lit. Réveil fréquent et de bonne heure, à cause du froid qu'on éprouve au lit.

Fièvre. — Predominance du froid. — Frissonnement, avec bâillements et pandiculations, sans soif, et non suivis de chaleur. — Chaleur sans soif, avec agitation et besoin de se découvrir le soir. — Pouls intermittent. — Sueur meturne, le soir en s'en-

-dormant, ou avant minuit.

Moral. Tristesse. — Tacitarnité et concentration en soi-même, acce anxiété, appréhensions et manssaderie. — *Hésitation et inquiétude. — Affluence d'idées sur des évenements récents, pendant le travail. — Disposition à se tâcher et à Semporter.

dant le travail. Disposition a se fâcher et à s'emporter.

Tête. -- Vertige tournoyant, avec marche chancelante. -- Mal de tête par la marche au grand air, et surtout par un vent âpre. -- Mal de tête aggravé en se redressant dans son lit et en remuant les yeux, se dissipant par un exercice coporel. -- Pesanteur surtout à Pocciput, avec obscurcissement des yeux, fortement aggravée en regardant fixement un objet. -- Mal de tête, comme si le cerveau était meurtri. -- Aècès de secousses, déchirements ou élancements dans la tête.

Youx. — Cuisson pruriante dans les angles des yeux. — Élancements au travers des yeux. — Gonflement et rougeur des pau-

pières. - *Hémiopie verticale.

Oreilles. — Otalgie, comme des tiraillements crampoïdes et aigue
Pulsation dans les oreilles. — Insensibilité du conduit auditif. — Éruption croûteuse dans les oreilles. — *Dureté de l'ouïe, et
surdité. — Acuité de l'ouïe, avec sensibilité au bruit. — Tintement, bourdonnement et sifflement devant les oreilles.

Nes. — Narines ulcérées. — Obturation du nez. — Coryza avec

mucosités épaisses, jaunes, ou séreuses et corrosives.

Visage. — Chalcur du visage, avec rougeur ardente des joues, en marchant au grand air, sans soif. — *Ephélides. — *Eruption de boutons croûteux au risage, au front et aux tempes. — Füroncle sur la tempe. — Brûlement aux lèvres. — Bouffissure de la lèvre inférieure. — Éruptions aux lèvres, parfois se couvrant de croûtes.

Dents. — Odontalgie, avec douleur pulsative, aggrarée en burant froid, soulagée par la chaleur. — Maux de dents, avec pression écartante. — Fourmillement dans les dents. — Gencires scor-

butiques.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche, avec paralysie de la langue. — Accumulation abondante de salive. — Pesanteur de la langue en parlant, comme du plomb. — Ulcères profonds pustules sur la langue. — *Mal de gravec douleur d'excoriation et cuisson dans la gorge et le ps



MURIATIS ACIDUM.

483

Appétit. — Goût de graisse rance dans la gorge. — Goût âcre et putride dans la gorge. — Goût douceâtre de tous les aliments, et surtout de la bière, qui répugne. — Boulimie et soif immodérée. —*Dégoût de la viande.

—*Dégoût de la viande.

Estomac. — *Renvois — putrides ou amers. — Vomissement des aliments. — Vomissement de bile, la nuit, avec nausées et renvois.

Malaise à l'estomac, comme si l'on était gravement malade. —

Sensation de vacuité dans l'estomac. — Douleur contractive dans l'estomac, avec sensation comme s'il était rétracté. — Tension pressive et douleur crampoide dans les hypocondres.

Ventre. — Malaise dans le ventre comme dans une grave maladic. — *Plénitude et ballonnement du ventre. — *Douleurs crampoïdes dans le ventre; avec tranchées et pincements depuis la région ombilicale jusque dans les côtés, accompagnés de borborygmes. — Sensation de vacuité dans le ventre. — Lancination

dans les aines.

Selles. — Évacuation difficile des selles, comme par inactivité du rectum. — Selles d'un moule trop mince. — Diarrhée avec cuisson et brûlement au rectum et à l'anus. — Diarrhée d'excréments. — Évacuation involontaire d'une selle liquide et séreuse en urinant. — Écoulement de sang pendant les selles. — Chute du rectum en urinant. — Prurit à l'anus. — *Boutons hémorrhoïdaux, gonflés et bleuâtres, avec douleur brûlante d'excoriation. — Hémorrhoïdes fluentes. — °Sortie douloureuse et pénible de gros boutons hémorrhoïdaux à chaque selle.

Urines. — Ténesme de la vessie. — Envie fréquente d'uriner avec émission abondante. — Émission immodérée d'une urine aqueuse.

- Relâchement de la vessie et du col de la vessie.

Parties génitales. — Excoriation du prépuce. — Appétit vénérien engourdi. — *Impuissance. — Sensation comme si tout affluait vers les parties génitales, comme pour les règles. — Règles trop hâtives.

Larynx. — Enrouement chronique. — Toux violente et sanglotante, suivie de gargouillement dans le fond de la poitrine.

Poitrine. — Respiration profonde, avec gémissements. — Élancements dans la poitrine pendant un mouvement violent et en respirant. — Douleur tensive sur le sternum. — Coups incisifs dans la poitrine, avec pression sourde à la partie postérieure de la poitrine, et avec oppression. — Élancements dans la région du cœur. — La nuit, coup si violent dans le cœur, qu'on le ressent dans le visage.

Tronc. — Douleur pressive dans le dos comme si on avait été
courbé trop longtemps ou qu'on se fut donné un tour de reins. —

Elancements dans les omoplates. - Furoncles au dos.

Bras. — Faiblesse paralytique et douleur de luxation dans l'épaule. — Pesanteur dans les bras. —*Déchirement, pression et tiraillement dans les bras. — Tension tractive dans l'articulation du

4 MURIATIS ACIDUM. — NATRUM GALLES

coude. - Tractions crampoïdes et pesanteur de l'avant-bras. - Déchirement incisif dans les avant-bras, les mains et les doigts.

Prurit et chatouillement voluptueux et lancinant dans la paum des mains. Frențian crouteuse sur le dos de la main, et la partie supéricare des diagts. Douleur crampoïde à la partie charme du peuce, en cerivant. Conflement du bout des deigts, avec brub ir nt. Terpeur nocturne et palissement des doigts qui sent comme no ris.

Jambes. Dechirement et tiruillement erampoïde dans les cuisses. Taches dartreuses et pruriantes sur les cuisses, « Gonflement des genoux. « Tension tractive dans le nollet et le tendon d'Aschille en marchant. — Lancimations dans le tendon d'Achille, le jour et le muit, empelaant de marcher et de dormir. « Ulceres putrides aux jambes. « Troid aux plois. — Gonflement de l'extremite des orteils, evec brûlement.

NATRUM CARBONICUM.


NATR. — Sous-carbonate de soude. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 128. — Doses usitées: 12, 30. — Durés d'action: jusqu'à 40 jours, dans quelques cas de maladies chroniques. Antidotes: Ars. camph. nitr-spir.? — On l'emploie comme antidote de: Chin. Comparer avec : Arn. ars. carb-an. carb-veg. caus. chin. ign. kal. lyc. merc. natr-m. n-vom. plumb. puts. sabad. sep. spig. staph. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances rhumatismales, avec racçourcissement des tendons; Affections scrofuleuses; Glandes engorgées; Faiblesse par suite de pertes d'humeurs ou d'autres causes débilitantes; Tabes dorsualis?; Dartres; Verrues; Eruptions galeuses; Souffrances des lépreux; Souffrances des ivrognes?; Mélancole et hypocondrie; Suites facheuses d'un excès d'étude?; Ophthalmies chroniques; Ulcères de la cornée; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurotique; Presbyopie; Coryza chronique; Ozène?; Balbutiement?; Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques; Hépatite chronique; Coliques venteuses?; Orchite?; Priapisme?; Stérilité?; Dysménorrhée; Flueurs blanches; Catarrhe: Souffrances phthisiques; Maladies du cœur?; Goître, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement crampoïde, pu palement dans les bras et dans les jambes. — Tractions ;





NATRUM CARBONICUM.

tiques et déchirement dans les articulations, surtout le soir et la nuit. - Raccourcissement des tendons. - Tressaillement dans les membres, les articulations et les muscles. — *Lancinations fournillantes dans les muscles. — *Grande disposition aux luxations et aux tours de reins. — Gonflement des glandes. — Exacerbation des symptômes pendant l'orage. — La plupart des symptômes se manifestent pendant qu'on est assis et se dissipent par le mouvement, la pression et le frottement. — *Pendant les douleurs, angoisse, tremblement et sueur. — Forte agitation générale du corps, le soir. — Grande sensibilité maladive, avec tremblement, même en jouant du piano. — *Relâchement et manque de solidité dans tout le corps. — Marche incertaine. -Lourdeur et paresse surtout le matin, avec crainte du mouvement. — Brisement paralytique le matin, et grande lassitude dans les membres. — *Après une marche modérée, lassitude à se laisser tomber. — *Faiblesse prolongée. — Amaigrissement, avec teint pâle, pupilles dilatées et urine foncée. - Répugnance pour le grand air. - Grande disposition à se refroidir, suivie de rhume de cerveau ou coliques, avec diarrhée.

Peau. — *Sécheresse de la peau, avec sueur abondante par le moindre exercice ou le plus léger travail. — Fourmillement sous la peau. — Gale. — *Éruption dartreuse. — Les dartres s'étendent et suppurent. — °Cercles jaunes, comme restes de taches dartreuses. — °Tubérosités lépreuses. — *Verrues. — °Élancements, douleurs incisives et brûlement, dans les parties blessées. — °Éruptions galeuses (au ventre, chez les lépreux).

Sommeil. — *Envie de dormir insurmontable le jour, avec sommeil tardif le soir, et difficulté à se réveiller le matin. — *Sommeil agité, et plein de réves vifs et quelquefois confus et lascifs, avec violentes érections et pollutions. — Rêves anxieux, qui, après le réveil, semblent être vrais. — Rêves effrayants de morts, de déluges, de querelles, de brigands, de diables, de voleurs, etc. — Rêves de voyages. — La nuit, grande agitation dans le corps, ébullition de sang, battement de cœur et cauchemar, mal aux dents, coliques, vertiges avec angoisse, etc. — Tressaillement et secousses pendant le sommeil. — Réveil de trop bonne heure.

Fièvre. — Horripilation fébrile, avec mains froides et joues chaudes, et vice versa, mais toujours sans soif. — *Froid aux mains et aux pieds. — Sueur nocturne, souvent alternant avec sécheresse de la peau. — Sueur froide et continuelle, comme par angoisse. — *Sueur abondante au moindre travail.

Moral. — Tristesse, et découragement avec pleurs et inquiétude sur l'avenir. — *Inquiétude, avec accès d'angoisse, -surtout pendant l'orage et les travaux intellectuels. — *Eloignement pour les individus et la société. — *Humeur hypocondriaque et dégoût de la vie. — °Découragement. — Disposition à s'effrayer. — °Dépit et malveillance. — *Disposition à se fâcher et violents



NATRUM CARBONICUM.

486

accès de colère. — *Difficulté à concevoir et à combiner des idées en lisant et en écoutant. — *Inaptitude au travail intellectuel et à la méditation, qui fatigue la tête. — Instabilité

de l'esprit.

Tête.—*Embarras de la tête, "surtout dans l'appartement et pendant le repos.—*Vertige, "surtout après avoir bu du vin, et après un travail intellectuel. — *Mal de tête au soleil, ou en tournant promptement la tête. — Sensation d'obturation pressive dans la tête, comme si le front allait éclater. — Mal de tête pressif, avec nausées, renvois et obscurcissement des yeux. — Déchirement crampoïde dans le front, jusque dans les yeux et le bout du nez.— *Mal de tête, avec élancements, oquelquefois au travers des yeux. — Secousses à travers la tête. — Mal de tête pulsatif dans le vertex, tous les matins. — Congestion et chaleur à la tête.— *Déchirement à l'extérieur du sinciput, tous les jours, à une heure fixe.

Yeux. — Brûlement dans les yeux, surtout en lisant et en écrivant. — Lancinations au travers des yeux. — *Inflammation des yeux et des paupières, avec photophobie. — Gonflement des paupières. — *Ulcères à la cornée. — Abcès à la glande lacrymale. — Affaissement fréquent des paupières, avec difficulté de les ouvrir. — Trouble de la vue, avec points noirs voltigeants, ou scintillement éblouissant devant les yeux. — *Impossibilité de lire des caractères fins, comme par presbyopie. — *Duvet devant les yeux. — Pupilles dilatées.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles. — *Grande susceptibilité au bruit. — Sensation de surdité, comme par obturation des oreilles. — *Dureté de l'ouïe. — Tintement, musique, bourdon-

nement, bruissement et pulsation dans les oreilles.

Nez. — Grande sensibilité du nez. — Desquamation du dos et du bout du nez. — Ulcération au fond des narines. — Obturation du nez, quelquefois avec sortie de morceaux de mucosités dures et fétides. — °Coryza tous les deux jours. — *Coryza continuel, et toux provoquée par un refroidissement et le plus léger courant d'air, se dissipant seulement après la transpiration. — Mucosités

épaisse, vertes ou jaunes dans le nez.

Visage. — °Chaleur du visage. — Bouffissure de la face. — Gonflement et rougeur des joues. — Rougeur et chaleur brûlante, ou grande pâleur du visage, avec yeux cernés. — Face alternativement pâle et rouge. — °Éphélides à la face. — Éruption pruriante, et humide au nez et à la bouche. — °Taches jaunes sur le front et la lèvre supérieure. — Couleur jaunâtre de la face. — °Gonflement des lèvres. — Éruptions, dartres et ulcères autour de la bouche et sur les lèvres. — Engorgement des glandes sousmaxillaires.

Dents. — *Odontalgie, ¬avec douleur fouillante, térébrante, surtout après et pendant le repas, et particulièrement après avoir



NATRUM CARBONICUM.

487

mangé des choses sucrées ou des fruits. - Maux de dents pressifs, la nuit, avec gonflement de la lèvre inférieure et des gencives. Grande sensibilité des dents inférieures.

Bouche et Gorge. - Vésicules dans la bouche et ulcères lisses, avec brûlement. - Bégayement à cause de lourdeur de la langue. Apreté, grattement et sécheresse de la gorge et du palais. -

Accumulation de mucosités dans la gorge.

Appétit. — *Amertume de la bouche. — Goût acide de la bouche, avec langue chargée d'un enduit épais. — *Forte soif et malaise après avoir bu froid. - *Faim violente, dévorante, surtout le matin, par une sensation de défaillance et de vacuité. - Gourmandise. — Répugnance pour le lait et diarrhée après en avoir pris. — *Grande faiblesse de la digestion avec maussaderie et humeur hypocondriaque après le repas ou le moindre écart de régime. - Après le repas, ballonnement, lourdeur et pression dans l'estomac et l'épigastre. - *Souffrances par l'usage du vin.

Estomac. — Renvois fréquents pendant et après le repas. — Rapports douloureux. - *Sensation de fadeur à l'estomac et nau-sées continuelles. - Hoquet fréquent, surtout après le repas. -Pyrosis et grattement dans la gorge, curtout après des aliments gras. - *Pression à l'estomae, surtout après le repas. - *Sensibilité douloureuse de la région de l'estomac et de l'épigastre, au toucher et pendant que l'on parle. - *Douleurs d'estomac, tractives, pressives et incisives. - *Crampes d'estomac, contractives. - Sensation de vacuité dans l'estomac, avec nausées.

Ballonnement de l'estomac et de l'épigastre. Ventre. — Douleurs dans les hypocondres. — *Lancinations dans l'hypocondre gauche, quelquefois après avoir bu froid. - Lancinations dans la région hépatique. — Maux de ventre, le matin, après le réveil. — *Ventre gros, ballonné. — Maux de ventre nocturnes, avec tension dans la partie supérieure du ventre et diarrhée. - Colique avec rétraction de l'ombilic, et dureté des téguments du ventre. - *Élancements et fouillements dans le ventre. - Elancements et tractions dans les côtés du ventre. -Gonflement des glandes de l'aine. - *Accumulation, incarcéra-tion et mouvements douloureux de flatuosités dans le ventre. Expulsion abondante de vents d'odeur aigre ou fétide.

Selles. - *Envie pressante d'aller à la selle, sans résultat, ou suivie d'une évacuation peu abondante et *insuffisante. -Selle dure, difficile. - Selles molles, ou liquides, avec envie forte et très-pressante et ténesme à l'anus. - Selles diarrhéiques, jaunes. - Diarrhée avec tranchées, après un refroidissement, ou après avoir pris du lait. — Selles sanguinolentes. — Sortie de ténia, pendant la selle. — Pendant et après la selle, brûlement et douleurs incisives dans l'anns et le rectum. - Prurit et four-

millement à l'anus. - Lancinations au périnée.

Urines. -- Envic fréquente et pressante d'uriner, jour et nuit, acce écoulement peu abondant ou immodéré. - Pissement au lit. Urine d'un jaune vif, d'odeur acidulée, ou fétide et trouble. avec sediment imagicux. And the et pendint l'émission des urines, to dement d'us l'aprèlle. Tressillements, tirallements right et cris codans l'urethre. Urine tonce.

Parties viriles. Doubling de meantr's sine dans les testicules. Pesamennet traction pressives dans les testicules. Executation Pesanteur et traction pressives dans les testicines. Experiation au sensitur. Sono tion derrico legland, comme une governbre batande. Information, goadennent et executation tacile du gland et du popule. Exciltation de l'appoint rendran, presque comme no cosmo, avec pollutions et érections continuelles et doubour us et. Econlemant de liqueur, prestatique, en urinant Apres le coit, forte disposition à et pendant une selle difficile. transpirer.

Règles. — Pression comme si tout se portait vers les parties génitales, et allait sortir. — *Règles hâtives, ravec maux de tête. de reins et de ventre. - Métrorrhagie. - La conception paraît être favorisée par ce médicament- - Difformité du col de la matrice. — Excoriation à la vulve, entre les cuisses. — Après le coît, écoulement de mucosités par le vagin. - *Leucorrhée abondante, épaisse et jaunâtre, ou fétide, -quelque précédée


de tranchées.

Laryax. - Enrouement et âpreté dans la poitrine, avec coryza, frisson fébrile et toux grattante et douloureuse. - *Catarrhe continuel, avec coryza, et toux excitée par le moindre courant d'air le plus léger refroidissement, ne se dissipant que par la transpiration. — Toux provoquée par un chatouillement dans la gorge. - Toux violente et sèche, en passant du froid à la chaleur. -*Toux avec expectoration d'un goût salé ou d'un pus verdâtre et fétide. - Expectoration de petits morceaux, avec râle muqueux dans la poitrine. - Toux et expectoration de sang.

Poitrine. — *Haleine courte, quelquefois avec gêne de la respira-tion. — *Dyspnée. — En respirant, tension sur la poitrine. — Pression à la poitrine. — *Elancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. — Froid continuel au côté gauche. — Battements de cœur violents et anxieux, surtout en montant un escallier, ou la nuit, en étant couché sur le côté gauche.

Tronc. — *Douleur d'excoriation aux reins. — Lancinations aux reins, en étant assis. - Traction et tension crampoïde dans le dos et la nuque. — Fourmillement dans le dos. — *Roideur de ' la nuque. — Gonflement des glandes du cou. — Gonflement dur de la glande thyroïde.

Bras. — *Pression sur les épaules. — Traction et déchirement dans les épaules, les bras et les coudes, avec lassitude dans rep. — Pesanteur, roideur et douleurs dans les bras, at ne pouvoir les lever. — Tressaillement et sensation de



NATRUM CARBONICUM. — NATRUM MURIATICUM. 489

ment dans les bras, les mains et les doigts, surtout en saisissant un objet. — Tension tractive dans les avant-bras et les mains. — Verrues aux bras. — °Douleurs incisives dans les mains. — Déchirement et térébration dans les os du métacarpe, surtout le soir et le matin, au lit. — Brûlement dans les articulations de la main, le soir. — Tremblement des mains. — Peau des mains seche, râpeuse et gercée. — Verrues sur le dos de la main. — Taches rouges et dartres sur les mains. — Tressaillements dans les articulations des doigts. — Distorsion des doigts. — Prurit brûlant et résicules brûlantes sur les doigts, comme par des orties.

Jambes. — Grande pesanteur des jambes et des pieds, avec roideur en étant assis et en marchant. — Tressaillement dans les cuisses. — Éruption dartreuse aux fesses. — Raccourcissement des tendons du jarret. — Dartres au jarret. — Traction pressive et crampoides dans les jambes. — *Crampe et traction dans les mollets, comme s'ils étaient trop courts. — Jambes enflées, rouges, oenflammées et couvertes d'ulcères. — Douleurs incisives et *crampes dans les pieds. — Brûlement dans les articulations du piéd, le soir. — *Gonflement des pieds ou de la plante des pieds, avec élancements en appuyant le pied. — Disposition à se luxer et se fouler l'articulation du pied. — Pieds froids. — *Ulcères chroniques au talon, provenant de vésicules rongeantes. — Crevasses et excoriation entre les orteils. — Gonflement des orteils, avec déchirement et douleur d'excoriation qui ne permet pas de dornir. — Ampoules au bout des orteils, comme par une brûlure. — Térébration, traction et élancements dans les cors aux pieds.

NATRUM MURIATICUM.

NATR-M. — Muriate ou hydrochlorate de soude. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 130. — Doses usitées : 12, 30% — Durée d'action : 40 à 50 jours, dans des affections chroniques. Antidotes : Ars. camph. nitr-spir. — On l'emploie comme antidote de : Chin.

COMPARER AVEC: Arn. ars. carb-a. carb-veq.caus chin. ign. kal. lyc. merc. natr. n vom. plumb. pull. sabad. sep. spiz. staph. sull. — C'est surtout après merc. que natr-m. fera du bien, lorsqu'il se trouve indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant quider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre :

— Affections rhumatismales avec raccourcissement des tendons; Paralysie des membres; Affections scrofuleuses; Glandes engorgées; Suites fâcheuses de contrariétés et de colère; Faiblesse une perte



NATRUM MURIATICUM.

490

d'humeurs et autres causes débilitantes, même par suite d'onanisme; Faiblesse et syncope hystériques; Chloroses anciennes, négligées; Verrues; Varices; Fièvres intermittentes, même celles qui ont été dénaturées par de fortes doses de quinquina; Fièvre typhoïde; Mélancolie et hypocondrie; Souffrance par excès d'étude; Migraine: Chute des cheveux, par suite de fortes maladies aiguës, ainsi que chez les femmes en couche; Ophthalmies chroniques, et blépharophthalmies, surtout chez les individus scroniques, et blépharophthalmies; Presbyopie; Otite avec écoulement purulent; Coryza; Croûte de lait?; Affection scorbutique des gencives; Stomacace?; Dyspepsie, gastralgie et autres affections gastriques: Hépatite chronique?; Coliques venteuses; Constipation chronique; Épaississement du rectum; Relâchement chronique du ventre; Diabète?; Gonorrhée chronique?; Priapisme?; Impuissance; Dysménorrhée; Aménorrhée; Dysménie des jeunes filles; Stérilité avec règles trop hâtives et trop abondantes?; Flueurs blanches; Catarrhe; Souffrances phthisiques; Maladies du cœur; Goître; Panaris; Suppression de la sueur des pieds, etc., etc. Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Traction pressive dans les membres. - Roideur de toutes les articulations qui craquent quand on les remue. - Raccourcissement des tendons. - Tressaillement dans les muscles et les membres. — Disposition aux luxa-tions et à se donner un tour de reins. — *Paralysies. — Gonflement des glandes. - Accès de malaise, surtout le matin ou le soir avec nausées, faiblesse, páleur mortelle du visage, mal à la tête, engourdissement des membres, besoin de se concher, etc.-*Suites fâcheuses d'une contrariété. — Les symptômes se manifestent, se renouvellent et s'aggravent généralement en étant couché, et surtout la nuit ou le matin ; ils sont soulagés en se redressant dans le lit. - Les douleurs nocturnes suspendent la respiration et occasionnent une sorte de paralysie semi-latérale. -Bouillonnement de sang, général, avec pulsation dans tout le corps au plus léger mouvement. - Congestion à la tête, à la poitrine et à l'estomac, avec froid aux jambes. - *Malaise et incommodités après avoir beaucoup parlé. — Grand relachement de toutes les forces physiques et morales, après une fatigue corporelle. — *Pesanteur et paresse, surtout le matin après s'être levé, avec répugnance pour le mouvement et la marche. - *Brisement et lassitude excessive dans les membres, surtout le matin et en étant assis. — *Faiblesse hystérique. — Grande faiblesse. — Abattement et agilité alternativement dans les membres. — Grand amaigrissement. - *Disposition à se refroidir. - Inquiétudes dans le corps avec frissonnement. Peau. — Eruption miliaire avec douleur lancinante. — Tubérosités



491

pruriantes. — Éruption urticaire après un exercice violent. — Dartres. — Furoncles. — Verrues. — Panaris. — °Varices. — °Cors. — °Peau sale, flasque et sans vie, chez les personnes chlorotiques.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour. — *Sommeil tardif et insommie nocturne, avec efforts inutiles pour s'endormir. — *Difficulté à se rendormir la nuit, lorsqu'on s'est réveillé. — Difficulté à se réveiller et grande lassitude somnolente, le matin, de bonne heure. — *Sommeil agité, plein de réves vifs et lascifs, avec érections prolongées et pollutions. — *Rêves anxieux, pénibles, avec pleurs et paroles pendant le sommeil. — Rêves effrayants de querelles, de meurtres, d'incendie, de voleurs, etc. — Rêves qui occupent encore l'esprit après le réveil, et que l'on croit être des réalités. — Bouillonnement de sang la nuit, avec chaleur anxieuse et battements de cœur. — Cauchemar. — Somnambulisme. — *La nuit, douleurs dans le dos, tremblement comme dans les nerfs, émission d'urine fréquente, mal à la tête, coliques, souffrances asthmatiques, grande angoisse dans le corps, etc.

Fièvre. — *Frissons intérieurs, fréquents. — *Frisson continuel et manque de chaleur vitale. - Frisson avec ou sans soif. -Frisson et horripilation avec envie de dormir, suivie d'une légère transpiration. - Chalcur et frissons alternatifs, avec maux de tête. — Chaleur avec soif ardente. — Accablement avant la fièvre. — Avant le frisson, maux de tête; pendant le frisson, haleine courte, bâillements et envie de dormir. - Pendant la chaleur, maux de tête violents, étourdissement, obscurcissement des yeux, vertiges et rougeur de la face. - Fièrre avec douleurs ostéocopes, douleurs dans le dos, teint jaunatre, mal à la tête, faiblesse, amertume de la bouche, commissure levres ulcérées, absence d'appétit, pression au creux de l'estomac, avec grande sensibilité de cette partie au toucher, etc.; type quotidien, ou tierce; début de la fièvre, généralement le matin. par des frissons suivis de chaleur et de soif. - Vièrre typhoïde arec faiblesse, sécheresse de la langue et forte soif. — *Pouls irrégulier et souvent intermittent. — *Sueur matutinale. — *Sueur abondante, trop facilement excitée par le mouvement et la marche. Moral. — *Tristesse mélancolique qui fait rechercher toutes les choses désagréables, et pleurer abondamment; les consolations

ne font qu'aggraver cet état. — *Inquietude sur l'avenir. — *Angoisse, quelquesois pendant l'orage, mais surtout la nuit. — Indifférence, laconisme, morosité et inaptitude au trarail. — *Précipitation impatiente, et irritabilité. — *Disposition à s'effrayer. — Haine pour des personnes dont on a reçu anciennement des offenses. — *Irascibilité et violent emportement, sacilement provoqués. — Envie de rire. — Mauvaise humeur et gaieté alternatives. — *Faiblesse de mémoire, et oublis » —



Irréflexion et distraction. — On se trompe en parlant et en écrivant. — Incapacité de réfléchir, et fatigue par le travail intellectuel. -- Maladresse.

Tête. — *Embarras douloureux dans la tête. — *Vertige pendant lequel tout semble tourner devant les yeux, et où l'on risque de tomber en avant, surtout en marchant et en se levant du lit. Vertige avec secousses dans la tête et étourdissement. --*Maux de tête le matin en se réveillant, -en se retournant, et pendant le mouvement du corps ou de la tête, en courant, ou à l'air froid, ou après une contrariété. - *Pesanteur de la tête, tous les jours, surtout à l'occiput, et forçant à fermer les yeux.-*Mal de tête comme si la tête allait éclater, ou comme si elle était tendue et comprimée, surtout en écrivant. - Accès de maux de tête avec nausées et vomissements. - *Pression et compression dans la tête et surtout dans les tempes et au-dessus des yeux. aggravées en fronçant les sourcils. - *Tiraillements aigus et élancements dans la tête, surtout au-dessus des yeux, avec besoin de se coucher et obscurcissement de la vue. - Secousses lancinantes à travers la tête. - *Battement, pulsations et martellement dans la tête, surtout pendant le mouvement. ment et tractions dans le front. — Sensation comme si le cerveau vacillait en remuant la tête. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, comme s'il était excorié. - Contraction et mobilité du cuir chevelu. — Facilité à se refroidir la tête. — Sueur à la tête, surtout le matin et la nuit. -- *Croûtes sur le cuir chevelu. — *Chute abondante des cheveux, même des poils de la barbe.

Youx. — Prurit dans les yeux. — Elancements, *cuisson et brûlement dans les yeux. — Inflammation des yeux. — *Larmes corrosives. — *Larmoiement fréquent. — Chassie dans l'angle externe des yeux. — *Agglutination nocturne des yeux. — Paupières continuellement rouges et ulcérées. — *Occlusion spamodique des paupières, surtout le matin, le soir (pendant le crépuscule) et la nuit. — Obscurcissement de la vue en se baissant et en marchant, ainsi qu'en lisant et en écrivant. — Vue trouble comme par du duvet ou à travers un voile. — Confusion des caractères en lisant. — °Diplopie. — Hémiopie. — *Presbyopie. — Vue faible, comme par une amaurose commençante. — *Points noirs, traces lumineuses et étincelles devant les yeux. — Myopie.


Oreilles. — *Élancements dans les oreilles. — *Pulsations et battements dans les oreilles. — Gonflement et chaleur dans les oreilles. — *Ecoulement (de pus) par les oreilles. — *Dureté de Pouïc. — *Tintement, sonneries, -grondement et bourdonnement dans

les oreilles.

Nez. — Engourdissement et insensibilité d'un seul côté du nez. —

Inflammation et gonflement du nez, d'un seul côté, avec douleur

492



493

an toucher. — Térébration dans les os du nez. — Excoriation de l'intérieur du nez. — Croûtes sur le nez. — *Perte de l'odorat. — *Éternuments avortés. — *Obturation et sécheresse du nes. — *Corpsa sec, quelquefois le matin seufment. — *Violent coryza, fluent ou sec, avec perte de l'odorat et du goût, et éternument.

Visage. — Face jaunâtre, terreuse. — Visage luisant comme de la graisse. — Gonflement de la face. — *Prurit et éruption de boutons à la face et au front. — *Douleur dans les pommettes, pendant la mastication, comme par ulcération. — Lèvres sèches, gercées, crevassées ou excoriées et ulcérées, avec croîtes et éruptions brûlantes et cuisantes. — *Éruption dartreuse autour de la bouche. — *Gonflement des lèvres. — °Vésicules sanguinolentes à la face interne de la lèvre supérieure, avec douleur brûlante au toucher. — Éruption granulée et ulcères au menton. — Gonflement fréquent des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Dents très-sensibles à l'air et au contact. — Traction, comme un arrachement dans les dents, s'étendant jusque dans l'oreille et la gorge après le repas et la nuit; avec gonfiement de la joue. — Élancements, térebration et pulsation dans les dents cariées. — Vacillement et carie des dents. — *Fistules aux gencives. — Gencives gonfiées, saignant facilement et très-sensibles aux choses froides ou chaudes. — Inflammation putride des gen-

cives. — Ulcères aux gencives.

Bouche. — Ulcères et vésicules sur la langue et dans la bouche, avec cuisson brûlante et douleur au contact des aliments et des boissons. — Crachement de sang. — Parole embarraguée à cause de la pesanteur de la langue. — Torpeur et roideur d'une moitié de la langue. — Sensation prolongée, comme s'il y avait un cheveu sur la langue. — «Salivation abondante.

Gorge. — *Pendant la déglutition, sensation comme s'il y avait une cheville dans la gorge. — Spasme dans la gorge. — Inflammation de la gorge, avec douleur lancinante et ulcération. — *Expuition de mucosités en renâclant, surtout le matin.

Appétit. — Perte du goût. — *Amertune dans la bouche. — Goût putride ou acide, comme si l'on était à jeun. — Goût putride de l'eau. — Arrière-goût des aliments, surtout des acides. — *Soif continuelle, souvent avec nausées, ballonnement du ventre, et autres incommodités après avoir bu. — *Perte de l'appétit, surtout pour le pain, et répugnance pour la fumée du tabac. — *Dégoût pour les aliments, surtout lorsqu'ils sont gras. — Souffrances par les aliments acides et le pain. — *Appétit immodéré, l'aprèsmidi et le soir. — *Boulimie, sans appétit, avec plénitude et satiété pour peu que l'on ait mangé. — Appétence pour les acides. — Pendant le repas, sucur à la face. — Après le repas, renvois à vide, nausées, plénitude et ballonnement du ventre et de l'estomac, sommeil, tête embarrassée, aigreurs dans



la bouche, *pyrosis, -battements de cœur et pouls intermittent ou accéléré. — Après des aliments gras ou du laitage, renvois

désagréables.

494

Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois acides et âcres, quelquefois avec goût des aliments. — *Pyrosis qui remonte de l'estomac. — Nausées, surtout le matin. — * Ecoulcment d'eau comme des pituites, avec tournoiement dans l'estomac, suivi quelquefois de vomissement aigre des aliments. — *Vomissement des aliments et de bile. — *Pression à l'estomac, le matin ou dans la journée, nausées et chute subite des forces. — *Pression à l'épigastre, comme s'il y avait un corps dur dans l'estomac. — Épigastre gonflé et douloureux au toucher et à la pression, comme s'il était ulcéré. — *Crampes d'estomac contractives, quelquefois avec nausées. — *Secousses et griffement au creux de l'estomac. — Taches rouges au creux de l'estomac.

Ventre. — *Traction, tension, pression, pincement et élancements dans la région hépatique. — *Douleur et élancements dans la région splénique. — •Crampe dans le diaphragme en se baissant. — *Ballonnement du ventre. — *Gonflement du ventre. — Malaise tensif, pressif et hypocondriaque dans le bas-ventre. — *Douleurs pressives dans le ventre. — Douleurs abdominales, tractives et contractives, comme les douleurs d'enfantement. — *Tranchées quotidiennes et pincement dans le ventre, —quelquefois le matin et la nuit. — *Roideur dans le côté gauche du ventre. — *Incarcération de flatuosités, quelquefois la nuit. — *Gargouillement bruyant et borborygmes dans le ventre. —

Sortie des hernies.

Selles. - *Constipation, quelquefois prolongée, ou tous les deux jours. - *Envie fréquente et pressante d'aller à la selle, sans aucun résultat, ou avec évacuation peu abondante. - Constipation par faiblesse ou paralysie de la moelle épinière. -Epaississement du rectum. - Selle dure et interrompue. Écacuation difficile des selles, souvent avec déchirement et élancements dans le rectum et l'anus. — *Selles par trop fréquentes. - *Relachement prolongé du ventre. - Diarrhée avec coliques et évacuation de matières muqueuses. - Selles incolontaires. — Ecoulement de sang pendant les selles. — *Pendant et après les selles, brûlement à l'anus, et au rectum. Elancements, exceriation et pulsation au rectum. — Constriction crampoide de l'anus, et sensation de rétrécissement du rectum. Chute du rectum et douleur brûlante à l'anus, avec écoulement de matières sanguinolentes et sanieuses. - *Boutons hemorrhoidaux à l'anus, douloureux et lancinants. - Excoriation à l'anus et entre les fesses, et surtout en marchant. — Dartres à

l'anus. — Lombries.

Urines. — Envie fréquente et pressante d'uriner le jour et la nuit, quelquefois toutes les heures, avec écoulement abondant.



495



NATRUM MURIA CUM.

— *Émission involontaire des usines, quelquesois en toussant, en marchant ou —en éternuant — Émission d'urine, la nuit.
— Urine claire, avec sédiment rouge, briqueté.— *Après l'émission des urines, écoulement de mucus par l'urèthre. — Écoulement de mucosités, quelquesois jaunâtre, par l'urèthre, comme dans la gonorrhée.

Parties viriles. — Prurit, dartres et excoriation entre le scrotum et les cuisses. — Sécrétion derrière le gland, comme une gonor-rhée bâtarde. — *Excitation immodérée des parties génitales et de l'imagination pour le coît, ou engourdissement de l'appétit vénérien. — Manque d'énergie pendant le coît. — *Impuissance. — Après le coît, pollutions. — Odeur forte et fétide des parties

génitales.

Bègles. — Pression et sensation comme si tout affluait vers les parties génitales. — *Règles trop hâtires et trop abondantes ou tardires et rares. — *Règles de trop longue durée. — *Suppression des règles. — *Maux de tête avant, pendant et après les règles. — *Arant les règles, morosité et irritabilité. — *Au début des règles, tristesse. — °Pendant les règles, crampes abdominales. — *Prurit aux parties génitales. — °Répugnance pour le coît, chez la femme. — °Flueurs blanches, avec mal à la tête, disposition à la diarrhée, coliques et selles muqueuses. — *Leucorrhée âcre, °avec couleur jaune de la face. — Écoulement abondant de mucosités transparentes, blanchâtres et épaisses, par le vagin. — Élancements dans les seins.

Larynx. — *Enrouement et sensation de sécheresse dans le larynx. — Accumulation de mucosités dans le larynx, le matin. — *Poitrine embarrassée, avec catarrhe et toux. — *Toux proroquée par un chatouillement dans la gorge ou dans l'épigastre, le jour et la nuit, surtout en marchant ou en respirant profondément. — *Toux matutinale. — *Toux suffoquante, spasmodique, le soir, au lit. — *Toux courte, chronique, avec expectoration de mucosités et gonflement dans la poitrine. — Toux avec expectoration sanguinoleute, vomiturition et vomissement. — *En toussant, douleurs dans la tête, comme si le front allait se briser.

Poitrine. — *Haleine courte, surtout en marchant vite. — *Respiration génée, surtout pendant un travail manuel, soulagée au grand air. — *Respiration sibilante, le soir, au lit. — Haleine fétide. — *Douleur de poitrine, comme par une tension intérieure. — *Élancements dans la poitrine et dans les côtés de la poitrine, avec gêne de la respiration, quelquefois en respirant profondément et en toussant. — *Battements de cœur anxieux et violents à chaque mouvement du corps, mais principalement en étant couché sur le côté gauche. — Tressaillement et douleur lancinante dans la région de paur. — Battement du cœur irrégulier et intermittent. — Motement tressaillant du cœur.

Trone. — *Douleur de brisement et de paralysie aux reins, sur-



496 NATRUM MURIATICUM. - NITROGLYCERINUM.

tout le matin. - Élancements, douleurs incisives et fortes pulsations aux reins. - *Déchirement à travers les reins et les hanches. - *Douleurs nocturnes dans le dos. - *Lassitude, tension pressive et tiraillement dans le dos. -*Pression, roideur et tension dans la nuque. - Goître volumineux. - Croûtes


sous l'aisselle. — Engorgement des glandes axillaires.

Bras. — Douleur de luxation dans les articulations de l'épaule et des doigts. — *Lassitude et pesanteur paralytique des bras. — Douleur de brisement dans les bras et les mains, mais surtout dans les épaules, qui ne permet ni de lever ni de remuer les bras. oFouillement dans les bras. — Secousses dans le coude. *Lancinations dans les muscles et les articulations des mains et des doigts. - Taches brunâtres sur le dos de la main. - Verrues dans les paumes des mains. — Peau des mains sèche et gercée, surtout autour des ongles. — Mains froides. — Sueur aux mains. - Difficulté à fléchir les articulations des doigts. - *Engourdissement et fourmillement dans les doigts. - Envies fréquentes aux ongles. - Panaris.

Jambes. - *Douleurs de luxation dans les hanches, avec élancements.—*Douleurs tractives dans les cuisses, les genoux et les jambes.— Inquiétudes et tressaillement dans les jambes.— *Faiblesse paralytique des jambes, et surtout de l'articulation du pied.— Tressaillement des muscles des cuisses.— °Raccourcissement douloureux des tendons du jarret. - Douleur de luxation dans les articulations du genou et du pied. — *Lassitude dans les genoux et les mollets. — *Dartres dans les jarrets. — Tension dans les jambes et les mollets. - *Grande pesanteur des jambes et des pieds. - Brûlement dans les pieds. - Gonflement des pieds. — Froid aux pieds. — Douleur d'ulcération aux malléoles, en appuyant le pied et en y touchant. - Suppression de la transpiration des pieds. - Rougeur du gros orteil, avec tiraillements aigus et élancements en marchant et en se tenant longtemps debout. - Dartres aux malléoles. - Cors aux pieds, avec douleurs lancinantes et térébrantes.

NITROGLYCERINUM.

NITGL. — Nitroglycérine, glonoïnum, glonoïne. — HERING, Études pathogénétiques de l'Amérique du Nord. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac homœop. p. 434.
ANTIDOTES: N-vom. acon. Café en boisson, camph. — Pourra servir d'antidote contre: dig. plumb.



NYTROGLYCERINUM.

497

ce médicament, on verra les cas dans lesquels on pourra l'administrer avec succès contre l'une ou l'autre des affections suivantes: — Empoisonnements par la digitale, le plomb; Suites d'émotions saisissantes, telles que peur, frayeur, colère; Suites de commotions physiques; Suites d'un changement rapide dans les efforts intellectuels; Suites d'exercices inaccoutumés, tels que ceux à cheval, en voiture; Suites d'un refroidissement subit après s'être échauffé; Suite de l'influence d'un froid violent; Convulsions; Épilepsies; Éclampsies; Fièvres congestives, apoplectiques; Fièvres typhoïdes; Typhus de choléra; Typhus cérébral; Affections mentales; Manies puerpérales; Congestions cérébrales; Apoplexies; Céphalalgies; Suites d'un coup de soleil; Méningites; Hydrocéphale; Ophthalmies; Otite; Mal de mer; Affections vermineuses; Congestions pulmonaires; Cardites et péricardites; Hydropisie du péricarde; Myélite; Congestions à la moelle cérébrale.

SYMPTONES GÉNERAUX. — Ce médicament convient plus dans le cas de pléthore apparente que dans la pléthore réelle, et surtout chez les personnes disposées à des oscillations rapides dans la circulation; paraît surtout indiqué dans les congestions à la tête, au cœur, à la moelle épinière, principalement à l'époque des règles, pendant la grossesse ou les couches, ainsi que dans l'âge critique, et à la suite d'une hémorrhagie supprimée quelconque; ne pourra remplacer la saignée de l'ancienne école que là où l'application de celle-ci aurait évidemment empire l'état du malade. — Inquiétude dans les membres, forçant à se lever; lassitude, comme par manque de sommeil; odéfaillance sans perte de connaissance; offaissement, défaillance, avec perte de connaissance. — Battement, fourmillement, sensation singulière de chaleur, par tout le corps, de bas en haut. — o Convulsions, surtout à gauche, avec doigts écartés.

Bommoil. — Baillement: avec congestion à la tête; avec besoin de respirer profondément; avec rongement dans le creux de l'estomac. — Envie de dormir, le soir de bonne heure; Réveil difficile.

Pièvre. — Chaleur: surtout à la face; avec bouillonnement, remontant du croux de l'estomac à la tête. — Sueur: surtout à la face: après avoir dormi, même dans un endroit frais; la sueur fait cesser les nausées. — Pouls: *uccéléré; *alternatives d'accélération et de lenteur; pouls irrégulier, intermittent; *plein; *trèsdur ou bien très-souple; petit et accéléré; offliforme.

Intellect. -- Illusions: des rues connues paraissent inconnues, le chemin de retour trop long; le menton paraît trop long, le cou gonfié. -- Laconisme, ne veut pas repondre. -- Perte de connaissance, avec cris et fureur; perte des sens et chute sans connaissance, pendant les congestions à la tête.

9%.



NITROGLYCERINUM.

498

Tête. - *Vertiges, surtout en se baissant; démarche incertaine. Pesanteur dans la tête: surtout au front; au-dessous des yeux; jusqu'aux oreilles; céphalalgie sourde avec sueur chaude au front. - Maux de tête : pression de bas en haut, surtout au vertex; *du dedans au dehors, surtout aux tempes; *comme si le cerveau était trop volumineux, s'il augmentait de volume, ou s'il faisait des ondulations. — *Plénitude, principalement au vertex, avec battement ou chaleur. - *Congestion de sang, battement et chaleur : dans les tempes; *au sommet; jusqu'à la nuque, à chaque pas; à chaque mouvement de la tête; odouleur brûlante au milieu de la tête, depuis une fièvre typhoïde. Elancements au côté droit du front, ou aux tempes.—*Douleur de brisure et d'érision au cerveau, augmentée en secouant la tête. *La douleur, la chaleur et la plénitude de la tête remontent de bas en haut, commençant dans la poitrine, la nuque ou l'occiput. - *Les douleurs augmentent en secouant la tête, en se baissant, pendant les mouvements du corps et surtout en montant les escaliers. - *Les douleurs réclament la pression extérieure. Amélioration après la promenade au grand air. — Pendant les maux de tête : pouls accéléré; face accélérée; front moit. -ºMaux de tête à la suite d'un coup de soleil.—ºMigraine invétérée. avec douleur violente à gauche, vomissement et sensation comme si le point visuel de l'œil gauche était dérangé. — °Céphalalgie insupportable, avec fureur, chaleur de la tête, face rouge, yeux proéminents et pouls filiforme. - Mal à la tête pendant un temps humide; après un refroidissement, et à la suite d'une vie sédentaire et de travaux intellectuels forcés. — °Céphalalgie violente à la suite de violents efforts corporels, ou d'un échauffement avec transpiration arrêtée.

Yeux. — Regard étrange; yeux sans vie, fixes, creux; mouvements incertains. — *Rougeur du blanc, avec yeux proéminents, regard farouche; *douleurs comme si les yeux étaient poussés au dehors; chaleur dans le globe des yeux, les paupières et autour des yeux; dans le globe des yeux, douleur, chaleur, élancements, tressaillement. — Devant la vue: étincelles, éclairs, brouillard, taches noires, trouble; les lettres paraissent plus petites, en lisant. —

- Perte de la vue, pendant la défaillance.

Oreilles. — Plénitude: dans les oreilles; autour des oreilles: élancements dans les oreilles. — Obturation des oreilles; bourdonnement, son de cloches, chant, crépitation; odureté de l'ouie.

Nez. — Douleur dans la racine du nez et la glabelle. — Les dou-

leurs de tête vont jusqu'au nez.

Face. — *Paleur : même pendant la chaleur : *pendant les congestions à la tête ou à la poitrine. — *Chaleur : *pendant les battements de tête ; pendant les palpitations. — *Rougeur, surtout de la partie supérieure, pendant le mal de tête. — oSueur froide, pendant les congestions à la tête. — Prurit, surtout au milieu de





la face.— Sensation **comme** si la *lèvre* inférieure était gonfiée. — Douleurs et roideur dans l'articulation sous-maxillaire.

Dents. — Maux de dents pulsatifs, pendant les maux de tête.

Bouche et Gorge. — Langue gonflée; cuisson et élancements à la langue. — Palais sensible, comme gonflé, avec battement; voile du palais sec, contracté. — Dans la gorge: chatouillement,

érosion, chaleur.

Organes de la digestion. — Nausées: jusqu'à ce que la sueur arrive; pendant les maux de tête; avec des douleurs d'estomac; avec congestion à la tête et à la poitrine, et face pâle. — Sensation de vide dans l'estomac; rongement dans le creux; creux de l'estomac sensible, surtout en se baissant. — Maux de ventre, tranchées au-dessus du nombril, réveillant le matin et persistant toute la journée; avant et après les selles liquides; borborygmes dans le bas-ventre, le plus fort, en étant couché sur le côté gauche. — Selles liquides, avec borborygment émission de vents, toute la journée, dès le matin. — Urines de la journée, plus abondantes.

Système séminin. —• Avant et pendant les règles, ou à leur place, ainsi que pendant la grossesse : congestion à la poitrige et à la.

tête; maux de tête; défaillance.

Larynx et Peitrine. — Besoin de respirer profondément; gamissements; oppression de la poitrine alternant avec mal à la tête; poitrine comme serrée par une constriction; inquiétude, angoisse dans la poitrine. — Elancements: sous le sternum; autour du mamelon; depuis l'épaule jusqu'à l'estomac. — Dans la région du cœur: douleurs violentes jusqu'au dos; plénitude, pesanteur pression, chaleur, avec pulsation difficile du cœur. — *Palpitations de cœur, avec chaleur de la face, pou ls accéléré; *battement des carotides.


Tronc. — Le long de tout le dos: douleur, chaleur, horripilations; chaleur brûlante entre les épaules. — Dans la nuque: sensation de gonflement; douleur crampoïde; pulsations: plénitude. — Au cou, roideur: les vêtements gênent, comme serrant trop.

Membres thoraciques. — Dans le bras, pesanteur, circulation gênée, faiblesse; torpeur et fatigue dans le bras gauché. — Dans le coude, endolorissement du nerf cubital. — Sensation du pouls dans le bout de tous les doigts, produisant un tremblement.

Membres pelviens. — Dans la cuisse gauche, faiblesse et torpeur; manque de force, de solidité, dans les genoux.

TRUM.

NITR. — Kali nitricum, Nitrate de potasse. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 412. — Doses usitées : 94, 30, — Durce d'action : jusqu'à 7 semaines, dans des affections chroniques.



500

NITRUM.

ANTIDOTE: Nitr-spir. — Le camphre augmente les effets du nitre. Comparer avec : Amm. arn. cate. dros. natr-m. nitr-ac. nitr-spir.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Inflammations internes; Gastrite; Gastralgies; Coliques venteuses; Entérite; Diarrhées colliquatives; Phthisic laryngée?; Pneumonie chronique: Souffrances phthisiques, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs déchirantes, lancinantes et tractives. — Tractions dans les membres avec faiblesse
paralytique. — Déchirement dans les membres; le jour et la nuit,
ne s'apaisanté a la friction que pour peu de temps. — La plupart
des symptômes se manifestent le soir, après minuit et après
midi. — Les symptômes qui se sont manifestés le jour, se dissipent le soir, lorsqu'on est couché. — Gonfiement rapide et tout
le corps. — Grand accablement, le matin, avec sensation de chaleur à la face et front brûlant. — Lessitude plus grande en étant
assis que pendant le mouvement. — *Tremblement involontaire
de tout un côté du corps.

Peau. — Lancinations à la peau, comme par des aiguilles, suivies de brûlement, principalement à la face. — Nodosités de la gresseur d'un pois, même à la face. — Vésicules brûlantes, remplies d'une sérosité jaunâtre, qui crèvent lorsqu'on gratte, et cessent

alors de brûler.


Sommeil. — Envie de dormir, le jour. — Sommeil de nuit agité; on ne fait que sommeiller, avec réveil fréquent. — Sommeil comateux. — Rêves anxieux, agités, de choses périlleuses. — Cauchemar.

Fièvre. -- Frisson le soir, avec douleurs. -- Froid après midi, avec soif pu froid précédé de mal à la tête, avec adipsie et suiri de chaleur nocturne, sans soif ni sueur. -- °Fièvre quotidienne, avec douleurs tractives dans les jambes. -- Sueurs abondantes et colliquatives. -- Sueur matutinale, surtout à la poitrine.

Moral. — Anxieté et agitation. — Découragement et peur de la mort.

Tête. — Maux de tête, après aroir mangé du reau. — Maux de tête avec contraction des paupières, d'un soir à l'autre, insupportables en baissant la tête. — Maux de tête alternant avec déchirement crampoïde dans les articulations des doigts. — Pesanteur étour-dissante de la tête, le matin, comme à la suite d'une ivresse. — Douleurs pressives dans la tête, aggravées par le café et soulagées par le mouvement de la voiture. — Compression à





l'occiput, avec roideur de ces parties. — Contraction dans la tête qui semble aboutir au nez. — Traction crampoïde dans l'occiput et la nuque, qui force à renverser la tête. — Maux de tête lancinants. — Les douleurs dans l'occiput sont soulagées en détachant les cheveux. Sensibilité douloureuse du cuir chevelu.

Yeux. — Brûlement dans les yeux, avec larmoiement et photophobie, surtout le matin après les lotions d'eau froide. — Cécité passagère. — Obscurcissement de la vue. — Cercles colorés devant les yeux. — Auréole irisée autour de la lumière, le soir.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, le soir, aggravés en se couchant dessus. — Tension, élancements et déchirement derrière les oreilles. — Inflammation et gonfiement du lobe de l'oreille avec douleur brûlante et tressaillante. — Tintement et sonnerie dans les oreilles. — Surdité permanente, par paralysie du conduit auditif.

Nes. — Brûlement dans le nez, avec fouillement et douleur de griffement, aggravée par le toucher. — Inflammation du bout du nez, avec douleur lancinante. — Gonflement dans l'intérieur du nez. — Ulcère dans la narine. — Épistaxis avec sang âcre. — Coryza violent, avec obturation du nez et perte de l'odorat.

Visage. — Teint pâle et maladif. — Rougeur et tension dans les joues, avec exacerbation des maux de tête. — Déchirement dans les os du visage.

Dents. — Maux de dents, avec traction lancinante ou douleurs déchirantes dans les dents et la tête. — Élancements dans les dents cariées, au toucher. — Maux de dents pulsatifs, la nuit, aggravés par les choses froides. — Gonflement des gencires. inflammatoire ou scorbutique; elles saignent facilement.

Bouche et Gorge. — Haleine fétide. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Mal de gorge, avec douleur lancimante et inflammation du voile du palais et de la luette. — Douleur nocturne dans la gorge, comme si elle allait se contracter, avec suspension de la respiration.

Estomac. — *Absence d'appétit, et soif ardente et continuelle. — Appétit, le soir principalement. — Nausées, comme si on allait vomir, surtout la nuit. — Vomiturition et vomissement de mucosités mêlées de sang. — Maux d'estomac, avec sensation comme si quelque chose s'y retournait. — Rongement, faiblesse spasmodique et pression à l'épigastre. — *Crampes d'estomac, violentes, avec douleur contractive.— Élancement dans l'estomac et dans l'épigastre. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomacc. — (Inflammation de l'estomac.)

Ventre. — Maux de ventre, après avoir mangé du veau, excessivement violents, surtout dans le côté droit. — Fort ballonnement du ventre. — Tranchées qui se dissipent vers le soir. — Douleurs lancinantes dans le ventre. — *Incarcération de fla-



502 NITRUM.

tuosités, surtout l'après-midi. — °Entérite avec froid glacial des

pieds.

Selles. — Selles dures, difficiles et lentes, évacuées avec beaucoup d'efforts. — Besoin pressant d'aller à la selle, avec ténesme. — Selles molles, avec tranchées. — *Diarrhées, quelquefois sans douleurs, ou colliquatives. — Selles sanguinolentes.

Urines. - Besoin fréquent d'uriner, et émission abondante d'une

urine claire, avec un nuage rougeatre.

Parties génitales. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Règles trop hâtives et trop abondantes, avec écoulement d'un sang noir. — Avant et pendant les règles, douleurs violentes dans le ventre et aux reins. — Leucorrhée séreuse, blanche, qui roidit le linge,

et s'échappe pendant les douleurs aux reins.


Larynx. — Eurouement avec raucité et grattement dans la gorge. — Tension ét douleurs incisives dans le larynx, avec déglutition empêchée. — Toux qui réveille vers 3 heures du matin, avec maux de tête étourdissants. — *Toux au grand air, ou en montant un escalier, comme aussi chaque fois qu'on retient la respiration. — Toux sèche, surtout le matin. — En toussant, douleurs incisives dans la poitrine, jusqu'à ce que les mucosités se soient détachées. — *Toux avec élancements dans la poitrine, et expectoration de sang pur. — o'Toux avec expectoration purulente et sueurs colliquatives.

Poitrine. — Géne de la respiration, qui ne permet pas d'être couché la tête basse. — Oppression de poitrine, en montant. — Douleur de poitrine, avec tension pressive, accompagnée d'une sensation d'apreté sous le sternum, qui oblige à tousser fort. — Douleur contractive dans la poitrine, partant du dos, avec sensation de constriction des poumons. — Lancinations dans la poitrine, surtout en respirant profondément, et étant couché et en toussant, accompagnées d'angoisse et d'oppression excessives. — (Inflammation des poumons.) — Violents battements de

cœur, surtout la nuit, au lit.

Pronc. — Douleurs lancinantes dans la région des reins. — Douleurs violentes aux reins, la nuit et le matin, au réveil. — Douleurs dans le dos, en se baissant. — Pression dans les lombes,
pendant le repos, aggravée surtout en toussant. — Élancements
dans et entre les omoplates, souvent accompagnés de suspension
de la respiration, la nuit, en étant couché sur le dos, soulagée
en se couchant du côté droit. — Douleur dans la nuque et jusque
dans les épaules, comme si on tirait violemment les cheveux.

Bras. — Déchirement dans les épaules, la nuit. — Déchirement et élancements dans les articulations des bras, du coude, des mains et des doigts, principalement la nuit, avec pesanteur et sensation comme si la main était plus volumineuse, et gonflement des doigts. — Torpeur et fourmillement dans le bras et les mains. — Traction et déchirement dans les bras, depuis l'épaule jusque.



NITRUM. — NITRI ACIDUM.

503

dans les doigts. — Douleur de luxation dans les articulations des doigts. — Faiblesse dans les bras, les mains et les doigts, qui ne permet de rien tenir solidement. — Déchirement crampoide dans les articulations des doigts, alternant aves maux de tête. Crampes et roideur dans les articulations des doigts.

Jambes. — Déchirement dans les jambes. — Grande lassitude et faiblesse paralytique dans les jambes, après une marche modérée. — Déchirement tressaillant dans la plante des pieds. Torpeur et fourmillement dans les pieds. - Contraction des orteils.

NITR ACIDUM.

NITR-AC.—Acide nitrique.— HABREMANN.— Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 133. — Doses usitees: 8,30. — Durce d'action : jusqu'à 8 semaines dans les affections chroniques.

ARTHOTES: Calc. camph con. hep. mez. petr. sulf. — On l'emploie comme

antiontes etc. Cadina con. hep. mez. petr. sait. — On templote comme antione de: Cafad.? Calc. merc.

Comparer avec: Acon. aur. bell. calad. calc. chel. con. graph. hep. kal. lyc. magn. merc. mez. mur. ac. nitr. op. petr. phos.ac. plat. puls. rhus. sclen, sep. sit. sulf. sulf-ac. thui. Cest surtout après: Bell. calc. hep. kal. natr. puls. sulf. et thui., que l'acide nitrique fera du bien, lorsqu'il se trouvera indiqué; après l'acide nitrique, on emploiera souvent avec succès: calc. petr. puls. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : --Affections des personnes à teint brun, cheveux et yeux noirs ou bruns et d'une constitution maigre, sèche et bilieuse, caractère vif et irritable; ou bien des personnes d'une constitution faible, lymphatique ou leucoflegmatique, avec disposition à des diarrhées, des rhumes de cerveau, des flueurs blanches ou autres écoulements muqueux. — Affections rhumatismales ; Douleurs ostéocopes, inflammation, carie et autres affections des os, surtout par l'abus du mercure; Affections syphilitiques et sycosiques; Dartres, rhagades, taches etautres suites fâcheuses de l'abus du mercure; Inflammation. engorgement et ulcération des glandes; Affections scrofuleuses et rachitiques; Affections hystériques; abcès; souffrances chlorotiques (?) et ictériques; inflammations locales internes; Epilepsie?; Engelures; Ulcères mercuriels; Verrues; Loupes?; Mélancolie; Surexcitation nerreuse, surtout par l'abus du mercure; Migraine; Céphalalgies rhumatismales, congestives, hystériques et nerveuses; Chute des cheveux par suite de céphalalgies fréquentes; Corona Veneris; Ophthalmies aiguës et chroniques, surtout celles qui proviennent de l'abus du mercure ou d'ulcères syphilitiques répercutés; Obscurcis-



sement de la cornée ; Amblyopie amaurotique ; Myopie ?; Otite, et otorrhée purulente; Dureté de l'oule; Coryza chronique; Ozène; Dartres faciales; Affections scorbutiques des gencives et stomacace, surtout par l'abus du mercure; Amygdalite et autres angines flegmoncuses; Angines syphilitiques et mercurielles, même avec ulcération. Odontalgies, surtout celles provenant de l'abus du mercure; Affections gastriques et hépatiques; Ictère; Coliques flatulentes (et inflammatoires)?; Ulcération des intestins dans le typhus; Bubons syphilitiques, mercuriels et scrofuleux; Hernies inguinales; Constipation, ou relachement chronique du ventre; Diarrhées et dyssenteries; Hémorrhoïdes; Incontinence d'urine; Gravelle; Gonorrhees chroniques; Condylomes; Orchite; Cancer (?), squirre(?) de l'utérus; Aménorrhée; Chlorose?; Flueurs blanches; Induration des glandes mammaires?, Laryngite chronique (phthisie laryngée); Toux convulsive; Coqueluche?; Hémoptysie; Souffrances phthisiques (surtout après l'usige de kali carb) ; Pneumonics des personnes agées, maigres, colériques et très-débiles; Spasmes pulmonaires; Rhagades et taches mercurielles aux mains; Engelures aux mains et aux pieds, etc., etc.

Voir la note, page 15.

504

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs lancinantes, comme par des échardes, surtout au toucher. — *Déchirement dans les membres, ou tiraillement, surtout après un refroidissement. —
•Inflammation et sensibilité douloureuse des os. — •Ulcération des os. — Rachitisme. — Inflammation, gonflement et suppuration des glandes. — Craquement dans les articulations. —
Attaques d'épilepsie, précédées de tiraillement dans les membres, et suivies de roideur du corps et de ronflement. — *Douleurs aux changements de temps. — *Douleurs sensibles pendant le sommeil. — Exacerbation des symptômes, le soir et la nuit. — La promenade en voiture soulage la plupart des symptômes. —
*Grande faiblesse et lassitude générale, avec tremblement, pesanteur des jambes et besoin de rester couché, surtout le soir, ou le matin. — *Amaigrissement excessif. — *Facilité à se refroidir.

Peau. — *Sécheresse de la peau. — *Éruptions urticaires, pruriantes, même à la face et surtout au grand air. — *Pores noirs.

"Tuches brun rougeûtre *et éphélides foncées sur la peau. — *Taches cuivrées ou violettes. — *Dartres pruriantes. — *Douleurs dans les engelures et les cors aux pieds. — *Par un froid modéré, membres comme gelés, enflammés et pruriants, avec peau gercée. — Gros furoncles. — Plaies et ulcères avec élascements comme par des échardes, ou avec douleurs brûlantes, et saignant facilement. — Ulcères, avec suppuration sanieus, sanguinolente et corrosive. *Douleurs dans les ancien



505

nes cicatrices, par le changement de temps. - *Verrucs. -

oLoupes.

Sommeil. — Envie de dormir le jour, par faiblesse, avec vertige. — Sommeil tardif le soir, *et réveil de bonne heure ou difficile, le matin. - Insomnie, comme par surexcitation .- Sommeil incomplet et agité, avec réveil fréquent en sursaut. - Sommeil non réparateur. - La nuit, saignement de nez, mal à la tête, mal aux dents, soif, gastralgie, coliques, douleurs dans les membres, cauchemar, angoisse, battements de cœur, nausées, vomissement et beaucoup d'autres souffrances. - Affluence de rêves fantastiques, voluptueux, anxieux, effrayants, et souvent avec cris, gémissements plaintifs, paroles et sursauts avec effroi. - Rêves de morts, de spectres, des occupations de la journée, de crimes, de festins, etc. - Secousses du corps et tressaillement dans les membres, pendant le sommeil.


Fièvre. — Froideur générale de la peau. — *Froid continuel. -*Fièvre après midi; frisson et chaleur. - Chaleur intérieure, sans soif, continue ou par accès. — Chaleur sèche la nuit, avec forte soif. — *Sueur nocturne fétide, -acide. — *Sueur acide.

comme de l'urine de cheval, le jour.

Moral. - *Tristesse. - Mélancolie excessive et accès d'angoisse, surtout le soir, ou la nuit. — *Inquiétude sur l'état de sa santé, avec peur de la mort. — *Inaptitude au travail. — Surexcitabilité. - Concentration en soi-même. - *Irritabilité et opiniotreté. — Emportement. — Rancune prolongée. — Accès de fureur et de désespoir, avec jurements et imprécations. - Humeur pleureuse. -- Nostalgie. -- Caractère peureux et disposition à s'effrayer. - Faiblesse des facultés intellectuelles, avec inaptitude aux travaux d'esprit. - Faiblesse excessive de la mémoire.

Tête. — *Vertiges en marchant et en étant assis. — *Vertiges qui forcent à se coucher, surtout le matin ou le soir. — Vertiges avec faiblesse, nausées ou mal à la tête. — Mal de tête, le matin, au réveil. - Grande sensibilité de la tête au bruit des voitures ou d'une marche pesante. - Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements. - Sensation de plénitude et de pesanteur dans la tête, avec tension et pression jusque dans les yeux. — *Déchirement dans le front, le vertex et l'occiput. — Lancinations dans presque toutes les parties de la tête, qui obligent quelquesois à se coucher et troublent le sommeil de la nuit. — *Maux de tête pulsatifs. - *Congestion à la tête, avec chaleur intérieure. -Douleurs ostéocopes dans la tête, tractives et pressives. - *Sensibilité douloureuse du cuir chevelu; la coiffure gêne. - Tension du cuir chevelu. - *Prurit au cuir chevelu. - Eruption humide à la tête. - *Chute des cheveux. - Plaques ulcérées, suintantes et brûlantes à la tête.

Youx. — Yeux ternes et creux. — Pression et élancements dans les yeux. - *Inflammation des yeux. - *Ulcération des yeux.



506

— *Tuches et ulcères de la cornée. — Gonflement des paupieres. — Larmoiement fréquent, surtout en lisant, avec sensibilité douloureuse des yeux. — Difficulté d'ouvrir les yeux (ils sont entourés d'un cercle jaune). — d'aralysie de la paupière supérieure. — *Pupilles difficiles à contracter. — Myopie. — Diplopie. — *Brouillard, taches, filets, étincelles et points noirs, rolligeant devant la vue. — Vue trouble et obscurcissement des yeux. — Éblouissement à la lumière du jour.

Oreilles. —*Élancements dans les oreilles. - Sécheresse de l'interieur de l'oreille. - "Ulcération de l'apophyse mastoïde. - *Écoulement par les oreilles. — Excoriation derrière les oreilles avec prurit et suppuration. — *Obturation des oreilles. — Dureté de l'ouïe, principalement par allongement des amygdales. - *Éclatement, battement et grondement dans les oreilles. —Craquement dans les oreilles, pendant la mastication. — Gonflement

des parotides. -- Loupe sur le lobe de l'oreille.

Hes. — Bout du nez rouge et couvert de vésicules croûteuses. —
Dartres pruriantes aux ailes du nez. — Picotements lancinants
dans le nez, au toucher. — *Douleur d'excoriation, brûlement et
croûtes dans le nez. — *Saignement de nez, "provoqué par des
pleurs, ou le matin, d'un sang noir. — *Sensation d'une odeur
fétide en respirant par le nez. — Odeur fétide par le nez. —
*Excroissance, comme un tic, dans le nez. — *Éternuments avor
tés. — *Sécheresse et obturation du nez. — Violent coryza fluent
avec maux de tête, toux, gonflement et ulcération du nez. —
Écoulement de mucosités épaisses et corrosives, par le nez. —
Mucosités fétides et jaunâtres dans le nez.

Visage. — Páleur du visage, avec yeux enfonces. — Couleur jaune de la face, surtout autour des yeux, avec rougeur des joues. — Douleur crampoide et déchirement dans les joues et les pommettes. — Gonflement des joues. — *Eruption boutonneuse à la face, au front et aux tempes. — *Pustules au visage, à bords rouges et larges, se recouvrant de croûtes. — Gonflement érysipélateux de la joue; avec douleur lancinante, nausées et fièrre. — Peau furfuracée sur toute la face. — Éruptions pruriantes et dartres dans les favoris. — Pores noirs au visage. — Gonflement des lèvres. — L'evres gereces. — Ulcèration des lèvres et des commissures des lèvres. — «Ulcères à la partie rouge des lèvres. — Furoncles au menton. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Odontalgie, avec douleur tressaillante, lancinante, tractive ou *pulsative, principalement la nuit, ou le soir, au lit. — Douleurs dans les dents cariées. — Jaunissement et *vacillement des dents. — *Gencives saignantes, blanches et gonfiées.

Boucho. — Odeur fétide et putride de la bouche. — Excoristion de la langue, du palais et de la face interne des geneives, avec douleur lancinante, aiguë. — *Salication, equelquesis



507

par accès fébriles. — Grande sécheresse de la bouche, avec soif ardente.

Gorge. — Ulcère, avec douleur lancinante dans la bouche et la gorge. — *Inflammation de la gorge, avec douleurs lancinantes, surtout en avalant des liquides. — *Tonsilles rouges et gonflées. — *Sensation brûlante et douleur d'excoriation dans la gorge.

Appétit. — *Amertume de la bouche, surtout après avoir mangé.

— *Goût aigre, avec brûlement dans la gorge. — *Goût douceâtre dans la bouche. — *Forte soif, même le matin en se levant. — *Dégoût pour la viande et les choses sucrées. — Répugnance pour le pain, qui laisse un goût aigre et fait vomir.

•Appétence pour la terre, la craie, la chaux, ou pour les aliments gras et le hareng. — Faim vive avec dégoût de la vie. — •Difficulté de digérer le laitage. — •Nausées par des aliments gras. — *Sueur pendant et après le repas, — Après avoir bu pendant le repas, douleur d'excoriation dans la gorge, l'œsophage et l'estomac, ou coliques. — *Après le repas, plénitude, dans l'estomac, lassitude avec chaleur, sueur et battement de cœur par le moindre mouvement, ou nausées, renvois, fiatuosités, mal de tête avec vomissement, sommeil, angoisse, etc.


Estomac. — *Renvois aigres. — *Envie de vomir. — Pyrosis. — Écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, après avoir bu vite. — Hoquet. — *Nausées fréquentes et encie de vomir, souvent avec angoisse, tremblement et frissonnement. — Vomis

sements amers et aigres, avec renvois fréquents (après le repas).

— Pression à l'estomac. — Brûlement ou sensation de froid à l'estomac. — Donleur au cardia en ingérant les aliments. — Crampe d'estomac contractive. — *Lancinations dans l'épigastre.

Ventre. — Pression tensive et élancements dans l'hypocondre gauche. — Douleurs abdominales comme à la suite d'un refroidissement. — *Fort ballonnement du ventre, même le matin. — *Fréquemment, pincements et douleurs incisives dans le ventre. — *Douleur d'ulération dans le bas-ventre. — *Élancements dans le ventre, surtout en y touchant. — *Hernie inguinale, ochez les enfants aussi. — *Gonflement et suppuration des glandes de l'aine. — *Facilité à se refroidir le ventre. — *Accumulation de flatuosités dans le ventre. — *Grondement et borborygmes dans le ventre. — *Incarcération de flatuosités, surtout le matin et le soir.

Selles. — *Évacuations alvines, difficiles, irrégulières. — *Selles durcs, sèches. — Selles trop fréquentes, — *Envie pressante d'aller à la selle. — *Selles diarrhéiques, quelquefois muqueuses ou d'odeur putride. — Évacuation fétide et non digérée. — Selles sanguinolentes, dyssentériques, avec ténesme. — Coliques avant les selles. — Après les selles, surexcitabilité et accablement. — Douleur brûlante et *prurit à Fanus et au rectum. — Excernation



508

suintante à l'anus. - *Gonflement des boutons hémorrhoïdaux

de l'anus, qui saignent à chaque selle.

Urines. — Besoin fréquent d'uriner, avec émission peu abondante d'une urine fétide, de couleur foncée ou brunâtre. — *Incontinence d'urine. — *Émission d'urine douloureuse. — Urine froide. — *Urine fétide. — Sédiment rouge, et sable dans les urines. — Cuisson et brûlement en urinant. — Écoulement de mucosités quelquefois sanguinolentes, ou de pus, par l'urèthre.

- Gonflement de l'orifice de l'urèthre.

Parties viriles. — Fort prurit aux parties génitales. — Chute des poils aux parties. — Excoriation entre le scrotum et les cuisses. — Taches rouges se recouvrant de croûtes, au prépuce. — Sécrétion derrière le gland, comme une gonorrhée bâtarde. — Gonflement, inflammation et phimosis du prépuce. — *Ulcères comme des chancres, au prépuce et au gland. — *Excroissance comme des fics, au prépuce et au gland, avec douleur cuisante et saignement au toucher, et suintement d'un pus d'odeur fétide et douceâtre. — Testicules relâchés. — Gonflement inflammatoire des testicules, avec traction douloureuse dans le cordon spermatique, jusque dans le côté du ventre. — *Absence d'appétit vénérien et d'érections. — Grande lascivité avec écoulement labondant de liqueur prostatique. — Érections nocturnes, douloureuses et presque spasmodiques. — *Pollutions par trop fréquentes.

Règles. — Prurit, douleur brûlante et sensation de sécheresse à la vulve. — Lancinations dans le vagin. — Excoriation à la vulve, entre les cuisses. — Ulcères avec prurit brûlant dans le vagin. — Règles trop hâtives. — *Suppression des règles. — Pendant les règles, crampes dans le bas-ventre, et pression vers les parties génitales. — Leucorrhée fétide, muqueuse, rongeante. — Écoulement fétide, brun rougeâtre, par le vagin. — °Nodosités dures

au sein. - Atrophie des mamelles.

Larynx. — *Enrouement avec coryza, toux et douleurs lancinantes dans la gorge. — *Apreté dans les bronches. — Grattement et élancements dans la trachée-artère, surtout après une lecture ou une conversation soutenue. — Toux avec élancements et douleur d'excoriation dans la gorge et la poitrine. — *Toux, seulement le jour. — *Toux sèche, surtout le soir, en se couchant. — *Toux aboyante. — Toux avec vomissement. — Toux ébranlante, la nuit, avec suspension de la respiration, presque comme dans la coqueluche. — En toussant, lancinations dans les reins, ou mal à la tête, à l'estomac, aux hypocondres, ou douleur d'excoriation et élancements dans la poitrine. — *Expectoration purulente, jaunâtre, par la toux. — Toux courte, avec expectoration d'un sang noir, coagulé.

Poitrine. — *Respiration sibilante, surtout pendant un travail manuel. — *Gêne de la respiration. — *Haleine courte. — Perte d'haleine et battement de cœur en marchant et en montant un



510 NUPHAR LUTEUM. -- NUX JUGLANS.

encore peu connu. contre: Diarrhées chroniques matutinales, presque sans douleurs, avec faiblesse des parties génitales. — Dépression des facultés sexuelles, et pollutions sans érection, avec faiblesse des parties génitales.

NUX JUGLANS.

N-JUGL — Noix du noyer, Juglans regia. — Gazette autrichienne. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 248.
ANTIDOTES? — Durée d'action? — Doses usitées?

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament, n'ayant été malheureusement étudié, jusqu'ici, que par l'école autrichienne ou spécifiste, c'est-à-dire à de très-fortes doses seulement, n'a encore fourni aucun de ces symptômes qui indiquent les médicaments d'une manière spéciale et précise dans les cas particuliers d'une maladie, et qui ne s'obtiennent ordinairement que lorsque les substances sont étudiées aussi au moyen des dernières atténuations. Toutefois l'on verrasi les symptômes suivants pourront indiquer quelquefois les cas précis dans lesquels on emploierait avec succès la noix contre certaines maladies, telles que : — Fièvres intermittentes; Affections scrofsleuses de toute sorte; Souffrances rachitques; Glandes engorgées; Ulcères, dartres, ophthalmies, diarrhées syphilitiques, scrofuleuses et mercurielles: Flueurs blanches; Colère, etc., etc.

GÉNÉRALITÉS. — L'assitude, abattement et sensation de relachement des muscles. — Aggravation de quelques souffrances, le soir et la nuit, ainsi qu'après le diner; soulagement après les selles.

Peau. — Prurit à divers endroits, sans éruption visible. — Petites pustules à la face, surtout à la bouche, comme dans la couperose. Petits boutons rouges, se remplissant d'une humeur épaisse, au cou, à la face, aux épaules et au dos. — Petites vésicules, comme de l'eczéma rubrum, avec prurit brûlant, rougeur et gerqure à la peau, suintant un liquide qui roidit le linge et le teint en jaune verdâtre, et s'aggravant par la transpiration. — Petites papules comme celles du lichen, sur le cou-de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et croûtes dures. — Taches rouges, avec des papules, ou bien avec un point purulent au milieu. — Petite tumeur dure, rouge et ronde, au bras, comme une petite glande endurcle, ou une tumeur enkystée. — Ulcère au pé-



NUX JUGLANS.

511

nis, à bords épais et durs, à fond lardacé et saignant facilement.

— Tumeur dure, rougeâtre et très-douloureuse sur la joue, partant de la gencive et ayant au milieu une tache ronde, rouge foncé, molle et affaissée, formant un abcès qui se vide à l'intérieur.

Sommeil. — Pandiculations et baillements fréquents. — Grande agitation et jactation, le soir au lit, parfois avec sensation comme st l'on volait dans l'air, avec vertige tournoyant. — Sommeil nocturne, agité, avec beaucoup de rêves effrayants. — Réveil en sursaut, pendant la sieste, comme par des secousses électriques, auxavant-bras et aux mains, à chaque effort de s'endormir.

Fièvre. — Le soir, face brûlante avec extrémités froides. — Accès fréquents de chaleur fugace. — Pouls plus fréquent, le soir, parfois avec chaleur brûlante des mains.

Moral. — Humeur chagrine et mécontente, le soir. — Grande répugnance pour la conversation et les discussions. —Paresse d'esprit,

inattention en lisant, et répugnance pour le travail.

Tôte. — Vertiges. — Agitation et excitation comme par ivresse, avec sensation comme si l'on volait dans l'air. — Pesanteur dans la tête, le matin, avec tête entreprise. — Douleur au front, parfois surtout en secouant la tête et en remuant les yeux. — Mal de tête au-dessous des yeux, surtout du côté gauche, parfois pressif et augmenté par le mouvement. — Céphalalgie avec embarras de la tête et brûlement dans les yeux. — Mal de tête, comme une migraine, sur une petite place circonscrite de l'os pariétal gauche, s'exacerbant fortement par la conversation. — Chaleur brûlante à la tête, avec froid glacial aux extrémités, le soir, au lit.

Yeux. — Douleur aux 'yeux, comme si un coryza allait se déclarer.

- Brûlement dans les yeux.

Nez. — Embarras au nez, comme le commencement d'un coryza.

Face. — Petites pustules à la face, surtout autour de la bouche, comme dans la couperose. — Tumeur dure, rougeâtre et doulou-reuse, à la joue et à la lèvre, formant abcès suppurant.

Dents. — Odontalgie sourde, tractive, dans les dents cariées, le soir et augmentée par la chaleur du lit. — Abcès très-douloureux aux

gencives.

Bouche. — Afflux de salive à la bouche. — Langue couverte de mu-

cosités blanches, le matin en se réveillant.

Gorge. — Accumulation de mucosités, forçant à renâcler souvent. Appétit et Goût. — Goût amer de la bouche, particulièrement le matin au réveil, où la bouche est aussi pâteuse. — Appétit augmenté. — Soif vive, ou bien adipsie complète au dîner et au souper, avec une sorte de déplaisir au vin, et plaisir à garder la bouche sèche. — Répugnance pour la pipe, le soir. — Après le repas, aggravation de la plupart des symptômes.

Estomac. — Renvois violents et bruyants, et grande disposition à



NUX JUGLANS.

rendre des rapports. — Hoquet, surtout après avoir mangé des aliments lourds. — Mal au cœur et nausées, avec accumulation d'eau dans la bouche et envie de vomir, ou bien avec brûlement dans l'estomac. — Vomissement des aliments, le soir au lit. — Grande plénitude, sensation et ballonnement de l'estomac, ne permettant de rien manger malgréle meilleur appétit, et soulagés

par des rapports. - Pression dans l'estomac.

Ventre. — Elancements dans le côté gauche, tant du ventre que de la région hypocondriaque, surtout en se baissant, en riant et en marchant vite. — Pression douloureuse dans le bas-ventre, surtout du côté gauche, soulagée par des rapports ou par l'émission de vents. — Douleur violente dans la partie inférieure du bas-ventre, passive et tractive, avec règles trop hâtives. — Grande plénitude, ballonnement, tension, pesanteur du ventre, parfois avec besoin fréquent d'aller à la selle, ou après la selle même, ou avec amélioration par des rapports et l'émission de vents. — Flatuosités continuelles et émission fréquente de vents, surtout dans la position couchée. — Gargouillement dans le ventre et borborygmes. — Les vents émis n'ont presque pas d'odeur. — Dureté tympanitique du ventre.

Selles. — Parfois selles dures et constipation, ou bien besoin fréquent d'aller à la selle. — Selles liquides, précédées de pincements dans le ventre. — Après la selle, amélioration du ballonnement et de la pesanteur du ventre, ou bien brûlement et pression à l'anus. — Prurit à l'anus, le soir, au lit, avec élancements qui forcent

à se lever.

512

Urines. — Besoin presque continuel d'uriner, émission très-fréquente, jour et nuit, et sécrétion des urines fortement augmentée.
 Émission d'urine involontaire, goutte à goutte, si le besoin pressant n'est pas satisfait sur-le-champ. — Urines claires, couleur de vin blanc, et sans dépôt.

Parties viriles. — Érections fréquentes, jour et nuit. — Ulcère, près du frein du prépuce, à bords épais et durs, à fond lardacé et

saignant facilement.

Règles. — Règles trop hâtives de quinze jours, précédées de fortes douleurs dans les aines, et durant huit jours, avec sang abondant en caillots noirâtres.

Poitrine. — Élancements fugaces, comme dans les deux poumons. — Oppression de la poitrine pendant et avant la marche. —

Prurit au sernum, forçant à se gratter.

Tronc. — Élancements au sacrum, tellement violents qu'ils font tressaillir. — Boutons rouges, comme ceux de l'acné, se remplissant d'un pus épais, au dos, à la nuque et aux épaules. — Sous les aisselles, petites vésicules, comme d'un eczéma rouge, avec prurit brûlant, suintement léger et rougeur, excoriation et gerçure à la peau. — Furoncles très-douloureux, gros et purulents, à l'épaule et à la région du foie.



NUX JUGLANS. - NUX MOSCHATA.

513

Extrémités supérieures. — Taches larges, pruriteuses, avec une bosse purulente au milieu, au pli du coude. — Petite tumeur indolore, dure, rouge et ronde, au bras, comme une petite glande endurcie, ou une tumeur enkystée. — Papule douloureuse et purulente, se formant à l'avant-bras sur une petite place rouge, brûlante, et pruriteuse. — Furoncle très-douloureux, gros et dur, au biceps du bras droit. — Ancienne dartre à la main, redevient pruriteuse et rouge. — Tiraillement et sensation de faiblesse paralytique à la main droite. — Prurit aux doigts, ou bien au bras, le soir au lit. — Tiraillement au pouce et à l'index de la main droite, comme par foulure.

Extrémités inférieures. — Douleurs dans l'articulation coxo-fémorale, en marchant. — Douleur génant la marche, à l'articulation du genou, tantôt lancinante, ou rhumatismale, ou comme faiblesse paralytique. — Tiraillement comme par foulure, au gros orteil droit. — Brûlement et prurit aux jambes, le soir au lit. — Petites papules, comme celles du lichen, au cou-de-pied, avec rougeur, fort prurit, épaississement de la peau et croûtes dures

NUX MOSCHATA.

N-MOS. — Noix muscade. — Helbig. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 250. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: ?
Antidote: Semina cari carvi (cumin).
COMPARER AVEC: Con. ign. magn. mosch. n-vom. op. sep. pulb. sulf.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections principalement des femmes et des enfants : Affections occasionnées par l'influence d'un froid (humide) ; Affections rhumatismales ; Névralgies ?; Affections scorbutiques ?; Éclampsie des enfants ?; Accès de défaillance et autres paroxysmes hystériques ; Convulsions ; Affections scrofuleuses et rachitiques ?; Tabes dorsalis ?; Atrophie des enfants ?; Fièvres intermittentes ; Fièvres typhoïdes ; Coma ?; Imbécillité ?; Apoplexie ?; Céphalalgie par indigestion ; Amblyopie amaurotique ?; Ephélides ?; Odontalgie des femmes enceintes ; Odontalgie par l'air froid et humide du soir ; Paralysie de la langue et des organes de la déglutition ?; Angines enceintes ; Dyspepsie, surtont chez les vieillards ?; Gastralgie ?; Engorgement du foie (et de la rate?); Coliques flatulentes, néphrétiques et vermineuses ?; Coliques des enfants ?; Diarrhées, surtont par suite de faiblesse ou par refroidissement ; Diarrhées putrides et sanguinolentes ; Diarrhées chez les enfants ; Dyssenterie ; Calculs



NUX MOSCHATA.

516

Gorge. — Grande sécheresse et sensation de sécheresse dans la

gorge, avec grattement.

Appétit. — Goût dans la bouche, comme après avoir mangé beaucoup de sel. — Goût pâteux ou goût de craie dans la bouche. — Faim et appétit immodérés, surtout vers midi. — Diminution de l'appétit et prompte satiété. — Absence de soif. — "Accablement et malaise après le repas. — *Faiblesse de la digestion et de l'estomac.

Estomac. — Renvois âcres, peu après le repas. — Nausées par le mouvement de la voiture. — Après le repas, et surtout après le déjeuner, aggravation des souffrances, et principalement des maux de tête. — Plénitude de l'estomac, avec gêne de la respiration. — Sensation de chaleur et douleur brûlante à l'estomac. — Ballonnement de l'estomac. — Crampes d'estomac, avec grande faiblesse de la digestion. — Pression de l'estomac, comme par incarcération de flatuosités.

Ventre. — Pression dans le foie, comme par des corps durs et pointus. — "Gonflement du foie. — "Sensation de pesanteur dans les hypocondres et la partie supérieure du ventre. — Colique avec douleur déchirante. — *Ballonnement du ventre, avec nausées et fouillement de la région ombilicale. — Tranchées, comme par des vers, avec envie de dormir. — *Souffrances par des

flatuosités, la nuit, troublant le sommeil.

Selles. — Selles molles, lentes, difficiles à évacuer. — °Diarrhées par faiblesse, ou à la suite d'un refroidissement. — *Diarrhées sanguinolentes, °putrides. — °Diarrhées comme des œufs brouillés, avec absence complète d'appétit (chez les enfants). — Diarrhée de matières non digérées. — °Diarrhées avec absence d'appétit et envie de dormir chez les enfants. — Diarrhée muqueuse comme par des vers. — Affections vermineuses, avec coliques et somnolence.

Urines et Parties viriles. — En urinant, douleurs brûlantes et incisives.—Strangurie douloureuse. — Urine d'odeur de violette. — Absence d'appétit vénérien. — Faiblesse des fonctions génitales. — Défaut d'érections, même pendant des idées volup-

tueuses. — Écoulement de liqueur prostatique.

Règles. — Menstrues irrégulières. — Avant les règles, maux de reins et lassitude, avec pression à l'estomac, écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, et douleurs hépatiques. — Pendant les règles, sensation comme si tout affluait vers le bas-ventre, et tractions dans les membres. — Flux menstruel épais et de couleur foncée. — °Suppression des règles. — °Métrorrhagie épaisse, foncée, avec pression qui pousse vers en bas. — Mamelles trop petites et vides de lait.

Larynx. — Voix chevrotante. — **Enrouement et catarrhe. — °Enrouement subit en marchant contre le vent. — Toux avec douleur dans la poitrine, comme si elle était à vif. — °Toux sèche, avec



NUX MOSCHATA. --- NUX VOMICA.

517

suspension de la respiration, après un refroidissement dans l'eau. - Toux sèche, qui s'établit pendant un travail échauffant, ou à la chaleur du lit. - Toux avec expectoration de sang.

Poitrine. - Dyspnée. - *Haleine courte, surtout après le repas. - Gêne de la respiration. - Rétrécissement de la gorge, comme un étranglement. — *Oppression de poitrine, venant ordinairement de l'épigastre. — Plénitude et sensation pénible d'un fardeau sur la poitrine. - *Battement de cœur, quelquefois avec accès d'évanouissement. — Tremblement du cœur.

Tronc. — Tractions dans les muscles de la nuque, à l'impression d'un air humide. Douleurs de brisement aux reins et dans le dos. - Douleurs dans le dos, en étant en voiture. - Lassitude aux reins et dans les genoux.

NUX VOMICA.

N-VOM. — Noix vomique. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 251. — Doses usitées : 45, 24, 30. — trurée d'action : 15 à homoop., p. 251. — Doses usitées: 15, 24, 30. — L'urée d'action: 15 à 20 jours, et même plus longtemps.

Antidotes: Acon. alcohol. camph. cham. coff. cocc. puls. vinum. — On l'emploie comme antidote de: Ambr. ars. calc. cham. chin. cocc. coff. colch. cupr. dig. graph. lach petr. phos. puls. stram. sulf. tabac.

COMPARER AVEC: Acon. alum. ambr. amm. arn. ars. bis. bry. calc. cann.

caps. carb-veg. caus. cham. chin. cocc. coff. colch. con. cupr. dig. dros. dulc. fer. graph. hyos. ign. ipec. lach. laur. lyc. magn. magn-m. merç. mur-ac. natr. natr-m. n mos. op. petr. phos. sep. stram. sul, tabac. tart. mgs. — C'est surtout après : Ars. ipce. lach. petr. phos. et sulf., que la noix vomique fera du bien, lorsqu'elle se trouvera indiquée. — Après la noix vomique, on trouvera souvent convenables : Bryon. puls.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Souffrances par l'abus du café, du rin, ou d'autres boissons spiritueuses ou drogues narcotiques; Suites fâcheuses d'un refroidissement, d'une colère, ou d'un excès d'étude, ou de veilles prolongées, ou d'une vie sédentaige; Affections principalement des personnes d'un tempérament vis colérique ou sanguin, aux yeux et aux cheveux noirs, teint pâle ou jaunatre ou virement coloré; Constitution bilieuse, sèche et maigre, ou pléthorique et forte, ou lymphatique, saible et épuisée, ou constitution veineuse, avec disposition aux hémorrhoides, à l'hypocondrie, à l'hystérie et à la mélancolie; Affections périodiques et intermittentes; Souffrances et douleurs dans les membres par un temps rude et tempêtueux; Affections rhumatismales; Prodromes et métastases arthritiques; Congestions sanguines à la tête, à la poitrine, ou au ventre; Faiblesse physique



518

et nerveuse par suite d'onanisme, de pollutions ou autres pertes débilitantes; Accès d'évanouissement et de faiblesse hystérique ou hypocondriaque; Atrophie des enfants scrofuleux; Faiblesse musculaire et difficulté d'apprendre à marcher, chez les enfants?: Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques; Accès de convulsions, d'épilepsie, de tétanos et de danse de Saint-Guy; Paralysies, principalement des extrémités inférieures; Souffrances chlorotiques, ou ictériques; Furoncles; Engelures; Ecchymoses; Éruptions miliaires; Affections à la suite des morbilles, telles que miliaire blanche, toux catarrhale, etc., etc.; Fièvres inflammatoires avec affections gastriques, muqueuses ou bilieuses; Fièvres quotidiennes tierces et quartes; Fièvres typhoïdes; Fièvres lentes; Aliénation mentale des irrognes; Affections morales par excès d'étude, ou par suite d'une humiliation ou d'une colère; Manie: Mélancolies hypocondriaques et hystériques; Congestion cérébrale avec vertiges; Apoplexie sanguine; Céphalalgie catarrhale, congestive, nerveuse, ou hystérique; Migraines; Maux de tête par l'abus du café, ou de boissons spiritueuses, par des études forcées, ou par un temps apre et venteux; Ophthalmies catarrhales, ou serofulcuses (ou arthritiques?); Photophobic scrofulcuse: Hémorrhagie des yeux; Coryza dans la période inflammatoire; Otalgie inflammatoire; Prosopalgie et odontalgie rhumatismales avec fluxion; Odontalgie par l'abus du café; Dentition difficile des enfants, avec fièvre; Stomacace; Angine scarlatine; Angine catarrhale; Angines pharyngée, uvulaire et tonsillaire: Gastralgie: Gastrite: Affections gastrico-muqueuses ou bilicuses: Dyspepsie même arec romissement des aliments; Vomissement des ivrognes, des femmes enceintes, etc., etc.; Rétrécissement et squirre du cardia?; Choléra?; Douleurs hépatiques?; Hépatite; Engorgement et dureté du foie et de la rate, même par l'abus du quinquina; Carreau; Congestions abdominales et stagnation dans le système de la veineporte; Coliques spasmodiques, flatulentes et hémorrhoïdales; Coliques par la grarelle: Hernies ombilicales et crurales?; Hernies incarcérées: Hernies inguinales; Péritonite; Constipation opiniâtre, principalement par suite d'une rie sédentaire ou par l'abus du café; Diarrhées muqueuses et sanguinolentes; Dyssenterie; Rétrécissements spasmodiques de l'anus et de l'urêthre; Hémorrhoïdes aveugles et saignantes; Ischurie et strangurie spasmodiques, ou par suite de la gravelle; Catarrhe de la vessie; Gonorrhée bâtarde; Orchite; Inflammation du cordon spermatique; Satyriasis?; Coliques menstruelles arec règles trop hâtires; Suppression des lochies: Aménorrhée?: Flueurs blanches; Chute de la matrice et du vagin; Céphalalgie; Odontalgie, nausées, vomissement, coliques, constipation et autres souffrances des femmes enceintes; Métrite?; Douleurs d'enfantement ou tranchées trop violentes: Abortus; Péritonite puerpérale; Excoriation des mamelles: Ophthalmie, catarrhe nasal, hernies, constipation, convulsions et



520

*Le café, le vin, la fumée du tabac, la méditation et les veilles, ainsi qu'un temps venteux, provoquent ou aggravent aussi beaucoup de souffrances. - *Le matin, au lever, ou le soir, vers les 8 ou 9 heures, ainsi qu'après le diner, on se trouve ordi-. nairement le plus mal, et bien des souffrances apparaissent périodiquement à l'une ou à l'autre de ces époques. - *Amai-

grissement du corps.

Peau. - Couleur pale *on jaunâtre de la peau. - *Jaunisse, avec dégoût des aliments et accès d'évanouissement. - *Peau froide et bleuatre pendant les frissons. - Prurit picotant et brûlant, le matin ou le soir, en se déshabillant, et même la nuit. - Sensibilité et douleur d'excoriation sur toute la peau, avec sensation de torpeur à l'endroit que l'on touche. — Éruptions d'un prurit brûlant. - Engelures avec prurit brûlant; egerçures saignantes et gonflement d'un rouge pâle. - *Furoncles. - *Taches bleuâtres, comme par des sugillations après une contusion. oUlcères à bords élevés de couleur rouge pâle. - Eruptions mi-

liaires et boutonneuses, avec prurit brûlant.

Sommeil. - *Grande envie de dormir, principalement le matin, en se levant, ou après le diner, ou le soir de bonne heure, et souvent avec insomnie la nuit. - Sommeil du matin excessivement doux et prolongé, avec réveil difficile. - *Sommeil trop court avec difficulté de s'endormir avant minuit, et impossibilité de rester au lit, après trois heures du matin. - *Le soir, au lit, grande affluence d'idées, empêchant souvent de dormir jusqu'au matin. *Etat comateux avec sommeil lourd et profond pendant le jour. - *Sommeil nocturne, léger, avec réveil fréquent, -ou comme une espèce de coma vigil, avec révasseries pleines de trouble et d'agitation, et sorte d'ennui, comme si la nuit était trop longue. - *Pendant le sommeil, sursauts fréquents avec effroi, gémissements, lamentations, beaucoup de paroles, pleurs, -délires, avec envie de s'enfuir de son lit, respiration ronflante ou sibilante, et coucher sur le dos, les bras levés sur la tête. -*Rêves continuels, fantastiques, terribles et anxieux, ou voluptueux, pleins de cruautés et d'horreurs, ou de méditations et de soucis; rêves de vermine, de corps mutilés, de la chute des dents, des occupations de la journée et d'affaires urgentes. -La nuit, agitation dans les cuisses, anxiété et inquiétude, chaleur et bouillonnement de sang. - Au réveil, le matin, douleur de meurtrissure dans les membres, grande lassitude avec besoin de rester couché, et accès de pandiculations et de bâillements convulsifs. - Cauchemar.

Fièvre. - *Frissonnement, horripilation et froid, principalement la nuit, ou le soir après s'être couché, ou le matin, ou au grand air, ou au moindre mouvement, même pendant la chaleur, ainsi qu'après avoir bu, après s'être fâché, et en se découvrant. -*Froid, frissons et horripilations partielles, principalement au



521

dos et aux extrémités. - *Pendant les frissons, peau, mains et pieds, risage ou ongles froids et bleuatres; ou douleur, congestion de sang, et chaleur à la tête, avec rougeur et chaleur du visage ou (de l'une) des joues; soif de bière; contraction crampoïde des pieds et des orteils; ou élancements dans le côté et dans le ventre, douleurs au dos et aux reins, tiraillement dans les membres, pandiculations, bâillements spasmodiques et besoin de se coucher. - *Chaleur principalement la nuit, ou vers le matin ou en se promenant au grand air, et quelquefois seulement à la tête, ou au visage, avec rougeur des joues, ou aux pieds et aux mains, avec froid partiel ou horripilations et frissons au reste du corps. - *Pendant la chaleur, vertige, mal à la tête, frissons pour peu qu'on se remue ou qu'on se découvre, soif, pugnance pour les boissons, avec sécheresse de la bouche, nausées, vomissements, bourdonnements des oreilles, urines rouges, douleurs à la poitrine. - *Accès fébriles, surtout le matin ou le soir, ou la nuit, et composés pour la plupart de frissons avec chaleur partielle (suivie de sueur), ou de chaleur précédée, suivie ou mélée de frissons, ou de chaleur alternant avec des frissons avec soif continuelle de bière, quelquefois même avant les frissons et après la chaleur; type quotidien ou tierce. - Accès fébriles avec congestion et douleurs à la tête et souffrances gastrico-muqueuses ou bilieuses, on avec perte de connaissance, grande faiblesse et prostration, même déjà au début de l'accès. *Pouls plein et fréquent, ou petit, accéléré ou faible, ou intermittent. - Sueurs abondantes, quelquefois fétides, ou acides, ou d'une odeur de moisi; sueurs froides et visqueuses; sueurs partielles ou semi-latérales, principalement à la tête et aux parties supérieures du corps; sueurs nocturnes, principalement après minuit ou vers le matin; sueurs pendant le mouvement au grand air; sueurs alternant avec des frissons, ou suivies de chaleurs et de soif de bière. - Pendant les sueurs, quelquefois rémission des douleurs, ou endolorissement des parties sur lesquelles on est couché, horripilation ou coliques pour peu qu'on se découvre, envie de vomir, chaleur au visage et aux mains, sécheresse des lèvres et de la partie antérieure de la bouche.

resse des levres et de la partie antérieure de la bouche.


Moral. — *Humeur hypocondriaque et chagrine, morose, soucieuse et triste, quelquefois avec envie de pleurer, sans le pouvoir.
— *Mélancolie, avec grande inquiétude sur son état, besoin de parler de sa maladie, désespoir de la guérison, et crainte d'une mort prochaine. — Désir de la solitude, du repos et de la tranquillité, avec répugnance pour la conversation. — *Angoisse, anxiété et inquiétude excessives, souvent avec agitation qui ne permet de rester nulle part, comme si on avait commis un crime, et qui pousse jusqu'au suicide. — *Les accès d'angoisse ont lieu le plus souvent le soir en se couchant, ou après minuit, vers le matin, et sont quelquefois accompagnés de battements de cœur,



522

chaleur et sueur, nausées et vomissements, pupilles dilatées et serrement de cœur. - *Exaltation et surexcitation morale, avec impressionnabilité extrême de tous les organes, sensibilité excessive à la moindre douleur, au moindre bruit ou mouvement. facilité extraordinaire à s'effrayer, et grande sentimentalité qui fait que même par la musique on est touché jusqu'aux larmes. *Exaspération inconsolable et lamentations, plaintes et cris (pendant les souffrances), quelquefois avec chaleur et rougeur des joues. - Caractère craintif, méfiant et soupçonneux, avec incertitude et indécision. - *Humeur pleureuse avec grande susceptibilité et irritabilité, disposition à se fâcher et à s'emporter facilement, envie de critiquer et de faire des reproches. - *Humeur acariatre, méchanceté, querelles, injures et invectives, avec paroles impudiques pleines de jalousie, mêlées de pleurs et de cris. - *Mauvaise humeur, dépit et colère, jusqu'à se porter à des violences. - Maladresse et gaucherie. - *Ennui, avec déplaisir et inaptitude à tout travail, de corps et d'esprit. -*Incapacité de méditer; disposition à se tromper en parlant, difficulté de trouver des expressions convenables; Terreur sur les poids et les mesures; confusions fréquentes en écrivant avec omission de syllabes et de mots entiers. -· Divagations et actions maniaques, visions effrayantes, perte de connaissance et délires quelquefois avec murmures.

Tête. - * Tête entreprise et embarrassée avec obnubilation, comme après une débauche, principalement au grand air et au soleil. -Ivresse, stupeur et étourdissements. - *Vertiges avec sensation de tournoiement et de vacillement du cerveau, principalement pendant ou après le repas, ainsi qu'en marchant et en se promenant au grand air, en éternuant, en toussant, en se baissant, ou en se redressant, le matin ou le soir au lit, en étant couché sur le dos, et souvent avec obscurcissement des yeux, péril de tomber, chancellement, acces d'évanouissement, obourdonnement des oreilles et perte de connaissance. - *Congestion de sang à la tête, avec bourdonnement des oreilles. - Perte de connaissance avec état de coma somnolent, et paralysie de la mâchoire inférieure, des organes de la déglutition et des extrémités. *Pesanteur, pression et sensation d'expansion dans la tête, comme si le front allait écluter, principalement au-dessus des *Douleur de meurtrissure dans le cerveau. - *Douleurs déchirantes et tractives ou tressaillantes dans la tête, ou élancements, ou coups et douleurs pulsatives, ou fouillements et sensation comme si un clou était enfoncé dans le cerveau, ou tension et serrement, ou douleur d'ulcération. - Secousses et résonnement dans le cerveau à chaque pas. — *Les maux de tête sont souvent profondément dans le cerveau, ou à l'occiput, ou d'un seul côté, ou dans le front jusqu'aux yeux et à la racine du nez ; ils apparaissent principalement le matin après le réveil ou



524

Nez. - Prurit insupportable au nez. - Douleur d'excoriation on d'ulcération dans les narines. - *Obturation du nez, quelquefois d'un seul côté, et souvent avec prurit dans les narmes et écoulement de mucosités .- * Enchifrènement, principalement le matin ou la nuit, et coryza sec, avec chaleur et pesanteur au front et obturation des narines. - *Coryza fluent le jour ou le matin, avec sécheresse et obturation nocturne du nez. - Grattement dans le nez et la gorge, chaleur dans les narines et éternument fréquent pendant le coryza. - Mucosités sanguinolentes dans le nez. - Saignement de nez, et sortie de caillots de sang par les narines. - Exhalaison fétide dans le nez. - *Grande sensibilité de l'odorat. - Odeur devant le nez, comme du soufre brûlé, du

fromage pourri, ou de la mouchure de chandelle.

Visage. — Aspect maladif, avec yeux cernés et nez pointu. *Visage pâle, jaunâtre (surtout autour du nez et de la bouche) et terreux. - *Chaleur et rougeur du visage ou (de l'une) des jones, calternant quelquefois avec pâleur. - Sueur froide au visage. - Palpitations musculaires, le soir au lit, ou fourmillement pruriant au visage. - *Douleurs déchirantes et tractives dans le visage, oquelquefois seulement d'un côté jusque dans l'oreille, avec gonflement de la joue. - Tension autour de la bouche, du nez et des yeux, avec enflure de ces parties. - *Gonflement du risage, quelquefois seulement d'un côté, et avec couleur pâle de la tumeur. — Petits boutons purulents aux joues et à la tête. -*Sécheresse, gerçure et exfoliation douloureuse des lèvres. Croûtes et ulcérations à la partie rouge des lèvres et aux coins de la bouche. - Petits boutons purulents autour des lèvres et au menton. - Sensation d'excoriation et petits ulcères à la surface intérieure des lèvres. — Éruption dartreuse au menton. — Dis-torsion de la bouche. — Serrement spasmodique des mâchoires.

- Elancement dans les glandes sous-maxillaires en avalant. Dents. - *Douleurs d'excoriation on d'ulcération, ou douleurs tractives tressaillantes, avec élancements, ou fouillement et térébration dans les dents et dans les machoires, ou seulement dans les dents cariées; principalement la nuit, ou le matin au réveil. ou après le diner, ou en se promenant au grand air, ou en inspirant l'air frais, ou le soir, ou en méditant et par un travail intellectuel; souvent jusque dans la tête, les oreilles et les pommettes, ou avec engorgement douloureux des glandes sous-maxillaires, gonflement et endolorissement des gencives, taches rouges et chaudes aux joues et au cou, humeur plaintive et découragement. — Les maux de dents n'occupent souvent qu'un seul côté; ils s'aggravent quelquefois à la chaleur de la chambre et s'améliorent au grand air. - *Les boissons et les soupes chaudes, ainsi que l'eau froide, ole vin et le café, renouvellent ou aggravent egalement les maux de dents. - Vacillement et chute des dents. - *Gonflement putride et douloureux des gencives, quelquefois



525

avec pulsation comme dans un abcès, brûlement, tiraillements et

saignement facile. - *Ulcère aux gencives,

Bouche. — *Odeur fétide, oputride et cadavéreuse de la bouche, principalement après le repas et le matin à jeun. — Grande sécheresse, principalement de la partie antérieure de la bouche et de la langue, surtout après minuit. — Douleur dans la bouche, à la langue et au palais, comme si tout était à vif et excorié. — *Accumulation de mucosités d'un blanc jaunâtre, dans la bouche. — *Ulcères d'une odeur fétide, *boutons et vésicules douloureuses dans la bouche, à la langue et au palais. — *Gonflement inflammatoire du palais. — *Accumulation d'eau dans la bouche; salivation nocturne; salive sanguinolente; crachement de sang. — *Langue chargée d'un enduit blanc, oépais, ou jaunâtre, ou langue sèche, gercée, pun âtre ou noirâtre, avec rougeur vive des bords. — *Grande pesanteur de la langue avec difficulté de parler, et sensation, en parlant, comme si la langue s'épaississait. — Parole balbutiante.

Gorge. — *Grattement et douleur d'excoriation dans la gorge, principalement en avalant et en inspirant l'air frais. — Sensation de gonflement au palais, et *douleur en avalant à vide, comme s'il y avait une tumeur ou un tampon dans la gorge, ou comme si le pharynx était rétréci. — Élancements dans la gorge, principalement en avalant, et quelquefois jusqu'aux oreilles. — *Gonflement de la luette oet des tonsilles, *avec douleurs pressives et lancinantes. — o'Étranglement et contraction spasmodique dans la gorge. — Brûlement dans la gorge, principalement la nuit, et

quelquefois jusque dans la bouche et l'œsophage.

Appétit. - Goût de bouche salé, soufré, douceatre, métallique, herbace, ou muqueux. - *Goût acide de la bouche, principalement le matin, ou après avoir ingéré des aliments. - *Goût acide des aliments, et principalement du pain (de seigle et de froment) et du lait. - *Gout putride, principalement le matin. - Gout amer de la bouche, des crachats, des aliments et principalement du pain. - Insipidité des aliments, principalement du lait, de la viande, du café et du tabac. - *Manque d'appétit et dégoût des aliments, et principalement du pain de seigle, du tabac et du café, et quelquefois avec soif continuelle. — *Soif, quelquefois avec dégoût de toutes les boissons, principalement du lait et de la bière, ou avec désir de la bière ou du lait. - *Désir d'eau-de-vie on de craie. - Faim, quelquefois avec dégoût des aliments, ou prompte satiété. - Boulimie périodique après midi. - *Pendant le repas, chaleur à la tête, sueur au front, nausée et accès de défaillance. - *Après le repas, rapports et régurgitations. nausées, envie de vomir et comissements des aliments, pressions et douleurs crampoïdes dans l'estomac, ballonnement pressif à l'épigastre, coliques, pyrosis, tête entreprise et douloureuse, malaise et humeur hypocondriaque, anxiété, certiges, et acces



de défaillance, froid et frissons, avec chaleur à la tête et au risage et rougeur des joues, fatigue et cavie de dormir. — Les boissons génent l'estomac et causent souvent des nausées, avec envie de vomir. — *Le pain de seigle et les acides causent également des souffrances; mais les aliments les plus gras sont quel-

quefois bien supportés.

Estomac. - Envic inutile d'expulser des renvois, avec sensation douloureuse de contraction spannodique de l'esophage. - *Rapports et régurgitations fréquentes et souvent amères et acides. - *Hoquet fréquent et violent. -- *Pyrosis, principalement après avoir pris des acides ou des aliments gras. - *Nausées et encie de romir continuelles, principalement le matin. ou pendant le repas, ou après avoir bu ou mangé. -- Ecoulement d'eau de l'estomac. -- *Vomiturition et romissements violents de matières muqueuses ou aigres ou des aliments, ou de matières insipides, ou de bile, *principalement après avoir bu ou mangé, cou le matin, ou même la nuit, et souvent avec mal à la tête. crampes aux jambes et aux pieds, anxiété et tremblement des membres. — *Régurgitation et romissement de sang, emèlé de caillots et de matières noires, avec tranchées, bouillonnement dans la poitrine, et écoulement d'un sang noir avec les selles dures. -- *Pression à l'estomac et à l'épigastre, comme par une pierre, ou douleurs crampoides, contractives, et rongeantes; principalement après avoir bu ou mangé, ou le matin, ou en se promenant au grand air, ou après avoir pris du café, ou la nuit, et souvent avec tension et ballonnement à l'épigastre, oppression et constriction de la poitrine, rapports, vomiturition et vomissements. - *Douleurs de meurtrissure, pulsation, douleur brûlante, sensation d'excoriation et douleurs pénibles à l'estomac. — *Sensibilité douloureuse du creux de l'estomac au toucher et à toute pression; les vétements serrés sont insupportables. - *Grande anxiété dans la région précordiale, comme si le cœur allait éclater. -- Sensation au cardia, comme si les aliments s'y arrêtaient et remontaient dans l'æsophage.

Ventre. — Douleur contractive aux hypocondres. — Sensibilité douloureuse de la région hépatique à tout contact et à tout mouvement, avec douleurs pulsatives, lancinantes, pressives et tensives. — Gonflement et dureté de la région hépatique. — *Pression, tension, et plénitude et ballonnement du ventre, et surtout de l'épigastre, principalement après le repas. — *Coliques, avec douleurs crampoïdes, contractives et compressives, ou tranchées et élancements, ou douleurs vives et tractives, dans la région ombilicale, dans les côtés et dans le bas-ventre, principalement après le repas, ou après avoir pris du café, ou le matin, et souvent acce envie de vomir, rapports, chaleur du visage, lassitude et envie de dormir. — Mal de ventre au grand air, comme par un refroidissement, avec sensation, comme si une diarrhée

526



527

aliait se déclarer. - *Sensation de pesanteur et de gonflement dans le ventre. - *Chaleur et brûlement, ou sensation d'excoriation, comme si tout était à vif, ou douleur de meurtrissure dans le ventre, - *Congestion de sang et bouillonnement dans le ventre. - *Mouvement dans le ventre, comme par quelque chose de vivant, et commotion des intestins en marchant. *Coliques flatulentes, quelquefois le matin, mais principalement après avoir bu ou mangé, et souvent avec douleurs pressives, comme par des pierres, affluence de flatuosités qui s'incarcèrent dans les hypocondres ou remontent vers la poitrine, borborygmes fréquents et grondement dans le ventre, pression sur l'anus, le périnée et les voies urinaires, maux de reins, ballonnement du ventre, anxiété, fatigue et besoin de se coucher. -- *Douleur de meurtrissure dans les téguments du ventre, principalement en toussant, en riant, etc., etc., avec sensibilité douloureuse au toucher. - Palpitation des muscles abdominaux, avec sensation comme si quelque chose y courait. - *Sensation de faiblesse dans l'anneau inquinal, comme s'il allait sortir une hernie. -Gonflement des glandes inguinales. - Excoriation dans le pli de l'aine.

Selles. - *Envie fréquente, mais inutile et anxieuse, d'aller à la selle, avec sensation comme si l'anus était rétréci ou fermé. *Constipation opiniâtre, souvent comme par inactivité ou par étranglement des intestins, avec selles dures, difficiles et trop volumineuses .- * Evacuations incomplètes, avec coliques et sensation de constriction du rectum. - Alternation de constipation et de selles diarrhéiques. - Selles moitié molles ou liquides, moitié dures avec beaucoup de vents. - *Petites selles diarrhéigues aqueuses ou muqueuses et sanguinolentes, avec coliques et tranchées, maux de reins et ténesme, douleur d'excoriation dans le rectum et douleur brûlante à l'anus. — * Selles muqueuses blanchâtres, ou verdatres, couleur foncée. - *Sortie de glaires et de mucosités sanguinolentes, ou de sang pur, même avec les selles non diarrhéiques. - Douleur contractive dans le rectum pendant et hors le temps des selles. - "Constriction et rétrécissement spasmodique du rectum. - Gonflement et occlusion de l'anus. - *Hémorrhoides avec douleur d'excoriation, élancement, douleur brûlante et pression à l'anus et dans le rectum, principalement en méditant et pendant un travail de tête. - Ecoulement de sang par l'anus. - Prurit, chatouillement et fourmillement dans l'anus et le rectum, comme par des ascarides. - Sortie d'ascarides. - Pression et prurit au périnée.

Urines. — *Envie inutile d'uriner, avec pression sur les voies urinaires, douleurs pénibles au col de la vessie, et émission douloureuse des urines, goutte à goutte. — «Rétrécissement spasmodique de l'urèthre. — *Évacuation douloureuse d'urines épaisses. — *Évacuations fréquentes d'urines aqueuses et pales.



528

quelquefois avec sortie de mucosités épaisses ou de matières purulentes, par l'urèthre. - Urines rougeatres avec dépôt couleur de brique. - Douleurs dans la région rénale, comme s'il y avait un corps étranger, avec impossibilité d'être couché sur le côté malade, *émission rare de quelques gouttes d'une urine saturée, et sortie de sang par l'urethre. - *En urinant, douleur brûlante au col de la vessie et à la partie antérieure de l'urèthre. Prurit et douleur d'excoriation dans l'urèthre, avant, pendant et après l'émission des urines. - Colique néphrétique avec vomissement violent.

*Démangeaison et prurit au gland et à la sur-Parties viriles. face intérieure du prépuce. - *Excoriation et rétraction du prépuce. - Sécrétion abondante du swegma, derrière le gland. -Prurit, élancements et douleurs constrictives dans les testicules. -*Appétit vénérien exalté, avec érections et pollutions fréquentes, principalement le matin. - Pollutions avec flaccidité de la verge, et quelquefois suivies de froid et de faiblesse dans les extrémités inférieures. — Impuissance par suite de débauches nocturnes. Après le coît, chaleur sèche du corps et sécheresse de la bouche. oGonflement inflammatoire des testicules, avec sensibilité douloureuse au toucher, dureté et rétraction des testicules. - oHernies scrotales volumineuses. - Douleur crampoide et sensation d'étranglement dans le cordon spermatique. - Flaccidité de la verge, pendant le coît.

Règles. — Gonflement de la matrice avec grande sensibilité au toucher. — *Chute du vagin ou de la matrice. — Douleurs erampoïdes et contractives dans la matrice et le bas-ventre. jusqu'aux cuisses, avec pression douloureuse vers les parties (et écoulement de mucosités). — *Chaleur britante dans les par-ties, avec désirs vénériens. — *Extase érotique facile à la moindre excitation, principalement le matin au lit. - *Règles trop hátives et trop peu abondantes. - Retour des règles à l'époque de la pleine lune. - *Pendant les règles, coliques spasmodiques, nausées et accès d'évanouissement le matin, grande fatigue, céphalalgie avec frissons et douleurs rhumatismales dans les membres. — *Ecoulement de mucosités jaunâtres et fétides, par

le vagin. — *Douleurs d'excoriation aux mamelons. Larynx. — *Enrouement catarrhal et apreté douloureuse du larynx et de la poitrine, principalement le matin, ou le soir au lit, avec grattement dans la gorge, accumulation de mucosités tenaces qu'il est impossible de détacher, mal à la tête, chaleur et rougeur du visage, frissonnements et constipation. - *Sensation d'étranglement dans le gosier, avec péril de suffocation. Impossibilité de parler à haute voix. - *Toux sèche, quelquefois continuelle, fatigante, oet même spasmodique, *excitée le plus souvent par une sensation de titillation et de prurit, ou d'apreté et de grattement dans la gorge, apparaissant principa-



529

lement le matin ou le soir au lit, ou la nuit, surtout après minuit, ou après le diner, ou périodiquement tous les deux jours.—
*Renouvellement ou provocation de la toux par le mouvement,
-la méditation ou la lecture, et étant couché sur le dos.—*En toussant, élancements et douleurs d'excoriation au larynx, mal à la tête comme si le crâne allait éclater, douleur de meurtrissure à l'épigastre, et quelquefois même avec vomissement, péril de suffocation et saignement par le nez et par la bouche.— En se promenant au grand air, la toux sèche devient humide, et l'expectoration s'établit.— Crachats d'un sang coagulé par la toux.

- *Gêne de la respiration, haleine courte, constriction asthmatique et oppression de la poitrine, principalement la nuit, ou le matin, ou le soir au lit, en étant couché, ainsi qu'en montant, ou en marchant, ou après le diner, et souvent avec étouffement, anxiété, pression dans l'épigastre, bourdonnement des oreilles, pouls accéléré et sueur. — *Pendant les accès asthmatiques, tout vêtement serré autour des hypocondres est insupportable. - *Respiration lente et sibilante, alternant quelquefois avec respiration accélérée. - Haleine fétide et d'une odeur acide. — Besoin de respirer profondément. — *Douleur de constriction et de contraction crampoide à la poitrine. - *Pression tensive dans la poitrine, comme par un poids, principalement la nuit et au grand air, et souvent avec gêne de la respiration. - *Élancements dans la poitrine et dans les côtés, augmentés en respirant et par le mouvement du thorax. - Chaleur et brûlement dans la poitrine, quelquefois la nuit, avec agitation, anxiété et insomnie. — Douleur de meurtrissure à la poitrine, souvent avec haleine courte, et principalement au sternum et dans les côtés. — Pulsation dans la poitrine et dans les côtés. -Elancements et coups dans la région du cœur. — *Battements de cœur, principalement après le dîner, étant couché, ou le matin, et quelquefois °avec nausées et envie de vomir, et sensa-

tion de pesanteur à la poitrine.

Tronc. — *Douleurs de meurtrissure dans le dos et aux reins, avec sensation de faiblesse dans ces parties, comme après l'enfantement. — *Maux de reins nocturnes qui ne permettent pas de se retourner dans le lit. — Douleur de luxation, ou comme après un tour de reins, dans le dos et dans les omoplates. — *Douleurs rhumatismales, tractives, et brûlantes, au dos, quelquefois le soir. — *Convulsions dans le dos, avec renversement de la tête. — Élancements et douleur de constriction entre les omoplates. — Tiraillement, douleur de meurtrissure, roideur, et sensation de pesanteur dans la nuque. — Gonfiement des muscles

du cou, avec douleur, comme s'ils étaient trop courts.

Bras. — Douleurs rhumatismales, avec sensation de faiblesse dans les épaules et les bras. — Paresse, lourdeur, fatigue et manque




530

de force dans les bras. - Paralysie du bras, avec insensibilité sensation comme si le sang y bouillonnait. - *Tiraillement dan les bras, avec sensation de torpeur et immobilité, principalemer - Miliaire pruriante aux bras. - Gonflement des mu cles de l'avant-bras, avec douleur, comme s'ils étaient brûles. -Engourdissement et torpeur des avant-bras, le matin. - Dou leur de luxation dans les poignets. - Faiblesse paralytique de l - Engourdissement facile des mains et des doigts. Mains froides et frileuses. — Sueur forte et quelquefois fraich à la paume des mains. — Chaleur à la paume des mains. — En flure des veines aux mains et-aux bras. - Gonflement pale de mains et des doigts. - Contraction crampoide des mains et de doigts, avec douleur comme si les tendons étaient trop courts principalement pendant les frissons, ou après minuit. - Gonflement chaud et douloureux du pouce, et qui passe en abcès à l'articulation. -- *Rougeur et prurit brûlant aux doigts, comme des

engelures.

Jambes. - Boutons avec prurit rongeant à la fesse. - *Elancements, douleur de luxation et tressaillements dans l'articulation coxo-fémorale. - *Douleurs vives et lancinantes dans les cuisses, avec torpeur et faiblesse paralytique, aggravées par le mouvement et le contact. — Douleur de brisure aux cuisses. — Mi-liaire, avec prurit brûlant et furoncles aux cuisses et aux genoux. — Froid, ou sueur, aux cuisses, la nuit. — Grande pesanteur, chancellement, faiblesse et tremblement des jambes avec fléchissement des genoux, et impossibilité de marcher ou de rester debout. - L'enfant tombe facilement en marchant. -*Roideur et tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts, principalement en se levant de son siége. - Sensation de sécheresse dans l'articulation du genou, avec craquement en le remuant. - Gonflement douloureux du genou, avec nodosités goutteuses. - Disposition des jambes à s'engourdir facilement. - Paralysie, froid et insensibilité des jambes. Douleur tensive et crampes dans les mollets, principalement la nuit; ou le soir, ou après minuit, ou le matin, au lit.-Crampes dans les pieds et les orteils. - Gonflement rouge de la jambe, avec taches noires, douloureuses. - Luxation facile du cou-depied. - Gonflement du dos des pieds. - Engourdissement facile des pieds (pieds morts). - Contraction des orteils. - *Prurit brûlant aux orteils comme par des engelures.



OLEANDER.

581

OLBANDER.

OLEAND. — Laurier-rose. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 253. — Doses usitées: 6, 30. — Duree d'action: 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.
Antidotes: Camph. eocc. n-vom.
COMPARER AVEC: Anac. chin. cocc. n-vom. puls. sabad.

CLINIQUE. — Jusqu'ici, on n'a encore employé ce médicament que contre: — Paralysies; Dartres aux oreilles; Éruptions à la tête et sorte de faiblesse intellectuelle se manifestant par la distraction.

Voy. la note, page 15.

Symptomes Gineraux. — Tension crampoïde, comme si les os étaient brisés, dans les membres et autres parties du corps. — Grande faiblesse, qui permet à peine de marcher. — Sensation de vibration et de résonnement dans tout le corps. — Tension dans tout le corps. — Roideur paralytique des membres, et paralysies sans douleurs. — Accès d'évanouissement, comme par faiblesse, quelquefois avec perte de connaissance, se dissipant après avoir transpiré. — Faiblesse et lassitude générale, avec tremblement des genoux, en étant couché, et des mains, en écrivant. — Accablement, comme si la vie allait s'éteindre. — Besoin d'étendre les mains. — Torpeur et insensibilité de tout le corps.

Peau. — Prurit rongeant qui force à gratter, quelquefois en se déshabillant. — Peau très-sensible, avec rougeur et excoriation

pour peu que l'on gratte.

Sommeil. — Bâillement fréquent avec horripilation et tressaillement des muscles. — Besoin de se coucher, avec une sorte de somnolence. — Insomnie et agitation la nuit. — Rêves agités et lascife, et réveil fréquent.

Fièvre. — Accès fréquents d'horripilation subite. — Sensation de chaleur avec frisson général. — Chaleur fugace, surtout pendant un travail intellectuel. — Pouls fréquent et plein, ou irrégulier

et variable. — Manque de chaleur vitale.

Moral. — Tristesse et manque de confiance en soi-même. — Répugnance pour le travail, et grande paresse. — Irascibilité, morosité, et mauraise humeur. — Humeur qui ne supporte aucune contradiction. — Emportement colérique, suivi d'un prompt repentir. — Faiblesse de la mémoire. — Grande distraction et





OLEANDER.

532

inadvertance. — Étourdissement. — Esprit obtus, avec conception difficile. — Rêveries poétiques sur l'avenir.

Tête. — Vertige tournoyant, avec chancellement des jambes. — Vertige, en se levant, après avoir été couché, ou en regardant en bas lorsqu'on est debout. — Vertige, avec tournoiement, obscurcissement et scintillement devant les yeux. — Maux de téte avec étourdissement, comme si le cerveau était tendu. — Pesanteur douloureuse de la tête, soulagée en se couchant. — Pression sourde dans la tête comme si le front allait éclater. — Battement douloureux et pulsatif dans la tête. — Térébration dans le cerveau. — Pression à l'extérieur de la tête. — Prurit rongeant au cuir chevelu, avec cuisson après s'être gratté. — Croûtes furfuracées ou humides, à la tête, avec prurit, surtout la nuit, et brûlement après s'être gratté. — Desquamation du cuir chevelu.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme après les avoir trop fatigués par la lecture. — Pression dans les yeux. — Douleur brûlante et tension dans les paupières, surtout en lisant. — Obscurcissement des yeux, en regardant de côté.

Oreilles. — Pression aiguë dans les oreilles. — Traction crampoïde à l'oreille. — Chant, tintement et roulement dans les oreilles. — oTaches dartreuses, rouges et râpeuses devant l'oreille, avec suintement fétide derrière l'oreille.

Nez. — Pression étourdissante et sourde, au nez. — Prurit autour du nez.

Visage. — Face pâle, hâve, avec cercles bleus autour des yeux. —
Pression sourde et engourdissante dans les os de la face, et
surtout dans les pommettes, jusque profondément dans la tête.
— Chaleur des joues sans rougeur et vice versa. — Paleur du
visage, alternant avec rougeur foncée. — Gonflement rouge du
visage autour des yeux. — Éruption tuberculeuse à la face et au
front. — Lèvres brûnâtres et sèches. — Sensation de torpeur et
de gonflement dans la lèvre supérieure. — Gonflement autour
des commissures des lèvres.

Dents. — Maux de dents pendant la mastication, avec pression incisive. — Déchirement et traction dans les dents, parfois la nuit, mais seulement au lit, se dissipant dès qu'on se lève. — Sensation de vacillement des dents, avec gencives d'un blanc bleuâtre.

Bouche. — Sécheresse de la bouche, avec langue chargée d'un enduit blanc. — Langue rude, sale, blanche, avec érection des papilles. — Perte de la parole. — Douleur brûlante dans la gorge.

Appétit. — Tous les aliments ont un goût trop fade ou insipide. — Goût pâteux dans la bouche. — Boulimie, avec tremblement des mains, tant on désire des aliments, souvent avec absence d'appétit. — Soif, surtout d'eau froide. — En mangeant avidement, à midi, étourdissement.



OLEANDER.

533

Estomac. — Renvois d'odeur putride. — Renvois à vide, violents, quelquefois après le repas. — Nausées avec envie de vomir, accumulation de salive dans la bouche, suivie de faim violente. — Vomissement des aliments ou de sérosités amères d'un vert jaunâtre. — Sensation de vacuité à l'estomac, avec plénitude du ventre. — Battements et pulsations dans l'épigastre, comme après un fort échauffement.

Ventre. — Pincements dans le ventre, comme par une diarrhée. — Élancements et rongement dans le ventre. — Sensation de vide et de faiblesse dans les intestins. — Gargouillement et borborygmes dans le ventre, avec émission abondante de vents

d'une odeur putride.

Selles. — Envie d'aller à la selle, sans résultat. — Selles liquides, molles, jaunes. — Évacuation, presque involontaire, d'une selle non digérée. — Douleur brûlante à l'anus, avant, après et hors le temps des selles.

Urines. — Augmentation de la sécrétion des urines. — Urines brunâtres, brûlantes, avec sédiment blanchâtre. — Émission

d'urine fréquente, surtout après avoir pris du café.

Larynx. — Toux courte, ébranlante, provoquée par un chatouillement dans le pharynx. — Accumulation de mucosités visqueuses

dans la trachée-artère.

Poitrine. — Oppression de poitrine, en étant couché, avec respiration profonde et lente. — Respiration faible. — Douleur gravative et compressive, ou sensation d'un grand vide dans la poitrine.
— Lancinations sourdes ou tensives dans la poitrine, sur le
sternum et les côtes, surtout en respirant profondément. — Sensation de froid dans la poitrine. — Points au diaphragme. —
Traction au-dessus du cœur, aggravées en se baissant. — Battements de cœur riolents et quelquefois anxieux, avec sensation
comme si la poitrine se dilatait.

Tronc. — Douleur dans le dos, comme si l'on s'était donné un tour de reins. — Lancinations tensives, brûlantes et aiguës dans le dos. — Pulsation violente des carotides. — Déchirement dans la

nuque, le soir, au lit.

Bras. — Douleur de luxation dans les bras, en les levant. — Tressaillement dans les muscles des bras. — *Tractions crampoides dans les des bras et les doigts. — Pression sourde dans les avant-bras, les mains et les doigts, comme après un coup ou une meurtrissure. — Veines gonflées aux mains. — Gonflement et roideur des doigts, avec douleur brûlante.

Jambes. — Douleur de foulure dans les fesses. — Sensation de fuiblesse dans les cuisses, les jambes, les pieds et la plante des pieds, comme si ces parties étaient engourdies. — Pression sourde et quelquefois lancinante dans les cuisses, les pieds et les orteils. — Paralysie des jambes et des pieds. — Sensation de vibration et de résonnement dans les jambes et les pieds, surtout dans la



OLEANDER. --- OPIUM.

plante des pieds. — Traction crampoïde dans les jambes et le pieds. — Crampes dans les mollets, en étant assis. — Froid con tinuel aux pieds.

OPIUM.

OP.— Opium. — Habnemann. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop... p. 254. — Doses usitées: 3, 9, 30. — Durée d'action: 24 heures à 5 jours, selon les circonstances.

ANTIDOTES: Camph. calc. con. hep. mez. petr. sulf. — On l'emploie comme antidote de : Calad. calc. merc.

534

COMPARER AVEC: Acon. bell. bry. camph. cann. chin. cic. coff. colch. con. croc. dig. hep. hyos. ipec. kal. men. merc. mosch. nitr-ac. n-mess. n-vom. petr. phos. phos-ac. plumb. puls. rut. samb. stram. tab. tart. thai. — C'est surtout après: Bell. hep. kal. merc. puls. thui. que l'opium est effeace, lorsqu'il est indiqué; après l'opium, on trouve quelquelois convenables: Calc. petr. puls.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections plutôt récentes qu'anciennes; Torpeur nerveuse et manque de réaction vitale contre les médicaments administrés; Souffrances des ivrognes; Affections des vieillards; Convulsions, tétanos, épilepsie et autres affections spasmodiques; Paralysie; Suites fâcheuses d'une frayeur avec peur, ou d'une joie subite; Asphyxie; Coma somnolent ou vigil; Fièvres intermittentes, Aypholdes, et soporeuses; Delirium tremens; Manie; Imbécillité; Céphalalgie congestive, avec vertiges; Apoplonie; Encéphalite; Amblyopie amaurotique; Cataracte; Trismus; Ptyalisme par l'abus du mercure; Ileus, Hernies enflammées et étranglées?; Constipation, principalement par torpeur du canal intestinal; après des diarrhées fréquentes, ou par manque d'exercice, et surtout chez des personnes vigoureuses, plethoriques et bien nourries, ainsi que chez les enfants et les femmes enceintes : Tympanite, Ischurie; Fièvre de lait, avec état soporeux; Douleurs d'enfantement supprimées, fausses ou spasmodiques; métralgie puerpérale; Orthopnée paralytique; Toux et asthme suffoquants; etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Insensibilité générale de tout le système nerveux. — Fortes inquiétudes dans les membres. Tremblement dans tout le corps, avec secousses, tressaillements dans les membres, et froid général. - *Accès de conculsion, osurtout le soir, vers minuit, avec sommeil, mouvements involon-



OPIUM.

585

taires de la tête et des bras, et poings fermés. — *Convulsions épileptiques, la nuit, ou le matin, avec accès de suffocation, perte de connaissance et de sensibilité, et mouvements violents des membres. — Après chaque accès de convulsions, sommeil. — Relâchement de tous les muscles. — *Convulsions avec cris. — Sensation de bourdonnement et de vibration dans tout le corps. — Absence de douleurs pendant les affections. — Irritabilité excessive des muscles qui sont sous l'empire de la volonté, et diminution de celle de tous les autres. — Les personnes qui font abus de l'opium vicillissent de bonne heure. — *Tétanos. — *Renversement du corps. — Paralysies. — Sensation de force et de vigueur, ou évanouissement et grande faiblesse. — Amaigrissement général. — Gonflement hydropique de tout le corps. — Aggravation et renouvellement des souffrances en s'échauffant.

Pean. — Peau bleuâtre, avec taches bleues. — Prurit continuel à la peau, avec petites élévations rondes et incolores, — Desqua-

mation de l'épiderme. - Engelures.

Sommeil. — *Somnolence comateuse, avec ronflement et bouche ouverte, yeux ouverts et convulsés, face rouge et bouffie, mâchoire pendante, perte de connaissance, respiration difficile, lente ou même intermittente, pouls lent ou même supprimé, et mouvements convulsifs des muscles de la face, des coins de la bouche et des membres. — *Envie excessive de dormir, avec impossibilité absolue de s'endormir. — Sommeil incomplet, sans que l'on puisse se réveiller. — Sommeil agité, avec rêves anxieux. — Insomnie, avec jactation anxieuse, inquiétude et délire. — Carphologie pendant le sommeil. — Gémissements en dormant. — Secousses effrayantes dans les membres pendant le sommeil. — Cauchemar. — Réves lascifs, effrayants et anxieux.

Fièvre. — Froid général de la peau, surtout aux membres. —
Froid et roideur de tout le corps. — Chaleur brûlante du corps, avec forte rougeur de la face, anxiété, délires et agitation. —
*Pouls généralement plein, lent et intermittent, ou accéléré et dur. — Fièvre, avec sommeil soporeux, ronflement, mouvements convulsifs des membres, excrétions supprimées et sueur chaude. — Fièvre, quelquefois avec perte de connaissance ou

délire.

Moral. — Insouciance ou grande anxiété et inquiétude. — Inconstance et versatilité. — Grande disposition à s'effrayer, et caracractère peureux. — Hardiesse téméraire et inconsidérée. — Tranquillité de l'âme, avec réveries agréables, et oubli des souffrances. — Stupidité et imbécillité. — Perte des sens. — Grande affluence d'idées, avec gaieté et disposition à faire des réflexions sublimes et profondes. — Erreurs de l'imagination. — *Manie avec idées bizarres ou fixes; il semble qu'on n'est pas chez soi. — * Délires, avec visions effrayantes de souris, de scorpions, etc., et envie de s'enfuir. — Diragations:



OPIUM.

536

Tête. -- Embarras dans la tête, avec sensation de chaleur dans les yeux, et besoin de les fermer. - Tête entreprise comme à la suite de l'ivresse. - * Étourdissement comme dans l'ivresse. - Vertige en se redressant dans le lit, qui force à se recoucher. - Vertige, après une frayeur.— Accès comme un coup de sang, avec vertige bourdonnement d'oreilles, perte de connaissance, face rouge, chaude, bouffie, yeux rouges et à demi fermés, pupilles dilatées et insensibles, écume à la bouche, monvements convulsifs des membres, respiration lente, ronflante; avant l'accès, insomnie ou sommeil, avec rêves anxieux; ébullition de sang et chaleur générale; après l'accès, surexcitabilité nerveuse, rires et divaga-tions. — Mal de tête aggravé en remuant les yeux. — Céphalalgic, avec tension pressive dans la tête. — Sensation comme si le cerveau se déchirait. - Grande pesanteur de la tête. -- *Congestion à la tête, avec forte pulsation.

Yeux et Oreilles. -- Paupières pendantes, comme paralysées. --Sensation comme si le globe des yeux était trop volumineux. — *Yeux rouges, enflammés. — Tremblement des yeux et des paupières. — *Yeux fixes à moitié fermés, conrulsés, proéminents, vitreux. — *Pupilles dilatées et immobiles. — Obscurcissement de la vue. — Étincelles devant les yeux. — Bourdonnement d'o-

reilles. — Tintement dans les oreilles.

Visage. - Visage pale, terreux, have, avec yeux creux et taches rouges sur les joues. - *Face rouge foncé, quelquefois brunatre, chaude et bouffie. - Pâleur et rougeur alternatives de la face.-Veines gonflées, à la face et à la tête. - *Relâchement de tous les muscles de la face. - *Tremblement, secousses et mouvements convulsifs des muscles de la face. — Lèvres gonflées. -*Lèvres et mâchoire inférieure pendantes, par l'axité. - Tressaillement des coins de la bouche. - *Distorsion de la bouche. -

Crampes de la máchoire.

Bouche et Gorge. — Dents vacillantes. — Sécheresse de la bouche avec forte soif. — Salivation abondante. — Crachement de sang. — Ulcères dans la bouche et sur la langue. — Langue noire. — Paralysie de la langue.—Parole faible, basse, avec impossibilité de parler haut sans faire de grands efforts. — Sécheresse de la gorge. - Gonflement et mouvements dans la gorge, avec déglutition gênée, par accès quotidiens. - Impossibilité d'avaler.

Appétit. — Perte du goût. — Goût amer ou aigre dans la gorge. - Soif ardente, surtout pour la bière. - Accès de boulimie, avec absence d'appétit et répugnance pour tous les aliments. -- Len-

teur et faiblesse de la digestion.

Estomac. — Nausées avec envie de vomir et vomiturition. -Vomissements avec douleurs violentes à l'estomac et convulsions. — Vomissements de sang ou de matières verdâtres. — · Vomissement de matières fécales et d'urine. - Sensibilité douloureuse et ballonnement de l'estomac et de l'épigastre. — Pres-



OPIUM.

537

sion constrictive à l'estomac, avec angoisse excessive. — Pesanteur à l'estomac. — Compression du diaphragme.

Ventre. — *Ventre dur et ballonné, comme par une tympanite. — Pesanteur dans le ventre, comme par un fardeau. — Pulsation, pression, pesanteur et tiraillement dans le ventre. — *Selles jamais sans lavement, comme de petites boules dures.

Selles. — *Constipation, quelquefois de longue durée. — Selles fétides, noires. — Diarrhées écumeuses et liquides, avec douleur brûlante à l'anus et ténesme violent. — Selles involon-

taires.

Urines. — *Rétention d'urine, comme par inactivité de la vessie. — Urine rare, foncée, avec sédiment briqueté. — Pissement de

sang.

Parties génitales. — *Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections et pollutions fréquentes. — Extases amoureuses. — Diminution de l'appétit vénérien et impuissance. — *Douleurs erampoides dans la matrice. — oMétralgie violente, pendant la grossesse, avec rapports, vomiturition, agitation extrême et con-

tact du ventre insupportable.

Larynx. — Enrouement pénible, comme par accumulation de mucosités dans la trachée-artère, avec grande sécheresse de la bouche et langue blanche. — Voix faible, basse. — Toux violente,
sèche, creuse, aggravée après le repos. — Toux, pendant la déglutition, ou en respirant, avec suspension de la respiration, et
couleur bleue du visage. — Toux, avec expectoration de sang
et de mucosités épaisses et écumeuses. — Toux grippeuse, fatigante, sèche, suivie de bâillement. — Toux chatouillante, sèche
tourmentant jour et nuit.

Poitrine. — *Respiration bruyante, ronfiante et râlante. — Respiration difficile, lente et intermittente, comme par paralysie du poumon. — *Géne de la respiration et étouffement avec forte angoisse. — Asthme spasmodique. — Accès de suffocation, en faisant des efforts pour tousser. — Pression à la poitrine, avec élancements dans les côtes, en respirant. — Tension et constriction dans la poitrine. — Chaleur et douleur brûlante dans la poitrine, surtout dans la région du cœur. — °Éréthisme du cœur.

Tronc et Membres. — Renversement du dos. — Gonflement des veines et battement dans les artères du cou. — Tressaillements et mouvements convulsifs dans les bras. — Paralysie des bras. — Tremblement des bras et des mains. — Engelures aux doigts. — Gonflement des veines des mains. — Tressaillements et mouvements convulsifs des jambes. — Faiblesse, torpeur et paralysie des jambes. — Pesanteur et gonflement des pieds. — Engelures aux orteils.



538

OXALIS ACIDUM.

OX-AC. — Acide oxalique. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 436. — Hening, — Études pathogénésiques de l'Amérique du Nord. COMPARER AVEC: Hippom. rumex. rhab.


. ___ ...

CLINIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de ce médicament, on verra les cas où l'on pourra l'administrer avec succès contre l'une ou l'autre des affections suivantes : — Paralysies; Rhumatismes articulaires; Jaunisse; Emphysèmes; Douleurs violentes dans les cancers; Fièvres typhoïdes. — Manies; Apoplexies; Vertiges; Lippitude. — Aphthes de la bouche; Angines; Pyrosis; Vomissement des femmes enceintes; Gastrites; Cancer de l'estomac; Coliques; Entérites; Diarrhées; Dyssenterie; Choléra. — Gravelle et calculs urinaires. — Laryngite; Catarrhe bronchique; Toux muqueuse; Pneumonies; Affections du cœur. — Marasme dorsal (Tahes dorsalis).

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs dans les membres, avec lassitude, faiblesse, engourdissement: lassitude, avec mal à la tête, pandiculations et baillement, améliorés au grand air; malaise et fatigue, avec soulagement dans la position couchée; lassitude, comme à la suite de grands efforts, avec sueur, après la diarrhée; lassitude, avec soif et vertiges. — oAmaigrissement, avec battements de cœur. — Défaillance; sensation d'engourdissement; membres très-légers, en marchant. — Tremblement; convulsions; paralysie du côté gauche. — Les douleurs occupent une petite place oblongue, et se montrent, de préférence, d'abord à gauche, puis à droite. — Douleurs par paroxysmes. — Le soir: douleurs, toux, filmons. — La nuit: Flatuosités, palpitations de cœur. — The matin: diarrhée, pouls accéléré, maux de gorge, souffrances de l'estomac.

Peau. — Peau sensible, en se rasant. — Prurit, à la nuque, aux doigts. — Peau marbrée, comme chez les enfants. — Étuptions verruqueuses, avec prurit et rougeur; pustule douloureuse au doigt indicateur; exfoliation de la peau des onglés. — Emphysème général de la peau. — Jaunisse. — Ulcères.

Sommeil. — Bâillements fréquents, violents. — Envie de dormir, le jour; sommeil profond, prolongé. — Rêves avec peur; avec sursauts comme par frayeur, il se redresse et regarde autour de



589

lui; rêves comme si l'on glissait; comme si l'on fût arrosé d'eau.

— Le matin: mal de tête; courbature; douleurs néphrétiques.

Fièvre. — Horripilations montant de bas en haut; frissonnement avec éternument, le soir; frissons, après la diarrhée, après-midi; le soir, frisson grelottant, avec rougeur de la face; °froid et frisson, avec constitution apoplectique. — Chaleur: à chaque effort; aux mains; intérieure; surtout à la face; chaleur avec sueur. — Sueur, pendant la faiblesse; *avec les vertiges; la nuit, froide, visqueuse, — Pouls: plus fréquent le matin (comme sulf. ars.); plus rare; inégal, plus faible; petit et lent, après la diarrhée, avec frisson; tremblant; decenant imperceptible. — °Fièvre typhoïde.

Moral et Intellect. — Excitation, vivacité, gaieté. — Affection de l'organe de l'amour filial, et douleur dans l'occiput. — Angoisse; peur; (cris et pleurs). — Stupeur; méditation difficile, lente. — Répugnance pour la conversation: pendant le mal de tête, avec sensation de plénitude à la face. — Sagacité; *en pensant aux

douleurs elles reparaissent.

Tête. — *Vertiges: pendant la fatigue avec soif, angoisse et mal de tête; °pendant la sueur; en regardant par la fenêtre; en se levant de son siége. — Vacnité dans la tête; *embarras de la tête, °tous les matins; front entrepris le matin. — °Apoplexie. — °Brûlement au front. — Douleurs: dans le sinciput et le vertex; dans le côté gauche du front, en s'éveillant. — Pression sur de petites places circonscrites; pression, comme le serrement par une vis, derrière les deux oreilles. — Mal de tête: après être resté couché; après avoir dormi; en se levant; amélioré après la garde robe. — L'usage du vin fatigue la tête.

Yeux. — Douleurs dans le globe des yeux, surtout à gauche. — °Lippitude. — Disposition à fermer les yeux. — Les petits objets, surtout ceux de forme linéaire, paraissent plus grands, parce qu'ils sont supposés être plus éloignés. — °Perte de la vue pendant les

vertiges, avec sueur et saignement de nez.

Nez. — Élancements dans la narine droite, en respirant. — Petites vésicules dans la narine droite, avec gonflement de l'aile. — Éternuments et frissons. — "Épistaxis avec perte de la vue.

Face. — Chaleur de la face, rougeur, sensation de plénitude. —

*Face pâle, blême, yeux creux.

Dents. — Douleurs dans les molaires cariées. — Dents comme émoussées; gencives saignantes; douloureuses çà et là; petits

ulcères aux gencives.

Bouche. — Mucosités abondantes dans la bouche; douleur; *beaucoup de salive; accumulation d'eau. — Langue chargée de blanc; rouge, gonflée, sensible, sèche, brûlante. — *Inflammation de la bouche; *ulcères; *aphthes.

Gorge. - Grattement, apreté dans la gorge; augmentation de la



sécrétion muqueuse. — Sécheresse de la gorge, dans la matinée, après la diarrhée. - Déglutition douloureuse, surtout le matin; dysphagie, avec renvois aigres. - Brûlement dans la gorge et

l'estomac. — Angines, aigues et chroniques.

Goût et Appétit. - Goût aigre de la bouche; *pyrosis. - Appétit augmenté. - Manque d'appétit : avec insipidité des aliments, soif, nausées; anorexie, tant avec langue chargée qu'avec langue nette. — Soif: pendant les vertiges, le manque d'appétit, les nausées et les douleurs d'estomac. — Après voir mangé; renvois, nausées, douleurs autour du nombril, coliques, borborygmes, besoin d'aller à la selle, fatigue. — Le manger soulage les maux d'estomac; un potage chaud est agréable dans les rongements d'estomac. — Digestion faible, difficile.

Symptômes gastriques. — Rapports d'air; renvois aigres. Pyrosis. — Hoquet; hoquets subits, avec renvois. — Nausées et soif, avec tranchées; envie de vomir, après la diarrhée; onau-

sées des femmes enceintes.

540

Estomac. — Brûlement dans l'estomac et la gorge.— Sensation de vide dans l'estomac, forçant à manger. - Estomac sensible au toucher .- Douleurs violentes dans l'estomac ; les douleurs d'es-

tomac réveillent la nuit; ogastrite; *gastralgies.

Ventre. - Dans l'hypocondre gauche : douleurs persistantes comme de contusion; élancements; élancements dans la rate, se dissipant en respirant profondément; douleur entre l'hypocondre et le nombril. — Douleur pénible entre le nombril et le creux de l'estomac, dans la grossesse. — Elancements dans la région du foie. - *Douleurs dans la région ombilicale; coliques; ombilic comme écorché; oinflammation chronique des intestins; élancements; *douleur avec envie d'aller à la selle et ténesme; avec émission de vents; avec augmentation par le mouvement, amélioration dans le repos. — Brûlement sur de petites places circonscrites, dans le ventre : tranchées. - Flatuosités, borborygmes, gargouillement et autres bruits dans le ventre, avec ou sans douleurs, surtout le soir, la nuit ou après midi; flatuosités, avec pression ou fourmillement dans l'anus. — Douleurs comme avant une diarrhée; douleurs, pression; coliques avant la diarrhée. l'aine gauche: flatuosités, incarcérées; douleur aiguë; contraction. - Dans l'aine droite: coliques, borborygmes; douleur, sur une petite place circonscrite du côté droit du ventre; élancement au dessus de la hanche droite; douleur dans la lombe droite.

Anus et Selles. — Garde-robes retardées; envie d'aller à la garderobe, avec pression et sensation de pression vers l'anus; ténesmes; douleur, ténesme, le long d'une bande étroite, dans le rectum. Le matin : garde-robes liquides ou en forme de bouillie, avec coliques autour du nombril et pression sur l'anus; les selles diarrhéiques reviennent dès qu'on se couche; la douleur pendant



541

les garde-robes provoque des maux de tête; garde-robes avec du sang et des mucosités. - Avant les selles : mal à la tête. - Pendant les selles, miction (défaillance, vomissement). - Après les selles: nausées, crampes aux mollets; sécheresse de la gorge; maux de reins améliorés.

Voies urinaires. — Douleur dans la région des reins. — Envie fréquente d'uriner; urines abondantes. — Brûlement dans l'urèthre, comme par des urines acres; en urinant, douleur dans le

gland. - Gravelle et calculs urinaires?

Parties viriles. — Appétit vénérien augmenté; érection, le matin. - Douleurs dans les testicules, surtout à droite; pesanteur et

tressaillements, jusque dans les cordons spermatiques.

Larynx et Toux. — Dans le larynx, sensation de gonflement et d'écorchure; contraction; chatouillement. - Enrouement; renaclement frequent. - OLaryngite; Ocatarrhes bronchiques. - Toux chatouillante, le soir; toux sèche, pendant un fort exercice du corps. — Mucosités de la gorge augmentées, ou bien diminuées; mucosités en morceaux, dures, friables, épaisses; pendant l'écoulement du nez, sortie de morceaux durs de la gorge; morceaux

noirs dans l'expectoration jaunâtre. Poitrine et Respiration. - Dyspnée, avec oppression; respiration difficile, pendant le mouvement, le soir; pendant la respiration, élancements; en baillant et en respirant, douleur au-dessus de la hanche; élancements qui coupent la respiration. - Douleurs de poitrine : sourdes ; pressives ; comme si la poitrine était à vif; douleur à travers le milieu de la poitrine; élancements, à gauche. - Douleurs dans la région du cœur : élancements; comme dans une partie ulcérée; de derrière en avant; de haut en bas. - *Palpitations de cœur, la nuit, après s'étre couché; *en y pensant, les battements de cœur s'arrêtent; cendocardite?; opéricardite ?; ohypertrophie du cœur?

Pronc. - *Mal aux reins, comme par engourdissement ou comme si les os étaient brisés. - Douleurs au dos : sous la pointe de l'omoplate; entre les épaules; depuis l'épaule jusqu'aux lombes; du dos jusque dans les cuisses ; douleur dans la région lombaire, passant tout d'un coup aux extrémités inférieures. - Torpeur, picotement froid et manque de force au dos qui est trop faible

pour porter le corps. - Marasme dorsal?

Membres thoraciques. - Douleurs aux épaules : élancements dans l'articulation : passant vers le dos; venant de la poitrine. -Douleur, d'abord dans le deltoïde gauche, puis dans le droit; douleur au milieu du bras droit, comme dans l'os, avec besoin de mouvoir le membre : bras comme roide et engourdi. - Mains froides, comme mortes; douleurs dans le métacarpe et dans le gras du pouce, avec sensation de foulure dans l'articulation de la main droite, forçant à l'étirer, avec élancements dans la région ulnaire. - Lourdeur à la main droite, mouvement lent des



542 OXALIS ACIDUM. — PARIS QUADRIFOLIA.

doigts. — Douleurs arthritiques dans les doigts, contraction des doigts, de la main gauche; tressaillements convulsifs des doigts. — Ongles de couleur foncée.

Membres polviens. — Dans les membres inférieurs: faiblesse, inquiétude, engourdissement, paralysie, roideur, horripilation, froid, chaleur.—Genoux fatigués; douleurs dans le jarret gauche.
— Douleurs dans l'articulation du pied droit. — Contraction des orteils du pied droit.

PARIS QUADRIFOLIA.

PAR. — Parisette à quatre feuilles, Herbe à Pâris, Raisin des renards. — Archives de Staff. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 237. — Doses usitées: 9, 30. — Durée d'action: 2 à 4 jours, suivant les circonstances.

ANTIDOTES : Acon. coff.

COMPARER AVEC : Hell. ign. kal. natr-m. n-vom. puls. sabad.

SYMPTOMAS GÉNÉBAUX. — Lancinations continuelles dans tous les membres. — Serrements crampoïdes dans les articulations, ou sensation en les remuant et en les tournant, comme si elles étaient brisées, gonflées et luxées. — Sensation de lourdeur dans tout le corps.

Peau. — Fort prurit à diverses parties. — Fourmillement souscutané, sans prurit. — Douleur d'excoriation de la peau, au tou-


cher. — Panaris.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour et le soir, de bonne heure. — Sommeil incomplet, interrompu et agité, la nuit, avec jactation continuelle et affuence de réves. — Rêves voluptueux, avec érections et pollutions.

Fièvre. — Frissons, surtout à la poitrine, au ventre et aux jambes, avec chair de poule et bâillements. — Froid intérieur continuel, avec tremblement intérieur. — Sueur matutinale, pruffinte, qui force à se gratter. — Froid d'un seul côté du corps.

Moral. — Disposition à traiter les autres avec mépris et dédain.
 — Disposition à dire des fadaises, et à se complaire dans ce que l'on dit. — Manie avec loquacité. — Répugnance pour le travail de tête. — Mécontentement, mauvaise humeur.

Tête. — Tête entreprise, embarrassée. — Vertige en lisant à haute 'voix, avec difficulté de parler et d'y voir. — Douleurs de tête aggravées par la méditation. — Douleur pressive dans la tête, qui se dissipe en appuyant la main dessus. — Sensation de gonfiement dans la tête, avec pression, comme si tout allait sortir par les tempes et les yeux. — Tension dans le cerveau et les tégu-



PARIS QUADRIFOLIA.

543

ments du front. — Élancements et lancinations dans la tête. — Céphalalgie pulsative la nuit, avec grande agitation. — Céphalalgie pulsative, avec sensation de balancement en montant un escalier. — Mal à la tête, après avoir fumé. — Douleur d'excoriation à l'extérieur du vertex, au toucher. — Sensibilité douloureuse et chute des cheveux. — Tension du euir chevelu au front et à l'occiput. — Croûtes sur la tête.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme une pression dans les os des orbites. — Sensation comme si le globe des yeux était trop volumineux ou gonflé. — Douleur brûlante dans les yeux, avec écoulement de larmes, surtout le matin, après le lever. — Tressaillement et frémissement dans les cils de la paupière supérieure. — Vue incertaine, et vacillement devant les yeux.

Oreilles. — Otalgie, avec déchirements. — Diminution de l'ouïe. — Tintement d'oreilles.

Nez. — Nez comme obstrué dans le haut, avec mouchement de sang. — Odeur putride du lait et du pain. — Obturation du nez, le matin, avec mouchement de mucosités épaisses et sanguinolentes. — Coryza sec, alternant avec coryza fluent. — Écoulement de mucosités liquides par le nez et les yeux, et qui provoque une respiration haletante. — Mucosités nasales, rouges ou verdâtres.

Visage. — Douleurs de la face, avec élancements brûlants dans les os des joues. — Boutons purulents sous le nez et au menton. — Boutons sanguinolents, comme des grains de millet, à la mâchoire inférieure. — Boutons au front, avec douleur pressive au toucher. — Lèvres gercées. — Dartres autour de la bouche.

Dents. — Odontalgie tractive ou avec pulsations tractives, surtout dans les dents cariées, aggravée par des choses froides. — Douleurs incisives dans les gencives, tous les matins. — Gencives

ridées, comme si elles étaient brûlées.

Bouche et Gorge. — Bouche sèche, aride, le matin, au réveil. —
Accumulation de salive âpre et astringente. — Écume blanche et
muqueuse aux coins de la bouche, le matin. — Douleur d'excoriation et desquamation du voile du palais. — Gonflement dur, de
la grosseur d'un œuf, au palais, qui est dur. — Langue âpre et
sèche, avec sensation comme si elle était trop volumineuse. —
Mal de gorge, comme par la pression d'une boule dans la gorge.
— Élancements, grattement et douleur brûlante dans la gorge.

Appétit. — Goût pâteux et fade. — Appétit violent. — Renvois dégoûtants ou pressifs. — Régurgitations aqueuses. — Nausées, avec goût aigre. — Faiblesse et lenteur de la digestion. — Ho-

quets continuels après le repas.

Estomac. — Pression à l'estomac, comme par une pierre, soulagée par des renvois. — Douleur brûlante depuis l'estomac jusque dans le ventre.

Ventre. - Douleur tensive dans tout le ventre. - Pression dure



544 PARIS QUADRIFOLIA. — PETROLEUM.

dans le ventre. — Traction incisive et térébration dans un côté du ventre, le soir au lit, en étant couché dessus.

Selles. — Évacuations alvines fréquentes, mais insuffisantes, et de la consistance de la bouillie. — Selles diarrhéiques fétides, comme l'odeur de chair pourrie.

Urines et Parties génitales. — Diminution de la sécrétion des urines. - Envie pressante et fréquente d'uriner, avec douleur brûlante pendant l'émission. — Urine enflammée, avec nuages dans le milieu, sédiment rougeâtre et pellicule irisée après avoir reposé. — Douleur brûlante et élancements dans l'urèthre. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Règles trop hâtives.

Larynx. — Le matin, sensation de sécheresse dans la trachéeartère. — Enrouement pénible et voix basse, avec renâclement continuel de mucosités. — Enrouement périodique. — Douleur brûlante dans le pharynx. — Toux, comme excitée par la vapeur du soufre, dans la trachée-artère, ou comme par des mucosités visqueuses dans le pharynx. — Toux nocturne en étant couché sur le côté gauche. - Toux avec expectoration de mucosités visqueuses, verdâtres, venant du larynx.

Poitrine. — Gêne de la respiration, avec besoin de respirer profondément. — Pression dans le côté droit de la poitrine. — Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. - Battement

de cœur, pendant le repos et le mouvement.

Tronc. — Douleurs dans le dos et la nuque en se baissant, comme si un fardeau pesait dessus. - Elancements et lancinations dans le dos, comme aussi dans et entre les omoplates. - Tension et faiblesse dans les muscles du cou et de la nuque.


Bras. — Pesanteur et faiblesse paralytique dans les bras et les articulations des doigts. — Déchirements et tractions dans les doigts, depuis l'épaule jusqu'aux doigts. — Tremblement des mains. — Élancements dans les doigts. — Doigts tantôt chauds, tantôt froids, tantôt morts. -- Engourdissement des doigts. -Panaris.

Jambes. — Déchirements et traction dans les jambes, et surtout dans l'articulation coxo-fémorale. — Douleur paralytique dans l'articulation du pied. — Fourmillement dans le tendon du talon. Déchirements, tractions et élancements dans les orteils. -Froid aux pieds, la nuit au lit.

PETROLEUM.

. – HAHNEMANN. – Hist. nat. et prép. Voy. Phar-Doses usitées : 18, 50. – Durée d'action : jusqu'à ETR. — Huile de pétrole. — HAHNEMANN mac. homœop., p. 437. — Doses usitées 50 jours dans des affections chroniques. ANTIDOTES : Acon. n-vom.

COMPARER AVEC: Calc. cann. cham. ign. lyc. magn. nitr-ac. n-vom. phos.



PETROLEUM.

545

- C'est surtout après : nitr-ac. et phos., que le pétrole est efficace lorsqu'il se trouve indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Souffrance, par suite de contrariétés; Affections scrofuleuses et rachitique Accès de défaillance; Atrophie des enfants; Dartres; Rhagades; Engelwres; Eruptions pustuleuses; Fièvres intermittentes; Mélancolie; Vertiges chroniques; Céphalalgie causée par des contrariétés, ou même par une chute; Migraine; Teigne; Ophthalmies scrofuleuses; Myopie et presbyopie; Fistules lacrymales (en alternant avec sil.); Otite, et otorrhée purulente; Dureté de l'ouëe (surtout après l'usage de l'acide nitrique); Surdité par paralysie du nerf acoustique; Affections gastriques; Mal de mer; Souffrances causées par le mouvement de la voiture; Dyspepsie chronique; Hernie inguinale; Diarrhées muqueses; Hémorrhoides; Rétrécissement de l'urethre; Dartres au missem; Gonorrhée; Cal-Rétrécissement de l'urèthre; Dartres au motum; Gonorrhée; Cal-culs urinaire de l'urèthre; Gonorrhée; Gonorrhée; Gonorrhée; Cal-culs urinaire de l'urèthre; Gonorrhée; Gonorrhée Éruptions p s des femmes enceintes; Catarrhe avec en- " s et gerçures aux mains en hiver; Engelures rouement; aux mains et aux pieds, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Douleurs tractives dans les membres. — Enroidissement et engourdissement facile des membres. - Craquement dans les articulations, avec roideur arthritique et douleurs tractives, déchirantes. — Gonflement et induration des glandes, même après une contusion. — Tressaillement des membres, le jour et pendant le sommeil. — Attaques d'épilepsie. - Accès d'évanouissement avec bouillonnement de sang, chaleur, palpitations et pression au cœur. - *Au moindre effort, grande faiblesse, equelquefois avec trouble de la vue, tremblement du corps, bourdonnement d'oreilles et nausées.— Faiblesse, nausées et autres incommodités par le mouvement de la voiture.

— Aggravation et apparition de plusieurs symptômes par un temps d'orage. — *Chaleur fugace, ébullition de sang et sueur après une promenade ou après s'être faché. — *Amaigrissement, ochez les enfants aussi. — Sensation d'un malaise insupportable et général, avec tremblement et accablement. - Pesanteur et lassitude dans tous les membres. — Grande lassitude le matin et le soir. - Forte disposition à prendre des refroidissements. -Répugnance pour le grand air, avec frissonnement dès qu'on y est. — Plusieurs symptômes se manifestent le matin. Peau. — Grande sensibilité de la surface de la peau. -



PETROLEUM.

urticaire. — Dartres pruriantes. — Plaques pruriantes, excoriées et suintantes, à la peau. — Taches brunes et jaunée à la peau. — *Éruption de pustules pruriantes et brûlantes. — *Rhagades. — Peau maladive; toute lésion tend à s'ulcérer. — Furoncles. — Ulcères avec douleur lancinante. — °Chairs luxuriantes dans les ulcères. — Verrues. — Cors aux pieds. — °Engelures, quelquefois douloureuses.

Sommeil. — Envie de dormir le jour et le soir, en étant assis tranquillement. — *Sommeil incomplet et agité, la nuit, avec affluence de rèves vifs, anxieux et effrayants, réveil fréquent en sursaut et chaleur anxieuse. — *Le matin il semble qu'on n'a pas

assez dormi.

546

Fièvre. — Frisson avec mal à la tête, et froid aux mains et au visage. — Frissonnement fréquent par tout le corps, et en se réchauffant, fort prurit à la peau. — Frissonnement eu froid, généralement le soir, et quelquefois avec ongles bleus. — Sueur immédiatement après le frisson. — *Fièvre, le soir, °avec chaleur de la face, et pieds froids après le frisson. — Chaleur fugace, fréquente. — Fièvre avec pouls plein et sensation brûlante à la peau. — *Chaleur nocturne. — *Sueur nocturies. — Tristesse et abattement moral, —quelquefois avec sensation à faiblesse au

foral. — *Anxiété et disposition à s'effrage? Tristesse et abattement moral, —quelquefois avec sensature faiblesse au cœur (au creux de l'estomac?). — *Grande irrésolution. — Inquiétude sur l'avenir. — *Humeur hypocondriaque. — Caractère irascible, violent, avec injures. — Pleurs fréquents, et pour la moindre chose. — *Absence de mémoire. — Inaptitude à réflé-

chir. — *Faiblesse de la pensée.

Tête. — *Tête entreprise. — *Vertige fréquent. — Vertige, comme un fort ballonnement. — *Vertige en se baissant, ou en se levant du lit ou de son siège. — *Maux de tête après s'être fâché, ou —le matin, à jeun, comme aussi le soir après une promenade. — Accès de mal de tête semi-latéral, qui force à se coucher. — *Pesanteur et plénitude dans la tête, le matin et en se baissant. — *Douleurs pressives ou lancinantes pressives, dans la tête, et surtout dans l'occiput. — °Mal de tête aggravé par tout travail intellectuel, jusqu'à l'hébétude complète. — Tension dans la tête, comme si la dure-mère était tendue. — Douleurs de tête crampoïdes, tractives, pinçantes. — *Maux de tête pulsatifs, surtout dans l'occiput. — Sensation comme si tout était vivant dans la tête. — Cuir chevelu douloureux au toucher, comme s'il était meurtri ou ulcéré. — °Traction à la tête, au front et aux tempes, jusque dans les dents. — *Éruption à la tête et à la nuque. — Gonflement codémateux et croûtes au cuir chevelu. — *Chute des cheveux.

Yeux. — Prurit dans les yeux. — Pression, cuisson, clancements et douleur brûlante dans les yeux. — Inflammation des yeux. — Fistule lacrymale. — Larmoiement. — Tressaillement et fré-



missement, des yeux et des paupières. — Convultions des yeux. — Myopie ou presbyopie. — Diplopie. — *Scintillement et voile devant la vue, ou étinselles et points noirs.

PETROLEUM.

Oreilles. — Otalgie avec douleur crampoïde et tressaillante. -

OSécheresse et sensation de sécheresse pénible dans l'intérieur de l'oreille. — Écoulement de sang et de pus par les oreilles. — Eruption aux oreilles.—Rougeur, excoriation et suintement derrière les oreilles. — *Surdité. — *Tintement, roulement, grondement et bourdonnement dans les oreilles.

Nez. — Épistaxis. — Vésicules purulentes au nez. — Narines ulcérées. - Gonflement du nez, avec écoulement de pus et douleur au-dessus de la racine du nez. - *Obturation du nez. oSécheresse et sensation de sécheresse pénible dans le nez. -

oCoryza avec enrouement.

Face. — *Chaleur de la face, quelquefois après le repas, et avec soif. — Teint jaunâtre, pâle. — Eruption boutonneuse à la face. - Boutons croûteux, avec douleur langinante, aux lèvres et aux commissures des levres. — *Gonflement des glandes sous-maxillaires. — Luxation facile de l'articulation de la machoire, le matin, au lit, avec douleurs vives.

Dents. - Odontalgie au contact du grand air, plus violente la nuit, avec gonflement de la joue. — Torpeur des dents, avec douleur en les serrant. — Vésicule purulente aux gencives, comme une fistule. — Gonflement des gencives, avec douleur lancinante au

toucher.

- *Haleine fétide, quelquefois comme de l'ail. — Ulcères à la face interne des joues. — Accumulation de mucosités dans la bouche et la gorge. — *Langue chargée d'un enduit blanc. — Grande sécheresse de la bouche, avec forte soif.

Gorge. — Mal de gorge, pendant la déglutition, avec douleur lancinante. — Gonflement et grande sécheresse dans la gorge. - En avalant, les aliments (liquides?) remontent vers les fosses

nasales. — Renâclement de mucosités, le matin.

Appétit. — *Goût putride, fade, muqueux, ou bien amer ou acide. — Forte soif de bière. — Boulimie. — Faim, avec prompte satiété. — *Voracité. — Friandise. — *Absence d'appétit. — Répugnance pour la viande et la graisse, comme aussi pour les aliments chauds et cuits. - Incommodités pendant la digestion, après presque tous les aliments, quelque peu qu'on en ait mangé. - Après le repus, obscurcissement et vertige, onausées, *lourdeur et pression dans l'estomac; sommeil, ou coliques avec rapports, ou renvois aigres, congestion à la tête, crampes de poitrine, etc.

lstomac. — Renvois bruyants.— Renvois aigres et régurgitations. - Pyrosis. — Nausées fréquentes, surtout le matin, souvent avec accumulation d'eau dans la bouche, gêne de la respiration, renvois aigres, langue sèche et blanche, points dans la région



PETROLEUM.

548

hépatique, chaleur du visage, vertiges, etc. — Nausées par le mouvement de la voiture. — *Écoulement d'eau par la fauche, comme des pituites. — *Envie de vomir. — °Vomissement verdâtre, amer. — Pression à l'estomac. — Crampes d'estomac. — Sensation de vacuité et de faiblesse dans l'estomac. — Douleur dans l'épigastre, comme si quelque chose s'en arrachait. — °Gonflement de l'épigastre, avec douleur au toucher. — °Sensation de plénitude à l'épigastre.

Ventre. — Mal de ventre peu après le repas. — °Sensation d'un grand vide dans le ventre. — Ballonnement et tension dans le ventre, avec crampes. — *Pincements et tranchées dans tout le ventre, quelquefois avec besoin pressant d'aller à la selle. — *Coliques nocturnes, vers le matin, avec diarrhée. — *Borborygmes dans le ventre, °avec sensation comme si l'abdomen était entièrement vide. — °Hernie inguinale. — Vents fétides. — °Sensation de froid dans le ventre.

Selles. — *Selles difficiles, dures, noueuses et insuffisantes. — *Selles fréquentes, le jour, equelquefois avec évacuation de matières séreuses, jaunâtres. — *Diarrhée, souvent précédée de tranchées. — *Selles muqueuses, souvent avec du sang. — Douleur brûlante au rectum, après la selle. — Dartres pruriantes au périnée.

Urines. — Émission d'urine fréquente, avec écoulement peu abondant d'une urine rouge ou brune et fétide. — Suintement d'urine involontaire. — Émission d'urine, la nuit. — Pissement au lit.
 Parties viriles. — oRétrécissement de l'urèthre. — Douleur brû-


Parties viriles. — °Rétrécissement de l'urèthre. — Douleur brûlante, *prurit, rougeur, excoriation et suintement, ou boutons pruriants et dartres, au scrotum et à côté, à la cuisse. — Diminution de l'appétit vénérien. — Pollutions fréquentes. — °Écoulement de liqueur prostatique. — °Après le coît, faiblesse et irritabilité nerveuse.

Bègles. — *Prurit, excoriation et suintement autour de la vulve.
Répugnance pour le coît, chez la femme. — Règles trop hâtives, avec écoulement d'un sang qui provoque la démangeaison.
Leucorrhée comme du blanc d'œuf. — °Leucorrhée, °aveo rêves lascifs. — Prurit et furfures aux mamelons.

Larynx. — Enrouement avec ou sans coryza. — Toux avec sécheresse dans la gorge. — *Toux suffocante, ola nuit. — *Toux sèche, la nuit, ou le soir, oaprès s'être couché. — oToux sèche, avec élancements sous le sternum.

Poitrine. — Gêne de la respiration, à l'air froid. — Râlement et ronflement dans la trachée-artère. — Sensation de pesanteur, d'anxiété et d'inquiétude dans la poitrine. — Oppression de poitrine, la nuit. — *Élancements dans les côtés de la poitrine. — *Dartres sur la poitrine. — *Battement de cœur.

Tronc. — *Mauæ de reins, equi ne permettent pas de se tenir debont. — *Douleur dans le dos, qui ne permet pas de bouger. —



PETROLEUM. — PHOSPHORUS.

549

Faiblesse et roideur dans le dos et aux reins. — Dartres à la nuque. — Gonflement des glandes et éruption à la maque. —

Suppuration des glandes axillaires.

Bras. — Douleur tractive dans les bras et les doigts. — Grande faiblesse des bras. — Enroidissement des bras et des doigts. — Inflammation érysipélateuse au bras. — Taches jaunes au bras. — Furoncles à l'avant-bras. — Déchirements dans les mains. — Sensation brûlante dans la paume des mains. — Seuer aux mains. — Taches brunes au poignet. — *Crevasses saignantes aux mains ét aux doigts, surtout en hiver. — Engelures et verrues aux doigts. — Roideur arthritique dans les articulations des doigts.

Jambes. — Craquement dans les articulations des jambes. —
Crampes dans les cuisses, les mollets et la plante des pieds. —
Furoncles aux cuisses et aux jambes. — Tension dans les jarrets.
— Lancinations dans le genou. — Faiblesse du genou. — °Dartres au genou. — Éruption tubéreuse, pruriante, au mollet. —
°Dartre à la malléole. — Sensation brûlante à la plante des pieds.
— *Froid aux pieds. — °Gonflement des pieds. — Gonflement chaud à la plante des pieds. — Gonflement et rougeur du talon, avec douleur brûlante et élancements, aggravés en marchant. —
°Engelures aux orteils. — *Cors aux pieds. — °Ulcères opiniâtres aux orteils, à bords élevés et à fond rouge, superficiel et suintant.

PHOSPHORUS.

PHOS. — Phosphore. — HARNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 438. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: jusqu'à 7 semaines dans des affections chroniques; 3 à 5 jours dans les affections aiguës.

ANTIDOTES : Camph. coff. n-vom. vinum.

COMPARER AVEC: Acon. agar. alum. amb. amm. ars. bell. bry. calc. carb.veg. caus. cham. chin. cin. coff. con. graph. hell. hyos. iod. ipec. kal. kroos. lyc. magn. merc. n-vom.op. petr. plumb. puls. rhus. sep. sil. spong. sulf. veratr. — C'est surtout après: Calc. kal. kreos. lyc. et rhus. que le phosphore est efficace, lorsqu'il est indiqué; après le phosphore, on trouvera parfois convenable: Petr. rhus.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections des personnes d'une constitution faible, phthisique, irritable et lymphatique, des personnes aux cheveux blonds, aux yeux bleus, taille svelte et d'un tempérament vif et sensible, ou d'une constitution affaiblie par de longues maladies, ou par des causes




550

débilitantes qui ont exercé une influence lente, mais continue, sur l'économie vitale; Souffrances par suite d'un refroidissement, ou d'une colère; Affections rhumatismales et arthritiques chroniques; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de longues influences nuisibles à l'économie vitale; Affections lymphatiques, scrosuleuses et rachitiques; Affections des glandes, aussi par suite d'une contusion; Douleurs ostéocopes, exostoses et autres maladies des os; Affections hydropiques; Taches hepatiques; Abcès lymphatiques; Fongus hématoïde; Hémorrhagie et congestion sanguines; Engelures; Scarlatines, morbilles, et suites fâcheuses de la répercussion de ces maladies ?; Chlorose ?; Atrophie ?; Furoncles; Engelures; Fièvres hectiques; Fièvres typhoïdes?; Affections hypocondriaques et hystériques; Somnambulisme; Congestion à la tête; Vertiges congestifs; Céphalalgies rhumatismales, nerveuses et hystériques; Migraine; Chute des cheveux, par suite de fortes maladies aigues; Teigne; Ophthalmie et photophobie scrofuleuses; Ophthalmie arthritique; Cataracte; Glaucome; Amblyopie amaurotique et surdité par suite de congestions à la tête; Affections de l'oule, à la suite de maladies nerveuses et inflammatoires; Polype au nez; Inflammation scrofuleuse du nez; Prosopalgie rhumatismale ou congestive; Odontalgie rhumatismale ou congestive; Dyspepsie, gastralgie, aigreurs et autres affections gastriques; Gastrite: Squirre de l'estomac; Choléra; Cholérine; Coliques spasmodiques et flatulentes; Entérite?; Relâchement chronique du ventre; Diarrhées, surtout chez des personnes sensibles, d'une constitution faible ainsi que chez les vieillards ou les phthisiques; Diarrhées chroniques et colliquatives; Diarrhées avec phénomènes typhoïdes; Calculs urinaires?; Dysménorrhée; Stérilité par suite d'un appétit vénérien trop exalté; Vomissement des femmes enceintes; Érysipèle abcès et induration aux mamelles (après l'usage de bell. ou de merc.); Aphonie; Catarrhe pulmonaire; Grippe; Laryngite chronique (après l'usage de : acon. spong. hep.); Disposition au croup, ou souffrances chroniques à la suite de cette maladie; Pneumonie chronique Souffrances asthmatiques, surtout à la suite d'une pneumonie, ou chez des personnes sensibles; Souffrances phthisiques; Maladies de cœur; Maux de reins rhumatismaux; Gonflement ædémateux des pieds, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Déchirements et élancements arthritiques et rhumatismaux, principalement dans les membres, quelquefois après un léger refroidissement, surtout la nuit, au lit. — Douleur brûlante dans les membres. — Tension, crampes, tressaillement et distorsion de plusieurs membres. —Convulsions. — Enroidissement de quelques parties. — Accès de pâlissement



551

et de torpeur dans quelques membres, qui paraissent alors comme morts. — Tremblement des membres, surtout pendant le travail. — °Facilité à se donner des tours de reins. — *Bouillonnement de sang et congestions, quelquesois avec pulsation dans tout le corps. — *Saignement par différents organes. — *Faiblesse et brisement des articulations, surtout des genoux. — Grande faiblesse et lassitude paralytique, quelquesois subite, surtout le matin, au lit, ou pour peu qu'on est marché. — Accès d'évanouissement. — Sensibilité excessive de tous les organes. — *Lassitude hystérique. — *Abattement général et faiblesse nerveuse. — *Pesanteur des membres et paresse. — *Paralysies, avec sourmillement dans les parties affectées. — *Amaigrissement et consomption. — *Engorgement des glandes. — *Impossibilité de rester à l'air, surtout quand il fait froid. — Grande disposition à prendre des réfroidissements, qui, souvent sont suivis de mal à la tête et aux dents, coryna avec fièvre, frissonnement, etc. — Douleurs dans les membres aux changements de temps. — La plupart des symptômes se manisestent le matin et le soir, au lit, comme aussi après le diner, tandis que plusieurs autres apparaissent au commencement du repas, et se dissipent après.

Peau. — Desquamation de la peau. — Plaques excoriées à la peau, avec crevasses et élancements. — *Taches rondes, dartreuses, par tout le corps. — Dartres sèches, furfuracées. — *Taches jaunes ou brunes à la peau. — *Taches cuivrées ou bleuâtres, comme des pétéchies. — *Taches cuivrées après l'abus du mercure, avec desquamation et exfoliation de la peau. — *Furoncles. — *Knostoses, avec douleurs nocturnes. — *Abes lymphatiques, avec ducères fistuleux, à bords calleux, sécrétant un pus fétide et incolore, et fièvre hectique. — *Fongus hématoide. — *Saignement abondant par de petites blessures. — *Engelures et cors aux pieds, quelquefois douloureux. — Four-

millement à la peau. — Éruptions urticaires.

Sommeil. — *Forte envie de dormir, le jour, comme par somnolence. — Sommeil stupéfiant. — *Sommeil tardif, le soir, et insomnie nocturne, ou réveil fréquent avec difficulté de se rendormir, à cause d'inquiétude, avec angoisse, jactation, chaleur, vertige et bouillonnement de sang. — Impossibilité de rester couché sur le dos ou sur le côté. — *Sommeil non réparateur; le matin, il semble qu'on n'a pas assez dormi. — La nuit, vertiges avec nausées, sensibilité douloureuse des membres, maux d'estomac et de ventre, asthme suffocant et spasmodique, etc. — Réveil fréquent, avec sursauts et effroi. — Pendant le sommeil, tressaillement des membres, cris, paroles, pleurs, plaintes, lamentations et gémissements. — *Réves anxieux, pénibles, effrayants et horribles, ou vite et inquiets. — Rêves d'animaux qui mordent, de brigands, d'incendie, des affaires du jour, d'hé-



552


morrhagies, de morts, de querelles, de vermine, etc. — Cauchemar. — oSomnambulisme.

Pièvre. — *Horripilations et frissons, surtout le soir, au lit, quelquefois avec baillements, suivis ou non de chaleur. — Froideur des membres. — Frissons, suivis de chaleur, avec soif et sueur, surtout la nuit et l'après-midi. — *Chaleur fugace -ou anxieuse. — *Chaleur nocturne. — *Fièvre hectique, -avec chaleur sèche vers le soir, surtout à la paume des mains, sueurs et diarrhées colliquatives, rougeur circonscrite des joues, etc. — *Pouls accéléré et dur. — Sueur nocturne et visqueuse. — *Sueur matutinale. — °Fièrre typhoïde avec état putride, sommeil soporeux,

bouche ouverte, lèvres et langue sèches et noires.

Moral. — Tristesse mélancolique et mélancolie, quelquefois aver pleurs violents, ou interrompus par des attaques de rire involontaire. — *Angoisse et inquiétude, surtout en étant seul, —ou par un temps d'orage, principalement le soir, avec disposition à la peur et épouvante. — *Angoisse sur l'avenir, —ou sur l'issue de la maladie. — Disposition à s'effrayer. — *Tristesse hypocondriaque. — Dégoût de la vie. — *Grande irascibilité, colère, emportements et violence. — Pleurs et rires involontaires et spasmodiques. — Misanthropie. — *Répugnance pour le travail. — Impudence, comme par aliénation. — Grande indifférence pour toutes choses, —et même pour les siens. — Grand oubli, surtout le matin. — Grande affluence d'idées difficiles à ordonner. — oÉtat de clairvoyance.

Tête. — *Obnubilation et étourdissement, surtout le matin. -*Accès fréquents de vertige de diverses natures et à différentes heures du jour, surtout le matin, dans le milieu de la journée et le soir, au lit. — Vertige en étant assis; Il semble que le siège s'élève, avec humeur hypocondriaque. — *Vertige avec nausées et douleurs pressives dans la tête. — Vertige opiniatre. — *Vertige avec perte des idées. — Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements, et douleurs battantes, tressaillantes. Maux de tête nocturnes, précédés de nausées, le soir. — Mal de tête après une contrariété. — *Mal de tête, le matin. — Faiblesse de la tête, qui est fatiguée par la musique, le rire, une marche lourde, etc., etc. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau. — *Mal de tête étourdissant, quelquefois avec fort bouillonnement de sang, et pâleur du visage. - *Sensation de pesanteur et de plénitude, et pression dans la tête. - Déchirement dans la tête, et surtout dans les tempes, ou semi-latéral. — Lancinations à diverses parties de la tête, surtout le soir. — *Congestion à la tête, avec battement, bourdonnement, chaleur et sensation brûlante, surtout au front. — Sensation de froid dans la tête. ---Les maux de tête sont soulagés au grand air. — • Élancements extérieurs au côté de la tête. — Sensation pénible, comme si la peau du front était trop tendue. — Facilité à se refroidir la tête,



avec sensation, en plein air, comme si le cerveau se congelait. -*Prurit au cuir chevelu. -- *Chute des cheveux, surtout audessus des oreilles. -- *Croûtes sèches, -et écailles abondantes
au cuir chevelu. -- Exostoses à la tête.

Yeux. — Douleurs dans les yeux, comme dans les os des orbites. —
*Pression dans les yeux, comme si un grain de sable s'y était
introduit. — *Élancements, cuisson, chaleur et seneation brûlante dans les yeux, surtout dans les angles extérieurs. — *Congestion de sang aux yeux. — Rougeur de la sclérotique et de la
conjonctive. — Couleur jaunâtre de la sclérotique. — *Inflammation des yeux, de diverses natures. — *Larmoiement, surtout
en pleisteir et au vent — *Agglutination nocturne des yeux. —
Orgelet. — Frémissant des paupières et de leurs angles. —
*Difficulté d'ouvrir les paspières. — Gouflement des paupières. —
Amblyopie. — Faiblesse de la vue, le matin, au réveil. — Myopie.
— *Cécité diurne, quelquefois instantanée; **stat semble être
recouvert d'un voile gris. — Obscurcissement de la vue, à la
lumière. — *Reflet noir ou étincelles et taches noires devant la
vue. — Sensibilité des yeux à la clarté du jour et à celle de la
lumière. — Auréole verdâtre autour de la lumière.

Oreilles. — Otalgie. — Déchirements aigus et élancements dans les oreilles et à la tête. — *Battement et pulsation dans les oreilles. — *Congestion de sang aux oreilles. — Sensation de sécheresse dans les oreilles. — Écoulement jaune par les oreilles, alternant avec surdité. — *Sensibilité excessive de l'oule. — Fort retentissement des sons et surtout des paroles, dans les oreilles, avec résonnement dans la tête. — *Surdité, surtout pour la parole humaine. — Murmure devant les oreilles. — *Bourdonnement d'oreilles.

Nex. — Nes rouge, gonflé et douloureux au toucher. — *Croûtes sèches et dures dans le nez. — Polype au nez. — Excoriation des angles du nez. — Narines ulcérées. — Éphélides abondantes sur le nez. — *Exhalaison fétide par le nez. — *Mouchement de sang. — Épistaxis, "quelquefois pendant la selle, ou le soir. — *Sensibilité excessive de l'odorat, surtout pendant les maux de tête. — Absence d'odorat. — *Sécheresse pénible du nez. — *Coryza sec — et fluent, avec mal de gorge et embarras de la tête. — *Écoulement continuel par le nez, de mucosités jaunes, verdatrès. — Éternument fréquent. — *Obturation du nez, surtout le matin.

Visage. — *Visage pâle, hâre, sale, terreux, avec yeux cares, bordés d'un cercle bleu. — Pâleur alternant avec rougeur du risage et chaleur fugace. — *Rougeur et chaleur brûlante des joues. — *Bougeur circonscrite des joues. — *Bouffissure de la face, surtout autour des yeux. — Tressaillement des muscles de la face. — *Tension de la peau du visage, quelquefois d'un seul côté. — Desquamation de la peau du visage. — «Sensibilité dou-



554

loureuse d'un seul côté du visage, en ouvrant la bouche. — *Elancements douloureux, tractifs et déchirants dans les os du visage, surtout le soir ou la nuit, au lit, ou après le plus léger refroidissement. — *Les douleurs à la face se renouvellent en parlant, ou au moindre contact. — Éruptions de boutons et de croûtes à la face. — *Lèvres bleuâtres. — *Lèvres sèches, "couvertes de croûtes brunâtres. — Lèvres gercées. — Dartres et boutons autour de la bouche. — Ulcération de la commissure des lèvres. — Crampe de la mâchoire. — Engorgement des glandes sous-maxillaires.

Dents. — *Odontalgie tractive ou déchirante, ou bien rongeante, térébrante, pulsative, tressaillante et lancinante, surtout au grand air, ou le soir et le matin, quelquefois aussi la nuit seulement, surtout à la chaleur du lit, ou bien au contact des aliments chauds. — *Maux de dents, après le plus léger refroidissement, avec salivation. —Dents douloureuses le matin, pendant la mastication, comme par ulcération. — Carie des dents. — Fort vacillement des dents. — Saignement des dents. — Grincement des dents. — Sensibilité douloureuse, inflammation, décollement, *ulcération, -gonflement et saignement facile des gencives.


Bouche. — *Excoriation de la bouche. — *Accumulation de salive,
—salée ou douceâtre, ou sécheresse excessive de la bouche. —
*Mucosités visqueuses dans la bouche. — *Crachement de sang.
— Vésicules purulentes au palais. — Peau ridée au palais, comme
si elle allait se détacher. — *Langue sèche, -chargée d'un enduit
brun noirâtre. — *Langue blanche.

Gorge. — *Sécheresse de la gorge, jour et nuit. — Pression dans la gorge. — *Cuisson, grattement et douleur brûlante dans la gorge. — *Renâclement de mucosités, le matin. — Douleur d'ex-

coriation dans la gorge. — Gonflement des amygdales.

Appétit. — Goût pâteux ou comme du fromage. — Amertume dans la bouche et la gorge, avec âpreté. — Goût aigre dans la bouche, surtout après le repas. — Perte du goût. — Absence d'appétit par une sensation de plénitude dans le gosier, et forte soif. — Désir excessif de choses rafraîchissantes. — Faim après le repas. — *Boulimie, même la nuit. — Après le déjeuner, sensation de fadeur et de mollesse au ventre. — Après le repas, envie de dormir et paresse, chaleur et anxiété, sensation brûlante dans les mains, aigreurs plus prononcées, pression et plénitude dans l'estomac, la poitrine et le ventre, accompagnées de gêne de la respiration, vomissement des aliments, ballonnement du ventre, —ou mal à la tête, rapports, hoquet, faiblesse, coliques et beaucoup d'autres souffrances.

Estomac. — Renvois avec douleur dans l'estomac, comme si quelque chose allait s'en arracher. — °La fumée du tabac produit des nausées et des battements de cœur. — *Renvois abondants, généralement à vide, surtout après le repas, et après avoir bu, quel-



555

quefois aussi avortés, ou spasmodiques, ou bien aigres, -ou avec goût des aliments.—*Régurgitation aigre des aliments.—*Pyrosis.—Hoquet.—*Nausées de diverses natures, surtout le matin, ou le soir, ou bien après le repas. - Nauséen, avec forte faim ou soif, se dissipant en mangeant, ou en buvant de l'eau. oÉcoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, surtout après avoir mangé des acties. — *Vomissements avec fortes dou-leurs à l'estomac, et grande faiblesse. — Vomissement verdâtre ou noirâtre. — Vomissement de matières acides. — *Vomissement des aliments, surtout le soir. - *Vomissements de bile, la nuit, ou de mucosités, quelquefois avec froid et torpeur des mains et des pieds. — Vomissement de sang. — Vomissement avec diarrhée. - Douleur d'estomac, surtout au toucher. - Douleurs violentes à l'estomac, soulagées en buvant froid. - Sensation de rétréciesement du cardia; les aliments, à peine ingérés, remontent dans la gorge. - *Plénitude d'estomac. - Elancements et pression dans l'estomac, surtout après le repas, avec vomissement des aliments.— *Scrobicule douloureux au toucher, le matin aussi. — Sensation de froid, ou chaleur, et *sensation brûlante à Pestomac et au scrobicule.—Inflammation d'estomac. — *Douleur crampoide, sensation de griffement -et contraction dans l'estomac, quelquesois avec étoussement. -- Malaise général, mais qui est ressenti plus particulièrement à l'estomac, les maux d'estomac se manifestent surtout après le repas, ainsi quele soir et la nuit.

Ventre. — Élancements dans la région hépatique. — *Ballonnement du ventre, surtout après le repas. — Ventre dur, tendu. — Douleur contractive dans le ventre. — *Coliques spasmodiques. *Pincements, tranchées et déchirement dans le ventre, surtout le matin, as lit, la nuit et le soir, et souvent avec envie pressante d'aller à la selle et diarrhée. — Maux de ventre lancinants, quelquefois avec pâleur du visage, frissons et maux de tête. — Sensation de froid, avec chaleur *et sensation brûlante dans le ventre. - Inflammation des intestins. — *Sensation de faiblesse et de vide dans le ventre, comme une sorte d'atonie. — Malaise dans le ventre, après le déjeuner. — Pression comme si tout affluait vers les côtés du ventre. — *Hernie inguinale. — *Taches jaunes au ventre. — Gonflement et suppuration des glandes inguinales. — *Incarcération de flatuosités. — *Coliques flatulentes, profondément dans le bas-ventre, empirées en étant couché, avec grondement et borborygmes.

Selles. — *Constipation. — Selles dures, lentes, interrempues, difficiles à évacuer et par trop sèches. — °Envie pressante et pénible d'aller à la selle. — *Laxité prolongée du ventre. — *Selles de la consistance de la bouillie. — *Diarrhées séreuses. —
•Diarrhées avec chute des forces. — •Diarrhées muqueuses. —
•Diarrhées sanguinolentes.—•Selles non digérées. — Selles ver-



556

dâtres, grises ou noires. — «Selles involontaires. — «Écoulemen de mucosités par l'anus qui reste constamment ouvert. — oTénia -ou ascarides du rectum, pendant les selles. - *Écoulement d sang pendant la selle. — Après la selle; pression, douleur brû lante, et ténesme à l'anus et au rectum, avec grand affaissement - *Prurit et élancement à l'anus et au rectum. -- *Sortie et saignement facile des boutons hémorrhoïdaux du rectum et de l'anus, avec douleur d'excoriation en étant assis ou couché.

Urines. - Sécrétion plus abondante d'une urine aqueuse. - Émission fréquente d'une urine peu abondante. - Urine avec sédiment blanc, séreux, sablonneux et rouge, ou bien jaune. *Urines troubles, avec sédiment briqueté. — Urines pâles, aqueuses ou blanchâtres. -- Pellicule irisée sur les urines. -- Pissement de sang .- *En urinant, cuisson et sensation brûlante. -*Tension et tressaillement, ou douleur brûlante dans l'urèthre.

hors le temps de l'émission des urines.

Parties viriles. — *Forte exaltation de l'appétit vénérien, avec désir constant du coït. - *Érections trop violentes, le soir ou le matin. — *Pollutions par trop fréquentes. — •Éjaculation sans énergie et trop prompte pendant le coît. — Douleurs dans les testicules et gonflement du cordon spermatique.

Bègles. - Déchirement dans les parties génitales et élancements, depuis le ragin jusque dans la matrice. - *Règles trop hâtires et trop abondantes, ou trop peu abondantes et séreuses. - • Ecoulement de sang, par la matrice, pendant la grossesse. - Règles de trop longue durée, avec maux de dents et coliques. — Avant les règles, saignement abondant des ulcères, oflueurs blanches, envie d'uriner et pleurs. - A l'apparition des règles, tranchées incisives, douleurs dans le dos et vomissements. - Après les règles, faiblesse, cercles bleus autour des yeux et anxiété. — Règles de trop courte durée. — *Retard des règles. — *Pendant les règles, maux de tête lancinants, fermentation dans le ventre, expectoration de sang, douleurs dans le dos, brisement des membres, grande lassitude et fièrre, ou battement de cœur, friesons, gonflement des gencives et de la joue, et beaucoup d'autres souffrances. — Leucorrhée cuisante, corrosive. — Nodosités dures et douloureuses dans les seins. — *Inflammation érysipélateuse des seins, avec gonflement, douleurs brûlantes, élancements. ·Abcès dans les seins, même avec ulcères fistuleux.

Larynx. - *Enrouement et grattement dans la gorge, equelquefois prolongés. — *Aphonie, de manière à ne pouvoir chuchoter que très-bas, en parlant. — *Catarrhe avec toux, ofièvre, et crainte de la mort. — Sensibilité très-douloureuse du larynx, qui ne permet pas de parler. — Grande sensibilité du larynx. avec douleur brûlante. - Sécheresse dans la trachée-artère et la poitrine. — *Expectoration de mucosités par le larynx. — *Toux proroquée par un chatouillement et une démangeaison dans la



PHOSPHORUS. — PHOSPHORI ACIDUM.

- *Gonflement des mains, même la nuit. - °Chaleur des mains. - Froid aux mains la nuit. - Contraction et tressaillement des doigts. - Doigts morts. - Paralysie des doigts. - Torpeur du bout des doigts. - Peau gercée aux articulations des doigts.

- Engelures aux doigts.

558

Jambes. — Douleur d'ulcération dans les fesses, en étant assis. Douleur de luxation dans les articulations coxo-fémorales, et celles des genoux et des pieds, avec chaleur extérieure. - Fatigue douloureuse et pesanteur des jambes. — Sensation brûlante dans les jambes et les pieds. — Tension et crampes dans les jambes, surtout dans les genoux. — Secousses dans les jambes, le jour et la nuit, avant de s'endormir. - *Traction et déchirement dans les genoux, jusque dans les pieds.—*Faiblesse paralytique dans les jambes oet roideur arthritique des genoux. - Dartres au genou. — Taches comme des pétéchies aux jambes. — Exostose au tibia. - oTressaillements dans les mollets. - Déchirement et élancements dans les pieds, surtout la nuit. - *Gonflement des pieds, ou seulement des malléoles, surtout le soir, ou après une promenade, quelquefois avec douleur lancinante. — Luxation facile de l'articulation du pied. — *Froid aux pieds, surtout la nuit. — Douleur d'ulcération à la plante des pieds, en marchant. -- oSecousses dans les pieds, le jour et la nuit, avant de s'endormir. — Torpeur du bout des orteils. — Inflammation et rougeur de la partie charnue du gros orteil. avec lancinations. — Engelures et cors aux orteils.

PHOSPHORI ACIDUM.

PHOS-AC. — Acide phosphorique. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 139. — Dones usitées: 3, 90, 30. — Durée d'action: 3 à 4 jours, dans les maladies aiguës; 6 à 7 semaines dans les affections chroniques.

allections enroniques.

Antidotes: Camph. coff. — On l'emploie comme antidote de: Lach.

Comparer avec: Asa. bell. caus. chin. coff. con. ign. lach. lyc. merc. op.


Phus. sep. staph. sulf. thui. veratr. — C'est surtout après: Lach. et

rhus. que l'acide phosphorique sera efficace, lorsqu'il se trouvera indiqué.

— Après l'acide phosphorique conviennent quelquefois: Chin. lach. rhus.

veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Arthrite invétérée; Arthrocace; Faiblesse phthisique et nerveuse par suite de fortes maladies aiguës, par perte d'humeur et autres causes débilitantes, surtout lorsqu'elles ont rapidement miné une constitution forte jusqu'alors: Souffrances par suite d'onanisme;



559

Faiblesse des jeunes gens qui grandissent rapidement; Suites fâcheuses d'un chagrin avec soucis et inquiétude ou d'un amous malheureux, etc.; Dartres; Ulcères invétérés; Varices; Scarlatine et suites fâcheuses de la répercussion de cette maladie; Fièvres typhoïdes, Fièvres nerveuses, lentes, par suite de chagrin; Maladies des os; Chute et grisonnement des cheveux par suite de chagrin; Cholérine; Diarrhées surtout après un chagrin, ou après la répercussion de la scarlatine; Diarrhées épidémiques; Diabète sucré; Pollutions par suite d'onanisme; Impuissance par suite d'excès dans le coït; Dysurie des femmes enceintes, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions, et déchirements tres-saillants dans les membres. — Douleurs crampoldes, pressives. - Sensation comme si on râclait avec un couteau sur le périoste. Douleurs ostéocopes, brûlantes, déchirantes, la nuit. flement des os. — *Sensation brûlante dans toute la partie inférieure du corps, quoique les membres soient froids au toucher. Gonflement des glandes. — *Brisement dans les membres et les articulations, comme par une paralysie ou par la croissance, surtout le matin et le soir. - Engourdissement et faiblesse des membres. — Pesanteur dans les membres et les articulations, avec grande paresse. — Grande fatigue après la marche. — *Grande faiblesse générale, physique ou nerveuse, avec forte disposition à la transpiration, le jour, ou avec sensation brûlante dans le corps. — Amaigrissement, avec teint maladif et yeux cernés. - Fort bouillonnement du sang, avec grande agitation. — Les douleurs sont aggravées dans le repos, et soulagées par le mouvement, et celles qui se manifestent la nuit sont soulagées par la pression.

Peau. — Insensibilité de la peau. — Fourmillement sous la peau. — Taches rouges et brûlantes aux membres. — *Éruption comme la scarlatine. — Inflammations árysipélateuses. — Éruption de petits boutons et de miliaires númics en groupe, et rouges. — — Éruptions boutonneuses avec douleur brûlante ou d'excoriation. — Vésicules galeuses. — Dartres humides et sèches. — Cors aux pieds, avec élancements et douleur brûlante. — Engagnes. — *Condylomes. — *Furoncles. — °Ulcères lisses, indoleus, avec sécrétion d'un pus sale et fond dentelé. — °Ulcères pruriteux.

Sommeil. — Forte envie de dormir, le jour, le soir de bonne heure, et le matin, avec difficulté de s'éveiller. — Somnolence. — Sommeil tardif et insomnie nocturne, à cause d'agitation et de chaleur sèche. — En s'endormant, apparition de chiffres devant les yeux. — Sommeil profond. — Tressaillement et mouvements automatiques des mains, gémissement, paroles et ghant, ou air tantêt



360

riant, tantôt pleurant, pendant le sommeil, avec yeux moitié ouverts et convulsés. — Rêres anxieux de morts, avec peur au réveil. — Rèves lascifs.

Pièvre. — Horripilation et frissons, quelquesois avec grelottement, ou avec froid aux mains et aux doigts, généralement le soir, et sans sois. — Sensation de froid, avec frisson et froid dans le ventre. — Chalcur sébrile le soir sans sois, avec angoisse et grande activité de la circulation du sang. — Frissons alternant avec chalcur. — °Fièvre maligne avec grande faiblesse, apathie, stupidité, aversion pour la parole, diarrhée, etc. — *Sueurs nocturnes. — Sueurs matutinales.

Moral. — Envie de pleurer, comme par nostalgie. — *Tristesse et inquiétude sur l'avenir. — *Recherches inquiètes sur sa maladie. — Agitation et précipitation. — *Morosité taciturne et répugnance pour la conversation. — *Grande indifférence. — Impossibilité de supporter le bruit ou la conversation. — *Esprit obtus et paresseux, sans imagination. — *Manque d'idées et inap-


titude aux travaux de tête. — Illusions des sens.

Tête. — *Tête entreprise, comme après l'ivresse, ou comme après des pollutions immodérées. — Vertige étourdissant, en étant debout ou en marchant, surtout le soir. — Maux de tête, le matin. — Maux de tête continuels qui obligent à se coucher, aggravés jusqu'à devenir insupportables par la plus légère commotion, ou par le bruit. — Pesanteur de la tête, comme si elle était pleine d'eau. — Pression crampoïde et dure dans la tête, aggravée en pressant dessus, et en tournant la tête, comme aussi par la méditation, et en montant un escalier, mais surtout après minuit, dans la partie de la tête sur laquelle on repose. — Compression dans le cerveau. — Maux de tête déchirants. — Lancinations dans les tempes, ou au-dessus des yeux. — Tressaillements ou secousses, coups et martellement dans la tête. — Douleurs tractives dans les os de l'occiput. — Cheveux gris, flasques, comme de l'étoupe. — Chute des cheveux.

Yeux. — Yeux ternes, vitreux, abattus. — Pression dans les yeux, avec sensation comme si le globe de l'œil était trop volumineux. — *Froid du bord interne des paupières. — Douleur brûlante dans les paupières et dans leurs angles, surtout le soir à la lumière. — *Inflammation des yeux, avec veines injectées dans les angles internes. — Inflammation des paupières. — Orgelet. — Tache jaune à la sclérotique. — *Larmoiement. — Pupilles dilatées. — Regard fixe. — Yue trouble, comme à travers un brouillard. —

Myopie. — Bande noire devant les yeux.

Oreilles. — Élancements dans les oreilles, quelquesois avec traction dans les joues, les mâchoires et les dents, aggravés seulement par le son de la musique.—Tractions crampoides dans les oreilles.—*Impossibilité de supporter la musique, le bruit et la conversation. — Forte répercussion de tous les sons dans l'oreille.



561

- Surdité, pour les sons éloignés. - Cris dans l'oreille, en se mouchant.

Nez. - Gonflement du dos du nez, avec taches rouges. - Croûtes sur le nez.-Besoin de mettre les doigts dans le nez.- Exhalaison fétide par le nez. - Ecoulement de pus par le nez. - Epistaxis. - Coryza violent, avec rougeur du bord des narines. -Coryza fluent, avec toux et douleur brûlante dans la poitrine et

dans la gorge.

Visage. - Visage pâle, hâve, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu, et le nez effilé. — Traction dans les joues, et les mâchoires. — Traits irréguliers. — Chaleur à la face, avec tension de la peau du visage, comme si elle était enduite de blanc d'œuf desséché. — *Gros boutons à la face. — *Douleur brûlante dans les joues. - *Dartres humides et croûteuses aux joues, aux lèvres et aux commissures des lèvres. - Lèvres couvertes de crevasses suppurantes, avec douleur d'excoriation. - Boutons et croûtes sur la partie rouge des lèvres .- Boutons au menton .- Gonflement des glandes sous-maxillaires. - Douleur dans la mâchoire inférieure. comme si elle était déboitée.

Dents. - Odontalgie, avec douleur déchirante, aggravée à la chaleur du lit, et par les choses froides ou chaudes. - Douleurs violentes dans les dents incisives, la nuit. - Dents jaunes. - *Gencives saignantes, gonflées et décollées. - Nodosité douloureuse

aux gencives:

Bouche. - Sécheresse de la bouche, sans soif. - Mucosités visqueuses, tenaces, dans la bouche et sur la langue. - Elancements et sensation brûlante sur la langue. - La nuit, on se mord la langue, sans le vouloir. - Gonflement de la langue, avec douleur en parlant. - Nasillement. - Cuisson dans l'intérieur de la bouche pendant la mastication d'aliments solides .- *Excoriation et ulcération du voile du palais, avec douleur brûlante.

Gorge .-- Douleur d'excoriation dans la gorge, avec cuisson et élancements, surtout pendant la déglutition (des aliments). - Douleur contractive dans la fossette du cou. — Renaclement de mucosités

visqueuses.

Appétit. - Goût putride, acide, herbacé. - Arrière-goût prolongé des aliments et surtout du pain. - Répugnance pour le pain qui semble amer. - *Forte soif -de lait froid, ou de bière, ainsi qu'en général. *de choses rafraîchissantes et succulentes; le pain paraît trop sec. — *Soif inextinguible, provoquée par une sensation de sécheresse dans tout le corps. — Les acides provoquent des renvois amers et autres incommodités. - *Après le repas, pression, °ou sensation d'un balancement dans l'estomac,
-avec embarras de la tête, malaise, plénitude et envie de dormir, ou abattement, comme si on allait s'évanouir.

Estomac. — Renvois acides, incomplets ou brûlants. — *Nausées

continuelles, dans la gorge. - *Nausées qui forcent à se cou-



562

cher.—Vomissement des aliments.—Vomissement acide.— Pression dans l'estomac, comme par un fardeau, en étant à jeun, et après des aliments quelconques, comme aussi en touchant le creux de l'estomac. — Sensation de froid ou sensation de brûlement à l'estomac.

Ventre. — Pression crampoïde, avec angoisse, dans les hypocondres, et surtout dans le foie. — Sensation et pesanteur du foie. — Élancements dans les régions du foie et de la rate. — Ventre ballonné et tendu. — Contractions dans le ventre, —des deux côtés de la région ombilicale. — Maux de rentre crampoïdes, surtout dans la région ombilicale. — Élancements et tranchées dans le ventre. — *Sensation brûlante dans le bas-ventre. — Gonflement dans le ventre, comme s'il y avait de l'eau, surtout au toucher et en se pliant en avant ou en arrière. — *Grondement fréquent et borborygmes dans le ventre. — *Production et expulsion de flatuosités abondantes, surtout après avoir mangé des acides. — Gonflement des glandes inguinales.

Selles. -- Selles dures, par petits morceaux, difficiles à évacuer. -- «Selles fréquentes. -- *Selles diarrhéiques non affaiblissantes. -- *Selles diarrhéiques, muqueuses, gris blanchâtre. -- «Selles diarrhéiques séreuses on non digérées. -- Selles involontaires de la consistance de la bouillie, avec sensation comme si on allait expulser un vent. -- Pendant la selle, sortie des boutons hémorrhoïdaux du rectum. -- Après la selle, ténesme. -- Déchirement,

cuisson et prurit à l'anus et au rectum.

Urines. — Envie pressante d'uriner, avec émission d'urine moins abondante, pâleur du visage, chaleur et soif. — *Emission fréquente et abondante d'une urine aqueuse, qui dépose immédiatement un nuage épais et blanc. — °Urine comme du lait, avec des morceaux sanguinolents et gélatineux. — °Urines fétides. — Flux d'urine, avec douleurs crampoïdes dans les reins. — Besoin pressant et irrésistible d'uriner. — °Urines comme dans le diabète sucré. — Angoisse et inquiétude avant d'uriner. — °Émission d'urine la nuit. — *Douleur brûlante dans l'urèthre, pendant et après l'émission des urines. — Constriction crampoïde dans la vessic. — *Douleurs incisives dans l'urèthre, en urinant. — °Gonorrhées chroniques, avec laxité des parties et de la membrane muqueuse.

Parties viriles. — Douleurs lancinantes dans le gland. — Fourmillement et vésicules suintantes autour du frein. — *Condylomes. — Éruption à la verge et au scrotum. — Gonflement
inflammatoire du scrotum. — Douleur des testicules au toucher.
— Douleur rongeante dans les testicules. — Gonflement des testicules, et cordon spermatique gros, dur et tendu. — Absence
d'appétit vénérien. — Érections fréquentes sans désir du cott. —
*Pollutions fréquentes et très-débilitantes. — Écoulement de
sperme, par les efforts que l'on fait pour aller à la selle.



563

Règles. — Pendant les règles, douleurs hépatiques. — Leucorrhée jaunâtre, pruriante, après les règles. — Ballonnement de

l'utérus, comme par des gaz.

Larynx. — Fort enrouement et âpreté dans la gorge. — Douleur contractive dans la fossette du cou, qui rétrécit la gorge. — *Toux provoquée par un chatouillement et un grattement dans le larynx, —ou au-dessus de l'épigastre, sèche le soir, et avec expectoration blanc jaunâtre, le matin. — *Toux avec vomissement des aliments, et mal de tête. — Expectoration pendant la toux, avec odeur et goût herbacés. — Toux, avec expectoration purulente et douleurs de poitrine:

Poitrine. — Haleine courte et impossibilité de parler d'une manière soutenue, par faiblesse de la poitrine. — Oppression crampoïde et contractive de la poitrine, comme si elle était serrée. — Faiblesse dans la poitrine, après avoir parlé. — Pression dans la poitrine, souvent crampoïde ou incisive. — Lancinations dans

les côtés de la poitrine.

Tronc. — Éruption douloureuse au toucher, au dos, aux omoplates, au cou et à la poitrine. — Fourmillement dans le dos et aux reins. — Tension et traction crampoide dans les muscles du cou, surtout en remuant la tête. — Miliaire au cou. — °Furoncles sous l'aisselle.

Bras. — Pression crampoïde aux bras, aux mains et aux doigts. —
Tractions et déchirements tressaillants dans les bras et les doigts. — Éruptions boutonneuses aux bras. — Douleurs tractives, incisives, dans les articulations des coudes, des mains et des doigts. — Faiblesse et tremblement des bras. — Ganglion sur le dos de la main. — Peau des mains et des doigts, sèche, ridée, aride. — Doigts morts, quelquefois d'un seul côté et d'une manière bien circonscrite. — Lancinations dans les doigts et leurs

articulations.

Jambes. — Gonflement et *furoncles aux fesses. — Douleurs de brisement dans les hanches et les cuisses, surtout en marchant et en se levant de son siège. — Crampe dans l'articulation coxofémorale, avec déchirement dans toute la jambe, insupportable en étant assis, et pendant le repos. — Douleurs pressives, crampoides, dans les cuisses, les jambes, les pieds et les orteils. — Déchirement dans toute la jambe, avec pesanteur dans les articulations. — Faiblesse des jambes, au point de tomber en faisant un faux pas. — Déchirement brûlant dans le tibia, la nuit. — Boutons aux genoux et aux jambes, qui deviennent confluents et se transforment en ulcères saignant facilement. — "Ulcères pruriteux aux jambes. — Sensation brûlante dans les pieds et à lu plante des pieds, avec excoriation entre les orteils. — Gonflement des pieds. — Sueur aux pieds. — Cors aux pieds. — Engelures aux orteils. — Gonflement de l'articulation du gros orteil, avec battement brûlant, et douleurs incisives et sourdes, au toucher.



56 I

PHYTOLACCA.

PHYT. - Phytolacca decandra. - Voy. IIALE, Remedes américains.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament a été employé jusqu'ic: avec succès contre : - Rhumatisme chronique, aggravé pendant le mauvais temps; Rhumatisme syphilitique du périoste, avec glandes cervicales et axillaires enflées, et aggravation nocturne. — Opisthotonos; Tétanos; Trismus. — Syphilis congéniale, avec affection de la gorge, ulcères aux parties génitales, douleurs violentes dans les bras et les jambes, avec gonflement ædemateux, taches d'un rouge pâle aux extrémités, à la face et au cou: Ophthalmie syphilitique, avec enflure rouge bleuâtre des paupières, surtout à gauche. granulations et douleur autour de l'orbite. - Parotite, avec formation d'abcès et fistules; Catarrhe nasal, avec obturation d'une narine, écoulement de l'autre et obturation complète en allant à cheval. - Angine granuleuse, avec sécheresse, sensation d'une boule ardente dans la gorge, en avalant, étranglement et incapacité d'avaler des liquides chauds; Angine couenneuse, avec grande prostration, impossibilité de rester debout ou de se redresser dans le lit. et violentes douleurs dans la tête, le dos et les membres. -Constipation chronique, avec douleurs passant comme des coups. le long du périnée jusqu'au milieu de la verge. — Dysménorrhée très-douloureuse, chez des femmes manifestement stériles; Ménorrhagie, avec augmentation simultanée des larmes, de la salive, de la bile et des urines. -- Gonflement douloureux des mamelles, empêchant le lait de sortir ; Abcès dans les mamelles, avec fistules, ulcères d'un mauvais aspect et sécrétion d'un pus sanieux; Excoriation très-douloureuse des mamelons; Anciennes cicatrices aux mamelles, empéchant le lait de bien sortir. — Sciatique, avec douleurs pressives, lancinantes et tiraillantes au côté extérieur de la cuisse, et aggravées par le mouvement et la pression extérieure, ainsi que la nuit.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Toutes les douleurs ont un caractère névralgique, et s'aggravent par le mouvement et la pression; les douleurs dans les extrémités affectent toujours les parties du côté extérieur. — Beaucoup de symptômes, surtout ceux de la tête, s'améliorent après le déjeuner; quelques souffrances abdominales disparaissent pendant la nuit; les douleurs de tête s'aggravent après le repas de midi; ceux de la poitrine, après mi-



363

nuit; ceux de la bouche, de la gorge et de l'estomac, ainsi que les symptômes des yeux et des paupières, le matin; la vue est pire, le soir. — Des douleurs internes se jettent parfois subitement sur les extrémités. — Bâillements fréquents et somnolence; sommeil agité, avec position couchée sur le ventre; nausée, étant réveillé, la nuit. — Furoncles : derrière l'oreille et sur le dos; pustule derrière l'oreille; éruption de petites taches, comme des lentilles et élevées sur la poitrine, avec prurit violent; beaucoup de douleurs sont suivies de prurit et de brûlement; douleurs dans d'anciennes cicatrices; suppuration dans des tumeurs indolentes. — Plusieurs symptômes sont accompagnés de chaleur. — Indifférence complète pour la vie, et grande répugnance pour les affaires du jour, le matin, en se réveillant.

Tête. — Vertige avec obscurcissement des yeux. — Sensation d'excoriation au fond du cerveau. — Douleur dans toute la tête; douleur sourde, continuelle, dans le sinciput, particulièrement après le repas de midi, ou avec oule plus fine. — Mal de tête avec nausée: au-dessus des sourcils; en marchant. — Aggravation des maux de tête en regardant en bas, ou en se baissant. — Cerveau comme meurtri, en descendant d'un endroit élevé sur le sol. — Affection catarrhale de la tête. — Douleur pressive, surtout dans les tempes, le sinciput et au-dessus des yeux. — Pression dans les tempes, avec sensation de constriction dans la région précordiale, comme au début d'un mal de mer. — Sensation d'excoriation dans la tête, comme si une migraine allait éclater, pire à droite et aggravée par le temps humide. — Douleurs fugaces, changeant de place, dans plusieurs parties de la tête, mais surtout du côté droit. — Chaleur dans la tête.

Youx. — Pression autour et en dedans des yeux, comme s'ils étaient trop volumineux. — Brûlement et cuisson dans les yeux, surtout à gauche, avec larmoiement abondant; cuisson dans les angles internes, pire à gauche, et fortement aggravée, le soir, à la lumière du gaz. — Sensation comme par du sable dans les yeux, surtout sous la paupière gauche, avec larmoiement de cet œil. — Sensation dans les yeux et le nez comme si un rhume allait survenir. — Impossibilité de fermer les yeux sans douleur, comme par excoriation, teute la matinée. — Agglutination nocturne des paupières. — Larmoiement continuel des deux yeux, amélioré au grand air. — *Gonfiement bleu rougeâtre des paupières, plus fort à gauche et le matin. — Photophobie, le matin. — Vue trouble. — Presbytie.

Oreilles et Nez. — Douleurs dans les oreilles, surtout du côté droit; trompe d'Eustache comme bouchée, du côté gauche, avec bruissement dans l'oreille et sensation comme si l'oule était diminuée, tandis qu'elle est en réalité beaucoup plus îne; oule plus fine, avec douleur dans le sinciput. — Coryza fluent. — Écoulement muqueux d'une narine, tandis que l'autre est bouchée, ou écou-



lement tantôt de l'une, tantôt de l'autre narine. — Obturatio complète du nez, en allant à cheval.

Face et Dents. — Pâleur de la face; chaleur de la face, surtou

Pace et Dents. — Pâleur de la face; chaleur de la face, surtou du côté gauche, après midi, ou bien avec rougeur, pieds froid et sensation de plénitude dans la tête; éruption du côté gauche de la lèvre supérieure. — Envie irrésistible de serrer les dents


Bouche et Gorge. — Petits ulcères à l'intérieur des joues, comme des ulcères mercuriels; sensibilité et chaleur du palais et de la langue; accumulation, dans la bouche, d'une salive jaunatre, d'un goût métallique; gonfiement du voile du palais. — Mal de gorge, avec enflure du voile du palais, avec accumulation, le matin, de mucosités épaisses et jaunatres, et amélioration après les avoir expectorées, ainsi qu'après le déjeuner; en avalant, ainsi qu'en tournant la tête à gauche, sensation comme s'il s'était formé une grosseur dans la gorge. — Endolorissement général des parties de l'arrière-gorge, se répandant vers la trompe d'Eustache. — Sensation d'une grande sécheresse dans la gorge, surtout le matin.

Symptômes gastriques et Estomac. — Goût de noisettes dans la bouche. — Appétit furibond; faim immédiatement après le repas: l'appétit ordinaire reste malgré les nausées. — Renvois, parfois avec salivation; nausées dans l'estomac, surtout pendant le mal de tête, ou étant réveillé la nuit; vomissement sans sensation désagréable dans l'estomac. — Pression dans l'estomac, le matin en se réveillant, avec accumulation d'eau dans la bouche.

Constriction dans les précors, avec pression dans les tempes.
Ventre et Hypocondres. — Douleur fouillante dans la partie supérieure et extérieure du foie, tous les matins, avant le jour, et rendant la marche impossible; douleur pénétrante, dans l'hypocondre droit, après minuit, ne permettant pas de rester couché sur le côté droit; violente douleur pressive dans l'hypocondre gauche, le soir, ne permettant point de rester assis, et se dissipant la nuit, en restant couché sur le côté douloureux. — Douleur et sensation d'excoriation dans l'hypocondre droit, pendant la grossesse. — Douleur névralgique dans les régions iliaque et inguinale du côté gauche; tranchées, toute la journée, et sortie de vents fétides.

Selles et Urines. — Selles dures; occunstipation chronique; diarrhée avec sensation de nausées dans les intestins; évacuations bilieuses abondantes. — Au milieu de la nuit, douleur névralgique, passant comme un coup, de l'anus, le long du périnée, jusqu'au milieu de la verge. — oEnvie pressante d'uriner. — Pissement abondant, la nuit.—oDouleur dans la région vésicale, en urinant et après avoir uriné. — Douleur dans la région des reins et sensation désagréable, le long des urethères. — Sédiment calcaire dans les urines; urines rouge foncé, déposant un sédiment couleur acajou, très-difficile à enlever.

566



567

Parties sexuelles. — Sensation roulante dans la prostate. — • Métrorrhagie; • règles trop abondantes et trop hatives; • menstruation douloureuse; • douleurs de ventre violentes, pendant les règles, chez une femme infertile; • flueurs blanches. — • Inflam-

mation, gonflement et suppuration des mamelles.

Larynx et Poitrine. — Chatouillement au côté gauche de la trachée, avec toux d'irritation, endolorissement du côté droit de la poitrine et grande sécheresse de la gorge; toux bronchique sèche, avec sensation de raucité et de chaleur dans la trachée et les bronches. — Haleine courte. — Douleur dans le côté droit de la poitrine, jusqu'au dos, se manifestant en respirant profondément et en effaçant les épaules, et s'améliorant dans l'après-midi; ou s'aggravant après minuit, en restant couché sur le côté droit, empêchant le sommeil et disparaissant le matin, après s'être levé. — Sensibilité dès muscles de la politrine, comme s'ils étaient contusionnés. — Secousses douloureuses dans la région du cœur, suivies d'une douleur semblable dans le bras droit.

Tronc. — Douleur dans la région lombaire droite, suivie immédiatement d'un prurit violent. — Douleur persistante dans l'omoplate gauche, comme à la suite d'un coup, et de temps en temps, sensation comme si l'on y appuyait dessus un morceau de fer froid — Sensation de pression et de lourdeur sur les deux omoplates, comme après avoir porté une lourde charge. — Roideur du côté droit de la nuque, plus forte au lit, après minuit. — Sensation d'une tension pressive dans les deux parotites; dureté d'une glande au côté droit de la nuque; suppuration d'une tumeur der-

rière l'oreille, avec écoulement de pus et de sang.

Membres supérieurs. — Endolorissement sourd et sensibilité au haut de l'épaule et au bord supérieur du muscle trapèse, augmenté en pressant sur les parties et en contractant le muscle. — Endolorissement de tous les muscles de l'épaule gauche, dans toute leur épaisseur. — Pressen et sensibilité des parties extérieures de l'un ou l'autre bras, au-dessus du coude, comme à la suite d'une contusion, avec aggravation en pressant les parties et en étendant le bras. — Faiblesse et douleur dans l'os du bras droit, avec aggravation par le mouvement et la pression. — Douleurs rhumatismales dans les avant-bras, les mains et les doigts. — Douleurs picotantes dans le bout des doigts, comme par des étincelles électriques.

Membres inférieurs. — *Sciatique; douleurs névralgiques dans les parties extérieures des cuisses, et dans l'aine gauche. — Lourdeur dans les genoux, avec fatigue, après une petite promenade; lourdeur dans les extrémités inférieures, comme si elles étaient endormies. — Douleurs rhumatismales aux genoux, avec sensation, comme si les museles étaient trop courts, et surtout par un temps humide; — Douleur au pied droit et au



PHYTOLACCA. - PLATINA.

cou-de-pied, vers 4 heures du matin. - Pieds froids, avec augmentation de la circulation capillaire à la tête et à la face. — Forte sueur aux pieds, surtont sous les orteils. — Douleur névralgique au gros orteil droit, au milieu de la nuit; douleur dans la partie charnue du pied droit et dans un cor.

PLATINA.

PLAT. — Platine. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 140. — Doses usitées: 6, 30. — Durée d'action: 40 à 50 jours, dans quelques affections chroniques.

ANTIONTE: Puls. — On l'emploie comme antidote de: Plumb.
COMPARER AVEC: Ang. asa. bell. canth. croc. fer. hyos. lyc. magn. mang. natr. nitr-ac. plumb. puls. rhus. sabad. stram. stront. valer. verb. — C'est surtout après bell. que le Platina est efficace, lorsqu'il se trouve indigné.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections diverses du sexe féminin, et principalement des femmes irritables, qui ont les règles abondantes et l'appétit vénérien trèsprononcé; Souffrances par l'abus du plomb; Suites fâcheuses d'une colère ou d'une mortification; Névralgies et névroses; Catalepsie. éclampsie et autres affections spasmodiques; Spasmes hystériques: Manie; Mélancolie; Hystérie; Céphalalgies nerveuses et hystériques; Névralgie faciale; Odontalgies nerveuses et congestives; Péritonite puerpérale?; Colique saturnine; Constipation par suite de voyages en voitures; Dysménorrhée; Métrorrhagie, même après l'accouchement, ou à la suite d'un avortement; Constipation, nymphomanie, Éclampsie, et autres affections des femmes en couche, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

568

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Douleurs compressives, crampoïdes, constrictives ou pressives, comme par la présence d'une cheville, ou bien comme de coups obtus. - Douleurs crampoïdes. tressaillantes et tractives, dans les membres et les articulations. - Tension dans les membres, comme s'ils étaient entourés de ligatures trop serrées. - Douleurs comme après une contusion, un coup, ou une meurtrissure, surtout en pressant sur la partie affectée. - Douleurs faibles à leur début, qui augmentent peu à peu, souvent à intervalles réguliers, et diminuent de la même manière, - OSensation de torpeur et d'enroidissement paralytique à diverses parties, souvent avec tremblement et battement



569

de cœur. — ⁶Accès de roideur spasmodique des membres, sans perte de connaissance, mais avec serrement des mâchoires, perte de la parole, yeux convulsés et mouvements involontaires des commissures des lèvres et des paupières. — Les accès de spasmes se manifestent surtout au point du jour. — *Affections à la suite d'une frayeur, d'une mortification, ou d'une colère. — Affections morales et physiques alternant les unes avec les autres; quand les unes se manifestent, les autres se dissipent, et vice versa. — Faiblesse excessive. — Inquiétudes fourmillantes, sensation de faiblesse et tremblement dans les membres, surtout dans le repos et en plein air. — La plupart des symptômes sont aggravés dans le repos, et soulagés par le mouvement. — Les affections qui sont soulagées en plein air sont généralement aggravées vers le soir, et dans l'appartement.

Peau. — Rongement fourmillant, avec douleur d'excoriation, et prurit ou douleur brûlante, picotante et lancinante, avec besoin de gratter à diverses parties de la peau. — Ulcères (aux doigts

et aux orteils).

Sommeil.—Bâillements convulsifs et spasmodiques, surtout après midi. — Forte envie de dormir, le soir. — Sommeil prolongé, le matin. — Rêves anxieux, de guerre et de sang répandu. — Réves lascifs. — Réveil, la nuit, surtout après minuit, avec pensées finxieuses, tristes et pénibles. — Étourdissement, la nuit, en se réveillant. — La nuit, on est couché sur le dos, les bras passés au-dessus de la tête, les jambes retirées, et l'on éprouve le besoin de les découvrir.

Fièvres. - Frissonnement continuel et horripilation par tout le

corps, surtout en plein air.

Moral. - *Tristesse, "surtout le soir, avec grand besoin de pleurer, souvent (tous les deux jours), alternant avec gaieté folle et bouffonnerie. - *Pleurs involontaires. - Cris au secours, de toutes ses forces. - *Angoisse de cœur excessive, avec peur excessive de la mort, qu'on croit très-prochaine, accompagnée de tremblement, battement de cœur et gêne de la respiration. - Peur avec tremblement des mains et des pieds, et désordre des idées, comme si toutes les personnes qui s'approchent étaient des démons. - Humeur hystérique, avec grand accablement moral, faiblesse nerveuse et surexcitation du système vasculaire. Disposition à s'effrayer. — Grande irritabilité, avec mauvaise humeur, longtemps encore après qu'on s'est mis en colère. Indifférence apathique et distraction. - *Orgueil et trop bonne opinion de soi-même, avec dédain pour tous les autres, même pour ceux qu'on vénère et qu'on aime le plus, surtout dans l'appartement, moins au grand air et au soleil. - Distraction et oubli. Perte de connaissance. - Divagations. - Erreurs des sens; il semble que l'on soit très-grand, et qu'au contraire toutes les autres choses ou personnes soient très-petites et très-



basses. — Envie irrésistible d'une mère, d'assassinar es enfant.

Tôte. — Embarras tensif, comme s'il y avait un étau devant la tôte — Accès passager de vértige, le soir, avec perte de connaissance … Maux de tête qui augmentent peu à peu, ou par accès, jusqu'à devenir très-violents, et s'affaiblissent dans la même progression. — Accès de maux de tête, avec nausées et vomissements. — Sensation de torpeur dans la tête, et à l'extérieur, au vertex. — Douleur dans les côtés de la tête, comme par la présence d'une cheville. — *Douleurs pressives, crampoïdes, dans le front et les tempes, surtout à la racine du nez, comme une compression, fortement aggravées par le mouvement et en se baissant, equequefois avec chaleur et rougeur de la face, inquiétude et pleurs, ou arec leucorrhée. — eFourmillement dans les tempes, comme par des insectes. — eBourdonnement et bruit dans la tête, comme celui que ferait un moulin. — Sensation de contraction du cuir chevelu, au vertex.

Youx. — Douleurs dans les yeux après s'être fatigué la vue à regarder un objet. — Tension dans les orbites, avec douleur rongeante d'excoriation aux bords. — *Douleur crampoide aux bords des orbites. — Tension compressive dans le globe des yeux. — Pression dans les yeux avec sommeil. — Fourmillement dans les angles des yeux. — Sensation de chaleur ou de froid, et cuisson dans les yeux. — Tremblement ou frémissement spasmodique des paupières. — °Yeux convulsés. — Les objets paraissent plus petits qu'ils ne le sont en effet. — Vue trouble, comme à travers un voile, souvent avec tiraillements indolores autour de l'œil. — Tremblement et scintillement devant la vue.

Oreilles. — Otalgie avec douleur crampoïde. — Secousses dans les oreilles. — Sensation de torpeur et de froid dans les oreilles, jusque dans les joues et les lèvres. — Fourmillement rongeant dans les oreilles. — *Tonnerre sourd et roulement dans les oreilles.

Nez. — Douleur crampoide, avec sensation de torpeur au nez. —
Besoin inutile d'éternuer et fourmillement dans le nez.—*Coryza
sec. souvent d'un seul côté.

Visage. — Visage pâle, hâve. — Chaleur brûlante et rougeur ardente de la face, avec soif violente et sécheresse de la bouche, surtout le soir. — Distorsion des muscles de la face. — Sensation de froid, avec fourmillement et *sensation de torpeur de tout un côté de la face:—Crampe et pression tensive dans les pommettes. — °Fouillement pulsatif dans les mâchoires, surtout le soir, et pendant le repos, avec pleurs involontaires. — Rongement avec douleur d'excoriation, qui oblige à gratter, aux lèvres et au menton. — Vésicules cuisantes et lancinantes aux lèvres. — Lèvres

seches, gercées. — Réseau veineux rouge bleuâtre, au menton. —





Sensation de torpeur ou de froid autour de la bouche et au menton. - Crampe de la mâchoire.

🗕 *Odontalgie, avec douleur pulsative et fouillante. -Traction crampoide, et par accès, dans les dents. — Crevasses

aux gencives.

Bouche et Gorge. — Douleur brûlante sous la langue. — Sensation sur la langue, comme si elle était brûlée. — Sensation. comme si la gorge était à vif, pendant et hors le temps de la déglutition (à vide). — Traction crampoide dans la gorge, comme un étranglement. — Sensation d'allongement de la luette. — Grattement et accumulation de mucosités dans la gorge. - Renâclement de mucosités.

Appétit. — Goût muqueux, pâteux. — Goût douceâtre, sur le bout de la langue. — Absence de soif. — Perte de l'appétit, dès la première bouchée.—*Perte complète de l'appétit. — Répugnance pour les aliments par l'effet de la tristesse. — Dégoût de la viande. — Bouttmie; on mange avec une vitesse vorace, avec disposition a measurer toutes choses. — *Après le repas, renvois, pression à l'estende et coliques.

Estomac. — Besoin inutile d'expulser des renvois. — Renvois à vide, bruyants. — Sérosités d'une amertume douceâtre et désagréable, qui remontent dans la gorge, et font qu'on s'engoue facilement. — Nausées continuelles, avec lassitude, tremblement et anxiété. — *Pression à l'estomac, surtout après le repas. — Douleur contractive au scrobicule comme si l'on était trop serré. — Pression aux secousses, ou bien battement, élancements et pincements au scrobicule. — Sensation brûlante dans le scrobicule, quelquefois aussi depuis la gorge jusque dans le ventre.

Ventre. — Maux de ventre, avec pression sourde et saccadée. Ballonnement du ventre, avec expulsion difficile et interrompue des flatuosités. — *Constriction dans le ventre. — Pincements dans la région ombilicale. — Élancements dans les côtés du ventre et la région ombilicale. - Rongement dans le ventre. -

Tractions dans les aines, partant du sacrum.

Selles. — *Constipation, quelquefois très-opiniâtre. 4 Besoin fréquent, avec selles peu abondantes, par morceaux, et expulsées sculement avec de grands efforts. — Selles de la consistance de la bouillie. - Ténia et ascarides du rectum, pendant et hors le temps des selles. - Après la selle, horripilation générale, ou sensation de faiblesse dans le ventre. - Fréquemment, fourmillement pruriant et ténesme à l'anus, surtout le soir. - Lancinations violentes et obtuses dans le rectum.

Urines et Parties génitales. — Urine rouge, avec nuage blanc, ou bien se troublant et déposant un sédiment rouge. — Écoulement des urines, lent, mais fréquent. — Douleur brûlante et rongement au scrotum. — Exaltation peu naturelle de l'appétit rénérien, avec érections fréquentes, surtout la nuit. — *Roule-



572

٠,٠

ment de liqueur prostatique. — Coît de trop courte durée et avec

peu de jouissance.

Régles. — Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales, avec pression dans le bas-ventre. — *Exaltation peu naturelle de l'appétit vénérien, chez la femme, avec sensibilité douloureuse et —fourmillement voluptueux dans les parties génitales internes et externes.— o'Induration de l'utérus. — Conges nitales internes et externes.— o'Induration de l'utérus. — Conges nitales, foncé, avec tractions dans les aines. — *Règles trop hâtives et trop abondantes, oquelquefois avec mal à la tête, inquiétude et pleurs.— *Règles de trop longue durée. — Avant les règles, tranchées et douleurs comme celles de l'enfantement, dans le bas-ventre. — Crampes au début des règles. — *Pendant les règles, pression comme si tout se portait vers les parties génitales, qui sont très-sensibles. — Leucorrhée comme du blanc d'œuf, coulant surtout après avoir uriné et en se levant de son siége.


Poitrine. — °Aphonie. — °Toux courte et sèche. — Haleine courte, avec oppression constrictive de la poitrine. — Oppression anxieuse de la poitrine, avec sensation de chaleur qui remonte de l'épigastre. — °Respiration courte, difficile et anxieuse. — Douleur de poitrine, comme s'il y avait un fardeau qui pressât dessus, avec besoin de respirer profondément qui est empêché par une sensation de faiblesse. — °Tension, pression et élancements dans les côtés de la poitrine, qui ne permettent de se coucher ni d'un côté ni de l'autre. — Pression et coups obtus dans la poitrine. — Pression crampoïde dans un côté de la poitrine. — Douleur crampoïde dans la poitrine, commençant faiblement, augmentant jusqu'à une certaine intensité, et diminuant dans la même progression. — Lancinations sourdes, dans les côtés de la poitrine, en inspirant. — Battement de cœur anxieux.

Tronc. — Douleur brisement aux reins et dans le dos, surtout en pressant dessus, ou bien en se penchant en arrière. — Douleur crampoide aux reins. — Sensation de torpeur dans le coccyx. — Roideur de la nuque. — Faiblesse et sensation de torpeur tensive

dans la nuque.

Bras. — Pesanteur et lassitude des bras, avec tiraillement paralytique. — Pression et douleur crampoïde dans les avant-bras, les mains et les doigts, surtout en tenant solidement un objet. — Rongement pruriant, picotement et sensation brûlante dans les bras, les mains et les doigts. — Sensation de roideur dans les avant-bras. — Battement douloureux dans les doigts. — Distorsion des doigts. — Torpeur des doigts. — Ulcères aux doigts.

Jambes. — Douleur crampoïde et tension dans les cuisses, les pieds et les orteils. — Faiblesse des cuisses et des genoux, comme si ces parties étaient brisées. — Secousses et coups dans les jambes. — *Lassitude des jambes. — Agitation et tremble-



PLATINA. - PLUMBUM.

573

ment dans les jambes, avec sensation d'engourdissement et od'enroidissement. — Lassitude et torpeur dans les pieds, en étant assis. — o'Froid aux pieds. — Rongement, excoriation et cuisson aux malléoles, fortement aggravés par le moindre contact. — Battement douloureux dans les orteils. — Gonflement de la partie charnue de l'orteil, avec déchirement et pulsations nocturnes. — Ulcères aux orteils.

PLUMBUM.

PLUMB. — Plomb. — HARTLAUB et TRIKES. — Hist. nat. et prép. Ver. Pharmac. homosop., p. 441. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 30 hab jours dans des affections chroniques.

Anthores: Alum. bell. hyos. op. plat. stram. et electricitas.

COMPAREN AVEC: Alum. bell. chim. con. fer. hyos. natr-m. n-vom. op. phos. plat. pals. rhus. sabad. sep. stram. zinc.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre quelques espèces de Constipation.

SYNPTONES GÉNÉBAUX. — Tractions et déchirement dans les membres, plus violents la nuit, se transportant parfois à un autre endroit par l'effet du grattement. — Sensation Mainte à diverses parties du corps. — Violentes douleurs ostéocopés, four-millantes et par accès. — Crampes et douleurs constrictives dans les organes internes. — Transissement, roideur, courbure et raccourcissement de quelques membres. — Paralysies. — — Tremblement convulsif et tressaillement des membres, convulsions et crampes, quelquefois suivies de paralysies. — Attaques d'épilepsie. — Evanouissements, surtout dans une assemblée nombreuse. — Pesanteur et paresse dans les membres. — Grande faiblesse arec tremblement des membres. — Après une léger exercice, abattement avec besoin de se coucher, et pulsation dans tout le corps. — Muscles flasques et nombrés. — Amaigrissement général, et surtout des parties paralysés univi du gonflement de ces parties. — Gonflement hydropique, quelquefois de tout le corps. — Sensibilité au grand air. — Les symptômes se développent lentement et disparaissent quelquefois pendant un certain espace de temps, pour reparaitre ensuite. Peau. — Couleur plombée, bleuûtre ou jaunátre de la peau. —

Taches d'un brun foncé, sur tout le corps. — Inflammation facile et suppuration de légères blessures. — Douleur brûlante dans les ulcères. — Excoriations. — Décubitus. — Sphacèle.



PLUMBUM.

Sommeil. — Forte envie de dormir le jour; on s'endort facile ment, même en parlant. — Sommeil et somnolence, quelquefois avec engourdissement. — Sommeil tardif. — Insomnie nocturne avec crampes abdominales. — Tressaillements pendant le sommeil. — Affluence de rêves, quelquefois lascifs, avec érections. — Paroles pendant le sommeil.

Fièvre. — Prédominance des frissons et du froid, surtout dans les membres et en plein air. — Sueurs froides ou visqueuses. —

Chaleur fugace, anxieuse.

574

Moral. — Mélancolie tuciturne et abattement. — Grande angoisse et inquiétude, avec soupirs. — Ennui et éloignement pour la conversation et le travail. — Découragement. — Dégoût de la vie. — Faiblesse de la mémoire. — Imbécillité. — Démence. — Manie. — Divagations. — Fureur. — Délires furieux, parfois avec aspect d'un fou.

Tête. — Tête entreprise, lourde, comme par apathie et mélancolie. — Étourdissement, au point de tomber sans connaissance. — Ivresse. — Vertiges, surtout en se baissant, ou en regardant en l'air. — Mal de tête, comme par une boule qui, de la gorge, monterait dans le cerveau. — Pesanteur de la tête, surtout à l'occiput et au front. — Déchirement dans le front et les tempes. — Maux de tête lancinants. — Congestion à la tête, avec pulsation et chaleur. — Grande sécheresse des cheveux. — Chute des

cheveux, même des sourcils et des moustaches.


Yeux. — Douleur pressive et très-sensible, comme si le globe de l'œil était trop volumineux. — Pesanteur des yeux, pendant le mouvement. — Paralysie des paupières. — Contraction dans les yeux et les paupières. — Déchirement dans les paupières, avec sommeil. — Congestion sanguine aux yeux. — Inflammation des yeux et de l'iris. — Agglutination nocturne des yeux. — Gonflement des yeux. — Couleur jaunâtre de la sclérotique. — Occlusion spasmodique des paupières. — Yeux convulsés. — Pupilles contractées. — Vue trouble, comme à travers un brouillard, qui force à se frotter les yeux. — Myopie. — Cécité, comme par amaurose.

Oreilles. — Déchirement dans les oreilles. — Térébration et élancements dans les oreilles. — Sensibilité au bruit. — Diminution

quelquesois subite de l'oule. — Surdité.

Nez. Nez froid. — Inflammation érysipélateuse du nez. — Vésiculés purulentes dans les angles du nez, qui sont rouges.—Odeur fétide du nez. — Perte de l'odorat. — Obturation du nez. — Accumulation de mucosités tenaces dans les narines, et qui ne peuvent être expulsées que par les fosses nasales.—Coryza fluent, avec écoulement de mucosités séreuses.

Visage. — Face pâle, jaune, hippocratique. — Air d'un aliéné. — bouffissure de la face. — Gonflement d'un seul côté de la face. — Peau luisante, huileuse, à l'œil et au toucher. — Déchirements



PLUMBUM.

575

dans les os des máchoires; se dissipant par la friction, ou reparaissant à un autre endroit. — Térébration dans la mâchoire inférieure. — Exfoliation des lèvres. — Crampes de la mâchoire.—Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Douleurs déchirantes, tressaillantes, dans les dents. aggravées par les choses froides. — Dents enduites de mucosités jaunâtres. — Dents qui se noircissent. — Dents fétides, cariées, qui s'ébrèchent. — Vacillement et chute des dents. — Grincement des dents. — Gencives pâles, gonflées. — Nodosités douloureuses et dures aux gencives.

Bouche. — Sécheresse de la bouche. — Accumulation abondante de salire doucedtre, dans la bouche, avec sécheresse du gosier. — Salivation. — Écume dans la bouche. — Mucosités visqueuses dans la bouche, le matin, au réveil. — Crachement de sang. — Aphthes et ulcères fétides dans la bouche. — Inflammation, gonflement et pesanteur de la langue. — Langue brune, sèche, avec rhagades. — Langue verte, ou chargée d'un enduit jaune. — Parole empêchée.

Gorge.—Mal de gorge, comme par un gonflement, ou par la présence d'un corps étranger dans le gosier. — Sensation d'une boule qui remonterait dans la gorge. — Sensation d'étranglement dans la gorge. — Paralysie du gosier arec impossibilité d'avaler. — Traction dans la gorge, en mangeant, comme si l'œsophage allait s'arracher. — Sensation comme si un insecte rampait dans l'œsophage. — Inflammation et induration des amygdales.

Appétit.—Goût douceâtre ou amer.—Goût sulfureux, acide, dans le fond de la gorge. — Forte soif d'eau froide. — Absence d'appétit. — Faim violente, même peu de temps après le repas. —

Grand désir de pain et de friture.

Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois à vide, quelquefois très-violents et douloureux. — Renvois douceâtres. — Hoquet. — Régurgitation d'eau douceâtre ou aigre. — Dégoût et nausées fréquentes, avec envie de vomit, quelquefois avec vomiturition. — Vomissements continuels et violents des aliments ou de matières rerdâtres et noirâtres, ou jaunâtres, avec douleurs violentes dans l'estomac et le ventre. — Vomissements de bile ou de sang. — Vomissement de matières fécales, avec coliques et constipation. — Douleurs des plus riolentes à l'estomac. — Sensation de pesanteur et pression dans l'estomac, quelquefois après le repas. — Pression sourde et anxiense dans le scrobicule. — Crampes d'estomac, constituires. — Élancements depuis le creux de l'estomac jusque dans le dos. — Tranchées et douleur brûlante dans l'estomac. — Inflammation de l'estomac.

Yentre. — Douleur au fois, evec pression lancinante. — Affections de la rate. — Douleurs abdominales des plus violentes, avec



PLUMBUM.

576

rétraction de l'ombilic. — Ballonnement et dureté du ventre. Coliques violentes, avec douleur constrictive, surtout dans la région ombilicale, avec forte contraction de l'abdomen, formant quelquefois des grosseurs et des enfoncements, aggravées par le moindre contact, et quelquefois portées, la nuit, au degré le plus violent. - (Pincements et tranchées dans le ventre.) - Elancements autour de l'ombilic. - Sensation dans la partie supérieure et les côtés du ventre, comme si quelque chose s'en arrachait et tombait. - Pulsation dans le ventre. - Sensation brûlante, ou froid dans le ventre. - (Inflammation des intestins).-Nodosités dures dans le ventre, comme par des indurations internes. Douleur de brisement dans les muscles abdominaux, aggravée par le mouvement et le toucher. - Production et incarcération continuelles de flatuosités, avec grondement et borborygmes dans le ventre. - Expulsion abondante de flatuosités très-fétides et chaudes, brûlantes. - Dans le rectum, besoin très-pressant d'expulser des vents, sans aucun résultat.

Selles .- *Constipation des plus opiniatres .- Envie continuelle et inutile d'aller à la selle. — Selles difficiles à évacuer, dures, quelquefois en boulettes, comme des crottes de mouton, et tenaces. — Selles dyssentériques. — Diarrhées de longue durée, généralement d'excréments jaunes, ou bien douloureuses, et souvent très-fétides. - Diarrhées sanguinolentes. - Rétraction douloureuse et constriction de l'anus. - Chute du rectum.


Urines. - Rétention d'urine. - Émission d'urine difficile et goutte à goutte. - Ténesme de la vessie. - Émission d'urine plus fréquente et plus abondante. - Urine aqueuse, ou rougeatre, enflammée, trouble et quelquefois épaisse. — Écoulement de sang

par l'urèthre.

Parties génitales. - Gonflement et inflammation des parties génitales (de la verge et du scrotum). — Etranglement et constriction dans les testicules, avec tressaillement dans le cordon spermatique. — Rétraction des testicules. — Excoriation du scrotum. Exaltation excessive de l'appétit vénérien, avec érections et pollutions fréquentes. - Ecoulement de sperme insuffisant, pendant le coît. — (Impuissance?) — Leucorrhée. — Avortement.

Larynx. — Enrouement et âpreté dans la gorge. — Aphonie. Constriction de la gorge. - Expectoration abondante de mucosités du larynx, visqueuses, transparentes, ou vert jaunâtre et en globules. — Toux seche, convulsive. — Expectoration de pus par la toux. — Toux avec expectoration de sang.

Poitrine. — Respiration difficile, anxieuse, oppressée et haletante. Haleine courte. - Asthme spasmodique. - Oppression de poitrine, reparaissant périodiquement. - Accès de suffocation. - Pression à la poitrine, surtout en respirant profondément et en riant. - Elancements dans la poitrine et les côtés, quelquefois avec étouffement de la respiration. — Bouillonnement dans la



PLUMBUM. — PODOPHYLLUM PELTATUM.

poitrine, avec angoisse dans la région du cœur, et palpitations sensibles.

Tronc. — Déchirements et élancements aux reins, dans le dos et entre les omoplates. — Déviation de la colonne vertébrale. — Tension dans la nuque et jusque dans l'oreille, en remuant la tête.

Bras. — Mouvements convulsifs des bras et des mains, avec douleurs dans les articulations. — Traction et déchirement dans les bras et les doigts. — Faiblesse et paralysie douloureuse des bras et des mains. — Ganglion sur le dos des mains. — Difficulté de remuer les doigts. — Plaques rouges et gonflées aux doigts.

Jambes. — Traction dans l'articulation cono-fémorale, en étant couché. — Sensation douloureuse de paralysie dans les articulations coxo-fémorales, celles des genoux et des pieds, surtout en montant un escalier. — Paralysies des cuisses et des pieds. — Engourdissement des jambes et des pieds. — Déchirement et élancements dans les cuisses et les genoux. — Sensation de torpeur dans les pieds, avec difficulté de s'appuyer dessus. — Crampes dans la plante des pieds. — Gonflement des pieds. — Sueur fétide des pieds. — Distossion des orteils.

PODOPHYLLUM PELTATUM.

PODOPH. - Voy. HALE, Remèdes américains.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament a été employé avec succès contre : — Atrophie des enfants scrofuleux, avec garderobes fréquentes mais normales, ou avec diarrhée matutinale; Dentition difficile des petits enfants; Gastrite, avec aigreurs, renvois de gas chauds, très-aigres, soif et vomissement de matières bilieuses mélées de sang, avec des contractions de l'estomac tellement denloureuses qu'elles forcent à jeter de hauts cris; Hépatite chronique et dégénérescence du foie, avec douleur, plénitude et sensation d'emoriation dans l'hypocondre droit, forçant à frotter constamment cette région avec les mains; Jauniese, avec des calculs hépatiques, douleurs depuis l'estomac, jusqu'à la région de la vésicule bilieuse et nausées violentes; Catarrhée intestinal, avec diarrhée plus forte le matin et changeant constamment de couleur, tantôt verdâtre, tantôt jaunâtre, tantôt blanchâtre. — Colique spasmodique, avec rétraction des muscles abdominaux, ou contraction de ces muscles en nœuds; Coliques ghes les enfants, par suite d'une indigention, avec accès tous les matins au point du joux; Diarrhée publicule la dentition, avec ces, grincement de dentitée.




PODOPHYLLUM PELTATUM.

agitation de la tête d'un côté à l'autre, et selles verdatres; Choléra des enfants, avec garde-robes très-fétides, plus fréquentes le matin, avec yeux à demi-fermés et gémissement dans le sommeil; Diarrhée des enfants, avec selles verdatres, aqueuses, et chute du rectum ; Dyssenterie des enfants, avec selles verdatres, muqueuses et sanguinolentes, et forte jactation de la tête; Constipation, avec selles difficiles, chute du rectum, urines fréquentes, douleur et faiblesse au dos; Hémorrhoïdes, avec chute du rectum, et avec diarrhée empirant le matin, ou avec constipation, flatulence et mal de tête; Leucorrhée, avec écoulement d'un mucus épais et transparent, constipation, pression en bas, vers les parties, chute du rectum ou de la matrice; Fausses positions de l'utérus, avec constipation, chute facile du rectum, urines fréquentes, dos faible et douloureux, surtout après avoir lavé; Chute de la matrice, surtout à la suite de l'accouchement, avec chute simultanée de l'anus et plusieurs selles par jour.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — La plupart des symptômes, mais surtout ceux de l'abdomen, s'aggravent le matin et s'améliorent le soir. — Peau moite, avec chaleur anormale; muscles mous. avec faiblesse, chez des enfants; occuleur terreuse de la peau, chez les enfants. - Pendant la fièvre, frissonnement en se remuant et en se couchant, suivi immédiatement de sueur; ofrissonnement, le soir, en se couchant, puis fièvre avec sommeil troublé par des paroles et réveil incomplet; ofièvre avec constipation; ofièvre avec paroles incoherentes; ofièvres tierces, quartes et quotidiennes; ofrisson le matin, à 7 heures, avec douleurs dans les hypocondres, les genoux, les malléoles, les coudes et les poignets; edouleur au dos, avant le frisson; ele grelottement et la sensation de froid persistent encore pendant quelque temps après le début de la chaleur; esoif plus prononcée pendant la chaleur que pendant les frissons; ependant le frisson, incapacité de parler, faute de trouver les mots qu'on voudrait prononcer; opendant la chaleur, délire et loquacité, sans souvenir de ce qui s'est passé; opendant la fièvre, mal de tête violent avec forte soif; opendant la sueur, sommeil; odans l'apyrexie, manque d'appétit. - Somnolence le jour, surtout dans la matinée, avec borborygmes; envie de dormir de trop bonne heure, le soir, avec sommeil profond, la nuit; malaise le soir, après le premier sommeil; *gémissement la nuit, avec yeux à demi-fermés; le matin, réveil difficile, sommeil non réparateur.

Tête. — Vertige en restant debout, avec disposition à tomber en avant; vertige, avec sensation de plénitude au-dessus des yeux, ou avec des secousses douloureuses dans le sinciput, qui forcent de fermer les yeux; odélire et loquacité pendant la flèvre.

-- Douleur dans le sinciput, le matin, en se levant; pression dou-



PODOPHYLLUM PELTATUM.

loureuse dans les tempes, dans la matinée, avec tiraillement dans les yeux, comme si l'on devait se mettre à loucher; céphalalgie stupéfiante, traversant les tempes, améliorée par la pression extérieure; mal de tête le matin, avec chaleur au vertex. — Jactation de la tête, pendant la fièvre de dentition, avec sueur à la tête pendant le sommeil. — Douleur subite dans le sinciput, le soir, avec mal à la gorge. — Mal de tête alternant avec diarrhée. — oMal de tête le matin, avec face rouge. — Douleur violente dans le sinciput, avec sensation d'excoriation au-dessus de l'endroit affecté. — Pendant les maux de tête, tiraillement et sensation de plénitude dans les yeux. — Douleur dans les tempes et le globe des yeux, avec chaleur et pulsation des artères temporales.

Bouche et Gorge. — Les dents sont, le matin, couvertes de mucosités desséchées; ogrincement de dents, la nuit, surtout chez les enfants pendant la dentition. — Forte salivation; omauvaise odeur de la bouche, dont on s'aperçoitsoi-même; goût dans la bouche, comme du foie rôti, la nuit; aigreurs dans la bouche, bouche et langue sèches, au réveil, le matin; oenduit blanc sur la langue, avec mauvais goût de la bouche. — Gorge sèche; orâle muqueux dans la gorge; omal de gorge qui débute à gauche et passe à droite; mal de gorge du côté gauche, aggravé en

avalant des liquides et le matin. — Goître.

Symptômes gastriques. — °Rassassiement par peu d'aliments, puis nausées et vomissement; —perte de l'appétit; indifférence pour le manger; °boulimie. — °Goût putride dans la bouche. — °Désir de choses acides. — Soif, vers le soir; °peu de soif pendant la fièvre; °immédiatement après avoir bu et mangé, diarrhée. — °Aigreurs de l'estomac; °renvois aigres; °renvois de gaz très aigres; —après midi, aigreurs, avec sensation d'un malaise très-désagréable dans l'estomac; °régurgiation des aliments; °régurgitation d'eau; °pyrosis. — Nausées violentes, durant plusieurs heures; nausées et vomissement, avec plénitude dans la tête; vomissement de mucosités chaudes, écumeuses; °vomissement des aliments avec odeur et goût putrides; °vomissement des aliments une heure après le repas, et suivi de boulimie. — °Tout ce qu'on mange tourne immédiatement en aigreurs. — °Souffrances gastriques, avec moral déprimé.

Estomac et Ventre. — Chaleur dans l'estomac; sensation de vide dans l'épigastre; battement dans l'épigastre, puis diarrhée; celancements dans l'épigastre, en toussant. — *Plénitude dans l'hypocondre droit, avec sensation d'excoriation, ou avec fiatulence; élancements dans l'hypocondre droit, aggravés en mangeant; douleur tournoyante et chaleur dans l'hypocondre droit; chépatite chronique avec constipation. — Sensation de lourdeur et d'un tirailllement en has, dans l'hypocondre gauche; censation de fiatulence dans l'hypocondre gauche. — *Colique spasmodique, avec rétrac-



PODOPHYLLUM PELTATUM.

tion des muscles abdominaux, à 8 heures du soir, et à 5 heures du matin; douleur dans le colon transverse, à 3 heures du matin, suivie de diarrhée; douleur et borborygmes dans le colon ascendant. — Mal de ventre au point du jour, apaisé par la chaleur extérieure, et en se pliant en avant, étant couché sur le côté, mais aggravé en se couchant sur le dos. - Les maux de ventre s'accompagnent d'abord de froid, puis survient de la chaleur avec sueur : sensation de chaleur dans le ventre, avec envie d'aller à la selle. — Ventre comme vide, avec sensation de défaillance, après la selle. — Douleur aiguë au-dessus de l'aine gauche, empêchant

le mouvement, pendant la grossesse.


580

Selles et Urines. — Constipation avec flatulence et mal de tête; oselles dures, sèches et difficiles. — Selles le matin, avec forte pression dans le ventre, chaleur et douleur dans l'anus; *évacuations fréquentes, dans le jour, °avec yeux cernés; *Diarrhées, °aiguës ou chroniques, *s'aggravant le matin; °Diarrhée douloureuse avec cris et grincements de dents, pendant la dentition; petites selles muqueuses et gélatineuses, avec flatulence et douleur dans la région sacrale; oselles fréquentes, comme de la chaux, et très-fétides, avec vomiturition et forte soif, chez les enfants; ocholéra des enfants. — Selles: *verdâtres, le matin; ojaunâtres; omuqueuses, blanchâtres; ojaune foncé, d'une odeur cadavéreuse; ochaudes, aqueuses; oécumeuses; oles aliments sortent sans être digérés. - Ochute du rectum, surtout le matin, avec les selles diarrhéiques, chez les enfants aussi; pendant la selle, sensation comme si la matrice allait descendre. — *Incontinence d'urine; opissement au lit; *urines diminuées, oou même supprimées; ourines fréquentes, la nuit, pendant la grossesse.

Parties génitales. — Douleur lancinante, le long du cordon spermatique.—•Règles supprimées chez les jeunes filles, avec pression en bas, dans le ventre et la région lombaire. — Leucorrhée de mucosités épaisses, transparentes, avec constipation et pression en bas.— O Symptômes d'une descente de la matrice, avec flatulence, après l'accouchement. - Douleurs dans les ovaires, pendant la grossesse. — Dans les premiers mois de la grossesse, impoesibilité de rester couché autrement que sur le ventre. — • Enflure des lèvres de la vulve pendant la grossesse. — Tranchées trop

fortes, avec chaleur et flatulence.

Larynx et Poitrine. — Toux pendant la fièvre; ocoqueluche avec constipation et perte d'appétit. — Douleur de poitrine, aggravée par la respiration profonde, qui produit une sensation comme si un fil se cassait dans le poumon. — Besoin de respirer profondément, et soupirs; respiration courte; sensation d'étouffement, le soir, en se couchant. — Sensation dans la poitrine, comme si le cœur remontait jusque dans la gorge; douleur lancinante dans la région du cœur.— *Palpitations de cœur, après chaque effort ou toute émotion, osurtout chez les individus souffrant de borbo-



PODOPHYLLUM PELTATUM. — PEUNUS SPINOSA. 581

rygmes, ayant le sommeil profond, non réparateur, avec somnolence dans la matinée; palpitations avec gloussement qui

remonte dans la gorge et coupe la respiration.

Trone et Membres. — Moux de reins, en marchant et en restant debout, avec la sensation comme si le dos se courbait en avant; aggravés par un faux pas ou la marche sur un terrain inégal; douleur dans la région lombaire, avec sensation de froid, pire la nuit et pendant le mouvement; douleur entre les épaules, le matin; roideur de la nuque, avec endolorissement des muscles de la nuque et des épaules. — eRhumatisme dans l'avant-bras gauche et les doigts; faiblesse dans les poignets qui sont douloureux au toucher. — Faiblesse et douleur rhumatismale dans la hanche gauche, aggravée en montant les escaliers; douleur dans les cuisses, les genoux et les jambes, pire en se tenant debout; *faiblesse paralytique des articulations, esurtout du côté gauche, et aux genoux; craquement des genoux, en marchant; lourdeur et roideur des genoux au début de la marche; douleur dans les genoux, les jambes et les pieds, surtout la nuit. — Pieds froids; sueur aux viets, le soir.

PRUNUS SPINOSA.


PRUN. — Épine noire. — WARLE. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 202. — Dose usités : 30. — Durée d'action : Plusieurs se-maines dans quelques cas de maladies chroniques.

CLINIQUE.—On a jusqu'ici fait usage de ce médicament contre :

— Anasarque générale ; Ascite ; Diarrhée, etc., etc.

Tremblement dans tout le corps. — Inquiétudes dans le corps, avec haleine courte et oppression de poitrine. — Sommeil après le repas. — Sommeil nocturne tardif, et insomnie. — Réveil de trop bonne heure. — Lassitude le matin, comme après un sommeil non réparateur. — Sommeil plein de rêves et de rêvasseries. — Rêves de furoncles et de choses qui sont sales. — Frissonnement, surtout le soir. — Chaleur sèche de tout le corps, surtout aux parties génitales. — Sueur seulement au visage, pendant le sommeil. — Tristesse, indifférence, mauvaise humeur et morosité.

Tôte - Dents. - Peranteur de la tôte et vertiges. - Pression



PRUNUS SPINOSA.

dans la tête, principalement au front, à l'occiput et aux tempes.

— Violentes douleurs nerveuses dans la tête qui font perdre les idées et les sens. — La pression de la tête se manifeste le plus souvent du dehors au dedans. — Mal de tête comme par la chalcur du soleil. — Douleurs dans les yeux, comme si les gluies étaient arrachés. — Étreintes dans les oreilles. — Éternument fréquent. — Douleurs violentes, nérralgiques, ou douleurs de luxation aux dents, ou bien sensation comme si les dents étaient soulevées et arrachées. — Douleurs picotantes aux dents.

Bouche — Selles. — Élancements et douleurs brûlantes à la lan-— Langue chargée de mucosités blanchâtres. — Goût muqueux, pâteux, ou amer dans la bouche. - Satiété prompte en mangeant. — Nausées continuelles avec dégoût de tous les aliments, et diarrhée. - Plénitude, ballonnement et oppression dans le creux de l'estomac, avec haleine courte. - Douleurs pressives dans la région hépatique. - Violentes coliques spasmodiques, qui ne permettent de se coucher ni sur le dos ni sur les côtés, ni de marcher, excepté très-lentement; les douleurs diminuent en penchant le thorax en avant. - Coliques pressives à l'épigastre ou dans le côté droit du ventre, même la nuit. — Élance-ments dans le ventre, qui coupent la respiration. — *Gonflement hydropique du ventre, avec perte d'appétit, urines rares, selles dures et noueuses. — Incarcération de flatuosités, avec coliques spasmodiques et crampes de la vessie. - Élancements dans la région inguinale, et pression comme si une hernie allait s'établir.


— Selles difficiles, dures et noueuses. — *Diarrhée, -avec coliques et évacuation abondante de matières fécales. — Douleurs crampoïdes dans le rectum. — Après la selle, écoulement de sang par l'anus.

Urines — Règles. — Crampes de la ressie, même la nuit. —
Urines rares et brunes, — Jet d'urine filiforme. — Urines chaudes, corrosives. — Urine jaune clair, avec dépôt blanchâtre et parfois couleur bleu de ciel. — Strangurie. — Rétention d'urine spasmodique. — Ténesme de la vessie. — Violentes douleurs brûlantes dans l'urèthre, en s'efforçant d'uriner. — Douleur d'excoriation dans l'urèthre, surtout au toucher. — Flaccidité de la verge et rétraction du prépuce. — Prurit au scrotum, ainsi que dans la région des ovaires. — Écoulement d'un sang aqueux et pâle par la matrice. — Règles trop hâtives et trop abondantes, avec maux de reins.—Flueurs blanches corrosives et qui teignent

le linge en jaune.

Larynx et Poitrine. — Grattement et âpreté dans la gorge, avec envie de tousser. — En parlant, douleur dans la poitrine, avec voix faible. — Toux excitée par un chatouillement au larynx. — Toux sibilante. — Respiration oppressire, courte, difficile, anxieuse, haletante. — Sensation de pesanteur et d'oppression dans la poitrine. — La respiration s'arrête constamment au creux

582



PRUNUS SPINOSA. — PULSATILLA.

583

de l'estomac. — Douleurs sous le sternum, et oppression, avec plénitade au scrobicule et ballonnement du ventre.

Tronc et Membres. — Puleur d'ulcération aux reins. — Roideur au dos et aux reins, comme à la suite d'un tour de reins. Endolorissement des glandes axillaires. — Tension, douleurs de luxation et sensation paralytique dans diverses parties des bras et des mains. - Prurit aux doigts, comme par des engelures. Douleurs dans les hanches, la nuit, avant minuit. — Douleurs de luxation aux genoux et aux pieds. — Sensation brûlante dans les jambes.

PULSATILLA.

ULS. — Pulsatille noire, Anémone des prés. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 263. — Doses usitées : 12, 30. — Durée d'action : 4 à 5 jours dans des cas aigus, et plusieurs semaines dans

sian. suit. suit-ac. text.


Companer avec: Agar. ambr. amm. ant. arn. ars. asa. aur. bell. bry. cham. chin. coc. colch. con. cupr. fer. ign. kal. lach. lep. lyc. merc. nitr-ac. n-vom. n-mos. petr. plat. rhus. sabad. sep. stann. sulf. sulf-ac. tart. thui. zinc. C'est surtout après: Asa. ant. aur. chin. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulf. tart. et thui. que la pulsatille est efficace, lorsqu'elle se trouve indiquée. Après la pulsatille conviennent quolquesois: Asa. bry nitr-ac. sep. thui.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections principalement du sexe féminin, ou des personnes d'un caractère doux, portées à la plaisanterie et à des rires ou à des pleurs faciles, avec une physionomie douce, un tempérament flegmatique, inclinant vers la mélancolie, constitution lympathique, avec teint pâle, yeux bleus et cheveux blonds, éphélides, disposition à des rhumes de cerveau ou à d'autres écoulements muqueux, etc.: Suites fâcheuses de l'abus des eaux sulfureuses, du mercure, du quinquina, de la camomille, ou de la graisse de porc, ou même du vin; Souffrances à la suite d'une frayeur ou d'une affliction, ou d'un refroidissement dans l'eau (bains de pieds, pluie, etc., etc.); Affections rhumatismales et arthritiques, avec gonflement; Arthrite cague: Rhumatisme articulaire; Affections spasmodiques; Accès d'épilepsie et d'évanouissement, à la suite de la suppression des règles; Congestions passives, avec enflure des veines; Varices; Anévrismes; Écoulements muqueux; Affections scrofuleuses et rachitiques?; Atrophie des ensants; Ictère; CMèrese; Inflammationa



584

érysipélateuses ; Zona? ; Eruptions urticaires? ; *Morbilles*, et suite fàcheuses de la répercussion de cette maladie ; Varicelles esmoldes? Éruptions causées par la graisse de porc; Engelures; Rhagades?; Suppurations; Ulcères enflammés, ou putrides; Suites de contusions, de chutes, de coups; Fièvre comateuse; Fièvres inflammatoires, avec affections gastriques, muqueuses, ou bilieuses; Fièvre typholde; Fièrres intermittentes, même après l'abus du quinquina ou du sulfate de quinine; Fièvre hectique; Manie, mélancolie, hystéries et autres affections morales, par suite de la suppression des règles; Congestion cérébrale; Apoplexie?; Céphalalgies, même par suite de l'abus du mercure, ou d'une indigestion; Migraine; Ophthalmies et blépharophthalmies, avec sécrétion muqueuse abondante; Ophthalmies par suite de la suppression d'une gonorrhée; Orgelet?; Cataracte?; Obscurcissement de la cornée?; Fistule lacrymale?; Amblyopie amaurotique (avec héméralpie?); Otalgie instammatoire; Otorrhée purulente; Dureté de l'oute, même par suite d'un froid, ou après la répercussion des morbilles; Ozène?; Hémorrhagie nasale, Coryza aigu ou chronique; Disposition à s'enrhumer facilement; Odontalgie rhumatismale; Angines catarrhales; Affections gastrico-muqueuses, ou bilieuses, avec vomissement ou diarrhée; Indigestions par l'abus de la graisse de porc ou des pâtisseries grasses; Refroidissement de l'estomac par des glaces, des fruits, des acides, etc.; Dyspepsie, avec romissement des aliments, même pour avoir fait abus de vin; Hématé-mèse; Gastralgie; Gastrite?; Affections hépatiques chroniques; Ictère; Coliques spasmodiques ou venteuses; Entérite?; Péritonite?; Diarrhées muqueuses, bilieuses; Dyssenterie; Suites fâcheuses de la suppression du flux hémorrhoïdal; Ischurie, dysurie et strangurie; Incontinence d'urine chez les enfants (pissement au lit); Catarrhe de la vessie; Gonorrhée et suites fâcheuses de la suppression de cette maladie; Hydrocèle, et gonflement inflammatoire des testicules, même par suite d'une suppression ou d'une contusion; Prostatite; Priapisme; Pollutions frequentes par suite d'onanisme; Dysménie, aménorrhée et dysménorrhée et beaucoup de souffrances par suite de la suppression des règles ou de l'irrégularité du flux menstruel, principalement dans l'âge de la puberté ou du retour; Métrite?; Métrorrhagies, principalement dans l'âge critique; Flueurs blanches; Affections morales, odontalgies, souffrances gastriques, coliques, spasmes, hystériques, dysurie et beaucoup d'autres souffrances de femmes enceintes ou en couche; Douleurs d'enfantement spasmodiques, tranchées trop prolongées et trop violentes; Manque de douleurs d'enfantement; Adhérence du placenta; Suppression des lochies?; Péritonite puerpérale; Agalactie; Souffrances par suite du sevrage; Excoriations des enfants qui ont fait abus de la camomille; Ophthalmies des nouveau-nés?; Affections catarrhales avec toux humide; Grippe; Coqueluche?; Hémoptysie; Affections asthmatiques; Pneumonie?; Souffrances



PULSATILLA.

phthisiques?; Affections organiques du cœur; Cardite?; Déviation rachitique de la colonne vertébrale; Gonflement inflammatoire ou cedémateux des jambes et des pieds; Psolte?; Sciatique?; Coxalgie.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Douleurs tractives et tressaillantes, dans les muscles, aggravées la nuit, ou le soir au lit, ainsi qu'à la chaleur de la chambre, soulagées au grand air, cet accompagnées souvent de torpeur avec faiblesse paralytique, ou de gonflement dur des parties affectées. - Elancements et sensation de froid dans les parties affectées, au changement de temps. - *Tension dans quelques membres, comme si les tendons étaient trop courts.- *Douleurs erratiques, qui passent rapidement d'un endroit à l'autre, souvent avec gonflement et rougeur dans les articulations. — Soubresaut des tendons. — *Accès de douleurs, avec frissons, gêne de la respiration, pâleur du visage, et tremblement des jambes. — *Plus les douleurs sont violentes, plus les frissons sont forts. — *Douleurs de meurtrissure ou d'ulcération sous-cutanée, en touchant les parties affectées. — *Douleurs et souffrances semi-latérales. — Aggravation et renouvellement des souffrances dans la position assise, après des exercices prolongés; ou en se levant, après être resté longtemps assis, ainsi que dans le repos, et principalement en étant couché sur le côté, ou sur le dos. — Les souffrances qui ont apparu en étant comahé sur le dos s'améliorent en se couchant sur le côté, ou en se redressant et vice versa. — Le mouvement, la marche, la pression, la chaleur extérieure et le grand air améliorent également beaucoup de souffrances, tandis que quelquefois d'autres s'aggravent sons ces mêmes conditions. — C'est ordinairement le soir, ou la nuit, avant minuit, quelquesois aussi le matin et après le repas, que l'on est le plus souffrant. *Aggravation des souffrances, tous les deux jours, le soir. Agitation et malaise dans tout le corps avec impossibilité de dormir ou de se reposer, et besoin continuel d'étendre les membres. — Pulsations fréquentes et pénibles par tout le corps, plus fortes pendant le mouvement. — *Grande disposition des membres à s'endormir. — Tremblement fréquent des membres, avec anxiété.—Paresse et lourdeur des membres, avec faiblesse paralytique, sensibilité douloureuse des articulations et marche vacillante. — Fatigue matutinale, qui augmente danda position couchée. — Accès d'évanouissement, avec pâleur mortelle du visage. — Convulsions épileptiques, avec mouvements violents des membres, et suivies de faiblesse, de rapports et d'envie de vomir (après la suppression des règles). — Grande sensibilité et répugnance pour le grand air. — Grand besoin de rester couché



586

ou assis. — *Douleur de meurtrissure dans les os des extrémités. — Amaigrissement.


Peau. — Prurit le plus souvent brûlant ou picotant (comme par des piqûres de fourmis), principalement le soir et la nuit, à la chaleur du lit, aggravé en se grattant. —*Taches rouges comme des morbilles, ou des urticaires. — Rougeur fréquente, même des parties froides. — °Éruptions semblables aux varicelles conoïdes, avec prurit violent, au lit. — *Engelures, avec gonflement rouge bleuâtre, chaleur et douleur brûlante ou pulsative. — °Érysipèle flegmoneux, avec dureté, chaleur brûlante et douleur lancinante en touchant ou en remuant la partie malade. — Furoncies. — Rougeur luisante, dureté et prurit autour des ulcères, arec saignement facile et douleurs lancinantes, brûlantes et rongeantes.

— "Ulceres enflammés, ou putrides. — Varices.

Sommeil. — *Somnolence continuelle et sommeil comateux, avec agitation et récasseries inquiètes, le jour ou la nuit. — Grande envie de dormir, le jour, principalement le soir, ou après-midi. - Sommeil irrégulier, le soir de trop bonne heure, ou le matin trop tard, et quelquefois avec insomnie nocturne. — *Sommeil tardif, quelquefois pas avant deux heures après minuit, et souvent avec réreil de bonne heure. - *Une grande affluence d'idées empêche de dormir le soir et la nuit. - *Sommeil agité, avec réreil fréquent -et état d'engourdissement en s'éveillant.-Impossibilité de dormir autrement qu'en étant assis, la tête penchée en avant ou de côté. - *Pendant le sommeil, paroles, délires, mouvements convulsifs de la bouche, des yeux et des membres, -pleurs, cris et gémissements, cauchemar, sursauts arec effroi, secousses dans le corps et tressaillement des membres. - *La nuit, grande agitation et jactation, inquiétude et angoisse de cœur, bouillonnement de sang, chaleur sèche, prurit, divagations et idées fixes. — En dormant, on est couché sur le dos, les genoux levés et les bras posés sur la tête ou croisés sur le ventre. - *Réves fréquents, effroyables, anxieux, -confus, vifs, degoûtants, voluptueux, de querelles et d'affaires du jour, de spec-

tres et de morts. — Büillements fréquents.

Fièvre. — *Froid, frissons et horripilations, principalement le soir, ou après midi, et quelquesois arcc pâleur du risage, vertiges et étourdissement, douleur et pesanteur à la tête, —anxiété et oppression de poitrine, evomissement muqueux, —besoin de se coucher, et chaleur passagère. — Froid et frissons partiels, principalement au dos, aux bras, aux jambes, aux mains et aux pieds, souvent avec chaleur de la tête ou du visage et rougeur des joues. — Froid semi-latéral, avec torpeur du côté affecté. — *Chaleur sèche, principalement la nuit, le soir au lit, ou le matin, et souvent avec accès d'angoisse, mal à la tête, sace rouge et boussie, ou sueur au visage, frissons en se découvrant, brûle-lement aux mains avec gonssement des veines, lamentations,



587

soupirs et gémissements, sommeil profond ou agité, respiration anxieuse et précipitée, accès d'évanouissement avec obscurcissement des yeux, envie de vomir et selles diarrhéiques. - *Chaleur partielle, principalement au visage avec rougeur des joues, aux mains, aux pieds, etc., et souvent seulement d'un côté, avec froid ou frissons aux mêmes parties de l'autre côté. — *Accès fébriles, composés de chaleur qui est précédée de frissons avec adipsie et mélée ou suivie de sueurs; type quotidien, tierce, ou quarte; exacerbation le soir, ou après midi; rémission le matin, et, dans l'apyrexie, mal à la tête, oppression douloureuse de la poitrine, toux humide, amertume de la bouche, constipation ou diarrhée.oSymptômes fébriles, avec perte de connaissance, délires, pleurs et désespoir, ou avec symptômes gastrico-muqueux ou bilieux, ou avec sommeil comateux. — Répugnance pour la chaleur extérieure. — *Pouls acceléré et petit, -ou plein et lent, ou faible et presque supprimé. — *Sueurs principalement la nuit, ou vers le matin; sueurs abondantes et sétides; sueurs semi-latérales, ou partielles (à la tête et au visage), et sueurs avec crampes aux bras et aux mains, fatigue, sommeil comateux, rêvasseries et crougeur du visage.

Moral. — *Mélancolie, avec tristesse, pleurs, grande inquiétude sur ses affaires, ou sur sa santé, °crainte de la mort, soucis et humeur chagrine. — Rires et pleurs involontaires. — *Grande angoisse et inquiétude, le plus souvent dans la région précordiale, et quelquesois avec penchant au suicide, -battement de cœur, chaleur et besoin de desserrer les vêtements, tremblement des mains et envie de vomir. - *Accès d'anxiété, avec crainte de mourir ou d'être frappé d'apoplexie, avec bourdonnement d'oreilles, frissons et mouvements convulsifs des doigts. — Appréhensions, canthropophobie, *peur nocturne ou vespertine de revenants, avec envie de se cacher ou de s'enfuir, méliance et soupçons. -*Folie taciturne, -avec air morne, froid et égaré, soupirs et souvent position assise, les mains jointes et ne se plaignant de rien. Désespoir de la félicité éternelle, avec prières continuelles. Découragement, indécision, horreur des affaires et gêne de la respiration. — Caractère envieux, mécontent et avide, de manière à vouloir prendre tout pour soi. — Humeur capricieuse, avec désir tantôt de ceci, tantôt de cela, et refus de ces choses dès qu'on les a obtenues. — *Humeur hypocondriaque et morosité, principalement le soir, souvent avec répugnance pour la conversation, grande susceptibilité de caractère, disposition à se facher, cris et pleurs. — *Mauraise humeur, quelquesois avec horreur du travail, et dégoût ou mépris de toutes choses. - Inadvertance, précipitation et distraction. - En parlant, difficulté à s'exprimer correctement et omission de plusieurs lettres en écrivant. — Etat d'étourdissement; on ne sait ni où l'on est, ni ce que l'on fait. — Grande affluence d'idées très-mobiles. — *Diva-




gations nocturnes; délires violents et perte de connaissance. — oVisions effrayantes. — Faiblesse de mémoire. — Idées fixes. — Stupidité.

- *Fatique de la tête par les travaux intellectuels. Tête. -*Sensation de vide et d'embarras dans la tête, comme après des veilles prolongées ou des débauches, et quelquefois avec indifférence. - *Vertiges tournoyants, comme dans l'ivresse, ou vertiges au point de tomber, et chancellement, principalement le soir ou le matin, en se redressant, en se levant après avoir été codché, en étant assis, en se baissant, en se promenant au grand air, ou après le repas, ainsi qu'en levant les yeux, et souvent avec grande pesanteur, et chaleur à la tête, pâleur du visage, envie de vomir, sommeil, obscurcissement des yeux, et obourdonnement d'oreilles. — La méditation et la conversation augmentent les vertiges. - Accès d'étourdissement et perte de connaissance, avec rougeur bleuâtre et bouffissure du visage, perte du mouvement, battements de cœur violents, pouls presque éteint et respiration râlante. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau, comme dans les fièvres typhoides ou par suite d'un enivrement par de l'eau-de-vie. — *Mal de tête, comme par une indigestion par des choses grasses. - *Douleur dans la tête comme si le front devait éclater, ou comme si le verveau était tendu, comprimé, on contracté. - *Elancements on douleurs vives, tractives et tressaillantes, ou fourmillement, pulsation et térébration dans la tête. — *Bruissement, bourdonnement -et pétillement dans la tête, -ou sensation douloureuse comme si un courant d'air traversait le cerveau. - *Les maux de tête ne sont souvent que semi-latéraux, se propageant jusqu'à l'oreille et aux dents, ou ils occupent le front au-dessus des yeux jusque dans les orbites, ou bien ils se font sentir à l'occiput, avec contraction douloureuse dans la nuque. - *Apparition ou aggravation des maux de tête, le soir après s'être couché, ou la nuit, ou le matin au lit, ainsi qu'en se baissant, -en remuant les yeux ou la tête, en se promenant au grand air, *et pendant un travail de tête; -la compression les soulage quelquefois. — Maux de tête avec nausées et vomissement, *ou avec congestion et chaleur à la tête, -ou bien avec horripilation et accès d'évanouissement, *vertiges, obscurcissement des yeux et bourdonnement des oreilles, photophobie et larmoiement. — Douleur au cuir chevelu en rebroussant les cheveux. — Démangeaison et prurit à la tête. — Pustules purulentes et petites tumeurs, avec douleur d'uicération au cuir

Yeux. — Douleur aux yeux, comme si on les grattait avec un couteau. — Sensation brûlante, *douleur pressive comme par du sable, -ou douleur vive ou lancinante dans les yeux, ou bien térébration et douleur incisive. — Prurit brûlant aux yeux, principalement le soir. — *Inflammation des yeux et des bords des

588



PULSATILLA.

paupières, avec rougeur de la sclérotique et de la conjonctive, et sécrétion muqueuse abondante. — *Gonflement et rougeur des paupières. — °Trichiase à la paupière. — °Cristallin obscurci, couleur grisatre. — Orgelets —avec inflammation de la sclérotique et douleurs tensives, tractives, en remuant les muscles de la face. — *Sécheresse des yeux et des paupières, surtout lorsqu'on a sommeil. — *Larmoiement abondant, principalement au vent ainsi qu'au grand air, au froid et à la clarté vive du jour, -- Larmes âcres et corrosives. — Abcès près de l'angle de l'œil, comme une fistule lacrymale.—Agglutination nocturne des paupières.— Pupilles contractées ou dilatées. - Regard fixe et stupide. -Obscurcissement des yeux et perte de la vue, quelquefois avec pâleur du visage et envie de vomir. — Vue pâle (aspect blême de tous les objets). — •Perte de la vue au crépuscule, avec sensation comme si les yeux étaient couverts d'un bandeau. — *Vue trouble, comme à travers un brouillard, ou comme par quelque chose que l'on pourrait enlever par le frottement, principalement au grand air, le soir, le matin, ou en se réveillant. —Diplopie. — *Cercles lumineux devant les yeux, et diffusion de la lumière des bougies. — Grande sensibilité des yeux à la lumière, qui cause des élancements.

Oreilles. — Douleur dans l'oreille, comme si quelque chose allait en sortir. — *Elancements avec prurit ou douleurs vives, tressaillantes, et étreintes dans les oreilles et aux environs; eles douleurs viennent quelquefois par accès, envahissent toute la tête, paraissent insupportables et font perdre jusqu'à la raison. —
*Gonflement inflammatoire, chaleur et rougeur érysipélateuse de Poreille et du conduit auditif, ainsi que des parties externes environnantes. — Gonflement douloureux des os derrière les oreilles.—•Cérumen dur et noir.—Écoulement de pus, de sang, ou d'une humeur jaunâtre, épaisse, par l'oreille.—Gazouillement comme par des oiseaux, murmures pulsatifs, tintement, *bruissement et bourdonnement dans les oreilles, — *Dureté de l'oute, comme par obturation des oreilles. — Croûtes brûlantes, démangeantes, au tragus (avec gonflement des glandes du cou). - Élancements dans les parotides.

Mes. — Pression et douleur d'abcès à la racine du nes. — *Ulcération des narines et des ailes du nez. - *Écoulement d'un pus fétide et verdâtre ou jaunâtre par le nes.-Mouchement de sang et *hémorrhagie nasale, quelquefois avec obturation du nez. *Obturation du nez, corysa sec, principalement le soir, et à la chaleur de la chambre. -- Coryza avec perte du goût et de l'odorat, ou *avec écoulement de mucosités épaisses et fétides. — * Chatouillement au nez, et éternument fréquent, principalement le soir et le matin. — Frissonnement continuel pendant le coryza. — Odeur continuelle devant le nez, comme d'un vieux rhume, ou comme d'un mélange de casé et de tabac. — Genflement du nez.



590

Visage. — *Visage pâle, et quelquefois avec air souffrant. — *Pâleur du visage, alternant avec chaleur et rougeur des joues. —
Sueur à la face et au cuir chevelu; horripilation ou sueur
semi-latérale à la face. — °Visage bouffi et rouge bleuâtre. —
Mouvements convulsifs et palpitations musculaires au visage. —
Tension et sensation de gonflement du visage, ou sensibilité douloureuse de la peau, comme si elle était excoriée. — Érysipèle à
la face, avec douleur lancinante et desquamation de la peau. —
Nodosités rouges dans la région des pommettes. — Gonflement,
tension et gerçures aux lèvres, avec exfoliation de la peau. —
Douleur vive et contractive aux mâchoires. — Gonflement des
glandes sous-maxillaires et de celles du cou.

Dents. - *Douleurs vives, lancinantes dans les dents, ou douleurs tractives, tressaillantes, comme si le nerf était tendu et relaché tout d'un coup, ou douleurs pulsatives, fouillantes et rongeantes, souvent avec picotement dans les gencives. - *Les maux de dents qui affectent les dents saines comme celles qui sont cariées, ne sont souvent que semi-latéraux, et se propagent fréquemment jusqu'au risage, à la tête, à l'oreille, et à l'œil du coté affecté, étant accompagnés quelque fois de pâleur du visage, frissonnement, oct dyspnée. — *Aggravation ou apparition des maux de dents, principalement le soir ou après midi, ou la nuit, ainsi qu'à la chaleur du lit ou de la chambre; renouvellement en mangeant, ainsi qu'en prenant quelque chose de chaud et par le contact du cure-dents; soulagement par l'eau froide, ou à l'air frais.-Quelquefois les maux de dents s'aggravent aussi par l'eau froide, ainsi que par l'air frais ou le vent, mais ces cas sont plus rares. — Sensation brûlante ou de gonflement, douleur d'excoriation et pulsation aux gencives. — Vacillement des dents.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche, -le matin. — Mauvaise odeur, et même fétidité putride de la bouche, principalement le matin, ou la nuit et le soir au lit. — *Écoulement d'une salive douceâtre aqueuse par la bouche, quelquesois avec envie de vomir. — Sensation comme si la langue était trop large. — Insensibilité de la langue, comme si elle était brûlée. — *Langue chargée d'un enduit épais, de couleur grisâtre, blanchâtre, ou jaunâtre. — Accumulation de mucosités tenaces dans la bouche et sur la langue; ces parties sont comme revêtues d'une peau blanche. — oGerçures -et vésicules douloureuses à la langue. — Sensation comme si le palais était gonssé ou couvert de mucosités tenaces.

Gorge. — *Douleur d'excoriation dans la gorge, comme si tout y était à vif, avec grattement, sensation brûlante et cuisson. — *Rougeur à la gorge, des tonsilles et de la luette, avec sensation comme si ces parties étaient gonflées, principalement en avalant. — Déglutition difficile, comme par paralysie ou par rétrécissement de la gorge. — *Élancements dans la gorge, avec pression et tension en avalant à vide. — oInflammation de la gorge avec



591

enflure variqueuse des veines. — «Sécheresse dans la gorge, ou accumulation d'un mucus tenace qui revêt les parties affectées. — *Les maux de gorge s'aggravent ordinairement le soir ou l'après midi.

Appétit. - *Goût de la bouche fade, muqueux, putride, empyreumatique, terreux, ou comme du pus. — *Goût douceâtre, acide ou amer, de la bouche et des aliments, principalement de la viande, du pain, du beurre, de la bière et du lait, substances qui souvent aussi paraissent insipides ou causent du dégoût. - Amertume ou aigreur de la bouche, immédiatement après avoir mangé, ainsi que le matin et le soir. - Goût amer du vin, et goût putride de la viande. - Les aliments paraissent ou trop salés ou insipides. - *Manque d'appétit et dégoût des aliments. — Faim et désir de manger, sans que l'on sache quoi. — Faim canine, avec douleur rongeante à l'estomac. — *Adipsie complète, ou soif excessive avec humidité de la langue, et désir de la bière, ou de boissons spiritueuses, piquantes et acides. -*Sensation d'un dérangement d'estomac, semblable à celui que causeraient la viande de porc ou des pâtisseries grasses. Dégoût et répugnance pour la fumée du tabac. - *Après avoir mangé, nausées et rapports, régurgitation et vomissement, ballonnement et pression dans le creux de l'estomac, coliques, et flatuosités, mal à la tête, gêne de la respiration, omauvaise humeur et mélancolie, ou rires et peurs involontaires, et beaucoup d'autres souffrances. - C'est surtout le pain qui pèse sur l'estomac.

Estomac. - *Rapports fréquents, quelquefois avortés, ou avec goût des aliments, ou acides, ou amers, et principalement après le repas. - Régurgitation des aliments. - Écoulement d'eau de l'estomac, comme des pituites. - *Hoquet fréquent, principalement en fumant du tabac, après avoir bu, ou la nuit, oet quelquefois avec accès d'étouffement. - *Nausées et envie de vomir insupportables, quelquefois jusqu'à la gorge et dans la bouche, avec sensation pénible comme si un ver remontait dans l'œso-phage.—Accès de contraction et d'étranglement dans l'œsophage. *Vomissements quelquefois violents, de matières verdâtres, muqueuses, ou bilieuses et amères, ou acides. - *Vomissement des aliments. - Vomissement de sang. - *Les nausées et les vomissements ont principalement lieu le soir ou la nuit, ou après avoir bu ou mangé, ainsi que pendant le repas, et souvent ils se manifestent avec frissonnement, pâleur du visage, coliques, douleurs aux oreilles ou au dos, sensation brûlante dans la gorge et borborygmes. - *Sensibilité douloureuse de la région stomacale à la moindre pression. — *Douleurs pressives, crampoides, contractives et compressives, dans Pestomac et la région précordiale, principalement après le repas, ou le soir, ou le matin, et souvent avec vomissement on nausées, et gêne de la respira-



592

tion. — Fourmillement, ou pulsations dans le creux de l'estomac, ou élancements en faisant un faux pas. — • Douleur à l'épigastre qui s'aggrave fortement en étant assis (pendant la grossesse).

Ventre. — Tension tractive dans les hypocondres, ou élancements pulsatifs, comme dans un abcès. — Ballonnement dur du ventre, principalement à l'épigastre, avec tension et sensation de plénitude. — *Douleurs crampoides et compressives, quelquefois au fond de l'hypogastre, avec pression sur le rectum, ou tranchées, principalement autour du nombril, ou douleurs vives et lancinantes dans le ventre. -- *Les coliques sont souvent accompagnées de vomissement ou de diarrhées; elles se manifestent le plus souvent le soir, ou après avoir bu ou mangé, et quelquefois le serrement du ventre ou le repos les soulagent, tandis que le mouvement les aggrave. — Gonflement annulaire autour du nombril, douloureux en marchant. - Rétraction et endolorissement du ventre, avec grande sensibilité des téguments du ventre, qui paraissent gonflés, avec douleur de meurtrissure en y touchant, en bâillant, en chantant, en toussant, et à tout mouvement des muscles abdominaux. — Coliques flatulentes, principalement le soir, après le repas, ou après minuit, ou le matin, avec douleurs pressives, produites par des flatuosités incarcérées, rumeur, borborygmes et grondement dans le ventre, et sortie de flatuosités fétides. — Pustules purulentes dans les aines.

Selles. — *Constipation et selles difficiles, quelquefois avec pression douloureuse sur le rectum et douleurs au dos. — Envie fréquente d'aller à la selle, même la nuit. — Selles involontaires et inaperçues, pendant le sommeil. — *Selles diarrhéiques même la nuit, et quelquefois avec coliques et tranchées, frissons et horripilations, et douleurs à l'anus. — *Évacuations fréquentes de mucosités blanchâtres, *jaunâtres, sanguinolentes, ou de matières verdâtres, hachées, bilieuses, ou aqueuses, et quelquefois même corrosives. — Avant et après les selles, brûlement, cuisson, et douleur d'excoriation à l'anus et dans le rectum. — Écoulement de sang par l'anus, même hors le temps des selles. — *Hémorrhoïdes aveugles et saignantes, avec prurit, cuisson et douleur d'excoriation. — Sortie des hémorrhoïdes.

Urines. — •Rétention d'urine, avec rougeur et chaleur à la région vésicale; anxiété et douleurs pénibles dans le ventre. — *Ténesme de la vessie, et envie fréquente d'uriner, avec pression douloureuse sur la vessie, et douleur tractive dans le ventre. — Émission involontaire de quelques gouttes d'urine, en toussant, en marchant, étant assis, et en expulsant des flatuosités. — *Pissement au lit. — *Flux abondant d'urines aqueuses, avec faiblesse dans les reins, et diarrhées, ou urines rares, rouges ou brunes, quelquefois avec écume violette. — Urines, avec dépôt rouge, ou couleur de brique ou de violette, ou muqueux, ou gé-



593

latineux. — *Urines sanguinolentes, °avec dépôt purulent, et douleurs dans les reins. — *Écoulement par l'urèthre, comme dans la gonorrhée. — Rétrécissement de l'urèthre, avec jet d'urine très-mince. — Brûlement pendant et après l'émission d'urine. — Tiraillement et pression dans l'urèthre, le col de la vessie et la vessie. — Pression et constriction dans la vessie, avec endolorissement de la région vésicale. — °Gonflement de la région du col de la vessie, avec endolorissement au toucher, jet d'urine intermittent, et douleur crampoide jusque dans le bassin et les cuisses, après avoir uriné.

sin et les cuisses, après avoir uriné.

Parties viriles. — *Prurit et démangeaison au prépuce et au scrotum, principalement le matin et le soir. — *Gonflement inflammatoire des testicules et du cordon spermatique (quel ue fois seulement d'un côté), avec douleurs pressives et tractires jusque dans le ventre et les reins; rougeur et chaleur du scrotum, nausées et envie de vomir. — *Gonflement hydropique du scrotum, de couleur blanchâtre. — *Exaltation extraordinaire de l'appétit vénérien, presque comme priapisme, avec érections fréquentes et continues, désir violent du colt, et pollutions fré-

quentes. — Écoulement de liqueur prostatique.

Règles.—*Douleurs crampoides dans la matrice, ou tension tractive dans l'utérus, et douleurs comme celles de l'enfantement.
—•Métrorrhagie.—*Sang des règles noir, avec caillots et mucosités, ou sang pâle et séreux.— Règles irrégulières, trop tardires
ou trop hâtives, de trop courte ou de trop longue durée, ou entièrement supprimées, avec coliques, spasmes hystériques abdominaux, douleurs hépatiques, gastralgie, maux de reins, nausées
et romissements, frissons et pâleur du visage, migraine, vertiges, affections morales, ténesmes de l'anus et de la vessie,
points de côté et beaucoup d'autres souffrances, avant, pendant ou après l'époque.—*Flueurs blanches, épaisses comme de
la créme, ou corrosives et bûlantes, principalement à l'époque
des règles (avant, pendant ou après), et quelquefois avec tranchées.— Gonflement des mamelles, avec tension et pression,
comme si elles se remplissaient de lait.

Larynx. — *Catarrhe, avec enrouement, apreté, sécheresse, grattement et douleur d'excoriation dans le larynx et la poitrine. — *Accès de constriction du larynx, principalement la nuit, en étant couché horizontalement. — *Toux ébranlante, principalement le soir, la nuit, ou le matin, provoquée par une sensation de sécheresse ou un grattement et un chatouillement dans la gorge, aggravée en étant couché, et souvent accompagnée d'envie de romir arec romiturition et romissement, ou d'étouffement comme par la vapeur du soufre, avec saignement du nez et respiration râlante. — *Toux avec élancements dans la poitrine ou les côtés, et battements de cour. — *Toux humide, avec expectoration de mucosités blanches, tenaces, ou de matières épaisses,



594

jaunâtres, d'un goût amer ou putride. — *Expectoration d'un sang noir et de caillots par la toux. — En toussant, élancements


à l'épaule droite ou au dos.

Poitrine. - Respiration accelérée, courte et superficielle (pendant la fièvre), ou râlante et anxieuse. - *Gêne de la respiration, haleine courte, étouffement comme par la vapeur du soufre, et accès de dyspnée et de suffocation, avec anxiété. - Constriction crampoide de la poitrine ou du larynx, hoquet violent, toux, mal à la tête, et vertiges; principalement le soir, après le repas, ou la nuit, étant couché horizontalement. — *Le mouvement, la marche accélérée, le grand air et le froid, aggravent les souffrances asthmatiques. - *Tension crampoide et constrictive dans la poitrine, principalement en respirant, et quelquefois avec chaleur intérieure et bouillonnement de sang. - Douleur d'ulcération, ou douleur vive et incisive, dans la poitrine. -*Élancements dans la poitrine et dans les côtés, principalement la nuit et en étant couché, et quelquefois avec gêne de la respiration profonde, impossibilité d'être couché sur le côté malade, toux courte et accès d'étouffement. - Congestion de sang à la poitrine et au cœur, surtout la nuit. - *Accès fréquents et violents de battements de cœur, principalement après le dîner, ou après des émotions morales, ou provoqués par la conversation. et souvent avec angoisse, obscurcissement de la vue et gêne de la respiration, surtout en étant couché sur le côté gauche. Anxiété, pesanteur, pression et sensation brûlante au cœur.

Pronc. —*Maux de reins et douleurs dans le dos, comme après être resté longtemps courbé, ou avec roideur comme par un bandeau. — *Maux de reins, comme ceux de l'enfantement. — *Elancements dans le dos, aux reins et entre les omoplates. — *Déviation de la colonne vertébrale. — *Douleurs rhumatismales, tensives et tractives, à la nuque et au cou, quelquefois seulement d'un côté, et souvent avec gonfiement des parties et douleurs d'ulcération sous-cutanée au toucher. — Craquement dans les vertèbres du cou et les omoplates, en remuant ces parties. — Boutons pruriants au cou. — Gonfiement des glandes

du cou.

Bras. — *Douleurs vives, tressaillantes et tractives dans l'articulation scapulaire, ainsi qu'aux bras, aux mains et aux doigts.
— Douleur paralytique à l'articulation scapulaire, en levant et en remuant le bras. — *Sensation brûlante au bras, le soir ou la nuit, avec sensation de sécheresse aux doigts. — *Pesanteur pressive dans les bras, avec sensation de torpeur, principalement dans les mains. — Sensation de *gonflement, et douleur de luxation aux articulations des coudes, "des mains et des doigts, avec tension et roideur. — Engourdissement facile des doigts, principalement le matin et la nuit. — Vésicules entre les doigts, avec douleurs picotantes. — Douleur de panaris à l'index.



PULSATILLA. - RANUNCULUS BULBOSUS.

595

Jambos. — Douleur de meurtrissure ou d'ulcération dans le psoas. — Douleur de luxation à l'articulation coxo-fémorale, avec tressaillements douloureux, comme dans une plaie, jusqu'au genou, principalement dans le repos. - *Tiraillement et tension dans les cuisses et les jambes, principalement aux mollets, comme si les tendons étaient trop courts. — Douleur de meurtrissure, avec sensation de faiblesse paralytique dans les os et les muscles des cuisses et des jambes. — Douleur d'ulcération sous-cutanée, dans les jambes et la plante des pieds. — Craquement dans les genoux. — *Gonflement des genoux, oquelquefois principalement au-dessus de la rotule, et souvent avec chaleur, inflammation, *et douleurs vives, tractives et lancinantes. — Faiblesse et fléchissement des genoux, avec marche vacillante. — oTiraillement et grande fatigue dans les jambes, et principalement dans les genoux, avec tremblement. — Enflure des veines, et *varices aux jambes. — Bourdonnement dans les jambes, en restant de-bout. — Douleur de meurtrissure dans le tibia. — Tension et traction dans les mollets. — *Gonflement chaud des jambes, ou seulement du dos ou de la plante des pieds, quelquefois avec douleurs lancinantes au toucher, et pendant le mouvement. — Sensation de torpeur douloureuse dans la plante des pieds et dans le gras des orteils. — *Gonflement ædémateux des pieds, princi-palement le soir. — Élancements térébrants et douleurs incisives dans les talons. — Élancements dans la plante des pieds et le bout des orteils.

RANUNCULUS BULBOSUS.

RAN. — Renoncule bulbeuse. — Archives de STAFF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homospa, p. 265. — Doses usitées: 6, 9. — Durée d'action: plusieurs semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES: Bry. camph. puls. rhus. — Les boissons alcooliques en aggravent les effets; il em est de même de staph., de sulf. et du vinaigre. Comparer avec: Bry. carb-v. n-vom. puls. ran-sc. rhus. sassap. sabad. sep. staph.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs de brissment, élancements ou douleurs déchirantes, rhumatismales et arthritiques, dans les membres et les muscles. — Tressaillement des muscles. — Secousses dans tout le corps. — Attaques d'épilepsie. — (Indurations. — Affections ictériques.) — Douleurs provoquées par le contact, le mouvement, l'extension ou le changement de position, surtout au tronc et dans les membres. — Beaucoup de symptômes parsissent aussi au changement de température.



RANUNCULUS BULBOSUS.

596

par exemple, lorsqu'on passe du froid à la chaleur, et vice verea, comme aussi le matin et le soir, et après le repas. — Lassitude et brisement dans tous les membres. — Tremblement des membres après un accès de colère, même des plus légers. — Faiblesse subite comme si on allait perdre connaissance.

Peau. — Prurit fréquent et fort à diverses parties de la peau. — L'ancinations à la peau qui se changent en prurit. — Éruptions résiculeuses, comme des ampoules de brûlure. — Vésicules bleu foncé, petites, profondes, transparentes, par groupes rapprochés, avec prurit brûlant et croûtes calleuses et dartreuses. — Ulcères rongeants et lisses, avec bords aigus et prurit brûlant et lancinant. — Excroissances calleuses et autres. — Dartres sur tout le corps. — Eruptions bulleuses des nouveau-nés. — Gale pustuleuse.

Sommeil. – Envie de dormir le jour. – Sommeil tardif et insomnie nocturne, fréquemment par oppression de poitrine, chaleur et bouillonnement de sang, mais le plus souvent sans cause appréciable. – Réveil fréquent la nuit, et veille prolongée. – Réveil de bon matin. – Impossibilité de rester couché sur le côté. – Réves anxieux, de péril (par l'eau), ou vifs et lascifs.


Fièvre. — Accès de fièvre, consistant principalement en froid, après le repas ou le soir, avec douleurs abdominales et autres incommodités. — Chaleur dans la tête, avec froid aux mains. — Frissons le soir, avec chaleur de la face.

Moral. — Pusillanimité et inquiétude, surtout le soir. — Peur de revenants, le soir. — Irritabilité colérique et humeur querelleuse, surtout dans la matinée. — Oppression avec pleurs abondants. — Perte des idées. — Difficulté de la méditation. — Esprit obtus.

Tête. — Faiblesse, étourdissement et embarras de la tête. — Vertige tournoyant, au point de faire tomber, en passant de la chambre au grand air. — Mal de tête avec anxiété et faiblesse, pendant le repas. — Mal de tête semi-latéral, au-dessus de l'œil, avec abattement et envie de pleurer. — Compression et pression expansive dans le sinciput et le vertex. — Sensation de bouffissure de toute la tête. — Déchirement et pression dans les tempes. — Coups dans l'occiput. — Congestion sanguine dans la tête. — La plupart des maux de tête apparaissent en passant d'un endroit chaud au froid, et vice versa. — Fourmillement douloureux ou élancements brûlants au cuir chevelu.

Yeux et Oreilles. — Prurit aux yeux. — Pression dans le globe des yeux. — Douleur d'excoriation dans les angles des yeux, cuisante et brûlante. — Inflammation des yeux et larmoiement. — Elancements dans les oreilles, surtout le soir. — Sensation crampoïde dans les oreilles et aux oreilles.

Nez. — Fourmillement pénible et douloureux dans le nez. — Nes rouge, gonfé et enflammé, avec douleur tensive et croûtes abon-



RANUNCULUS BULBOSUS.

597

dantes dans l'intérieur. — Obturation du nez, surtout dans l'appartement, avec douleur d'excoriation. — Écoulement abondant de mucosités visqueuses par le nez.

Visage et Dents. - Chaleur de la face, avec rougeur vive des joues. - Fourmillement à la face, principalement au menton et au nez. — Douleurs cramposdes et tournoyantes dans la face et les mâchoires. — Crampes dans les lèvres. — Maux de dents, le matin, au réveil. — Douleurs incisives et comme d'arrachement dans les dents molaires.

Bouche et Gorge. — Accumulation abondante d'eau dans la bouche. — Salivation. — Salive blanche, avec goût métallique. — Accumulation de mucosités abondantes dans la gorge. — Sensation spasmodique de quelque chose qui remonterait dans l'œsophage et dans la gorge. — Douleurs inflammatoires, brûlantes dans la gorge et le palais.

Appétit et Estomac. — Goût fade, douceâtre ou d'une amertume aigre. — Goût amer, empyreumatique, pendant que l'on mange et après avoir mangé des aliments secs. — Soif augmentée, après midi. — Renvois fréquents. — Hoquet crampoide. — Nausées fréquentes, après midi, ou le soir, quelquefois avec maux de tête. - Douleurs d'estomac. — Pression au scrobicule. — Douleur d'excoriation et sensation brûlante au creux de l'estomac, comme aussi à l'orifice de l'estomac, surtout au toucher. — (Inflammation

de l'estomac.)

Ventre. — Douleur de brisement dans les hypocondres, quelquefois au toucher. - Douleur d'excoriation dans l'hypocondre gauche, principalement en remuant le tronc. — Lancinations dans la région hépatique. — Pulsations dans l'hypocondre gauche. — Douleurs sourdes dans le ventre, avec sensibilité des intestins pendant la marche. — Douleurs abdominales pinçantes, avec mouvements de rotation, et sensation, à la pression extérieure, comme si tout était meurtri et ulcéré dans le ventre. - Douleur d'excoriation brûlante dans le ventre, comme dans une inflammation lente. — Expulsion fréquente de vents trèsfétides.

Selles - Règles. - Selles tardives et dures. - Selles fréquentes et abondantes. — Dysurie. — Ulcères dé la vessie. — Leucorrhée

acre et rongeante.

Poitrine. — Respiration courte et gênée, avec oppression de poitrine, comme après une mortification ou un chagrin, avec besoin de respirer profondément et de pleurer abondamment. - Pression à la poitrine. — Douleur rhumatismale à la poitrine, ou comme d'ulcération sous-cutanée. — Pression brûlante à la poitrine. — Lancinations dans la postrine et le côté droit de la poitrine, souvent profondément jusque vers le foie. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur des parties de la poitrine et de l'épigastre. — Sensibilité douloureuse de toutes les parties ex-



598 RAN. BULBOSUS. — RAN. SCELERATUS.

ternes de la poitrine, des muscles intercostaux, de la plèvre, etc., se manifestant ou s'aggravant surtout par le mouvement, le contact et en étendant le corps. — Douleur dans la poitrine, comme par adhérence de la plèvre.

Tronc et Membres. — Douleur de brisement rhumatismal dans tout le tronc et entre les omoplates. — Douleurs crampoïdes, déchirantes, lancinantes et tressaillantes dans les bras. — Froid aux mains. — Prurit aux mains et aux doigts. — Dartres à la paume des mains. — Fourmillement dans les doigts. — Dartres, ampoules et ulcères aux doigts. — Douleurs tractives le long des cuisses. — Douleurs crampoïdes, térébrantes, et prurit dans le milieu des cuisses. — Craquement dans l'articulation du genou. — Douleur de roideur dans les articulations des pieds. — Crampes au cou-de-pied. — Lancinations pulsatives dans les talons. — Douleur d'exoriation et de lancinations dans les orteils.

RANUNCULUS SCELERATUS.

RAN-SC. — Renoncule scélérate. — Archives de STAPF. — Hist, nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 266. — Doses usitées: 6? 30? — Durée d'action: 6 à 7 semaines dans des affections chroniques.
ANTIDOTE: Camph.
COMPARER AYEC: Puls. ran. sil. veratr.

SYMPTOMES GENERAUX. - (Affections arthritiques.) - Douleurs térébrantes, rongeantes, lancinantes, fourmillantes, et qui se manifestent ou s'aggravent vers le soir. — Douleurs pressives et tractives. - Affections périodiques. - Tressaillements convulsifs. — Evanouissements. — Eruptions résiculaires, avec sécrétion séreuse, âcre, jaunâtre. — Ulcères opiniâtres. — Insomnie avec agitation et jactation après minuit, quelquefois avec angoisse et chaleur. - Envie de dormir, le soir, avec humeur maussade et peu de disposition au travail. — Bâillements fréquents, après midi. - Sommeil incomplet après minuit, avec reves anxieux, effroyables. — Réveil de bonne heure, avec veille prolongée. — Fièvre après minuit, chaleur générale et soif ardente, avec pouls plein, souple, accéléré; suivie de sueur générale, surtout au front. — Frissons pendant le repas. — Pouls plus fréquent, avec sensation comme si l'artère radiale était plus mince. Horripilation le soir, avec soif et pression au front vers le dehors. - Sensation de froid, le matin après le lever, partant de la nuque et descendant le long du dos. — Chaleur le soir, surtout à la figure, et suivie de sueur avec abattement. — Paresse et



RANUNCULUS SCELERATUS.

599

inaptitude au travail, le matin et le soir. - Tristesse, mélancolie,

le soir. — Forte distraction et disposition à oublier les choses. Tête. — Vertige avec perte des idées. — Mal à la tête, comme si elle était serrée dans un étau. - Pression rongeante, tractive, crampoïde, sourde, occupant souvent une place très-restreinte du vertex. - Pression compressive et expansive, dans les tempes. -Pesanteur et sensation de plénitude dans la tête, qui semble être gonflée et plus volumineuse. - Contraction des téguments de la tête. - Cuisson et prurit au cuir chevelu.

Yeux et Oreilles. - Douleur dans les yeux en remuant promptement le globe de l'œil. - Pression dans le globe des yeux, fréquemment. — Cuisson dans les angles des yeux, de temps en temps. — Yeux convulsés. — Larmoiement. — Blanc des yeux d'un jaune clair, avec veines injectées et agglutination des paupières. — Otalgie, avec pression dans la tête et traction dans les dents. - Tractions, élancements et térébration à l'extérieur du conduit auditif.

Face et Dents. - Cuisson et fourmillement dans le nez. - Picotement au bout du nez. - Éternument fréquent. - Mucosités séreuses, abondantes dans le nez. - Face comme recouverte de toiles d'araignée. - Tractions dans la face, avec sensation de froid.—Tressaillement dans la face.—Souvent chaleur fugace à la face. - Tache rouge à côté de l'aile droite du nez, sur laquelle se forme une petite vésicule avec douleur d'excoriation. sation de tremblement autour des commissures des lèvres, et de la lèvre inférieure. — Maux de dents avec douleurs lancinantes et émoussement des dents. — Tractions tressaillantes et lanci-nantes dans les dents. — Gonflement rouge et douloureux et suignement facile des gencives. - Fourmillement dans quelques racines, comme si elles étaient poussées au déhors.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche. — Salivation écu-meuse. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Inflammation de la langue, avec sensation brûlante et rougeur. - Desquamation et rhagades à la langue. - Contraction avec étranglement dans la gorge, aggravée en mangeant du pain. - Sensation brûlante et grattement dans la gorge. - Gonflement des amygdales, avec lancinations. - Cuisson et élancements dans le gosier. -Mucosités épaisses dans la gorge, difficiles à détacher par le

renaclement. - Besoin fréquent d'avaler à vide.

Estomac. — Goût douceâtre, le matin, avec langue blanche, chargée. - Sensation de faim, sans appétit, parfois avec renvois. -Absence d'appétit. — Après le repas, émission de vents, ou selles liquides. — Renvois avec goût des aliments, après le repas. -Renvois à vide, fréquents, surtout après avoir mangé des beurrées. — Renvois aigres, rances, le soir. — Nausées, surtout après minuit, ou le matin, avec envie de vomir. — Douleurs d'estomac des plus violentes, avec inquiétude. - Sensation de plénitude,



RANUNCULUS SCELERATUS.

de pression et de tension à l'épigastre, aggravée par la pression extérieure, avec exacerbation le matin. — Douleurs constrictives à l'estomac. — Lancinations à l'épigastre. — Douleur d'excoriation et sensation brûlante à l'épigastre. — (Inflammation de l'estomac.)

Ventre. — Pression sourde dans la région hépatique, aggravée en respirant profondément. — Lancinations dans la région hépatique. - Élancements dans la région de la rate, aggravés en respirant profondément. — Elancements, secousses et pression, dans la région lombaire. - Douleurs abdominales, avec accès d'évanouissement. — Pression sourde comme une cheville, ou sensation de tortillement derrière l'ombilic, la nuit ou le matin. - Douleurs abdominales crampoïdes. - Pincements et tranchées dans le ventre. - Tressaillement au ventre.

Selles — Parties génitales. — Selles retardées. — Envie pressante et fréquente d'aller à la selle, avec selle molle. - Besoin fréquent, sans qu'il sorte autre chose que des vents. - Prurit à l'anus, comme par des hémorrhoïdes, avec sensation comme si l'anus était poussé au dehors. — Suintement à l'anus. — Diarrhée séreuse, fétide. — Besoin fréquent d'uriner, avec émission peu abondante d'urines claires. — Brûlement dans l'urèthre après avoir uriné. — Émission de quelques gouttes après avoir uriné. Tiraillements dans la verge. — Lancinations dans le gland.

Cuisson au scrotum. — Pollutions.

Poitrine. — Petite toux sèche, rare et sans efforts. — Respiration gênée et profonde. — Soupirs involontaires. — Douleur de brisement dans la poitrine, avec sensation de fatigue dans cette partie, surtout le soir. — Pression oppressante à la poitrine. — Pincements et élancements dans la poitrine et la région du cœur, quelquesois avec suspension de la respiration, surtout le soir ou la nuit. — Rongement derrière le sternum, qui suspend la respiration. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la poitrine, surtout du sternum. — Battements de cœur plus fréquents. — Pression comme par une cheville dans la région du cœur.

Tronc et Membres. — Douleur de brisement et de paralysie aux reins. - Picotement et fourmillement dans le dos et sur la poitrine. — Excoriation de la peau sous l'aisselle droite. — Élancements térébrants à l'avant-bras, et jusque dans les doigts. – Térébration dans les os des mains. – Rongement dans la paume des mains. - Rongement, térébration et tressaillement lancinant dans les os des doigts. — Gonflement des doigts. Rongement et térébration dans toutes les parties des jambes et des pieds, surtout dans les orteils. — Élancements tressaillants et fourmillement dans les gros orteils. — Lancinations et douleurs brûlantes dans les cors aux pieds.

600



RAPHANUS SATIVUS.

RAPHABUS SATIVUS.

RAPHAN, — Rave. — D^o Nussen. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. **288**, — Durée d'action : 4 à 45 jours. ANYIDOTE?

SYMPTOMES GENERAUX. — Grande lassitude et accablement. quelquefois avec brisement dans tous les membres; l'enfant se couche le jour, parce qu'il se sent malade ; amaigrissement visible. — Peau, généralement moite; brûlement passager çà et là; odeur de raifort de tout le corps. — Envie de dormir; somnolonce presque tout le jeur, avec paroles grondeuses, en rêve; sommeil agité, avec réveil fréquent, céphalalgie, nausées et pincements agree, avec reveil frequent, céphalalgie, nausées et pincements dans la région ombilicale; sommeil avec révasseries; insomnie depuis 11 houres du soir jusqu'à 2 heures du matin, puis sommeil agité, avec embarras de la tête, froid aux genoux et aux pieds; sommeil soulement jusqu'à 3 heures et avec rêves inquiets; réveil à 3 houres du matin, avec horripilation violente au dos et aux bras; pendent le sommeil, sucur abondante, ou bien murmure léger, comme s'il s'entretenait avec ses amis.— Horrivalation, muréest le long de dos et à la martie mantiellement des ripilation, surtout le long du dos, et à la partie postérieure des bras, surtout après avoir bu de l'eau froide; fréquents, avec chaleur intérieure à la tôte et générale à la peau; *après l'horripilation, chaleur intérieure, on bien anssi alternation d'horripflation et de chaleur; froid le soir au lit, avec faibleure dans les articulations, surtout celles du coude, et suivi de sueur très-abondants; froid intérieur, avec peau chaude et moite; on se plaint continuellement du froid, tandis que la peau est constamment bralante au toucher; sueur de l'odeur du médicament (de même que l'haleine); sueur abondante pendant le sommeil, surtout van le matin. — Pouls: petit et un peu dur; un peu fréquent et dur; ralenti. — Moral : forte angoisse, avec pour de la mort; on la croit si prochaine que l'on demande les secours de la suligion.

Tôte — Denis. — Tête entreprise, le matin an réveil, avec donleur sourde dans le front; vertige avec trouble de le veu; douleur violente dans le front; pression dans le front, quelquelois surtout la nuit, ou avec embarras de la tête; pression an-douent des yeux, avec vue obscurcie, se dissipant après avoir vonsi; pression an-dessus de la racine du nez; élansements ou vertex; uneur à la tête, après le lever. — Yous enfoncés filligeur dem your; codème de la pangière infécieure; pupilles su pas dilatées; vue plus forte, plus lengue, ches un myoge, — Dans Vereille gandhu,

Jame. - De bille, for part., &



RAPHANUS SATIVUS.


déchirements et élancements qui semblent être dans l'os; élancements dans l'oreille droite; prurit à la conque de l'oreille gauche qui est douloureuse au toucher. — *Nez obstrué. — Odeur de raifort: éternument fréquent, ou tout au moins, besoin fréquent d'éternuer. — Visage: rouge, sombre; défiguré, avec nez pointu et joues jaunes, ou bien avec yeux creux et teint livide, à tel point qu'on se fait peur à soi-même; pâle avec traits anxieux et qui dénotent une grande faiblesse et beaucoup de souffrances; teint jaune, surtout le matin, après le lever; déchirement dans la pommette droite; glande à la mâchoire inférieure, dure et gonflée. — Odontulgie lancinante, dans les molaires

gauche.

602

Bouche - Vomissements. - Langue: blanche; *chargée d'un épais enduit blanc; pâle et rouge bleuâtre, avec sillon profond et points rouge pale dans le milieu (au début de l'amélioration). Dans la gorge, chaleur et brûlement, quelquefois surtout dans les amygdales et avec élancements; gonflement, rougeur et douleur des amygdales, comme si elles étaient à vif; mucosités abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe bronchique; expectoration abondante de mucosités blanches et très-visquenses, se détachant du gosier et de l'œsophage, le matin, à la suite d'un sommeil lourd et avec douleur d'excoriation dans la gorge. - Goût: de raifort; *insipide; *amer; -très-mauvais; de poivre. - *Anorexie; -répugnance pour les aliments; répugnance pour le tabac à priser (chez un priseur); dans l'anorexie, grand désir de lait bouilli. - *Forte soif, continuelle. - Renvois fréquents d'air venant de l'estomac, avec goût putride. — Nausée, comme si on allait s'évanouir, par accès, en sorte que nonobstant une faiblesse extrême, elle est forcée de s'asseoir et ne peut rester couchée; relâchement d'estomac. - *Envie de vomir; *fréquente, quelquesois à tout moment; -avec perte de la vue et de l'ouie, quelquefois presque à chaque instant; avec obscurcissement de la vue et de l'ouïe; avec régurgitation d'eau et de mucosités, qui quelquefois, sont striées de sang; en toussant, avec pression sur la poitrine et régurgitation de mucosités acides et sans couleur. - *Vomissements: violents des aliments; des aliments et de mucosités blanches, quelquefois avec haut-le-cœur violents, forte pression sur la poitrine et froid; ode mucosités et de bile; d'a-bord d'un liquide vert et très-amer, puis d'eau claire; chaque fois, avant de vomir, horripilation sur le dos et les bras; ovomissement noir (morbus niger); oromissements de matières stercorales (Miserere?).

Estomac — Parties génitales. — Maux d'estomac qui forcent à manger constamment; forte pression à l'estomac, de même que dans le creux; clancement et picotements dans l'estomac et le creux de l'estomac. — Dans la région hépatique, elancements ou bien aussi pression avec douleur d'exportation. — Pincements



RAPHANUS SATIVUS.

603

dans le rentre, surtout à la région ombilicale, quelquesois avec clancements et pression à droite de l'ombilic ; tranchées violentes et élancements à la région ombilicale, surtout à droite, après le déjeuner; sensation de chaleur dans le ventre, surtout dans la région ombilicale; brûlement au-dessus du nombril; ballonnement et plénitude du ventre, suivis de pincements, comme avant la selle; borborygmes dans le rentre, surtout la nuit, ou bien chaque fois avant de vomir; émission de vents par le haut et le bas, avec odeur du médicament, surtout après avoir bu de l'eau; *aucune émission de rents pendant longtemps, ni par le haut ni par le bas (caractéristique). — Besoin d'aller à la selle, trèsfréquent, surtout à midi; *fréquentes selles, liquides et abondantes, quelquesois partant violemment, brun jaunatre, ou bien brunes et écumeuses (caractéristique); odiarrhées chroniques, rertes, liquides, mêlées de mucosités et de sang; selles diarrhéiques non digérées. — Urine peu abondante, ou bien aussi *plus abondante que la boisson ingérée; -besoin, avec émission peu abondante; il faut attendre longtemps avant que l'urine arrive; urine pale; jaune sale, avec sédiment comme du levain de bière; ourine trouble; en urinant, ardeur dans l'urethre. — Dans le testicule droit, tiraillements et déchirements, plus tard aussi dans la plante du pied droit.

Larynx, Poitrine, Extrémités. - Toux, avec mucosités abondantes dans la gorge, comme dans un catarrhe bronchique. -Haleine de l'odeur du médicament. — Douleurs à la poitrine : surtout en mangeant et en toussant, moins en buvant; pressives et lancinantes, depuis le creux de l'estomac jusqu'à la fossette du cou, et quelquesois aussi jusque dans le dos; chalcur extérieure au sein droit; palpitations de cœur rapides et violentes. — Au dos, brûlement pruriant; déchirement dans les lombes, en se baissant; picotement dans le creux de l'aisselle gauche. — Tremblement des membres. — Au bras, élancements dans l'articula-tion du coude gauche, comme dans l'os; faiblesse, déchirements et picotements, immédiatement au-dessus du poignet droit. A la jambe gauche, sensation de paralysie, en étant couché; froid aux genoux et aux pieds, avec envie de dormir, tête entreprise, douleur sourde dans le front et envie de vomir; crampe au mollet, la nuit, au lit; déchirements dans le côté du pied droit; élancements et fourmillement à la plante du pied droit; rougeur et gonflement du talon droit, avec pincements violents en appuyant le pied et en marchant, plus tard il s'y forme une ampoule pleine d'eau claire et un peu rougeatre, qui disparaît

après le lever.



RHABARBARUM (RHEUM).

604

RHABARBARUM (RHEUM).

RHAB. — Rhubarbe. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 267. — Doses usitées : 9, 80. — Durée d'action : 2, 3 jours dans des maladies aiguës.

ANTIDOTES : Camph. cham. n-vom.

COMPARER AVEC : Ars. bry. carb-v. cham. n-vom. puls. rhus. samb. tart.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre : — Diarrhées des enfants ou des femmes en couche; Aigreurs, colique, insomnie et cris des enfants.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Endolorissement des articulations, pendant le mouvement. — Douleurs pulsatives. — Palpitations dans les muscles, surtout autour des articulations. — Engourdissement des membres sur lesquels on est couché. —

Lassitude et pesanteur dans tout le corps.

Semmeil. — Sommeil et bâillements. — *Sommeil de nuit agité, avec jactation, cris, gémissements et ronflement, ou avec tressaillement convulsif des paupières, des muscles de la face et des doigts, surtout ches les enfants. — Mains passées au-dessus de la tête, en s'endormant et pendant le sommeil. — Divagations nocturnes, et ambulation dans le lit, bien qu'on ait les yeux fermés. — Après le sommeil, maux de tête, et étourdissement, ou mucosités fétides, odeur et goût putride dans la bouche. — Rêves anxieux, tristes, vifs.


Fièvre. — Horripilation, sans froid extérieur. — Frissons et chaleur alternatifs, avec anxiété et répugnance pour toute chose. — Chaleur aux mains et aux pieds, avec visage frais. — Sueur facilement excitée par le moindre exercice, surtout au front et au

cuir chevelu.

Moral. — Indifférence. — Paresse et éloignement pour la conversation. — Humeur chagrine, avec pleurs. — Désir impétueux de tel ou tel objet. — Engourdissement des sens, comme dans un

demi-sommeil. — Divagations.

Tête. — Obnubilation stupéfiante de la tête, comme après l'ivresse, avec yeux proéminents. — Vertige à faire tomber de côté, en étant debout. — Mal de tête, comme un étourdissement, avec anxiété. — Maux de tête pressifs, surtout dans le sinciput, les tempes et le vertex. — Pesanteur de la tête, avec chaleur et déchirements. — Tension sourde et crampolde dans la tête. — Bat-



RHABARBARUM (RHEUM).

605

tement dans la tête, quelquefois remontant du ventre. — Mouvements du cerveau, en se baissant.

Yeux. — Yeux faibles et abattus, avec douleur pressive, surtout en fixant un objet avec persévérance. — Pression et tiraillements dans les paupières. — Cuisson dans les yeux, comme par l'effet de la poussière. — Battement douloureux dans les yeux. — Tressaillement convulsif des paupières. — Larmoiement, surtout en plein air. — Pupilles contractées.

Oreilles et Nez. — Otalgie, avec prurit dans l'oreille. — Pression et battement dans les oreilles. — Émoussement de l'oule, comme par laxité du tympan, avec grondement dans les oreilles. — Traction étourdissante à la racine du nez, et jusqu'au bout du nez, avec fourmillement dans cette partie. — Sensation de chaleur du nez.

Face et Dents. — Tension de la peau du visage. — Froncement et contraction des muscles du front. — Sueur fraîche à la face, surtout à la bouche et au nez. — Tressaillement des commissures des lèvres. — Douleurs fouillantes dans les dents cariées. — Sensation douloureuse de froid dans les dents. — Sensation de torpeur, et insensibilité de la langue. — Contraction du gosier.

Estomac. — Perte du goût. — Goût fade, pâteux ou aigre. —
Amertume des aliments. — Appétence pour diverses choses, qui répugnent cependant à la première bouchée. — Dégoût pour les aliments gras ou sans saveur. — Répugnance pour le café (non sucré). — Faim, sans appétit. — Nausées, comme venant du ventre, avec coliques. — Plénitude d'estomac, avec pression comme par surcharge. — Contractions dans l'estomac. — Élancements et battements dans le creux de l'estomac.

Ventre. — Ballonnement du ventre, avec tension. — Pression dans la région ombilicale. — Tranchées dans le rentre, qui forcent à se replier sur soi-même, souvent peu après le repas, aggravées en étant debout. — Incarcération de flatuosités, avec pression et tension à la poitrine. — Palpitation et tressaillement dans les muscles abdominaux.

Selles. — Envie pressante et fréquente d'aller à la selle, non suivie de résultat, aggravée par le mouvement et la marche. — *Selles diarrhéiques, généralement d'odeur aigre, liquides, ou de la consistance de la bouillie, précédées et suivies de ténesme, avec pincement constrictif dans le ventre, et horripilation pendant l'évacuation. — Diarrhées grisâtres ou brunes, mélées de mucosités. — Diarrhée abondante, avec vomissements et grande faiblesse.

Urines. — Sécrétion plus abondante d'urine. — Urine rouge ou jaune verdâtre. — Faiblesse de la vessie; l'urine ne peut être évacuée sans effort. — Sensation brâlante dans la vessie. — Urines brâlantes.



606 RHABARBARUM (RHEUM). — RHODODENDRON.

Poitrine. — Dyspnée en respirant profondément, comme par un fardeau sur la poitrine. — Lancinations dans la poitrine. — Palpitation des muscles de la poitrine. — Douleurs et lancinations dans les mamelons. — Lait amer et jaune.

Tronc et Membres. — Roideur aux reins et dans les hanches, qui ne permet pas de se tenir droit. — Lancinations dans les bras. — Déchirement dans les bras, les avant-bras et les articulations des doigts. — Tressaillements dans les bras et les mains. — Palpitations musculaires dans les articulations du coude. — Veines gonfiées et chaleur aux mains. — Sueur, quelquefois froide, dans la paume des mains. — Tressaillement des doigts. — Grande lassitude dans les cuisses. — Tressaillements dans les muscles des cuisses. — Engourdissement des jambes lorsqu'elles sont croisées. — Palpitations musculaires dans les jarrets, les jambes et les orteils. — Roideur du jarret, avec douleur pendant le mouvement. — Élancements dans les genoux et les jambes.


RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

RHOD. — Rosage à fleurs jaunes; Rose de Sibérie. — Archives de STAPP. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 268. — Doses usitées: 12, 18, 30. — Durée d'action: 4 à 6 semaines dans des affections chroniques.

ANTIDOTES: Camph. clem. rhus.
COMPARER AVEC: Calc. canth. carb-an. carb-v. clem. lyc. n-vom. rhus. sep.

CLINIQUE. — Jusqu'ici ce médicament n'a encore été employé que contre des Affections arthritiques, une espèce d'Hydrocèle et une Induration des testicules.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Traction rhumatismale et arthritique et déchirements, comme sur le périoste, dans les membres, provoqués par un temps apre et aggravés dans les articulations, avec rougeur et gonflement. — Nodosités arthritiques. — Inquiétudes, fourmillement, faiblesse, et sensation d'enroidissement paralytique dans quelques membres. — Grand abattement et courbature après le plus léger exercice. — Gonflements hydropiques. — Rémittence fréquente des souffrances et apparition généralement le matin. — *Les souffrances sont provoquées ou aggravées par un froid humide, ou à l'approche d'un orage, comme aussi dans le repos.



RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

– Forte envie de dormir le jour, avec sensation brû-

607

lante dans les yeux. — Sommeil profond avant minuit, après s'être endormi de bonne heure, le soir. — Insomnie après minuit. — Sommeil du matin troublé par une agitation dans le corps et des douleurs. Fièvre. - Frissons, alternant avec chaleur. - Chaleur augmentée,

surtout dans les mains. - Fièvre le soir, avec chaleur à la tête, froid aux pieds, sensation brûlante dans les yeux et le nez, courbature et absence de soif, suivie de chaleur nocturne et d'insomnie. - Sueur avec prurit et fourmillement à la peau. — Sueur d'odeur

Moral. — Humeur sombre, morose. — Indifférence excessive. avec crainte de tout travail, de toute occupation. - Oubli exces-

sif. — Perte subite des idées.

Tête. — Tête entreprise le matin, après le lever, avec sommeil.

— Ivresse. — Vertige, avec angoisse. — Vertige tournoyant, au lit, comme si la tête allait se renverser en arrière. — Maux de tête provoqués ou aggravés par le vin on par un froid humide. — Tension dans le front. — Pression tractive dans le sinciput et les tempes, principalement dans les os. — Lancinations dans le sinciput et les côtés de la tête. — Déchirement dans les os de la tête. — Battement dans la tête. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête, comme par ulcération sous-cutanée. — Douleur comme par contusion ou des coups, à l'occiput. — Prurit rongeant au cuir chevelu, surtout le soir.

Yeux. — Elancements pressifs dans les bords de l'orbite, avec contraction spasmodique des paupières. — Pression dans les yeux venant d'un côté de la face. — Sensation de sécheresse et brûlement dans les yeux, de temps à autre, surtout à la clarté vive du jour et en regardant fixement un objet. — Agglutination des paupières. — Tressaillement frémissant des paupières. — Contraction d'une pupille, tandis que l'autre est dilatée. -– Trouble de

la vue, en lisant et en écrivant.

Oreilles. — Otalgie, avec déchirements tressaillants. — Déchirement et térébration dans les oreilles et près des oreilles. — Sensation comme s'il y avait un ver dans l'oreille. — Bourdonnement sourd, continuel, dans les oreilles, augmenté en avalant.

Hen. — Épistaxis. — Odorat diminué.—Obturation semi-latérale du nes, à la racine, surtout le matin. — Coryza fluent, avec obturation d'une narine et perte de l'odorat et du goût.—Sécrétion

plus abondante de mucosités nasales, au grand air.

Visage. — Horripilation parcourant le visage. — Lèvres sèches, brûlantes. — Vésicules aux lèvres, avec douleur d'excoriation en

mangeant.

Dents. — *Odonialgie, avec déchirement tractif, dans les dents molaires, par un froid humide ou un temps d'orage, aggravée par le contact. — Odontalgie nocturne, avec otalgie. — Prurit



RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

aux gencives. - Gonflement et douleur d'excoriation entre les gencives inférieures et la joue. — Odontalgie arthritique, aggrarée par les boissons froides et chaudes, améliorée par la chaleur extérieure. — o Térébration dans une dent, avec élancement jusque dans l'oreille, renouvellement des douleurs par un vent d'est âpre, au printemps et en automne, aggravation la nnit.

Bouche et Gorge. - Accumulation abondante de salive dans la bouche, avec sécheresse du gosier, et vésicules cuisantes sous la langue. — Grattement dans la gorge, comme par des mucosités.

– Constriction et sensation brûlante dans la gorge.

Estomac. — Émoussement du goût. — Les aliments n'ont point de saveur. — Soif augmentée. — Satiété prompte, avec bon appétit, suivie de malaise. - Nausées, avec envie de vomir, pression à l'estomac, et écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, soulagée par des renvois. — Pression à l'estomac, la nuit, ou après avoir bu de l'eau froide. - Pression contractive au scrobicule, arec géne de la respiration. — Élancements pressifs dans le creux de l'estomac et les hypocondres.

Ventre. — Douleurs crampoides dans les hypocondres. — Tension dans la région de la rate, après s'être baissé. - Elancements dans la rate, en marchant vite. - Ballonnement du ventre, surtout de la partie supérieure, avec sensation de plénitude qui gêne la respiration, le matin et le soir. — Incarcération douloureuse de flatuosités dans les hypocondres et les reins. — Grondement et borborygmes dans le ventre, avec renvois et expulsion de vents

fétides.

608

Sollos.—Envie pressante d'aller à la selle, avec retard de la selle. - Évacuation difficile de la selle, même lorsqu'elle est molle.

- Selles de la consistance de la bouillie. - Evacuations muqueuses. — Diarrhée après avoir mangé des fruits, ou par un froid humide. — Battement à l'anus. — Traction depuis le rectum jusque dans les parties génitales.

Urines. — Envie plus fréquente d'uriner, avec traction dans la

région de la vessie et les aines.—Urine plus abondante et fétide.

Parties génitales. — Sensation d'excoriation entre les parties génitales et les cuisses. — Battement et élancements sous le gland .- Traction et douleur de meurtrissure dans les testicules et jusque dans le ventre et les cuisses. — Testicules gonfiés et rétractés. - Prurit, sueur et racornissement du scrotum. oGonflement transparent du scrotum, comme par hydrocèle. Induration des testicules. — Suppression des règles. — Règles trop hatives et trop abondantes.

Larynx. — Catarrhe et enrouement de la trachée-artère. — Toux sèche, ébranlante, avec oppression de poitrine et âpreté de la gorge, surtout la nuit et le matin.—Toux grattante, avec expec-

toration peu abondante de mucceités.



RHODODENDRON. - RHUS TOXICODENDRON.

609

sitrine. —Pression à la poitrine, avec gêne de la respiration.— Constriction oppressive de la poitrine.—Ondulation chaude dans la poitrine et au cœur. — Congestion sanguine à la poitrine.—

Douleur de brisement à l'extérieur de la poitrine.

Trenc. — Douleurs dans le dos, aux reins, comme de luxation ou de brisement. — Traction rhumatismale et déchirement dans le dos et les épaules. — Roideur de la nuque. — Tension et traction rhumatismale, dans les muscles de la nuque et du cou.

Bras. — Douleurs tractices dans les bras, par un temps âpre. -Sensation comme si le sang ne circulait pas dans les bras. -Faiblesse, avec fourmillement et pesanteur dans les bras, jusque dans le bout des doigts, pendant le repos. — Tireillement et déchirement dans les avant-bras et les mains, comme dans le périoste, aggravés pendant le repos. — Douleur de luxation dans les articulations de la main. — Chaleur des mains augmentée.

Jambes. — Douleur de luxation dans l'articulation coxo-fémorale et celle des genoux. -- Sensation de froid et racornissement de Gonflement des jambes et des pieds. — Sueur aux jambes. — Gonflement des jambes et des pieds. — Traction et déchirement dans les jambes et les pieds, comme dans le périoste, surtout dans le repos. — Froid excessif aux pieds. — Cors aux pieds, avec douleur lancinante.

RHUS TOXICODENDRON.

RHUS. — Arbre à poison, Sumac vénémenx. — HARREMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 268. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 3 à 6 semaines dans des affections chroniques.

ANTHOTES: Bry. camph. coff. sulf. — On l'emploie comme l'antidote de :

Bry. rhod. tart.

COMPARER AVEC: Alum. amm. ant. arn. ars. asa. bell. bry. calc. caus. cham. chin. elem. cocc. coff. con. cupr. dulc. graph. hyos. ign. iod. kal. lach. laur. led. tyc. magn. merc. mur-ac. natr. mir-ac. n-vom. phos. phos-ac. plat. puls. rhod. rat. samb. sabad. sep. sil. sulf. veratr.—C'est surtout après. Arn. bry. calc. phos. cham. lack. phos. phos-ac. sulf. que le rhus est efficace, lorsqu'il est indiqué. — Après le rhus, conviennent quelquefois : Amm. ars. bry. calc. con. phos. phos-ac. puls. sulf.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections, surtout des tendons, des ligaments et des membranes synoviules; Manque de plasticité dans le sang, avec tendance à la cessation de l'activité organique jusqu'à la paralysie; Affections rhumatismales avec gonfiement; Inflammations locales avec affections cérébrales; Affections rachitiques et scrofuleuses; Engorgement et




RHUS TOXICODENDRON.

induration des glandes; Convulsions et autres souffrances par suite d'un bain froid; Paralysies; Gonflements ædémateux et inflammatoires; Atrophie; Exostoses; carie et autres affections des os?; Dartres humides, ou sèches, ou lichénoïdes; Pemphigus; Inflammations érysipélateuses, surtout l'érysipèle résiculeux; Zona, Pétéchies, Ulcères; Verrues; Scarlatine et morbilles, et affections à la suite de ces maladies; Prodromes de la petite vérole; Suites facheuses d'un tour de reins, d'une luxation, d'une commotion et d'autres lésions mécaniques, surtout avec souffrances des articulations et des membranes synoriales, ou avec sugillation et extravasation de sang; Fièrres intermittentes, rhumatismales, gastriques et typhoïdes; Hypocondrie; Melancolie; Céphalalgies nerveuses, hystériques et autres; Migraine; Hydrocéphale aiguë (deuxième période); Teigne; Ophthalmies scrofuleuses (et arthritiques?); Photophobie scrofuleuse; Amblyopie amaurotique; Parotite, même à la suite de la scarlatine; Hémorrhagie nasale; Érysipèle à la face, surtout érysipèle vésiculeux; Croûte de lait; Odontalgie arthritique?; Angines; Affections gastriques ;Dispepsie, même avec vomissement des aliments; Rétrécissement de la gorge et de l'æsophage; Coliques inflammatoires; Entérite; Ictère; Diarrhées et dyssenteries; Incontinence d'urine; Fièvre puerpérale; Tumeur blanche et lochies maladives chez les femmes en couche; Incommodités par suite de sevrage, ou par la suppression du lait; Grippe; Pneumonie avec symptômes typhoïdes et soif nocturne (après l'usage d'acon. et de bryon.); Hémoptysie; Maladies de cœur; Maux de reins rhumatismaux ou par suite d'un refroidissement; Coxalgie et luxation spontanée; Inflammation érysipélateuse des pieds; Gonflement œdémateux des pieds, même à la suite de dartres répercutées, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

610

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Tractions, tension et déchirements rhumatismaux et arthritiques, dans les membres, portés au plus haut degré pendant le repos, cainsi que dans la mauvaise saison, la nuit, et à la chaleur du lit, souvent avec sensation de torpeur et engourdissement de la partie affectée, après l'avoir remuée. — Crampe et tension à diverses parties, comme par raccourcissement des tendons. — Contraction de quelques membres. — *Elancements tensifs et roideur dans les articulations, aggravés en se levant de son siége et en plein air. — *Roideur paralytique dans les membres, surtout en commençant à remuer la partie après le repos. — *Engourdissement facile des parties sur lesquelles on repose. — *Torpour de quelques parties, avec fourmillement et insensibilité. — *Fourmillement dans les parties affectées. — *Douleur de luxation facile des membres. — *Paralysies, quelquefois semi-latérales. — *Gonfements



RHUS TOXICODENDRON.

611

rouges et luisants, avec douleur lancinante d'excoriation au toucher. - *Douleurs de brisement, ou bien sensation comme si la chair était détachée des os, à quelques parties. - Tractions pressives sur le périoste, comme si on raclait les os. — Sensation comme si quelque chose était arraché dans les organes internes. — Gonflement et induration des glandes. — Ictère. — Tressaillement des muscles et des membres. - Mouvements convulsifs et autres souffrances, après avoir pris un bain froid.-- Affections semi-latérales. — *Exacerbation et apparition des douleurs et des symptômes, pendant le repos, ou la nuit, comme aussi en entrant dans l'appartement après avoir été au grand air; amélioration par le mouvement et la marche. -Reproduction ou aggravation de beaucoup de souffrances, dans la mauvaise saison. - Surexcitabilité générale du système nerveux, augmentée pour peu qu'on se fâche. — Tiraillement dans tous les membres en étant couché. — Tremblement des membres. après la plus légère fatigue. — Marche mal assurée. — *Grande lassitude et faiblesse, avec besoin de se coucher. — Accès d'évanouissement. — *Impossibilité de supporter le grand air, chaud ou froid; il impressionne douloureusement la peau.

Peau. — Prurit sur tout le corps, principalement aux parties velues. — Inflammations érysipélateuses. — Éruptions urticaires. — *Éruptions généralement vésiculeuses, croûteuses, avec prurit brûlant, apparaissant surtout au printemps et en automne. — *Éruptions de petites pustules, sur un fond rouge, comme le zona. — oUlcères gangréneux, résultant de petits vésicules, avec fièvre violente. — oPétéchies avec grande faiblesse allant jusqu'à la prostation de toutes les forces. — Pustules noires. — oEruptions dartreuses, quelquefois alternant avec souffrances asthmatiques et selles dyssentériques. — oVerrues, principalement aux mains et aux doigts. — Rhagades aux mains. — Panaris. — Fourmillement ou élancements, ou bien cuisson brûlante dans les ulcères, surtout la nuit. — Engelures. — Cors aux pieds, avec sensation brûlante et douleur d'excoriation. — *Anasarque générale après la scarlatine.

Sommeil. — Bâillements fréquents, violents, crampoides. — Forte envie de dormir le jour, et même le matin, au lit. — *Somnolence pleine de rêvasseries pénibles et interrompues. — Insomnie, surtout avant minuit, et généralement causée par une sensation de chaleur, un bouillonnement de sang, et une inquiétude qui ne permettent pas de rester couché. — *Sommeil agité, avec rêves anxieux et effrayants. — °Coma somnolent, avec ronflement, murmures et carphologie. — Sommeil empêché par des idées tristes. — Réveil causé par amertume et sensation de sécheresse dans la bouche. — Sommeil de nuit, empêché par une pression à l'estomac, pincements fouillants dans le ventre, et nauxéea avec envie de vomir. — Impossibilité de rester couché sur le chéé,



RHUS TOXICODENDRON.

la nuit. - Sursauts avec effroi et tressaillement du corps, pen-


612

dant le sommeil. - Sommeil incomplet et agité, avec jactation et affluence d'idées pénibles. — Rêves vifs des affaires du jour, avec paroles pendant le sommeil. — Pleurs en dormant. — Réces d'incendie. - Sommeil avec bouche ouverte et respiration courte. Fièvre. — Frissons et froid, généralement le soir, et accompagnés d'accès de douleurs et autres symptômes accessoires. Frisson grelottant au grand air, avec forte soif. - Frissons passagers, continuels, comme si on était inondé d'eau froide. — Sensation de froid, pour peu que l'on bouge. — Froid et pâleur du visage, alternant avec chaleur et rougeur. — Frissons et chaleur entremêlés, soit généraux et simultanés (frissons intérieurs, avec chaleur extérieure, et vice versa), soit à des parties différentes. — *Fièrre le soir, d'abord frisson, puis chaleur et soif (et sueur), accompagnée ou suivie de tranchées et de diarrhée. — *Fièrres tierces ou quotidiennes. — *Fièrre tierce double, d'abord frisson avec soif, puis chaleur générale, avec frisson, au moindre mouve-ment, enfin sueur. — *Pendant le frisson, douleur dans les membres, maux de tête, vertige, maux de dents pulsatifs, avec accumulation de salive dans la bouche, et envie de vomir. — Pendant la chaleur nocturne, tiraillements dans tous les membres. · Chaleur fugace, avec sueur partant de la région ombilicale et alternant brusquement avec frissons. — Pendant et après la fièvre, tressaillements, tintement d'oreilles, surdité, coryza sec' insomnie, avec jactation inquiète, jaunisse et éruption urticaire, pression dans le creux de l'estomac, battement de cœur avec anxiété, coliques, diarrhée et autres affections gastriques et soif nocturne. — Fièvres malignes, avec délire loquace, douleurs violentes dans tous les membres, faiblesse excessive, langue sèche ou noire, lèvres sèches, brunâtres ou noirâtres, chaleur et rougeur des joues, carphologie, pouls accéléré et petit, coma

Sueur continuelle.

Moral. — Tristesse anxieuse et angoisse mortelle, surtout le soir et la nuit, avec désir de la solitude et besoin de pleurer. — Agitation qui ne permet pas de rester assis. — *Angoisse avec crainte de la mort et soupirs. — Peur d'être empoisonné. — Manie du suicide. — Irritabilité et mauvaise humeur, avec répugnance pour un travail quelconque. — Abattement moral, avec anthropophobie. — *Inquiétude sur ses enfants, sur ses affaires et sur l'avenir, avec manque de confiance en soi-même. — Faiblesse de la mémoire et oubli. — Absence d'idées et d'esprit. — Lenteur de la marche des idées et esprit obts. — Erreurs de l'imagination et visions. — ODelires.

somnolent avec ronflement et gémissements. — Sueur pendant les douleurs. — Sueur en étant assis, souvent avec tremblement violent. — Sueur nocturne, quelquefois avec éruption miliaire et pruriante. — Sueurs matutinales, quelquefois d'odeur acide. —



RHUS TOXICODENDRON.

618

180. — Tits entrepries, comme dans l'ioresse. — Stupeur de la 1812. — *Vertige et chancellement, comme si l'on allait tomber. — Surtout en se levant du lit. — Vertige le soir, en se couchant, avec crainte de mourir. - Maux de tête, immédiatement après le repas, ou après avoir bu de la bière, comme aussi en remuant les bras. — Accès de manx de tête, avec besoin de se concher; toute contrariété et tout exercice en plein air renouvellent les accès. - Maux de tête périodiques. - *Douleur dans la tête, comme si le cerveau était meurtri, surtout le matin, aggravée en remuant et en levant les yeux. — Pesanteur et plénitude pressice de la tête, avec sensation en se baissant, comme si le cerveau allait éclater. — Sensation de compression ou d'expansion dans la tête. — Tractions et déchirements dans la tête et surtout dans les tempes, principalement le soir et la nuit. — °Maux de tête laucinants jour et nuit. jusque dans les oreilles, la racine du nes et les pommettes, avec dents agacées. — Battement et pulsations dans la tête, surtout à l'occiput. — Douleurs, surtout dans les bosses occipitales. — Congestion sanguine à la tôte. - Sensation brûlante, surtout dans le front et l'occiput. - *Fourmillement douloureux dans la tête. — Bourdonnement et bruissement dans la tête. - Ballonnement et sensation de fluctuation dans la tête, à chaque pas, comme si le cerveau vacillait. — Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête. comme par ulcération sous-cutanée, surtout en rebroussant les cheveux et au toucher. — Contraction du cuir chevelu. comme si on arrachait les cheveux. — Traction et déchirement au cuir chevelu. — Gonflement de la tête. — Fourmillement rongeant au cuir chevelu. — oDartres sèches au cuir chevelu. — • Teigne périodique réapparaissant tous les ans. — Teigne à croûtes épaisses, qui détruisent les cheveux, avec pus verdatre, et prurit violent la nuit. — Petites tubérosités molles au cuir chevelu.

Toux. — *Douleurs dans les yeux, en remuant le globe de l'ail.

— Pression et sensation brûlante dans les yeux. — °Yeus fixes, turnes et abattus. — Cuisson dans les yeux et les paupières. — *Inflammation des yeux et des paupières, avec rougeur et agglutination nocturne. — Larmoiement abondant, avec gonflement adémateux autour des yeux. — °Photophobie. — Gonflement des paupières. — Gonflement de l'ail tout entier et des parties environnantes. — Orgelet aux paupières. — Roideur paralytique des paupières. — Tressaillement et fraissement des yeux et des paupières. — Voile devant les yeux et faiblesse de la vue; tous les objets paraissent pâles. — *Amblyopie après la suppression d'une transpiration habituelle des pieds, dies censation d'un voile devant les yeux.

Greilles. — Otalgie. — Battement denloureux dans l'ereille, la nuit. — Goussement des oreilles. — elécoulement de pus un gui-



nolent par les oreilles, avec surdité. - *Gonflement et inflam-

614

mution des parotides, avec fièvre.


Nez. — Rougeur du haut du nez, avec douleur d'excoriation au toucher. — Gonfiement du nez. — Sécheresse du nez en la nuit et en se baissant ou en renâclant. — Éternuments fréquents, violents, presque crampoïdes. — Écoulements abondants de mucosités nasales, sans coryza.


Visage. -- *Face pále, maladive, have, avec yeux bordés d'un cercle bleu et nez effilé. - *Visage defiguré, convulsé. - *Face rouge avec chaleur brûlante. - *Inflammation érysipélateuse et gonflement de la face, avec élancements pressifs et tensifs et fourmillement brûlant. -- *Erysipèle résiculeux, avec sérosité jaune dans les vésicules. - · Eruptions humides et croûtes épaisses au risage, avec suintement de serosités fétides et sanguinolentes *Eruption au visage, comme la couperose. — Eruption dartreuse, croûteuse, autour de la bouche et du nez, avec tressaillement pruriant et sensation brûlante. — Desquamation de la peau et au visage. - Contractions incisives et douleurs crampoïdes brulantes dans les joues (avec chaleur et rudesse de ces dernières). - Sueur froide au visage. - Éruptions de boutons brûlants autour des lèvres et du menton. -- Douleur crampoïde dans l'articulation des mâchoires, avec craquement au moindre mouvement. — °Crampes de la máchoire. — Gonflement dur et doulou-reux des glandes sous-maxillaires. — *Lèvres sèches, brunâtres.

Dents. — *Odontalgie, comme par excoriation ou avec déchirements, élancements, tressaillements, creusement et fourmillement, fréquennment la nuit, ou aggravée en plein air et soulagée par la chalcur extérieure, quelquefois aussi à la suite d'un refroidissement. — Vacillement des dents. — Exhalaison fétide par les dents cariées. — Douleur d'excoriation brûlante aux gencives, même la nuit.

Bouche. — *Sécheresse de la bouche, avec forte soif. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Il coule de la houche, la nuit, une salive jaune, et quelquefois même sanguinolente. — Accumulation abondante de mucosités visqueuses dans la bouche, avec crachement fréquent. — *Langue sèche, orouge ou brunâtre. — Sensation comme si la langue était recouverte d'une peau.

Gorge. — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur, aver douleur de meurtrissure, même en parlant, et avec pression et élancements pendant la déglutition. — Sensation dans la gorge, comme si quelque chose en était arraché. — *Difficulté d'avaler et douleur en ingérant des aliments solides, comme par rétrécissement de la gorge et de l'asophage. — L'eau-de-vie cause une sensation extraordinairement brûlante dans la gorge. — Accumulation abondante de mucosités dans la gorge, avec renâcle-





RHUS TOXICODENDRON.

615

ment fréquent, le matin. — Douleur pulsative au fond du gosier.

Appétit. — Goût putride, surtout le matin et après le repas. — Goût fade, pâteux ou âcre, d'une aigreur amère ou métallique. — Goût douceâtre dans la bouche. — Goût amer des aliments, surtout du pain, qui paraît âpre et sec. —*Absence totale d'appétit, arec répugnance pour tous les aliments, "surtout le pain, la riande, le café et le vin. — Sensation de plénitude et de saiété dans l'estomac, qui ôte tout appétit. — Après le repas, forte enrie de dormir, pression et plénitude dans l'estomac et le ventre, na: ées avec envie de vomir, lassitude, vertige et horripilation. — Le pain pèse sur l'estomac. — Douleur et chaleur dans la tête après avoir bu de la bière. — *Soif, le plus souvent par une sensation de sécheresse dans la bouche, même la nuit, ou le matin, avec désir principalement d'eau et de lait froid. — Grand désir de friandises.

Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois à vide. après le repas ou après avoir bu. - Violents renvois avec fourmillement dans l'estomac, soulagés en étant couché, renouvelés chaque fois qu'on se redresse. — Pituites de l'estomac. — Nausées et envie de romir; principalement après le repas et après avoir bu, comme aussi la nuit ou le matin, après le lever, soulagées en se couchant. -- Vomissement immédiatement après avoir mangé. - Vomissement fréquent, dans le choléra, avec froid général et circulation du sang diminuée. - * Douleurs dans l'estomac, comme s'il contenait des pierres, surtout après le repas. *Pression dans l'estomac et le scrobicule, souvent avec gêne de la respiration. - *Battement et élancements dans la région épigastrique. - Serrement, sensation de gonflement et douleur d'ulcération au creux de l'estomac. — Sensation de froid dans l'estomac. - Sensation dans le creux de l'estomac, comme si quelque chose en était arraché, surtout en se baissant ou en faisant un faux pas.

Pesanteur pressive dans le ventre, comme par un fardeau. —
Crampes abdominales contractives, qui forcent à se tenir courbe.
— Contraction dure et visible du ventre à travers l'ombilic.
— Contraction dure et visible du ventre à travers l'ombilic.
— Tournoiement fouillant dans le ventre, comme par un ver. —
Déchirements incisifs, tressaillements et pincements dans le ventre. — Sensation brûlante dans le ventre. — Laxité dans le ventre, avec ébranlement intérieur à chaque pas que l'on fait. — oColiques violentes, souvent la nuit, ou aggravées par des aliments ou des boissons quelconques, parfois avec selles sanguinolentes. Sensation dans le ventre, comme si quelque chose en était arraché. — oRougeur écarlate du bas-ventre. — Téguments du ventre douloureux, comme s'ils étaient ulcérés, surtout le matin en s'étirant. — Pression vers le dehors dans les aines, comme s'i une

À



RHUS TOXICODENDRON.

616

hernie allait s'établir.—Flatuosités abondantes, avec grondement. fermentation et mouvements pinçants dans le ventre. — Flatuosités très-fétides.


Selles. — *Constipation, quelquefois alternant avec diarrhées. — Selles dures et tardives. — *Ténesme, quelquefois avec nausées et déchirements ou pincements dans le ventre. — *Selles diarrhéiques sanguinolentes, "séreuses ou muqueuses, écumeuses gélatineuses, rouges ou striées de blanc et de jaune. — *Diarrhées opiniaires ou dyssentériques, aussi par suite de l'affection des glandes du mésentère. — Selles et mplètement blanches. — "Diarrhées nocturnes, avec coliques violentes, mal à la tête et douleurs dans tous les membres. — Selles involontaires, en dormant, la nuit. — Pendant la selle, haleine courte. — Fourmillement et prurit à l'anus et au rectum. — Après une selle molle, sortie des boutons hémorrhoïdaux de l'anus, avec douleur d'exceriation.

Urines. — Rétention d'urine. — *Envie pressante et fréquente d'uriner, jour et nuit, avec écoulement plus abondant. — Incontinence d'urine, surtout pendant le repos. — Émission goutte à goutte d'une urine rouge de sang, avec ténesme. — Émission d'urine diminuée, quoique l'on boive beaucoup. — Urine foncée, se troublant promptement. — Urine d'un blanc trouble. — Urine claire comme de l'eau, avec sédiment blanc de neige. — Enflure de l'urethre. — Jet d'urine double.

Parties viriles. — Forte éruption aux parties génitales. — Inflammation du gland. — Vésicules suintantes sur le gland. — Gonflement du gland et du prépuce. — Paraphimosis du prépuce. — Tache rouge à l'intérieur du prépuce. — Genflement et épaississement du scrotum. — Éruption humide au scrotum. — Érections fréquentes la nuit, avec envie d'uriner. — Forte propension à l'éjaculation, le matin.

Bègles. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Règles de trop longue durée. — Ecoulement de sang pendant la grossesse. — Douleur d'excoriation et élancements dans le vagin. — Écoulement de sang et de caillots par la matrice, avec douleurs d'enfantement. — Diminution de la sécrétion du lait.

Larynx. — Enrouement et âpreté de la gorge, avec sensation dans la poitrine, comme si elle était à vif. — Sensation de froid dans la gorge, en respirant. — Engouement facile. — Exhalaison brûlante par le larynx. — Sensation de constriction dans la fossette du cou, après une courte promenade. — Toux proroquée par un chatouillement dans les roies aériennes, généralement courte et sèche, avec angoisse et haleine courte, et principalement le soir arant minuit. — Toux, avec vomissement des aliments, surtout le soir, et en étant couché sur le dos. — Toux le matin, après le réveil. — Toux courte, avec amertume de la bouche, le soir, après s'être couché, et le matin après le réveil. — Toux



RHUS TOXPOUT TATROR

avec douleur d'estomat ou avec diminiement inns la pointine et a tête. — Toux avec expensarions d'un uniq rouge vi, et sensation de fadeur dans la pointine. — "Toux le prope la sont en se réceillant, avec expensarions d'uneutour. Leffecte le motion grande faiblesse, forte angrisse resolution profonte, inquientes corporelles avec besoin constant le manger le position quage à la suite d'un froid humale.

Trone. — *Dealeur de bromment our reine, virtuit it visces à pendant le repos. — Rolleur l'ultimense aux reine — Existes douleurense au sacrum — Theoritain de la definité verteure — *Douleure que reine, dans le dos et la naque, come et dos s'était donné un étant de ceine. — Trovisin et la norme et dos surteurs en étant assis et en se baissant. — De niferment rhumatismal entre les singletes azzrasé par le ficile a tiare par la chaleur. — Renceragneut du don. — Roldeur autuntiemale de la naque et la contact du don. — Roldeur autuntiemale de la naque et la contact du don.

Bras. — Dich recent et senertion le ilimite d'un l'épicle, ave paralyse du bros, sur ut poulant le marraise sais et dins le repos et à la chaleur de lit. — "Fro d, paralysée et insene b leté du bras. — Exectes au bras, avec senertion brilante et utieres suintant un pus sanieur. — "Cionflement écysipélateux et pustules, avec prurit brilant, acc bras, aux mains et aux digre. — Taches rouges sur les bras. — Dechirements, élancement et déchirement dans les bras. — Dechirement et l'ancement et déchirement dans les coules, les poignets et les articulations des doigts. — Fouillement dans les coules des doigts pendant le mouvement, et tremblement de ces parties après le moindre effort. — Goullement chaud des mains, le soir. — Eruption vésiculaire, en forme de grappe, au voignet.

- Eruption vésiculaire, en forme de grappe, au voixue. Cuisson au dos des mains. - Verrues aux mains et aux dougle.



618 RHUS TOXICODENDRON. -- RUMEX CRISPUS.


— Gonflement des doigts. — Tressaillement des pouces. — Contraction des doigts.

Jambos. — • Élancements et déchirements dans l'articulation coxofémorale, jusque dans le jarret, surtout en appuyant sur le pied, ou avec tiraillements sourds et sensation brûlante dans le repos, et sensibilité douloureuse des articulations en se levant de son siége, et en montant un escalier. — Tension et roideur dans les muscles et les articulations des hanches, des cuisses, des jambes, des genoux et des pieds. — *Paralysie des extrémités inférieures. - Crampes dans les fesses, les cuisses et les mollets, surtout la nuit, au lit, ou en étant assis, après avoir marché. — Tension dans le genou, comme si les tendons étaient trop courts. — Traction et déchirement tressaillant dans les cuisses et les jambes. Lancinations dans les cuisses, les jambes, les genoux, les pieds et les orteils. - Lourdeur des jambes, surtout dans les jarrets et les mollets. — *Paralysie des jambes et des pieds. -Elancements et douleur de luxation dans les malléoles, en appuyant le pied. - *Gonflement inflammatoire du cou-de-pied, equelquefois avec pustules et boutons miliaires à la partie affectée. - *Gonflement érysipélateux des pieds. — Gonflement des pieds, le soir. - Torpeur et pâtissement des pieds (pieds morts). -Distorsion des orteils. — Cors aux pieds, avec sensation brûlante et douleur d'excoriation.

RUMEX CRISPUS.

RUM-CR. — Patience crépue. — Voy. Héring, Études pathogénétiques américaines, au médicament ci-après.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament, encore peu connu dans ses effets physiologiques, a été employé avec succès contre: — Gastrite, avec douleurs lancinantes, passant, comme des coups, dans différentes directions vers la poitrine, avec douleur dans le creux de l'estomac, douleur et élancements dans la partie supérieure de la poitrine; sensation et plénitude dans l'épigastre jusqu'à la fossette du cou, redescendant vers l'estomac, pour un moment, en avalant à vide; flatulence, renvois et ballonnement pressif de l'estomac, après le repas. — Catarrhe intestinal, avec diarrhée matutinale, et toux excitée par un chatouillement dans la fossette du cou. — Catarrhe du laryax et de la trachée, avec quintes de toux sèche, provoquées par des inspirations profondes, ou accélérées, ainsi que par la parole, l'air froid, ou par une pression exercée sur la fossette du cou. — Bronchite, avec de longs accès



RUMEX CRISPUS. — RUMEX PATIENTIA.

619

d'une toux sèche, provoquée par les mêmes causes que ci-dessus, avec aggravation la nuit après s'être couché, et forçant de tirer la couverture sur la tête, parce que le moindre air froid excite un chatouillement pénible dans la fossette du cou. — Péricardite rhumatismale, avec douleur lancinante dans la région du cœur, en respirant profondément la nuit, au lit. — Eruptions scabéiformes; Gale des troupiers, n'affectant que la nuque, le dos, les épaules et la face dorsale des membres, et s'améliorant à la chaleur du lit. — Syphilis secondaire avec ulcères à la gorge?; Cachexie mercurielle?; Tumeurs et ulcérations cancéreuses?; Scrofules?; Carie et nécrose?; Scorbut?.

N. B. — Pour ceux qui nous ont demandé le Rumex crispus, pour avoir la Patience officinelle, nous leur dirons que le seul Rumex dont nous possédions une pathogénésie acceptable, est celui qui se trouve ci-après, sous le titre Rumex patientia, et qui, du reste, est la réritable Patience officinelle. — L'usage purement empirique qu'on a fait jusqu'ici du R. crispus pourra, du reste, être appliqué à la Patience, attendu que celui-ci est, par les anciens auteurs, déjà recommandé contre les mêmes maux que nous avons énumérés ci-flessus.

RUMEX PATIENTIA.

FUM. — Patience officinelle. — HERING. Études pathogénétique de l'Amérique du Nord. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop. COMPAREZ: Ox-ac, rhab.

CLINIQUE. — En examinant les symptômes caractéristiques de connédicament, on verra les cas où on pourra le consulter, surtout contre les affections suivantes: Éruptions croûteuses; Affections cancéreuses; Ulcères aux jambes; Dyspepsies; Gastrites; Cancer de l'estomac; Diarrhées; Catarrhes bronchiques; Douleurs de poitrine, etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande lassitude, faiblesse et fatigue corporelle et intellectuelle. — Dans la position couchée: douleur à la mâchoire inférieure; toux. — Pendant le mourement: douleur dans la tête, le cartilage typhoïde, l'épigastre, la poitrine et l'épaule. — Pendant la marche: toux; douleurs dans les oreilles, le côté droit du ventre, l'anus, l'hypocondre droit, la cuisse et le genou. — Au grand air: abattement, toux, caducité; douleur de poitrine; douleur dans l'os frontal, avec flatuosités; sensibilité au grand air: l'air froid donne la toux et des douleurs.



620 RUMEX PATIENTIA.

de poitrine. — La plupart des souffrances paraissent se manifester le soir et la nuit.

Peau. — Prurit à divers endroits. — *Étaptions; vésicules au nez et au cou. — 'Ulcères aux jambes. — 'Érysipèle avec chaleur fugace.

Sommeil. — Baillements fréquents; avec mouvements de flatuosités et douleur dans la région ombilicale. — Grande envie de dormir. — Sommeil agité, avec des réves de toutes sortes, dans lesquels les petits objets paraissent constamment grandir; rêves de dangers, d'inendations, de querelles, de soucis, de malheurs, etc.

Fièvres. — Frissennement et horripilations, surtout au dos. — Sensation de chaleur générale, mais principalement aux joues. — Sueur en se réveillant d'un bon sommeil. — Pouls fréquents, surtout après avoir monté les escaliers.

Moral et Intellect. — Abattement moral, comme l'appréhension d'un grand malheur; air très-sérieux, ainsi que la parole. — Caractère irascible, irritable. — Les petits objets paraissent grandir, pendant un sommeil agité. — Arrêt des pensées et grande indifférence, avec abattement corporel; répugnance pour la méditation, dans la matinée.

Tête.—°Tête entreprise pendant la toux.— Sensation de plénitude, pression, pesanteur et douleur sourde dans la tête. — Douleur aiguë dans l'os frontal, au grand air, avec flatuosités; douleur sourde au front, plus forte pendant le mouvement. — La nuit, pression dans la tempe et le côté droit de l'occiput; douleur dans l'occiput, la nuit, en se réveillant.

Yeux.—Douleurs (brûlantes, lancinantes) dans la région des sourcils. — Yeux douloureux comme si les paupières étaient sèches et enflammées, surtout le soir, sans altération visible. — Picotements dans l'œil droit.


Oreilles. — Prurit au fond du conduit auditif; dans le conduit gauche, suivi de bâillement. — Douleurs pressives dans l'oreille.

Mez.—Rougeur, vésicule et croûtes à la cloison du nez; brûlement au côté droit du nez et à la joue.—Saignement de nez.—Obturation de la narine droite, la nuit. — Éternument violent, la nuit. — Coryza: avec voix voilée; avec expectoration jaunâtre provenant des fosses nasales. — *Coryza fluent; *avec éternument; avec douleur dans la narine droite, et aggravation, le soir; oplus fort la nuit; très-violent, avec toux.

Face et Dents. — Chal ur à la face, surtout aux joues et particulièrement le soir. — Grande pâleur le matin. — Prurit à la face et à la lèvre supérieure. — Élancements à la mâchoire inférieure

et à la racine d'une dent canine, après s'être couché.

Bouche. — Salive augmentée, le soir. — Langue sèche et chaude, à sa partie antérieure, le soir; écorchure des bords, le soir; blanche; chargée d'un enduit jaune; d'un brun rougeatre, avec un enduit sec qui s'enlève facilement.



RUMEX PATIENTIA.

621

 *Accumulation abondante de mucosités dans les fosses Gorge. nasales et la gorge. - Sensation cmome si les parties étaient à rif, dans la gorge et au voile du palais; écorchure dans la gorge;

sensation comme s'il y avait un morceau dedans.

Goût et Appétit. — Mauvais goût de la bouche; goût amer; sur-tout le matin. — Appétit diminué; fortement augmente, avec faim après avoir mangé. — Forte soif, le soir. — Après le repas (de midi): renvois, douleur dans l'hypocondre droit et l'oreille; douleur dans l'hypocondre gauche en marchant vite; toux dès qu'on se couche; élancements violents dans la poitrine; colique venteuse. — Après le déjeuner : plénitude dans l'estomac; sensation comme si la digestion était arrêtée; coryza fluent. — Avant le déjeuner : toux.

Symptômes gastriques. — Renvois à vide, après le repas, avec douleur dans l'hypocondre droit. - Dégoût avec élancements dans la poitrine. — Nausées : en se réveillant à minuit, avec le goût des aliments ingérés, plénitude dans le ventre et douleur dans l'occiput; avec renvois, élancement au-dessus du sourcil et douleur dans la région ombilicale; le soir, améliorée aprèsavoir émis des renvois, et avec sensation comme avant la diarrhée; avec douleur dans l'estomac et le ventre; le matin, en s'habillant.

Estomac. — Douleurs sourdes dans l'estomac; douleur dans l'estomac en toussant, et chatouillement dans cet organe, qui provoque la toux. - Sensation dans l'estomac, comme si cet organe avait disparu; plénitude dans l'estomac, après le déjeuner. — Douleur lancinante dans le cartilage xyphoïde et les parties voisines de l'épigastre et la poitrine. — Cancer de l'estomac? — Gastrite?

Ventre. — Douleur dans l'hypocondre droit. — Douleurs dans l'hypocondre gauche : la nuit, en étant couché sur le côté gauche, forçant à changer de position, ce qui soulage; en marchant vite, après le repas de midi. — Douleur dans l'épigastre, le ventre et l'hypogastre, le soir, avec nausées; dans la région du colon ascendant, en marchant. - Douleurs dans la région ombilicale : avec nausées, rapports et élancements au-dessus du sourcil droit; subites, étant au lit, d'abord en bâillant, puis en respirant profondément : le soir, avec nausées, des deux côtés du nombril. Coliques renteuses: autour du nombril, le matin; commençant pendant le repas, après midi, et soulagées par l'émission des vents; sensation de vents qui se promènent dans les intestins et le rectum, le soir, précédée de bâillements et suivie de douleur dans la région pelvienne; plénitude dans le ventre, la nuit, en se réveillant; ballonnement et dureté du ventre; flatuosités avec douleur dans l'os frontal. - Douleurs de ventre qui changent de place. — Mal de ventre avec dégoût, élancements dans la poitrine et frissonnement. — Prurit au ventre. — Douleur dans l'aine, partant comme un coup, du rectum.

Anus et Belles. — *Constipation avec accumulation d'excréments



RUMEX PATIENTIA.

durs et tenaces; garde-robes insuffisantes. — Sclles liquides, diarrhéiques, le matin: brunâtres, et aqueuses, ou en forme de bouillie; avec ténesme; précédées de coliques. — Dans le rectum, sensation comme si l'on y enfonçait un bâton; prurit, irritation et chaleur autour de l'anus, surtout en marchant; apparition d'un petit bouton hémorrhoïdal.

Urines. — Envie pressante d'uriner. — Urines très-pâles. — Urines plus rares, rouges, troubles, avec rédiment floconneux et surface graisseuse. — Sédiment couleur de brique.

Parties viriles. — Douleur dans la région pelvienne. — Prurit au

prépuce; rougeur et écorchure au bord.

622

Larynx et Toux. — Voix d'un timbre plus élevé; voilée, comme pendant un coryza; nasillarde. — Enrouement, surtout le soir: osensation comme si le larynx était à vif, en toussant; *chatouil-lement dans la fossette du cou, provoquant la toux; ola pression sur la fossette du cou fait tousser. — Renaclement de mucosités du larynx et de la gorge. — *Toux, provoquée par un chatouillement dans la gorge : les bronches, la poitrine et l'estomac; *surtout le soir ou la nuit; dès qu'on se couche, la nuit et le jour. — En toussant : douleur aiguë dans la poitrine; élancements dans le poumon gauche, en respirant l'air froid; ébranlement douloureux de l'estomac, avec douleur au-dessus du sourcil droit; osensation comme si la poitrine était à vif.

Poitrine et respiration. — *En respirant, douleur d'écorchure dans la poitrine; en inspirant l'air froid, toux et élancements dans le poumon gauche. — *Douleurs de poitrine comme si les poumons étaient à rif; douleur sous le sternum; odouleur invétérée dans le poumon gauche; **douleurs en toussant. — *Élancements; *surtout à gauche; par l'air froid, dans la position couchée ou en se couchant. — *Douleur de luxation près du sternum. — Douleurs dans la région du cœur: à gauche, la nuit, en se réveillant; brûlantes, le soir et au commencement de la nuit. — Prurit au sternum, la nuit.


Tronc. — Mal aux reins, le matin. — Douleurs (pressives, aiguës) dans la colonne vertébrale et à côté; sensation de chaleur dans le dos et à la face, le soir; prurit au dos et entre les omoplates. — Douleur crampoide dans la nuque, à gauche; vésicules au côté

droit du cou, près de la mâchoire.

Membres thoraciques. — Douleurs dans les épaules et autour des clavicules. — Douleur dans le bras gauche, le soir, comme après un effort. — Douleur dans les articulations des mains; engourdissement de la main droite, le soir. — Doigts froids, pendant la toux.

Mombres polvions. — Douleurs rhumatismales dans les cuisses et les jumbes; sensation de fatigue dans les os. — Olleères aux jambes. — Sensibilité douloureuse des pieds, surtout dans les

cors, avec douleurs lancinantes.



RUTA GRAVEOLENS.

623

RUTA GRAVEOLENS.

RUTA. — Rue fétide ; rue des jardins. — Hahnemann. — Hist. nat et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 272. — Doses usitées : 12, 30. — Durée d'action : 8 à 45 jours. Antipote : Camph.

COMPARER AVEC: Acon. amm. arm. ars. asa. bell. bry. con. hyos. ign n. vom. op. plumb. puls. rhus. stram. veratr. — C'est quelquefois ign. qu'on peut administrer alternativement avec ruta.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Souffrances par suite de lésions mécaniques (contusion, chute, luxation, lésions des os ou du périoste); Carie?; Douleurs ostéocopes?; Paralysie par suite de lésions extérieures; Souffrances par suite d'un temps pluvieux et froid; Affections rhumatismales, principalement aux articulations des mains et des pieds; Amblyopie amaurotique, surtout par suite de travaux fins, de la lecture, etc.; Couperose; Affections vermineuses des enfants, surtout avec vomissement; Dyspepsie, surtout par suite de vomissements fréquents; Coliques vermineuses; Pneumonie chronique avec suppuration, par suite de lésions mécaniques de la poitrine; Paralysie desarticulations des mains et des pieds, soit par suite d'affections rhumatismales, soit par suite de luxation, etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTONES GÉNÉRAUX. — *Douleurs de brisement ou comme à la suite d'une contusion, d'une chute ou d'une meurtrissure, dans les membres, les articulations et les os, surtout au toucher.—*Douleurs dans le périoste des membres, brûlantes ou rongeantes.—Déchirements et tractions pressives, crampoïdes, dans les membres. — Sensation de plénitude dans tout le corps. avec gêne de la respiration. — Lassitude, faiblesse et pesanteur dans tous les membres, surtout en étant assis, avec grandes inquiétudes dans les jambes. — Marche chancelante, mal assurée, par faiblesse des cuisses. — En étant assis, après de petites promenades, sensation d'un grand brisement dans tous les membres, avec sensibilité douloureuse du sacrum et des lombes.

Peau. — Prurit rongeant à la peau. — Inflammations érysipélateuses. — Excoriation facile, chez les enfants ou bien en marchant et en montant à cheval. — Ulcères enflammés. — Anastrque. —

Verrues.



RUTA GRAVEOLENS.

Sommeil. — Bâillements fréquents et pandiculations. — Forte envie de dormir, le soir et après le repas, avec réveil en sursaut et cris perçants au plus léger attouchement. — Agitation la nuit, avec jactation et réveil fréquent.

Fièvre. — Horripilation, froid et frisson, même auprès du feu.—
Froid aux mains et aux pieds, avec chaleur à la face, embarras
dans la tête et soif. — Chaleur générale avec agitation et inquiétude mortelle, étouffement de la respiration et mal de tête pressif.

- Chaleur passagère, fréquente.

624

Moral. — Anxieté, comme trouble de conscience. — Disposition à la querelle et à la contradiction. — Inaptitude au travail. — On est mécontent de soi et des autres et disposé à pleurer. — Mélancolie et abattement moral. — Lenteur de la marche des idées.

- Fréquente absence d'esprit.

Tête. — Tête entreprise, comme si l'on n'avait pas assez dormi. — Vertige tournoyant, au point de tomber, le matin en se levant, comme aussi en étant assis et en se promenant en plein air. — Maux de tête, comme par une pression étourdissante sur tout le cerveau, avec grande inquiétude. — Douleur battante ou déchirante dans le front avec embarras de la tête, le soir, avant de se coucher, et le matin au réveil. — Chaleur dans la tête. — Douleurs de traction tensive ou lancinante, à l'extérieur de la tête, comme après un coup ou une contusion, surtout dans le périoste. — Prurit rongeant au cuir cherelu. — Nodosités et bosses au cuir chevelu, avec douleur d'excoriation au toucher, se formant après avoir éprouvé un déchirement à la partie qu'elles occupent. — Petits ulcères et croûtes suintantes au cuir chevelu.

Youx.—*Douleurs dans les yeux en regardant fixement un objet.

— Cuisson pruriante dans l'angle des yeux. — Pression sur les yeux.—Sensation brûlante dans les yeux, en lisant aux lumières.


— Larmoiement au grand air. — Tache sur la cornée. — *Auréole rouge autour de la lumière, le soir. — Frémissement et tressaillement des muscles des sourcils.— Spasmes des paupières.

— Propension à la fixité du regard. — *Vue trouble, comme à travers un brouillard et obscurité complète dans le lointain. — Points voltigeant devant les yeux. — °Myopie.

Oreilles et Nes. — Otalgie avec pression grattante. — Lancinations pruriantes dans l'oreille. — Douleur de meurtrissure dans le cartilage de l'oreille et sous l'apophyse mastoide. — Pression aigue et dure à la racine du nez. — Sueur sur le dos du nez. —

F pistaxis avec pression à la racine du nez.

Visage et Dents. — Douleurs de la face, comme par suite de contusions ou de coups, dans le périoste. — Déchirement crampoïde-dans l'os de la pommette. — Prurit et rongement à la face et sur les joues. — Érysipèle au front, avec gonflement. — Éruption de boutons aux lèvres. — Couperose. — Odontalgie avec



RUTA GRAVEOLENS.

625

douleur fouillante. — Sensibilité douloureuse et saignement facile des gencives.

Bouche et Gorge. — Bouche sèche, gluante. — Crampe de la langue, avec parole embarrassée. — Mal de gorge, comme par une tubérosité au fond du gosier, en avalant à vide. — Sensation d'excoriation et pression au voile du palais, en avalant.

Appétit. — Goût des aliments fade et sec, comme du bois. — Forte soif d'eau froide, après midi. — Dégoût des la première bouchée, avec sensation de plénitude et de satiété dans le ventre, d'ailleurs avec bon appétit. — *En mangeant, nausées subites, arec vomissement des aliments. — Après avoir mangé du pain, ou bien des crudités et des aliments indigestes. douleurs à l'estomac.

Estomac. — Renvois à vide, ou avec goût des aliments. — Hoquet en fumant. —Renvois putrides, après avoir mangé de la viande. —Renvois comme chez les femmes hystériques. —*Nausées dans le creux de l'estomac. — Vomissement, même des aliments. — Douleurs d'estomac après avoir mangé des crudités ou des aliments indigestes. — Pincements dans l'estomac après avoir mangé du pain. — Douleurs d'estomac, rongeantes, brûlantes ou pressives. — Élancements déchirants dans l'épigastre.

Ventre. — Pression rongeante dans la région hépatique. — "Gonflement douloureux de la rate. — Pulsation et picotement dans
l'hypocondre gauche. — Gonflement douloureux de la rate. —
Douleur de meurtrissure dans le rentre, avec fouillement dans
la région lombaire. — Pincements pressifs dans le bas-ventre. —
Pincements incisifs dans les côtés du ventre. — Élancements qui
remontent dans le ventre, en s'asseyant. — Sensation de froid,
ou chaleur, et sensation brûlante dans le ventre. — *Rongement
dans le ventre. — Coliques, comme par des vers. — Lancinations
dans les muscles abdominaux qui forcent à rentrer le ventre.

Selles. — Selles difficiles, évacuées sculement par de violents efforts, comme par inactivité du rectum. — Selles rares, dures, noucuses, comme des crottes de mouton. — *Diarrhée maqueuse alternant arec constipation. — *Envie fréquente d'aller à lu selle, arec évacuations peu abondantes, mais molles. — Envie intelle d'aller à la selle, avec chute du rectum. — *Chute du rectum à chaque selle. — Ecoulement de sang pendant la selle. — Déchirements et élancements dans le rectum.

Urines et Parties viriles. — *Encie d'uriner, quelquefois trèspressante, avec pression sur la vessie, et émission d'une urine peu abondante et verte. — Pression sur la vessie, quelquefois même après et hors le temps de l'émission des urines. — Emission d'urine fréquente et abondante, même la nuit. — *Encie continuelle d'uriner, même immédiatement après l'émission. — Rétention d'urine. —*Émission d'urine involontaire la nuit, au lit, et le jour, pendant le mouvement. — *Urine chargée de grarelle. — Exaltation de l'appétit vénérien. — Pollutions.



RUTA GRAVEOLENS.

Règles. — Stérilité. — *Règles très-irrégulières, trop fortes et trop hâtives. — *Règles de trop courte durée, précédées et suivies de flueurs blanches. — *Flueurs blanches, corrosires, après la cessation des règles.

Larynx. — Douleur de contusion au larynx. — Toux, le soir, après s'être couché, avec expectoration abondante de mucosités visqueuses, et soulèvement de cœur, comme pour vomir. — Toux croassante, la nuit, avec grattement dans la poitrine. — Toux avec expectoration abondante de matières purulentes. — *Expectoration de mucosités épaisses, jaunâtres, presque sans toux. mais arec sensation de fatique dans la poitrine.


Poitrine. — Haleine très-courte avec dyspnée. — Pression à la poitrine, avec sensation de plénitude. — Compression nocturne de la partie inférieure de la poitrine. — Lancinations dans la poitrine, souvent avec suspension de la respiration, principalement en montant un escalier. — Sensation de froid, ou chaleur dans la poitrine. — Sensation de rongement dans la poitrine. — *Au sternum, pluce douloureuse au toucher. — *Battement de cœur avec anxiété.

Tronc. — Douleurs de brisement dans le dos et aux reins, souvent avec étouffement de la respiration. — Traction dans la nuque et les omoplates. — Douleur de contusion aux reins et dans le sacrum. — *Élancements dans les reins, en marchant et en se baissant, ou seulement en étant assis.

Bras. — Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, surtout en laissant pendre les bras ou en les appuyant. — Secousses dans les bras, comme si c'était dans les os. — Déchirements sourds dans les os du bras et les articulations du coude. — Douleur de contusion dans l'articulation du coude. — Douleur de brisement duns les avant-bras, ainsi que dans les os et les articulations des mains. — Tractions pressives et crampoïdes, et déchirement dans les avant-bras, les mains et les doigts. — *Roideur paralytique du poignet. — *Douleur de luxation ou élancements dans les poignets. — *Douleur dans le poignet, en soulevant un fardeau.—*Torpeur et fourmillemeut dans les mains, après des efforts. — Contraction crampoïde des doigts. — Veines gonflées aux mains.

Jambes. — Traction crampoide dans les cuisses, jusque dans l'articulation coxo-fémorale et le sacrum. — Douleur de brisement dans l'articulation coxo-fémorale et les os des jambes, comme par une contusion, surtout au toucher et en les étendant. — Faiblesse dans les os des cuisses, en se levant de son siège, comme s'ils étaient brisés. — Faiblesse, tremblement, et pesanteur paralytique des genoux et des jambes, qui ne permet pas de se tenir solidement debout. — Fatigue et lourdeur des jambes, après la marche. — *Sensation de raccourcissement des tendons du genou. — *Ulcères fistuleux aux jambes. — Fléchissement

626



RUTA GRAVEOLENS. — SABADILLA.

627

des genoux, surtout en descendant un escalier. — Douleur brûlante, rongeante, dans les os des pieds, qui ne permet pas de les appuyer. — *Roideur paralytique du cou-de-pied, comme par luxation.

SABADILLA.

SABAD. — Cévadille. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 2 à 3 semaines.

ANTIDOTES : Camph. puls.

COMPARER AVEC: Ant. ars. caps. cham. chin. con. ign. natr-m. n-vom. plat. plumb. puls. rhus. sep. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Fièvres intermittentes, surtout au printemps; Angines chroniques, opiniâtres; Affections vermineuses, surtout souffrances par le ténia; Œsophagite?; Gastrite; Grippe, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. — Tractions douloureuses dans les membres, comme dans la moelle des os, avec disposition à l'étirer les membres, soulagées pendant le repos. - Raclement et douleurs incisires dans les os, comme par des conteaux, surtout dans les articulations, aggravés au toucher, soulagés en remuant promptement la partie. - Lancinations picotantes, pressives et sourdes à diverses parties. — Fourmillement dans les membres. Convulsions. — Lourdeur de la marche et des mouvements.— *Sensation douloureuse de paralysie dans les membres, et surtout dans les genoux. - *Lassitude et pesanteur dans tous les membres, aggravée le soir, ou rers midi, temps pendant lequel les douleurs dans les membres s'aggravent aussi. — En étant cou-· ché, on se trouve mieux qu'en marchant ou en se tenant debout. -- Plusieurs symptômes paraissent d'abord au côté droit, puis au côté gauche. - *Grande sensibilité au froid, qui aggrave le malaise et les douleurs.

Peau. — Élancements fourmillants et brûlants sous la peau. — Bandes, taches et points rouges à différentes parties de la peau. apparaissant plus fortement au froid. —•Couleur sale, grisatre de la peau.

Sommeil.—Forte enrie de dormir le jour, - avec baillements con-



628 SABADILLA.

tinuels et pandiculations. — Sommeil tardif par affluence dées. — Sommeil incomplet le soir, avec esprit fatigué par pensées étranges. —*Sommeil de nuit agité, non réparateur, av rèves anxieux.

Fièvre. — Fièvre sans soif, consistant seulement en froid et accès de chaleur isolés, qui sont plus sensibles à la face et ai mains qu'aux autres parties du corps. — Frisson ou froid ext rieur arec tremblement des membres, sans frisson, et arec so peu forte ou complétement nulle; puis chaleur, avec soif mod rée, accompagnée ou suivie de sueur. — °Pendant le frisson, doi leurs dans les côtes supérieures, toux sèche, crampoide et déchi rements dans tous les membres et les os. — °Pendant la chaleur délire, bâillements et pandiculations. — Sommeil pendant 1 sueur. — °Fièrre quotidienne, tierce, quarte, apparaissant i heures fixes, avec absence d'appétit, ballonnement pressif de l'estomac, douleurs de poitrine, toux, frissonnement, faiblesse et soif entre les frissons et la chaleur. — °Dans l'apyrexie, courbature des membres, sans autres souffrances.

Moral. —*Inquiétude et angoisse, avec grande agitation. —Disposition à s'effrayer. — Mauvaise humeur et colère. — Éloignement pour le travail. — Fureur. — Exaltation de l'esprit, avec caractère froid, et vice versa. — Difficulté de penser. —Erreurs de l'imagination pur rapport à soi-méme; il semble que le corps soit défait et comme un cadavre, que l'estomac soit


rongé, etc.

Tête. — Vertige avec nausées, soulagé en appuyant la tête. — Vertige avec perte de connaissance et obscurcissement des yeux, en se levant de son siége. — Mal de tête, avec douleur tensive, surtout pendant une fatigue intellectuelle. — *Mal de tête pressif et étourdissant, dans le front et les tempes. — Pesanteur douloureuse de la tête. — Douleurs térébrantes dans la tête toutes les fois qu'on s'est promené. —Battement pulsatif et douloureux dans la tête. — Fourmillement brûlant et picotement dans le front et au cuir chevelu.

Yeux. — Cuisson brûlante dans les yeux. — *Pression sur le globe des yeux, surtout en regardant en l'air. — *Rougeur du bord des paupières. — *Larmoiement, -surtout pendant la promenade au grand air, en regardant la clarté, en toussant, en bâillant, et à la plus légère douleur à d'autres parties. — Faiblesse de la vue.

Oreilles. — Otalgie, avec pression pénible. — Chatouillement dans les oreilles. — Prurit brûlant et élancements aux lobes de l'oreille. — Surdité comme s'il y avait un bandeau sur les oreilles. — Bourdonnement, grondement et détonation dans les oreilles. — Térébration dans les parotides.

Nez. — Fourmillement pruriant dans le nez, et cuisson contractive. — Épistaxis. — Grande sensibilité à l'odeur de l'ail. — Éternument ébranlant. — Obturation tantôt de l'une, tantôt de



SABADILLA.

629

l'autre narine. — *Coryza fluent, avec visage altéré et tête entreprise. — Mouchement de grosses masses de mucosités blanches

et transparentes, sans coryza.

Visage. — Chaleur de la face avec rougeur ardente, surtout après avoir bu du vin. - Cercles bleus autour des yeux. - Peau marbrée, dartreuse, à la face. — Sensation brûlante, douleur d'excoriation, picotement et fourmillement pruriant, aux lèvres. - Térébration dans la mâchoire inférieure et les glandes sous-maxillaires.

Dents. - Odontalgie, avec douleur tractive et pulsative. - Douleur lancinante dans les dents molaires. — Carie des dents. — Gencives blenatres. - Picotement dans les gencives. - *Douleur dans

les dents inférieures du côté gauche. Bouche. — Sensation dans la bouche et sur la langue, comme si elles étaient brûlées et excoriées. — Picotement au bout de la langue. — Bout de la langue bleuâtre. — *Langue chargée d'un enduit épais, jaunâtre. - *Sécheresse de la bouche, sans soif. Accumulation abondante de salire (douceâtre) dans la bouche.


Gorge. — Mal de gorge, comme par une cherille, ou un gonflement intérieur, pendant et hors le temps de la déglutition. - Sensation de constriction dans la gorge. - Pression et sensation brúlante dans la gorge, pendant et hors le temps de la déglutition. — Sécheresse de lu gorge. — Apreté et grattement dans la gorge, avec besoin continuel d'avaler ou de renâcler. — Inflammation de la luette.

Appétit. — Goût amer ou (d'une douceur répugnante). — Forte soif d'eau froide, de lait et de bière, même le matin. - Faim avec répugnance pour tous les aliments, surtout la viande (le café, le vin et les acides). - Boulimie, surtout le matin et le

soir (et principalement pour le miel et les farineux).

Estomac. — Renvois généralement à vide, et quelquefois avec horripilation. — Renvois douloureux et incomplets. — Pyrosis. — *Nausées arec envie de romir, -souvent avec horripilation, soulagées en mangeant. - Vomissement de lombrics. - Mollesse, malaise et froid dans l'estomac. — Fouillement dans la région épigastrique, avec douleur d'excoriation en pressant dessus. -Fréquemment, sensation subite de gêne de la respiration dans le scrobicule, avec anxiété. — Sensation de chaleur au scrobicule et brúlement à l'estomac.

Ventre. — Raclement pressif dans la région hépatique. — Traction fouillante dans le foie, avec douleur d'excoriation en pressant dessus. - Sensation de chaleur dans la région hépatique. -Mal de ventre, comme par des vers. — Constriction dans le ventre. — (Tranchées, comme par des couteaux). — Elancements violents dans les côtés du ventre qui obligent à se courber. -- Térébration, fouillement et rotation dans le ventre. -- Sen-



SABADILLA.

630

sation de froid, ou brûlement dans le rentre. — Contraction crampoide des muscles du ventre. — Taches et points rouges sur le ventre.

Selles. — Constipation. — Selle interrompue, dure, insuffisante. —
Forte envie d'aller à la selle, avec évacuation peu abondante. —
Selles diarrhéiques brunes ou fermentées, mêlées de mucosités et
de sang. — Pincements, déchirement et fourmillement dans le
rectum. — *Souffrances par le ver solitaire.

Urines. — Envie pressante d'uriner, surtout le soir, avec ténesme et émission peu abondante. — Sécrétion d'urine plus abondante. — Urine trouble, épaisse, bourbeuse. — Sensation brûlante en

urinant.

Parties génitales. — Douleur fouillante et pressive dans les testicules. — Appétit vénérien diminué. — Érections tensives et douloureuses, sans désir du coît. — Pollutions avec flaccidité de la verge. — (Règles en retard, mais plus abondantes et de plus longue durée).

Larynx. — Voix rauque, enrouée. — *Aphonie complète. — Renâclement d'un sang rouge vif, venant des fosses nasales. — Toux courte, sèche, même la nuit, par un grattement dans la gorge. — *Toux, avec romissement, élancements au rertex et douleur à l'estomac. — *Toux sourde, quelquefois avec crachement de sang. — *Toux dès que l'on se couche. — Toux avec expectoration et lancinations dans la poitrine.

Poitrine. — Respiration genée, comme s'il y avait une pierre sur la poitrine. — Respiration courte, difficile. — Respiration siffiante.

Pression à la poitrine.
 Sensation brûlante dans la poitrine.
 Élancemente dans les côtés de la poitrine, surtout en respirant et en toussant, qui troublent le sommeil de nuit et ne permettent pas de se coucher sur le côté.
 (Inflammation de la plèvre).
 Battement de cœur, avec pulsation dans tout le corps.
 Taches et points rouges sur la poitrine.

Tronc. — Douleur de brisement dans le dos et aux reins, surtout en étant assis. — Sensation de constriction depuis les omoplates jusque dans la poitrine, avec sensation comme si le sang n'y cir-

culait pas, aggravée au froid.

Bras. — Mouvements convulsifs des bras. — Tremblements des bras et des mains. — Taches, bandes et points rouges aux bras et aux mains. — Lancinations picotantes dans les avant-bras. — Sécheresse de la peau des mains. — Distorsion des doigts. — Taches jaunes aux doigts. — Desquamation de la peau autour des ongles.

Jambes. — Élancements dans les cuisses et les genoux. — Faiblesse et fléchissement des genoux. — Déchirement et tension dans les mollets, même la nuit. — Pesanteur des pieds. — Gonflement des pieds, avec sensibilité douloureuse de la plante des pieds. —

Sueur abondante à la plante des pieds.



SABINA.

631

SABINA.

SABIN. — Sabine. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 274. — Dose unitée: 30. — Durée d'action: 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

ANDAREE AVER. A. D. C. MERARE AVER. A. C. M. C. M SABIN.

COMPARER AVEC : Acon. arn. bell. cham. cocc. graph. ipec. puls. thui. veratr.

CLINIQUE. -- Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections arthritiques aiguës et chroniques; Maladies des os?; Odontalgie rhumatismale; Aménorrhée; Flueurs blanches; Métrorrhagies actives, surtout par suite de pléthore, et chez des femmes qui ont été réglées de bonne heure et très-abondamment; Métrorrhagies à la suite de l'accouchement, ou par suite d'un avortement; Disposition à l'arortement, surtout dans le troisième mois de la grossesse (en l'alternant avec lyc..) Hydropisie de l'oraire; Podagra, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs arthritiques, lancinantes et déchirantes, surtout dans les articulations, oet quelquefois avec gonflement rouge et luisant des parties affectées. •Nodosités goutteuses. — Traction lancinante dans les os cylin-- Sensation brûlante, pressive, dans le périoste qui est driques. gonflé.-Hémorrhagies.- Battement tressaillant dans toutes les artères. — Malaise général, comme après avoir beaucoup veillé. *Affections du périoste.

Peau.—Prurit à la peau, avec exceriation et ulcération ou plaques croûteuses, appropriée propriée de Sensation brûlante au toucher.


dans les parties de la peau qui sont affectées.

Sommeil. - Sommeil agité, avec réveil fréquent, bouillonnement de sang, chaleur et sueur. - Rêves anxieux. - Rêves continuels, pleins d'imaginations et d'efforts intellectuels. - Paroles et ronilement bruyant pendant le sommeil. - Disposition à être couché sur le côté gauche, en dormant.

Fièvre. — Horripilation et frisson, avec chair de poule et obscurcissement de la vie. - Chaleur brûlante sur tout le corps, avec grande agitation.—Chaleur de la face, avec froideur glaciale des pieds et des mains. - Fièvre le soir; d'abord frisson, puis chaleur.

et enfin sueur. - Sueur nocturne.

Moral. - Abattement, découragement et tristesse. - - Morosité, avec



632 SABINA.

éloignement pour la conversation, surtout en se promenant au grand air. - Disposition à se fâcher, avec pleurs et sanglots. --Îndifférence. — Faiblesse de la mémoire.

Tête. - Vertige étourdissant, à faire tomber, avec obscurcissement de la vue. - Accès de migraine. - Pesanteur et pression pénible dans la tête, souvent depuis le sinciput jusque dans la nuque. - Sensation d'écartement dans le front et les tempes. - Douleurs tractives dans la tête, surtout dans le front et les tempes. -Douleurs de téte luncinantes, avec cuisson ou pression, souvent dans tout le cerveau.--Fourmillement et térébration dans la tête. - Maux de tête pulsatifs, avec pesanteur et étourdissement. —

Les maux de tête paraissent souvent subitement, diminuent lentement, et se renouvellent fréquemment.

Youx et oreilles. -- Douleurs tensives dans les yeux, comme si les muscles étaient trop courts. — Yeux ternes, abattus. — Chaleur des yeux. - Larmes cuisantes. - Tressaillement frémissant des paupières. - Nuages devant les yeux. - Pincements dans les oreilles. - Dureté de l'ouïe.

Visage. — Face pale, avec cercles bleus autour des yeux. — Pores noirs sur les joues et autour du nez. - Douleur paralytique et pression à l'os de la pommette. - Lancinations depuis la mâchoire inférieure jusque dans l'os de la pommette.


Dents. — Odontalgic pendant et après le repas et la mastication. – Pression et battement dans les dents, surtout le soir et la nuit. avec sensation comme si la dent alluit être arrachée, aggravée en buvant, en fumant, et à la chaleur du lit, améliorée après le lever. - Traction dans les dents, en buvant, en mangeant, et par le contact de l'air. - Sensibilité douloureuse et gonflement blanc des gencives, autour d'une dent cariée. — Ulcère des gencives. - *Pression comme si la dent allait éclater.

Bouche. — Exhalaison putride par la bouche. — Salive rougeatre ou blanche, qui devient écumeuse en parlant. — Crachement de sung. -- Langue chargée d'un enduit blanc ou brunâtre.

Gorge. - Mal de gorge, pendant la déglutition, comme par un corps étranger ou un gonflement intérieur dans le gosier, avec pression et étranglement. — Lancinations sourdes dans la gorge.

Appétit. - Goût dans la bouche et la gorge, comme d'un vieux rhume. -- Gout fade, gras, ou comme de sang, dans la bouche. - Goût amer de la bouche, et amertume des aliments, surtout du luit et du café. — Appétence pour les acides, surtout pour la limonade. — Après le repai, aigreur dans l'estomac. Estomac. — Renvois à ride. — Nausées avec plenitude d'estomac.

- Vomissement de bile, *ou des aliments. - Plénitude et ballonnement de la région de l'estomac. - Pression à l'estomac. -Lancinations depuis le creux de l'estomac jusqu'à travers le dos. Ventre. — Pression dans la région hépatique. — Ballonnement du



SABINA.

633

ventre. — Douleurs contractives dans le ventre. — Pincements pressifs dans le ventre, comme par un refroidissement ou par une diarrhée. — Inflammation des intestins. — Douleur de meurtrissure dans les muscles abdominaux, le soir, au lit.

Selles. — Évacuations alvines, d'abord molles, puis dures. —
*Selles diarrhéiques, molles, -avec bruit et expulsion abondante
de vents. — Écoulement de mucosités sanguinolentes par l'anus.
— Écoulement de sang par l'anus, après une selle dure. —
Boutons hémorrhoïdaux de l'anus, douloureux. — Fourmillement
à l'anus.

Urines. — Rétention d'urine, avec émission goutte à goutte, et sensation brûlante. — Forte envie d'uriner, avec écoulement peu abondant. — Émission d'urine abondante, même la nuit. — Inflammation douloureuse de l'urethre, avec écoulement de pus, comme par une gonorrhée.

Parties viriles. — Tumeur dure sur le dos de la verge. — Élancements dans le gland. — Rougeur foncée du gland. — Sensibilité douloureuse du prépuce, avec difficulté de le retirer. — Frein gonfié et tendu. — Douleur d'excoriation aux condylomes. — Exaltation de l'appétit rénérien, avec érections violentes et prolongées.

Bègles. — Forte exaltation de l'appétit vénérien chez la femme. —
Douleur contractive dans la région de la matrice. — Congestion sanguine à l'utérus. — *Métrorrhagies, avec écoulement d'un sang caillé ou d'un rouge vif, et douleurs comme pour l'enfantement aux reins et dans les aincs. — *Règles trop abondantes. — oSuppression des règles avec flueurs banches. — *Avortement. — Gountement sensible des seins. — Fournillement dans les seins. — *Leucorrhée pruriante, jaunâtre, fétide, épaisse comme de l'amidon. — *Hydropisie de l'ovaire.

Larynx et Poitrine. — Toux sèche, proroquée par un chatouillement, ou suivie plus tard d'expectoration de mucosités striées
de sang. — Pression à la poitrine. — Tension pressive, crampolde dans la poitrine, principalement au milieu du sternum. —
Elancement et douleur d'excoriation dans le cartilage xyphoïde,
avec aggravation en respirant profondément et par le toucher. —
Tremblement dans les poumons, avec alement sourd et pétillement. — Battements de cœur, augmentés et tendus. — Lancina-

tions à l'extérieur de la poitrine et dans la clavicule.

Tronc. — Traction pressive aux reins, jusque dans la région de l'aine. — Déchirements pressifs et élancements dans l'épine dorsale. — Douleur de brisement dans les muscles et les vertèbres du cou.

Bras. — Douleur de luxation dans les articulations de l'épaule et des mains. — Déchirements pressifs et élancements dans les bras et les doigts. — Roideur arthritique et gonflement de l'articulation du poignet; avec déchirement et élancements. — Traction



SANGUINARIA CANADENSIS.

638

Pendant le mal de tête: chatouillement dans la gorge; frissons, parfois avec nausées suivies de chaleur fugace depuis la tête jusqu'à l'estomac; vertiges et douleur à l'oreille. — Les maux de tête s'aggravent particulièrement par le mouvement et en se baissant, et viennent parfois par accès. — • Mal de tête arec douleur d'excoriation, surtout aux tempes. — • Mal de tête remontant de la nuque comme un rayonnement. — Sensation comme si quelque chose tirait la tête en avant. — Douleur d'excoriation aux téguments de la tête, en y touchant. — Sensation comme si la peau de la tête était détachée du côté droit, avec tiraillement en levant les yeux. —* Enflure des veines à la tête, particulièrement aux tempes.

Yeux. — Yeux larmoyants, avec brûlement, ou bien avec douleur au toucher, suivie de coryza. — Sensation comme si des vapeurs acides étaient entrées dans l'œil. — Yeux troubles, avec sensation comme s'il y avait des cheveux dedans. — Scintillement devant les yeux. — Obscurcissement fréquent de la vue. — Pupilles dilatées.


Oreilles. — Battement au-dessous des oreilles. — Douleur d'oreille, avec mal à la tête. — Ochaleur brûlante aux oreilles, avec
joues rouges. — Élancement dans l'oreille gauche. — Bruissement et tintement dans les oreilles. — Ouïe très-sensible, chaque coup de marteau (d'une forge) est ressenti douloureusement.

Nez. — Sensation de chaleur dans le nez. — Perte de l'odorat. — Odeur devant le nez, comme des oignons rôtis. — Répugnance pour l'odeur de la mélasse. — Éternument fréquent. — Coryza fluent, corrosif, avec excoriation des narines, ou bien avec larmoiement violent de l'œil droit et selles diarrhéiques. — Alternation de coryza fluent et d'obturation du nez. — «Coryza avec gorge enrouée, douleur de poitrine, toux et diarrhée.

Pace. — Sensation de plénitude à la face. — Bouffissure du visage, avec rougeur foncée et sensation de roideur. — Rougeur de la face, parfois avec chaleur et brûlement. — Rougeur de l'une des joues. — Rougeur circonscrite de la face. — Face pâle pendant l'envie de dormir. — Couleur livide des joues et des mains, dans les pneumonies typhoides. — Tressaillement aux pommettes. — Roideur des mâchoires. — Sensation de sécheresse aux lèvres.

Dents. — Douleurs dans les dents cariées, surtout au contact des aliments, ou en y portant le cure-dents. — Rongement dans une molaire. — Mul aux dents, au réreil, avec mal de tête du même côté (droit), aggravation du mal de dents par l'eau froide et amélioration par des boissons chaudes. — Branlement des dents, au point qu'on croit les pouvoir ôter toutes.

Bouche. — Salivation, avec branlement des dents. — Fourmillement et picotement à la langue, surtout au bout de la langue. —





SANGUINARIA CANADENSIS.

639

Sensation d'excoriation et de sécheresse à la langue, comme après avoir mangé des choses âcres, le matin, au réveil. — Langue au vif, avec douleur d'ulcération. — Élancement au côté gauche de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Perte du goût.

Gorge. — Sensation de sécheresse dans la gorge, sans soulagement par la boisson. — Chaleur dans la gorge, soulagée par l'inspiration de l'air frais. — Sensation d'àcreté, comme après avoir mangé quelque chose d'àcre. — Brûlement dans le gosier, surtout après avoir mangé des choses sucrées. — Sensation de gonflement: comme si la gorge était fermée, et que la tumeur allait l'étouffer, avec aphonie; ou bien le soir, le plus fort pendant la déglutition, et surtout du côté droit. — ° Ulcération à la gorge.

Appétit et Goût. — *Manque d'appétit, avec langue chargée d'un enduit blanc. — Le sucre paraît amer et cause un brûlement au gosier. — Goût gras ou muqueux à la bouche. — Répugnance pour le beurre, qui a un arrière-goût douceâtre. — Désir de choses non définies, avec manque d'appétit. — Désir de choses piquantes. — *Grande faiblesse de digestion. — Après le repas,

sensation de vacuité dans l'estomac.

Estomac. — Renrois: spasmodiques et à vide; d'une odeur désagréable; avec envie de vomir et face pâle; avec soulagement des étourdissements. — Pyrosis et dégoût. — Hoquet en fumant du tabac. — Pituites avec envie de dormir. — *Nausées: après le repas: périodiques, avec manque d'appétit; en se baissant: avec besoin de cracher beaucoup; avec saliration et sensation comme si on allait mourir; arec frissons et chaleur, pendant le mal de tête aussi; °avant l'éruption urticaire. —ou avant le mal à la tête. — Vomissements: précédés de grande angoisse, d'envie inutile d'aller à la selle, ou de beaucoup d'autres souffrances; avec désir de manger, pour apaiser le mal de cœur; avec diarrhée; avec grande faiblesse; romissements amers. — Sensation de chaleur, d'ardeur et brûlement dans l'estomac. — Mouvements dans l'estomac, comme si quelque chose de vivant y sautillait — o'Infiammation de l'estomac?

Ventre. — Douleurs dans les hypocondres, avec vertiges continus et lassitude. — "Douleur dans l'hypocondre gauche, plus forte en toussant, moindre en pressant dessus et en se pliant à gauche. — "Torpeur et atonie du foie. — "Sensation d'un courant chaud passant de la poitrine au ventre, "suivie de diarrhée. — Battement dans le ventre. — Crampe dans le ventre, passant d'une place à l'autre. — "Ballonnement du ventre, le soir, avec émission de rents par le augin. — Emission de vents par le haut et le bas, en se redressant à cause de la toux, qui disparaît ensuite. Les maux de ventre viennent par accès. — Tranchées tractives. — Douleur fouillante dans le ventre, la nuit, avec maux de



SANGUINARIA CANADENSIS.

reins. — Elancements violents dans le ventre, comme par de couteaux, suivis de diarrhée aqueuse. — Le matin, colique, suivi de diarrhée. — Sortie fréquente de vents fétides.

Anus et Selles. — Envie inutile d'aller à la selle, avec sensatio d'un gros tampon dans l'anus, ou bien suivie de vomissement, or encore arec émission de vents. — Diarrhée: avec émission fré quente de vents; précédée de tranchées, de coliques, de douleur violentes. — Après les selles diarrhéiques, cessation du corvez, de la toux, des douleurs de poitrine. — Selles avec évacuation des aliments non digérés. — Selles molles, plus fréquentes, les premiers jours.

Urines. — Pissement fréquent, surtout la nuit aussi, avec émission fréquente d'urines claires, aqueuses.

Parties viriles. - Pollutions, deux nuits de suite.

Règles. — Souvent mal au ventre, comme si les règles allaient venir. — Règles trop hâtives de 8 jours, avec sang noir. — Règles plus fortes, avec mal à la tête surtout du côté droit, comme si les yeux allaient sortir de la tête. — Métrorrhagies. — Avortement. — o'Émission de vents par le vagin, avec orifice ouvert de la matrice. — Élancements dans les mamelles. — Douleur d'excoriation au-dessus du mamelon droit, plus sensible au toucher. — Excoriation et sensibilité douloureuse des mamelons.

Larynx. — Toussottement fréquent, surtout en mangeant; ou bien arec chatouillement à la gorge, le soir, parfois surtout après s'être couché, ou avec mal à la tête. — Toux sèche pendant le sommeil, et réveillant, ne cessant que par l'émission des vents par le haut et le bas après s'être réveillé sur son séant. — *Toux, ouvec ou *sans expectoration, oparfois violente, continuelle, avec rougeur circonscrite des joues, et douleur de poitrine. — Faci-

lite l'expectoration.

640

Poitrine. — Douleurs de poitrine, arec toux périodique, avec ou sans expectoration. — Respiration difficile, avec couleur livide des joues et des mains, et pouls vibrant et facile à comprimer (dans une pneumonie typhoide). — Pression et ardeur à la poitrine, suivies de chaleur dans le ventre et diarrhée. — Oppression et sensation de faiblesse dans la poitrine. — Sensation d'un courant ardent dans le côté droit de la poitrine, partant de la clavicule et de l'aisselle droites, et descendant jusqu'à la région du foie. — Élancements, dans la poitrine, à droite et à gauche. — Pression dans la poitrine, le dos et la région du cœur. — Battement de cœur avec grande faiblesse.

Tronc. — Maux de reins à la suite d'un tour de reins.—Douleurs au dos. — Mal aux reins, soulagé en se courbant en avant. — Douleurs rhumatismales à la nuque, Max épaules et aux bras, oparfois le plus fort la nuit, au lit, et surtout en se retournant.— Douleur d'excoriation à la nuque. — Douleur au cou, comme à la

suite d'un tour de reins.

į



SARRACENIA PURPUREA. — SASSAPARILI

Extrémités supérieures. — Douleurs rhumatismales bras et la paume des mains. — Douleur d'ulcération dans des mains. — Brûlement à la paume des mains, par rougeur. — °Couleur livide des mains. — °Roideur des tions des doigts. — Douleur d'ulcération au-dessous de l pouce. — °Panaris à tous les doigts.

Extrémités inférieures. — *Douleurs rhumatismales et trissure dans la hanche gauche, °ainsi qu'au côté int la cuisse droite, °ou bien alternant avec brûlement et dans la poitrine. — Roideur et tension dans les ja Crampe et traction dans les mollets. — Élancements de culation du pied et les malléoles. — Pieds froids, aprè *Brûlement à la plante des pieds et à la paume des mofort la nuit, au lit. — Douleurs aux cors. — Grande faibles jambes.

SARRACENIA PURPUREA.

SARRAC. - Voy. HALE, remèdes américains.

Ce médicament, dont nous ne possédons encore aucune nésie sérieuse, doit sa grande réputation uniquement à la cavec laquelle certains empiriques l'ont prôné comme un sabsolu contre la petite vérole, prétendant qu'il neutralisai dans le sang, de la manière la plus radicale. Depuis lors, catance a été, tant en Amérique, qu'en Angleterre, en Fra Belgique, employée bien souvent contre la petite vérole; ma que ses prôneurs ne peuvent dire assez des succès suqu'ils en ont obtenus, il en est d'autres qui lui contestent cacité contre cette maladie. Quant à nous-même, nous en l'un et l'autre: les cas des plus graves où sarrac. produisi racles, et d'autres où il restait absolument sans nul effe nous manque, ce sont les indications caractéristiques pour ploi dans chaque cas individuel.

SASSAPARILLA.

SASS — Salsepareille. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. homœop., p. 277. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : jusqu'à ! dans des affections chroniques.

COMPARER AVEC : Amm. cham. clem. cocc. merc. puls. ran. sep.



SASSAPARILLA.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections rhumatismales et arthritiques, surtout à la suite d'un refroidissement dans l'eau ou après la suppression d'une gonorrhée; Ulcères et autres souffrances par l'abus du mercure ; Dartres, Calculs urinaires et rénaux; Constipation, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

642

SYMPTOMES GENERAUX. - Douleurs lancinantes, déchirantes, pressives. - Déchirement paralytique dans toutes les articulations et les membres, souvent accompagné de tremblement des mains et des pieds, déchirements douloureux dans la tête, et pincement: dans le ventre. — Douleurs arthritiques, avec diminution de la secretion des urines. -- Roideur et immobilité des membres. -Gonflements chauds et épais. — Grande lassitude, surtout dans les membres inférieurs. — Lassitude dans les mains et les pieds. -Amaigrissement. - Les douleurs attaquent le moral et abattent l'esprit.

Peau. - Prurit, quelquefois sur tout le corps, surtout le soir au lit, et le matin, en se levant. - Boutons rouges et secs, qui ne démangent qu'à la chaleur. -- Eruption miliaire, au contact de l'air frais, en sortant d'un appartement chaud. - Eruptions urticaires. — Vésicules purulentes. — Dartres, presque à toutes les parties du corps. — Verrues. — Peau ridée. — Rhagades profondes, brûlantes, douloureuses (aux doigts).


Sommeil. — Sommeil de bonne heure, le soir. — Insomnie nocturne et réveil fréquent. - Rêves effrayants, avec sursauts fré-

Fièvre. — Frissons nuit et jour. — Froid, même auprès du feu, par tout le corps, excepté au visage et à la poitrine, mais principalement aux pieds. — Chaleur le soir, avec bouillonnement de sang, battement de cœur et sueur au front.

Moral. — Anxiété, avec tremblement dans les pieds. — Morosité et mauvaise humeur, avec aptitude au travail. - Irascibilité et sus-

ceptibilité. - Humeur changeante.

Tête. — Vertige, en fixant longtemps les yeux sur un objet. — Vertiges, avec nausées et renvois aigres. — Maux de tête, avec nausées et vomissements aigres. - Maux de tête lancinants ou pressifs, ou bien pressifs et lancinants à la fois. - Douleurs de tête crampoïdes, semi-latérales, comme si la tête était serrée dans un étau, avec obscurcissement des yeux, besoin de se coucher et résonnement dans le cerveau à chaque parole qu'on prononce. Douleurs battantes dans la tête. - Bruit et bourdonnement dans la tête.—A l'extérieur de la tête, douleurs pressives et incisives, ou lancinantes pressives, tractives et déchirantes, aggravées par



SASSAPARILLA.

643

le contact et la marche. -- Sensibilité du cuir chevelu. -- Chute des cheveux.

Youx. — Douleurs dans les yeux, par la clarté du jour. — Pression dans les yeux, surtout le soir, en lisant aux lumières. — Élancements dans les yeux. — Sensation brûlante dans les yeux et les paupières. — Agglutination des paupières, le matin. — Angles internes des yeux, bleus et gonflés. — Obscurité devant les yeux, comme un brouillard. — Reflet rouge du papier blanc, le soir.

Oreilles et Nez. — Élancements dans les oreilles. — Contraction et pression dans les oreilles. — Croûtes brûlantes, pruriantes, aux lobes des oreilles. — Tintement et sonnerie dans les oreilles. — Epistaxis. — Éruption croûteuse, sur, sous et dans le nez. — Coryza sec et obturation du nez. — Mucosités nasales trèsducies.

épaisses.

Visage. — Éruption faciale. — Éruption pruriante sur le front, avec sensation brûlante et suintement après avoir gratté. — Taches rudes, rouge pâle sur le front. — *Croûtes épaisses au visage. — Roideur et tension dans les masséters et les articulations de la mâchoire. — Dartre sur la lèvre supérieure. — Vésicules purulentes et pruriantes au menton.

Dents. — Odontalgie, avec déchirements tractifs, par un courant d'air froid ou par des boissons froides. — Agacement des dents supérieures. — Déchirement dans les gencives. — Gencives gon-

flées, avec douleur d'excoriation.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche. — Aphthes sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec douleur lancinante, en avalant. — Pression crampolde dans la gorge, comme un étranglement, avec gêne de la respiration. — Sécheresse et âpreté dans la gorge, surtout le matin. — Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge.

Appétit. — Goût amer, ou acide et pâteux, ou bien douceâtre, métallique et herbacé. — Amertume du pain. — Insipidité des aliments. — Après le repas, sensation de vide dans l'estomac, comme si on était à jeun, ou bien dégoût seulement en pensant à ce que l'on a mangé. — Soif d'eau surtout, même le matin.

Estomac. -- Renvois et régurgitations, surtout pendant et après le repais, généralement amers ou aigres. -- *Nausées fréquentes ou continuelles, avec envie inutile de vomir. -- Vomissements aigres. -- Douleurs constrictives dans l'estomac. -- Pression dans le creux de l'estomac. -- Chaleur et sensation brûlante dans l'estomac, surtout après avoir mangé du pain.

Ventre. — Douleur de brisement dans l'hypocondre gauche. — Élancements dans l'hypocondre gauche. — Grande sensibilité du ventre à la pression extérieure. — Douleurs intestinales, constrictives et crampoides. — Tranchées, surtout dans la région ombilicale. — Élancements dans les côtés du rentre, surtout



SASSAPARILLA.

644

dans le côté gauche. — Sensation de froid, ou chaleur et sensation brûlante dans le ventre. — Sensation de vacuité et borborygmes dans le ventre. — Expulsion abondante de vents fétides.

- Inertie des intestins.

Selles. — Selles dures, retardées et rares, souvent avec besoin pressant. — Évacuations alvines, douloureuses, difficiles, avec douleurs contractives dans le ventre et forte pression vers le bas. — °Constipation opiniâtre, avec envie fréquente d'uriner. — Selle gluante, tenace. — Selles diarrhéiques, âcres, corrosives, avec maux de ventre. — Pendant la selle, accès d'évanouissement. —

Douluer d'excoriation et prurit brûlant à l'anus.

Urines. — Ténesme vésical, avec pression sur la vessie et écoulement d'une matière blanche et trouble, mêlée de mucosités. —
Envie fréquente d'uriner, sans résultat, ou avec émission peu abondante. — Émission fréquente et abondante d'une urine pâle, jour et nuit, souvent sans sensation dans les voies urinaires. — Urine trouble, bourbeuse. — Urine enflammée, rare, rouge. — Flocons filiformes dans les urines. — Sang dans les urines, vers la fin de l'émission. — o'Urines chargées de gravelle et de petits calculs. — Sensations brûlantes en urinant. — Crampe de la vessie, avec douleur contractive. — Écoulement de pus par l'urèthre, comme une gonorrhée.

l'urèthre, comme une gonorrhée.


Parties génitales. — Exhalaison fétide des parties génitales. —
Inflammation et rougeur du gland. — Dartres sur le prépuce. —
Désir du coît, avec pollutions fréquentes et douloureuses. —
Règles en retard, peu abondantes et âcres. — Pendant les règles, envie d'uriner, excoriation entre les cuisses, pincements dans le ventre et serrement comme par une griffe aux reins, et dans le

creux de l'estomac. — Leucorrhée muqueuse.

Larynx. — Toux violente, avec sensation d'ulcération chatouillante dans le gosier, ou par une âpreté dans la gorge. — Respiration courte et génée. — Forte dyspnée et étouffement, par une sensation de constriction dans la gorge, qui oblige à se débarrasser de tous les vêtements qui couvrent le con et la poitrine. — Oppression crampoïde de la poitrine. — Respiration profonde, fréquemment. — En respirant profondément, sensation comme s'il y avait un corps qui se fût arrêté dans le dos. — Haleine fétide. — Pression à la poitrine, souvent avec haleine courte. — Élancements dans les côtés de la poitrine, qui forcent souvent à se replier sur soi-même. — Battements de cœur. — Douleur tensive à l'extérieur de la poitrine, comme par raccourcissement, en se redressant. — Mamelons flétris, insensibles.

Tronc. — Douleur de brisement aux reins, surtout pendant qu'on se baisse et après. — Fourmillement aux reins. — Douleur tensive depuis les reins jusque sur les hanches, au moindre mouvement. — Pression douloureuse et tension dans le dos et la nuque, avec lancination au moindre mouvement du tronc on de la tête.





SASSAPARILLA. — SECALE CORNUTUM.

Lancinations entre les omoplates et dans les muscles du cou. — Gonflement d'un côté, douloureux au toucher.


Bras. — Déchirements et élancements pressifs dans les bras, les avant-bras et les articulations des mains et des doigts. — Sueur aux mains. — Dartres aux mains. — Engourdissement des doigts. Douleur au bout des doigts, comme par ulcération souscutanée. — Vésicules purulentes aux doigts. — Rhagades profondes à la peau des doigts.

Jambos. — Déchirements pressifs et élancements dans les cuisses, les genoux et les jambes. - Lassitude dans les cuisses et les articulations des genoux. - Gonflement et roideur des genoux, avec élancements. — Taches dartretues rouges, aux mollets. — Roideur des jambes, comme par contraction. — Crampes dans les jambes et les mollets. — Sensibilité douloureuse de la plante des pieds. - Tension et gonflement des pieds, avec chaleur et rougeur. - *Froid aux pieds, surtout avant de se coucher.

SECALE CORNUTUM.

SEC. Seigle ergoté, Ergot de seigle. — HARTLAUB et TRINKS. — Hist. nat. et prép. Voy. l'harmac. homœop., p. 279. — Doses usitées : 3,30. — Durée d'action : jusqu'à 7 semaines dans les affections chroniques.
ARTIBOTES : Camp. (solan-nigr.)
COMPARER AVEC : Arn. camph. ign. laur. veratr.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Hémorrhagies, surtout chez les sujets faibles, cachectiques : Spasmes hystériques, chez des femmes d'une constitution faible : Convulsions par suite d'une frayeur; Gangrène sénile ??; Amblyopie amaurotique; Hémorrhagie nasale; Souffrances des enfants, par suite de la dentition; Affections gastriques et bilieuses; Coliques; Gastrite??; Entérite??; Choléra asiatique et sporadique; Cholérine; Diarrhées, surtout chez les vieillards; Métrorrhagies des femmes faibles et cachectiques; Prodromes de l'avortement, surtout dans le troisième mois; Absence de douleurs d'enfantement; Douleurs d'enfantement spasmodiques; Adhérence du placenta; Lochies de trop longue durée; Métrite par suppression des lochies; Affections his-tériques, par manque de vitalité dans l'utérus?; Affection gangréneuse de la matrice, etc., etc. Voy. la note, page 15.



SECALE CORNUTUM.

millement dans les membres et les articulations. — Doulen crampoïdes, violentes et erratiques. — Sensation brûlante dar toutes les parties du corps, comme par des étincelles. — Distoision des membres. — Spusmes toxiques. — Tressaillements e mouvements convulsifs dans les membres, se manifestant surtou la nuit, souvent aussi périodiquement, et soulagés en étirant vio lemment les parties. — Tétanos. — Attaques d'épilepsie. — Atrophie générale et amaigrissement. — Marche mal assurée. — Éva nouissements. — Grande lussitude et paresse. — Tremblement des membres. — Faiblesse, pesanteur et torpeur des membres. — Paralysies. — Mort de quelques parties par sphacèle.

Peau. — Peau blafarde, plombia, flétrie et ridée. — Peau rude, sèche. — Torpeur et insensibilité de la peau. — Eruption miliaire, surtout à la poitrine et à la nuque. — Fourmillement sous-cutané. — Desquamation générale de l'épiderme. — Pétéchies. — Furoncles. — Pustules noires, gangréneuses. — Vésicules sanguinolentes, et qui passent à la gangrène, aux membres.

Sommeil. — Forte envie de dormir et somnolence. — Sommeil profond, comateux. — Insomnie avec agitation et chaleur sèche.

- Somnolence avec délire, sursauts et effroi.

Fièvre. — Frisson violent, suivi de chaleur brûlante, avec forte soif. — *Froid excessif dans le dos, le ventre et les membres. — oChaleur sèche, avec pouls accéléré, agitation et insomnie. — oPouls petit, supprimé. — *Sueurs froides.

Moral. — Découragement et caractère peureux. — *Tristesse et mélancolie. — *Forte angoisse. — Démence furieuse, avec désir de s'élancer dans l'eau. — Fureur et envie de mordre. — *Crainte de la mort. — Manie. — Faiblesse des facultés intellectuelles. — Aliénation mentale. — *Délires. — Perte de connaissance.

Tôte. — Téte embarrassée, étourdie. — Ivresse. — *Accès de rertiges de diverses natures, même opiniâtres. — Mal de tête, avec embarras sourd et douloureux, surtout à l'occiput. — Douleur de tête semi-latérale. — Chute des chereux.

Youx. — *Globe des yeux enfoncé. — Pupilles contractées spasmodiquement, ou bien dilatées. — Yeux convulsés. — Regard fixe, égaré. — Diplopie. — Brouillard, taches et voile devant la vue. — Faiblesse de la vue. — Scintillement devant les yeux et obscurcissement de la vue.


Oreilles et Nez. — Bourdonnement d'oreilles et dureté de l'ouïe.

— Surdité passagère. — *Épistaxis.

Face et Dents. — *Visage décoloré, pâle, jaune, hâve, avec yeux caves, bordés d'un cercle bleu. — Distorsion des traits du visage. — Taches livides à la face. — Fourmillement dans le visage. — Lèvres et bouche douloureusement contractées. — Trismus. — Grincement des dents. — Vacillement et chuis des dents.

Bouche et Gorge. — Sécheresse de la bouche, avec soif. — Crachement de sang. — Écume à la bouche, sanguinolente ou vert

646



SECALE CORNUTUM.

647

jaunâtre. - Langue décolorée, brune ou noire, ou bien chargée d'un enduit épais. — Fourmillement douloureux dans la langue. Gonflement de la langue. — Parole bégayante, embarrassée, indistincte, faible. — Sécheresse de la langue. — Sensation brûlante, ou fourmillement pénible de la gorge. — (Inflammation de l'œsophage.)

Estomac. — Goût émoussé. — *Soif ardente, inextinguible. — Faim insatiable, surtout pour les acides. — Renvois fréquents. *Dégoût et nausées.—*Vomiturition et vomissement de matières bilieuses, crues. — Vomissement facile. — oVomissement des aliments, avec grande débilité. — Vomissement de lombrics. — Vomissement de mucosités. — Vomissement de bile noire. Pression à l'estomac. - Crampes d'estomac. - Sensibilité douloureuse excessive, oppression pénible et angoisse dans le creux de l'estomac, avec envie inutile de vomir. - Sensation brûlante dans le scrobicule et l'estomac. - Inflammation et cancer de l'estomac

Ventre. - *Ventre excessivement ballonné et tendu. - oTranchées et douleurs déchirantes dans le ventre. - Douleurs fixes, brûlantes dans les régions splénique et lombaire. — Coliques, avec maux de reins, douleurs dans les cuisses, rapports fréquents et vomissements. — *Coliques douloureuses, -arec convulsions. — Sensation d'un froid excessif dans le ventre et le dos. — *Sensation brûlante dans le ventre. — Borborygmes.

Selles. — Constipation, avec besoin continuel et inutile d'aller à la selle. — Selles diarrhéiques, fréquentes, arec évacuations séreuses, muqueuses, ou bien décolorées, ou bleuâtres. — Diarrhée d'odeur putride. - *Diarrhées, avec oprostration subite des

forces. — Selles involontaires. — Expulsion de vers.


Urines. — Suppression de la sécrétion des urines. — OUrines rares, chaudes, brûlantes. — Urine émise goutte à goutte; difficile, rare, avec besoin continuel. - Urine claire comme de l'eau, blanche. - Sécrétion d'urine augmentée. - · Hémorrhagie

par l'unethre.

Règles. - *Règles trop abondantes et de trop longue durée, quelquefois avec spasmes violents .- *Métrorrhagies -d'un sang noir, liquide, coulant surtout pendant un mouvement un peu fort, quelquefois avec fourmillement dans les jambes et grande débilité. — *Arortement. — «Après l'avortement, manque de contraction de l'utérus. — «Gonflement et verrues au col de la matrice qui est béant. — *Congestion sanguine à l'utérus. — Lochies rares, fétides ou de trop longue durée et sanguinolentes. -*Abaissement de la matrice. -- *Inflammation de la matrice.
Poitrine. -- Voix rauque, creuse. -- Respiration anxieuse et génée.

avec soupirs et sanglots. - Dyspnée et oppression de poitrine. Oppression de poitrine suffocante, avec crampe dans le diaphragme. - Battements de cœur spasmodiques, violents.





SECALE CORNUTUM. -- SELENIUM.

Tronc. -- Fourmillement et insensibilité dans le dos. - Boideur de la nuque. — Sensation de froid au dos. — Forte éruption miliaire à la nuque *et à la poitrine.

Bras. — Courbure spasmodique du bras, avec tiraillement dans la partie. — Sensation brûlante dans les mains. — Gonflement des mains, avec pustules noires. - Gonflement ædémateux à l'articulation de la main. — Distorsion des mains. — Fourmillement dans le bout des doigts, avec torpeur et insensibilité de ces parties. - Contraction, distorsion et renversement des doigts. -

Sphacèle des doigts.

648

Jambes. — Lassitude et endolorissement dans les jambes. — Contraction des jambes et des orteils. - *Crampes pénibles dans les mollets et la plante des pieds, surtout la nuit. — Sensation brûlante dans les pieds. — Distorsion des pieds. — Gonflement des pieds, avec pustules noires. — Sphacèle des orteils. — Fourmillement dans les orteils.

SELENIUM.

.. — Selenium. — HÉRING. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop. - Dose usitée : 80. — Durée d action : 5 à 6 semaines dans les affections chroniques.


Antidotes: Ign. puls. — Le vin. et le chin. aggravent les souffrances.

COMPARER AVEC: Carb. cinnab. graph. ign. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus.

sulf. thui. — C'est surtout après cinnab., que selen. est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs dans tous les membres, comme par un refroidissement. — Amaigrissement excessif, surtout du visage, des mains et des jambes. - Le china produit des souffrances extraordinaires et aggrave celles déjà existantes d'une manière insupportable. - Grand désir d'être couché ettle dormir. surtout pendant la chaleur du jour. — Aggravation des symptômes après avoir dormi. — Impossibilité de supporter le courant d'air. - Accès de vertige avec défaillance, sueur anxieuse, face pâle et décomposée, nausées et romissement, surtout après le déjeuner et le repas fait à mili, avec grande faiblesse, selles bilieuses, élancements dans la poitrine comme par des flatuosités incarcérées, tête douloureusement entreprise, hoquets et rapports fréquents.

Peau. — Fourmillement fréquent à des parties circonscrites de la peau, avec forte envie de gratter. — Éruptions miliaires. — Suintement prolongé des parties que l'on a grattées. — Ulcères lisses. — Éruption galeuse, à la suite de la rougeole. Sommeil. — Envie de dormir; le soir, de bonne heure, avec som-



SELENIUM.

649

meil incomplet la nuit et réveil fréquent. — Sommeil tardif, le soir. — Tressaillement du corps en s'endormant. — Sommeil léger la nuit, avec réveil au moindre bruit. — Réveil de bon matin et toujours à la même heure. — Rèves de querelles et de cruautés contre nature. — Sommeil plein de rèves avec des comptes et des calculs. — Rèves de voyages.

Pièvre. — Ardeur brûlante à quelques parties assez étendues de la peau (de la poitrine, du ventre, des lombes et des côtés). — Chaleur et froid alternant constamment. — Tendance par trop excessive à transpirer, pendant la marche et la sieste. — Sueur qui fait des taches blanches dans le linge et le roidit (sur la poitrine et sous les aisselles).

Moral. — Révasseries réligieuses et mélancoliques. — Grande loquacité. — Oubli excessif, surtout dans les affaires. — Incapa-

cité absolue d'exécuter un travail quelconque.

Tôte. — Fatigue de la tête, par un travail intellectuel. — Vertige à faire tomber, le soir, en allant en voiture. — Vertige en se levant. — Mal de tête toutes les après-midi. — Maux de tête après aroir bu de la limonade, du vin ou du thé. — Violents accès de maux de tête lancinants, au-dessus de l'œil, avec besoin de se coucher, sensibilité de l'extérieur de la tête, émission d'urine abondante, absence d'appétit et mélancolie, provoqués par la marche et les odeurs fortes. — Chute des cheveux en se peignant. — Douleur au cuir chevelu, comme si on arrachait les cheveux. — Élancements au front, aux tempes et aux yeux, en passant de l'air froid à la chaleur de la chambre.

Yeux — Nes. — Douleurs dans la profondeur des orbites. — Vésicules pruriantes dans les sourcils et sur le bord des paupières. — Chute des sourcils. — Sécrétion plus abondante d'un cérumen qui se durcit dans l'oreille de laquelle on est sourd. — Prurit au nez, dans les narines et sur le bord des ailes du nez. — Besoin de mettre les doigts dans le nez. — Obturation du nez. — Coryza fluent le soir. — Mucosités nasales, jaunes, épaisses, géla-

tineuses.

Face — Gerge. — Peau huileuse à la face. — Tressaillement des muscles du visage. — Lèvre supérieure gercée. — Odontalgie qui force à se servir du cure-dents jusqu'à ce que le sang vienne. — Douleur dans une dent cariée, avec sensation de froid jusque dans la joue, s'aggravant le soir au lit, soulagée par l'air libre, l'eau froide, le boire, le manger et la fumée de tabac. — Térébration dans les dents molaires. — Les dents deviennent dures, lisses, et crient quand on les frotte. — Sécheresse de la gorge. — Espèce de bégayement, qui fait qu'on confond et qu'on déplace les syllabes des mots. — Douleur sous la racine de la langue. — Langue chargée d'un enduit blanc, épais, le matin. — Grande sécheresse de la gorge, surtout le soir.

Appétit. — Goût douceatre, désgréable, après avoir fumé. --

JAHR. - 8º édit., Iro part., t. II.



SELENIUM.

650

Absence d'appétit, le matin. - Faim la nuit. - Répugnance pour les choses salées. — Désir fréquent d'eau-de-vie. — Hoquet et renvois après avoir fumé. — Après le repas, battement des artères dans tout le corps, surtout dans le rentre. — Beaucoup de soif, le soir.

Ventre et Selles. - Douleur au foie, surtout en inspirant, s'étendant jusqu'à la région des reins, avec sensibilité à la pression extérieure. — Miliaire rouge, pruriante, à la région hépatique. -- Elancements violents dans la rate en marchant. — Constipation. - Selles dures, suivies d'écoulement de mucosités ou de sang. --- Selles moitié liquides, avec ténesme. -- Filaments, comme

des cheveux, dans la selle.


Urines. — Urine rare et de couleur foncée, ou d'odeur de violette. -- Urine rouge, le soir. - Émission involontaire de quelques gouttes, en marchant. — Sédiment rouge, comme de l'argile, ou comme du gros sable, dans les urines. — Pissement fréquent, la nuit. - Gonorrhée chronique.

Parties génitales. — Chatouillement et prurit aux parties génitales, surtout au scrotum. — Impuissance, avec idées lascives. — Pollutions, avec flaccidité de la verge. — Écoulement de sperme goutte à goutte, pendant le sommeil. — Écoulement de liqueur prostatique pendant et hors le temps des selles. - Sperme séreux et sans odeur. — Pendant le coït, érection faible, lente, et éjaculation trop prompte. — Après le coît, faiblesse et mauvaise humeur.

Larynx. — Enrouement, en commençant à chanter. — Renâclement de mucosités et de petits globules de sang. — Toux matutinale qui fatigue toute la poitrine, avec expectoration de sang et de petits globules de mucosités. — Gêne de la respiration pendant la marche au grand air. — Besoin fréquent de respirer profondément, comme des soupirs. — Etouffement de la respiration, la nuit, en étant couché, par des douleurs à la poitrine, dans le côté

et aux reins.

Tronc et Extrémités. — Sensation de paralysie dans les reins. -Roideur des muscles du cou et de la nuque, qui ne permet pas de tourner la tête. — Miliaire à l'avant-bras. — Déchirement nocturne dans les mains. — Prurit au poignet, dans la paume des mains, ainsi que sur et entre les doigts. — Boutons gâleux à la main. -- Amaigrissement des mains. -- Boutons pruriants aux fesses et aux cuisses, près du scrotum. — Amaigrissement des jambes. -- Craquement des genoux en les pliant. - Ulcères lisses aux jambes. - Prurit aux pieds, le soir, surtout autour des malléoles.



SENECIO AUREUS

651

SENECIO AUREUS.

SENEC. - Voy. HALE, Remèdes américains.

AVIS CLINIQUES. — Ce médicament a été employé, jusqu'ici, avec succès contre : Ascite, avec forte tension du ventre, douleur dans les régions des lombes et des ovaires, cedème des membres inférieurs, et urines rares et foncées, alternant quelquefois avec urines abondantes et aqueuses. — Dysménorrhée, avec règles trop hâtives ou trop abondantes, douleurs incisives dans les régions sacrale, hypogastrique et inguinale, face pâle, état nerveux et toux nocturne. - Suppression des règles, avec irritabilité nerveuse, insomnie, perte d'appétit, langue chargée, constipation, lassitude continuelle, horreur de tout mouvement et douleurs errantes dans le dos et les épaules. — Hémoptysie, à la suite d'un arrêt des règles, ainsi qu'après des évacuations sanguines. — Aménorrhées ; Dysménorrhée; Ménorrhagies; Leucorrhée; Chlorose; Lochies trop prolongées et trop abondantes. — Affections catarrhales de la tête, des yeux, du nez, des oreilles. — Insomnie chronique. — Hydropisies; Urines supprimées; grande irritabilité de la vessie; Dysurie des femmes et des enfants; Hématurie.

SYMPTOMES PRINCIPAUX. -- Réves vifs, d'un caractère intellectuel; sommeil agité; réveil fréquent, la nuit; réveil tellement inaperçu qu'on ne sait pas si l'on vient de dormir ou non. — Chaleur dans le sinciput; mal de tête sourd, stupéfiant; plénitude désagréable dans la tête; élancements aigus, passant du dedans de la tête au déhors. — Vertige, plusieurs fois par jour, passant comme une vague de l'occiput vers le sinciput. — Elancements aigus dans les yeux, du dedans au déhors. — Sensation de plénitude dans les narines, sans sécrétion muqueuse; éternument, avec sensation de plénitude dans le nez, soulagé par un flux muqueux abondant. — Larmoiement au grand air. — Urines augmentées, aqueuses; urines fréquentes et abondantes; sécrétion de l'urine diminuée; urines rares et foncées; pissement de sang; ténesme de la vessie.



652 SENEGA.

SENEGA.

SENEG. — Polygane de Virginie. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép Voy. Pharmac. homœop., p. 281. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 8 semaines dans des affections chroniques.
ANTIDOTES: Arn. bell. bry. camph.
COMPARER AVEC: Arn. ars. bar. bell. bry. canth. euph. squill. stann. sulf.


CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Souffrances des membranes muqueuses; Affections des personnes pléthoriques avec laxité des fibres: Anasarque et hydropisie des

pléthoriques avec laxité des fibres; Anasarque et hydropisie des organes internes?; Inflammations internes; Plaies par la morsure d'animaux vénimeux; Angines catarrhales et muqueuses?; Grippe; Laryngite chronique?; Phthisie laryngée?; Blennorrhée des poumons; Phthisie muqueuse?; Pneumonie?; Hydrothorax, etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Sensation d'une grande lassitude générale, avec tremblement, surtout dans les membres inférieurs. - Grand accablement moral et physique, avec pandiculation des membres, lourdeur, vacuité et battement dans la tête. -Grande faiblesse qui semble provenir de la poitrine. - Évanouissement, en se promenant au grand air. - Plusieurs souffrances, surtout celles de la poitrine, s'aggravent par le repos et s'améliorent par la marche au grand air. -- Forte envie de dormir le soir et sommeil profond, engourdissant, peu après qu'on s'est couché. — Sommeil agité par des affections de poitrine ou bien des crampes d'estomac vers le matin. - Frisson fréquent, provenant de lassitude dans les jambes. - Horripilation au dos, avec chaleur à la face, sensation brûlante dans les yeux, dyspnée, élancements dans la poitrine et battements dans la tête. - Mélancolie hypocondriaque, avec grande susceptibilité aux offenses.-. Angoisse excessive, souvent avec respiration accélérée et précipitée. — Gaieté *avec irritabilité et disposition à s'abandonner à des accès de colère et de fureur.

Tête. — Tête entreprise, avec étourdissement. — Embarras et vacuité dans la tête, avec pression dans les yeux. — Vertige, avec bruit dans les oreilles. — Maux de tête qui affectent en même temps, s'aggravent à la chaleur de l'appartement et sont soulagés au grand air ou au froid. — Céphalalgies pressires, dans le front et les orbites. — Traction dans le sinciput et les tempes,



SENEGA.

653

4.

jusque dans la face. — Congestion de sang à la tête et aux yeux, en se baissant. — Céphalalgie pulsative, avec pression dans les yeux. — Horripilation au cuir chevelu et prurit. — Éruption à la tête.

Youx. — Douleur dans les yeux, comme s'ils se dilataient et qu'ils fussent poussés au dehors des orbites. — Pression dans les yeux, le soir, surtout aux lumières et en se baissant. — Congestion de sang aux yeux en se baissant. — Sensation brûlante dans les yeux, en lisant et en écrivant (le soir). — Gonflement des paupières, avec pression brûlante et fourmillement. — Sécheresse des yeux. — Larmoiement au grand air et en regardant fixement un objet. — Le matin, accumulation de chassie sèche aux paupières. — Tressaillement et traction spasmodique dans les paupières. — Paupières inférieures contractées convulsivement. — Fixité du regard. — Opacité de la cornée. — Amblyopie, avec lucurs devant les yeux, augmentée en les frottant. — Confusion des caractères et éblouissement, en lisant. — Tous les objets paraissent être dans l'ombre. — Taches brillantes devant la vue. — Photophobie.

Oreilles et Nez. — Pression dans les oreilles, pendant la mastication. — Sensibilité douloureuse de l'ouie. — Prurit à l'intérieur du nez. — Odeur de pus dans le nez. — Éternument, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Sécheresse pénible du nez.

Face et Dents. — Sensation de paralysie des muscles de la face. — Vésicules brûlantes uux commissures des lèrres et sur la levre supérieure. — Dents agacées. — Fouillement dans les dents, en inspirant (l'air humide et froid).

Bouche. — Sécheresse de la bouche, surtout le matin. — Sécrétion de salice plus abondante. — Haleine putride. — Langue chargée d'un enduit blanc. — Sensation brûlante sur la langue et au palais.

Gorge. — Mal à la gorge, comme si elle était excoriée et à vif. —
Grattement, sensation brûlante et sécheresse dans la gorge, avec irritation qui provoque la toux et parole embarrassée. — Sensation de constriction du gosier. — Gonflement inflammatoire du palais et de la luctte. — Accumulation abondante de mucosités risqueuses dans la gorge et au palais, se détachant en petits globules.

Appétit. — Goût moins sapide des aliments. — Goût métallique dans la bouche, ou comme celui de l'urine. — Goût pâteux dans la bouche. — Absence totale d'appétit, surtout le matin. — Faim rongeante, avec sensation de vacuité dans l'estomac. — Soit ardente.

Estomac. — Renvois. — Dégoût et nausées, avec envie de vomir.

qui semble prorenir de l'estomac, avec vomiturition. — Vomissements, avec diarrhée et forte angoisse. — Crampe d'estomac.

arec douleur pressire, même la nuit. — Sensation brûlante dans
l'estomac. — Sensation de vacuité dans l'estomac.



SENEGA.

Tamboo Marris da marris anno dondono

05.1

Ventre. — Maux de rentre arec douleurs térébrantes et fouillantes, surtout dans la partie supérieure du ventre et les hypocondres. — Rongement dans le bas-ventre. — Ardeur et serrement dans la partie supérieure du ventre, en inspirant. — Traction entre les téguments du rentre, comme par un corps étranger. — Affections flatulentes, avec sensation, comme si tout se portait vers le bas-ventre.

Selles. — Selles lentes, dures et rares, avec efforts, et suivies de pression à l'anus et au rectum. — Selles diarrhéiques, fréquentes et de la consistance de la bouillie.


Urines. — Sécrétion d'urine diminuée. — Sécrétion plus abondante d'urine. — Pissement au lit, la nuit. — Urine écumeuse ou mêlée de filaments muqueux, et devenant trouble et nuageuse en se refroidissant. — Sédiment rougeatre dans les urines, avec flocons muqueux. — Sensation en urinant, comme si l'urèthre était obstruée. — Elancement et sensation brûlante dans l'urèthre après et pendant l'émission des urines.

Parties génitales. — Exaltation de l'appétit vénérien, avec érections douloureuses. — Leucorrhée muqueuse.

Larynx. — Grande sécheresse du larynx, surtout le matin et avant midi. — Enrouement et âpreté dans la gorge. — Chatouillement et sensation brûlante dans le larynx, surtout en étant couché, avec péril de suffocation. — Accumulation abondante de mucosités dans le larynx et la trachée-artère, avec haleine courte. — Toux sèche et dirantante, provoquée par un chatouillement dans le larynx, plus forte au grand air. — Expectoration de mucosités transparentes et jaunes, en toussant. — Toux avec expectoration abondante de mucosités visqueuses.

Poitrine. — Dyspnée, avec sensation de stagnation dans les poumons. — Haleine courte, en marchant vite et en montant un escalier. — Oppression de poitrine, pénible, surtout au grand air, et en se baissant, comme si le thorax était trop étroit. — Pression à la poitrine, dans le repos surtout, et le matin ou la nuit, en se réveillant. — Grande sensibilité des parois internes de la poitrine, au toucher. — Serrement et douleurs crampoïdes dans la poitrine, avec agitation et anxiété, surtout quand on est couché sur le côté. — Elancements dans la poitrine, surtout en toussant et en inspirant. — Douleur d'excoriation dans la poitrine, aggravée par la pression extérieure, le mouvement, en toussant et en éternuant. — Traction et sensation brûlante dans la poitrine. — Forte congestion de sang à la poitrine, avec pulsation et bouillonnement au point de s'évanouir. — Battement de cœur violent, ébranlant. — Pression et térébration dans la région du cœur. — La plupart des souffrances de la poitrine sont plus fortes dans le repos, et ne gênent pas la respiration.

Tronc et Extrémités. - Pression et traction dans le dos et les



SENEGA. — SEPIA.

655

omoplates, ainsi qu'entre et sous les omoplates. - Sensation brûlante, et prurit sous-cutané dans tout le dos. - Traction paralytique dans les avant-bras, jusque dans les doigts. — Douleur de luxation dans l'articulation de la main. — Sensation de lassitude dans les jambes, avec sensation de paralysie dans les articulations. — Douleurs de luxation dans l'articulation coxo-fémorale. - Tremblement dans les jambes.

SEPIA.

SEP. — Le suc de sèche ordinaire ou sépia, encre de sèche. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 7 à 8 semaines, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES: Acetum. acon. nitr-sp. tart. — On l'emploie comme antidote de : Cale-ph. cl-in. merc. sassap.? sulf.

COMPARRA AVEC: Acon. ambr. ant. ars. bar. hell. carb-v. caus. cham. chin. coff. con. fer. graph. ign. led. hye-merc. ant. natr-m. nitr-ac. n-mos. n-rom. petr. phos. phos ac. plumb. puls. Mod. rhus. sabad. sass. sil. sulf. tart. verair. zinc. — C'est surtous après: Caus. led. merc. puls. sil. et sulf., que la sépia est efficace, lors qu'elle est d'ailleurs indiquée. — Après la sépia, conviennent quelquefois: Carb-v. caus. puls.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections du sexe féminin, et surtout des femmes d'une constitution faible, ayant la peau délicate et sensible; Affections des vaisseaux capillaires et du système nerveux; Affections à la suite d'une contrariété; Faiblesse physique et nerveuse par suite d'onanisme; Affections scrofuleuses (et rachitiques?); Engorgement et inflammations des glandes; Tumeurs lymphatiques, inflammatoires; Affections rhumatismales, surtout chez les personnes d'une taille élancée; Extension des ligaments (après rhus); Éruptions et dartres chroniques; Gale; Taches livides des femmes enceintes ou nerveuses; Indurations squirrheuses; Verrues; Fièvres intermittentes; Manie; Hystérie; Céphalalgies nerveuses et hystériques; Migraine; Teigne; Ophthalmies scrofuleuses et autres; Amblyopie amaurotique; Hémorrhagie nasale; Croûte de lait; Stomacace et affection scorbutique des gencives?; Odontalgies, surtout chez les femmes hystériques ou enceintes; Disposition chronique aux angines; Dyspepsie. aigreurs, gastralgie et autres affections gastriques; Grosseur du rentre chez les femmes âgées; Ascite; Diarrhées, aussi chez les sujets scrofuleux; Blennorrhée du rectum?; Constipation chronique; Gonorrhée chronique; Pollutions par suite d'onanisme; Dysménie des jeunes filles ; Dysménorrhée ; Métrorrhagie; Aménorrhée; Chlorose?; Flueurs blanches; Odontalgie, constipation ou diarrhée, affections



gastriques, avec vomissement, taches jaunâtres à la peau, et autres souffrances des femmes enceintes; Disposition à l'avortement; Exceriation des mamelles; Écorchure des enfants; Toux de différentes espèces; Coqueluche?; Pneumonie?; Hémoptysie; Souffrances phthisiques; Panaris, etc., etc.

Voir la note, page 15.

656

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Élancements et douleurs picotantes dans les membres et autres parties du corps. — *Douleurs brulantes à diverses parties du corps. — *Tension dans les membres, comme s'ils étaient trop courts. — Traction et déchirement dans les membres et les articulations. — Douleurs qui sont soulagées par la chaleur extérieure. — Douleurs par accès, avec horripilation. — *Douleur de luxation, surtout par un effort de la partie affectée, ainsi que la nuit, à la chaleur du lit. — *Douleurs rhumatismales, avec gonflement des parties affectées, sueur facilement excitée, frisson mement ou frissons alternant avec chaleur. - *Fortes incommodités à la suite de contrariétés.—*Engourdissement facile des membres (bras et jambes), surtout après un travail manuel. - *Roideur et manque de flexibilité des articulations. — Luxations et entorses faciles, aux membres. — *Dispositions à se donner un tour de reins. - *Commotions et tressaillement dans les membres, nuit et jour. - *Tressaillement dans les muscles. — Accès de malaise et spasmes hystériques. — Gonflement et suppuration des glandes.—Exacerbation et renouvellement de plusieurs souffrances, pendant et immédiatement après le repas. — Les symptômes se dissipent pendant tout exercice riolent, excepté celui du cheval, et sont aggrarés pendant le repos, comme aussi le soir, la nuit, à la chaleur du lit (et avant midi). - Sensibilité douloureuse de tout le corps. - Traction dans tous les membres. — *Pandiculations fréquentes. — ' *Inquiétudes et battement dans tous les membres, avec agitation qui ne permet de rester nulle part. - *Fort bouillonnement de sang même la nuit, avec pulsation dans tout le corps. — Gonflement général du corps, avec haleine courte, sans soif.—Lourdeur et paresse physique. — Manque de solidité dans les membres.-*Accès de faiblesse et de défaillance hystériques ou autres. Evanouissements. — *Lassitude avec tremblement. — *Manque de vigueur, -quelquefois seulement au réveil. - *Prompte fatigue en se promenant au grand air. - Forte disposition à prendre des refroidissements, et sensibilité à l'air froid, surtout au vent du nord. — Après avoir été mouillé, frisson fébrile, accès d'évanouissement, et ensuite coryza.

Peau. — Sensibilité excessive de la peau. — Prurit à diverses parties, qui se change en sensation brûlante. — Prurit et éruption boutonneuse dans les articulations. — *Excoriation surtout dans






les articulations. — *Éruptions comme la gale, sèches et pruriantes. — *Taches brunes ou vineuses, ou bien rougeâtres et dartreuses, à la peau. — *Dequamation en forme d'anneau (dartres annulaires). — °Dartres humides, croûteuses, avec prurit et sensation brûlante. — Furoncles. — *Glandes engorgées. — °Indurations squirrheuses. — °Éruptions de vésicules, semblables au pemphigus. — Ulcères pruriants, lancinants, brûlants, ou quelquefois indolents. — Cors aux pieds, avec douleur lancinante. — Difformité des ongles. — °Taches hépatiques. — °Hydropisie des icrognes.

Sommeil. — *Forte envie de dormir le jour et le soir de trop bonne heure. — Accès de somnolence, réapparaissant en type tierce. — Sommeil tardif le soir. — Insomnie par surezcitation. — Réveil de trop bonne heure et veille prolongée. — *Réveil fréquent, sans cause appréciable. — *Sommeil agité avec fort bouillonnement de sang, jactation continuelle, rèves fantastiques, anxieux, effrayants, et sursauts fréquents, avec effroi. — En dormant, on croit s'entendre appeler. — *Sommeil non réparateur; on n'a pas assez dormi le matin. — Rèves lascifs. — En dormant, paroles, cris et tressaillement des membres. — La nuit, divagations, angoisse, chaleur fébrile et agitation dans le corps, maux de dents, coliques, toux et beaucoup d'autres souf-frances.

Pièvre. — Horripilations pendant les douleurs. — *Manque de chaleur vitale. — Frissonnement fréquent, surtout le soir, au grand air. — *Accès de chaleur (fugace), surtout en étant assis et en se promenant au grand air, comme aussi lorsqu'on se fache ou pendant une conversation importante. — Accès de chaleur (et de frissons) avec soif. — Chaleur continue, avec rougeur de la face et forte soif. — *Fièvre avec soif pendant les frissons, douleurs dans les membres, froid glacial des mains et des pieds, et doigts morts. — *Sueur pendant qu'on est assis. — *Sueur abondante au plus léger mouvement. — *Sueurs nacturnes, quelquefois froides. — Sueurs matutinales, quelquefois d'odeur acide.


Moral. — *Tristesse et abattement avec pleurs. — *Mélancolie et morosité. — *Angoisse et inquiétude, quelquefois avec chaleur fugace, généralement le soir, et quelquefois au lit. — Grande inquiétude sur son état de santé. — «Caractère rèveur. — *Forte disposition à s'effrayer. — *Découragement souvent au point d'être dégoûté de la vie. — *Indifférence pour toute chose et même pour les siens. — «Répugnance à s'occuper de ses affaires. — Caractère susceptible, acariâtre, avec forte disposition à la colère et à l'emportement. — Humeur querelleuse et caustique. — *Faiblesse de la mémoire. — Distraction. — Disposition à se tromper en parlant et en écrivant. — *Inaptitude aux travaux intellectuels. — Lenteur de la marche des idées.



Tête. -- *Tête entreprise. -- Accès de vertige, surtout en se promenant au grand air ou en écrivant, ou bien au moindre mouvement des bras. - Vertige, comme si tous les objets remuaient, ou comme si quelque chose roulait dans la tête. - Vertige, le matin, en se levant, ou l'après-midi. - *Accès de maux de tête. arec nausées, romissement, et douleurs lancinantes ou térébrantes qui forcent à crier. - *Maux de tan, tous les matins. - *Maux de tête, qui ne permettent pas d'ouvrir les yeux. — Maux de tête, avec désir excessif du cost. — Céphalalgie en secouant ou en re-muant la tête, comme aussi à chaque pas que l'on fait, comme si le cerveau était ébranlé. - Douleurs de tête semi-latérales, quelquesois le soir, après le coucher, précédées de pesanteur de la tête. — *Pesanteur de la tête. — *Céphalalgie pressive au-dessus des yeux, à la clarté du jour. — *Pression expansive dans la tête, quelquesois en se baissant, comme si elle allait éclater. - Contraction dans la tête. — *Traction et déchirement dans la tête et à la tête, quelquesois d'un seul côté. — Céphalalgie lancinante, souvent semi-latérale ou frontale. - *Tressaillement et secousses dans la tête. - *Céphalalgie battante, surtout dans l'occiput. -- *Forte congestion de sang à la tête, avec chaleur, surtout en se baissant. — Froid à l'extérieur de la tête. — *Tremblement involontaire, et secousse de la tête. — Mobilité du cuir chevelu. — *Prurit à la tête. — *Croûtes humides à la tête. — Chute des cheveux. — Gonflement de la tête, surtout du front.

Yeux. — Pesanteur et affaissement de la paupière supérieure. *Pression sur le globe des yeux. — Prurit et cuisson dans les yeux et les paupières. - Picotement dans les yeux, le soir, aux lumières. - Sensation brûlante dans les yeux, surtout le matin. au réveil. — • Inflammation des yeux, avec rougeur de la sclérotique et élancements. — Inflammation, rougeur et gonstement des paupières, avec orgelets. — Pustules à la cornée. — *Gonflement des yeux, surtout le matin, au réveil. — Croûtes dans les sourcils. — Yeux vitreux, noyés, le soir. — Fongus hématoïde à la cornée. — Croûtes sèches aux paupières, surtout le matin au réveil. — Couleur jaune de la sclérotique. — Larmoicment, surtout le matin, ou *agglutination nocturne des paupières. - Frémissement et tressaillement des paupières. — Paralysie des paupières et *impossibilité de les ourrir, surtout la nuit. — Vue trouble, en lisant et en écrivant. — Presbyopie. — Faiblesse de la vue, comme par amaurose, avec pupilles contractées. - Voile, *taches noires, points et traces lumineuses devant la vue. — Reflet vert autour de la lumière, le soir. — Grande susceptibilité des yeux à la clarté du jour.

Oreilles. — Otalgie. — Élancement dans les oreilles. — Douleur d'excoriation dans l'oreille. — Gonfiement et éruption purulente à l'oreille extérieure. — Dartres au lobe de l'oreille. — *Écoule-



659

ment d'un pus liquide par l'oreille, avec prurit. — Sensibilité excessive de l'ouïe à la musique. — Dureté de l'ouïe. — Surdité subite, comme par un tampon dans les oreilles. — Bruissement et bourdonnement devant les oreilles. — Dartres derrière les

oreilles et à la nuque.

Ion. — *Gonstement et inslammation du nes, surtout du bout. —

— Croûte sur le bout du nez. — Narines croûteuses, ulcérées. :

Mucosités durcies dans le nez. — Épistaxis, et mouchement fréquent de sang, onème après le plus léger échaussement, ou la plus légère contusion au nez. — *Absence d'odorat. — *Odeur sétide dans le nez. — *Obturation ou sécheresse pénible du nez. — Coryza sec. — Mucosités sèches qui obstruent le nez. — Violent coryza fluent, avec éternument, douleur dans l'occiput et traction dans les membres.

Pace. — Pâleur de la face, avec cercles bleus autour des yeux, qui sont rouges et ternes. — *Couleur jaune de la face. — •Face amaigrie. — Trace jaune à cheval sur le nes et les joues. — - Forte chaleur à la face. — Bouffissure pâle de la face. — Inflammation érysipélateuse et gonflement d'un côté de la face (provenant d'une dent cariée). — Gonflement inflammatoire de la face, avec boutons rapprochés à croûte jaune. - Dartres et croûtes à la face. - Verrues à la face. - Pores noirs à la face. - Prurit et éruption à la face et sur le front; quelquesois comme rougeur et rudesse de la peau. — Tumeurs au front. — Douleurs faciales, tractives. - Douleur crampoide et déchirement dans les os de la face. - *Prosopalgie dans la région sus-orbitaire, comme des coups électriques, plus forte dans la forte chaleur de l'été. — Sécheresse et exfoliation des lèvres. — Tension de la lèvre inférieure. — *Couleur jaune et éruption dartreuse autour de la bouche. — Eruptions humides et croûteuses sur la partie rouge des lèvres et au menton. — Ulcère douloureux à la face interne des lèvres. — Engorgement et sensibilité douloureuse des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Odontalgie en serrant les dents ou en y touchant, et en parlant, comme aussi par le plus léger courant d'air froid. — Odontalgie nocturne, avec forte surexcitation. — *Odontalgie pulsative ou lancinante, ou bien tractire, s'étendant quelquefois jusque dans l'oreille, ou dans les bras et les doigts. — •Maux de dents avec géne de la respiration, fluxion à la joue, engorgement des glandes sous-maxillaires, et toux, ou bien avec fort bouillonnement de sang et pulsation dans tout le corps. — Secousses déchirantes dans les dents. — Émoussement, vacillement, saignement facile et carie de dents. — *Gonfiement, excoriation. ulcération et saignement facile des gencives.

Bouche. — Haleine fétide. — Gonfiement de l'intérieur de la bouche. — *Sécheresse de la bouche et de la langue. — Salivation salée. — Douleur de la langue et du palais, comme s'ils étaient



brûlés. — Exceriation de la langue. — Vésicules sur la langue. — *Langue chargée d'un enduit blanc.

Gorge. — Mal de gorge avec gonflement des glandes du cou. —
Sensation pressive, comme s'il y avait un tampon dans la gorge,
ou *douleur d'excoriation et éluncements pendant la déglutition. —
*Tressaillement dans la gorge. — Gonflement et inflammation du
gosier. — Inflammation, gonflement et suppuration des amygdales. — Sécheresse dans la gorge, avec tension et grattement. —
°Gorge comme pâteuse. — Accumulation de mucosités dans la
gorge et au voile du palais. — *Renâclement des mucosités, surtout le matin. — Expulsion de mucosités sanguinolentes, en
renâclant.

Appétit. — Goût putride ou aigre. — Goût trop salé des aliments. — *Adipsic, ou soif excessive, surtout le matin et le soir, quelquefois avec anorexic. — *Grande voracité. — *Boulimie, —avec sensation de vacuité dans l'estomac. — Désir ardent de vin. — *Répugnance et dégoût pour les aliments, surtout pour la viande et ele lait, —qui donne la diarrhée. — La fumée de tabac ne convient pas.— Après des aliments gras, renvois désagréables avec nausées. — Faiblesse de la digestion. — *Après le repas, aigreurs dans la bouche, —renvois fréquents, grattement et sensation brûlante dans la gorge, pulsation dans le scrobicule, hoquet, ballonnement du ventre, sueur, chaleur fébrile, battement de cœur, céphalalgie, nausées, vomissements, douleurs d'estomac, etc.

Estomac. — *Renvois fréquents, généralement aigres ou amers ou bien comme des œufs pourris, ou avec le goût des aliments. Renvois douloureux, pendant lesquels il vient du sang dans la bouche. — Aigreurs avec dégoût de la vie. — Nausées, quelquefois le matin à jeun, soulagées en mangeant quelques bouchées. — Nausées, avec goût amer et renvois. — Nausées par le mouvement de la voiture. — Nausées et vomissement après le repas. - *Vomissement de bile et d'aliments. - *Maux d'estomuc après le repas, quelquefois le soir. — Douleur violente au cardia, en ingérant des aliments. — Douleur dans le scrobicule en marchant. - *Pression dans l'estomac, comme par une pierre. surtout pendant ou après le repas, ou bien la nuit. — Crampe d'estomac contractive. — *Pituites de l'estomac, osurtout après avoir bu, ou précédées d'une sensation de tournoiement dans l'estomac. — Vomissement de sérosités laiteuses (chez les femmes enceintes). - Vomissement nocturne avec mal à la tête. -Crampes d'estomac et de poitrine. — Térébration déchirante dans la région stomacale, jusque dans les reins. — * Élancements pressifs dans le scrobicule et la région de l'estomac. - *Sensation brûlante dans l'estomac et le scrobicule. — Battement dans le creux de l'estomac. — Sensation de vacuité douloureuse dans l'estomac.



Ventre. - Douleurs au foie, en étant en voiture. - Pression, battement et élancements dans la région hépatique. - Térébration, on elancements tensifs dans les hypocondres, surtout pendant le mouvement. - Elancement dans l'hypocondre gauche. - Maux de ventre, le matin, au lit. - *Pression et pesanteur dans le ventre, avec sensation d'expansion, comme s'il allait éclater. - Fort ballonnement du ventre. - Pesanteur et *dureté dans le bas-ventre. - Grosseur du ventre (chez les femmes qui ont eu des enfants). - *Gonflement hydropique du ventre. Crampes abdominales, avec douleur de griffement, comme si les intestins étaient tordus. - *Coliques incisives surtout après un exercice corporel, ou la nuit, avec envie d'aller à la selle. -*Fouillement, tranchées et pression dans le bas-ventre. - *Douleur de meurtrissure dans les intestins. — Froid dans le ventre. *Sensation brûlante et élancements dans le ventre, surtout du côté gauche et quelquefois jusqu'à la cuisse. - Sensation de vacuité dans le ventre. — Lancinations dans les aines. — Taches brunâtres au ventre. - *Mouvements et borborygmes dans le ventre, surtout après le repas. - Production abondante et incarcération de flatuosités.

Selles. — *Envie sans résultat d'aller à la selle, ou sculement avec évacuation de mucosités et de vents. — *Évacuations insuffisantes, lentes et comme des crottes de mouton. — Evacuations peu abondantes, avec efforts et ténesmes. — *Selles trop molles. — Selles gélatineuses, avec tranchées. — *Diarrhées débilitantes. — *Diarrhées verdâtres, souvent avec odeur putride ou aigre, ou surtout chez les enfants. — *Pendant la selle, écoulement de sang. — Douleur contractive et tension, prurit, fourmillement, sensation brûlante et élancements à l'anus et dans le rectum. — Suintement par le rectum. — «Écoulement muqueux par le rectum, avec douleurs lancinantes et déchirantes. — *Chute du rectum, surtout pendant la selle. — Congestion de sang à l'anus. — *Sortie des boutons hémorrhoïdaux du rectum. — Hémorrhoïdes fluentes — Excoriation entre les fesses. — Douleur contractive au périnée.

Urines. — Besoin fréquent et impossibilité d'uriner. — *Pression sur la vessie. — *Émission d'urine, la nuit. — *Pissement au lit, dans le premier sommeil. — *Urine foncée, d'un rouge de sang. — *Urine trouble, avec sédiment rouge, sablonneux ou briqueté. — Urine fétide, avec sédiment blanc, abondant. — Urine qui dépose du sang. — Crampe de la vessie. — Sensation brûlante dans la vessie et l'urèthre. — *Čuisson dans l'urèthre, surtout en urinant. — Douleurs incisives et élancements dans l'urèthre. — °Écoulement muqueux par l'urèthre, comme une gonorrhée chronique.

Parties génitales. - *Sueur abondante des parties génitales et surtout des testicules. - *Prurit autour des parties génitales. -



662

Éruption pruriante au gland et au prépuce. - *Gonorrhée bâtarde, d'odeur acide, salée. - Ulcères au gland et au prépuce.-*Douleurs dans les testicules.—•Gonflement du scrotum. —•Fai-blesse des parties génitales. — Exaltation de l'appétit vénérien. avec érections fréquentes. - *Pollutions fréquentes. - Ecoulelement de liqueur prostatique après avoir uriné et pendant une selle difficile. - Après le coît et les pollutions, fatigue intellec-

tuelle, morale et physique.

Bègles. - *Excoriation à la vulve et entre les cuisses, quelquefois avant les règles.-- Chaleur intérieure et extérieure aux parties génitales. — Douleur contractive dans le vagin. — *Gonflement et éruption pruriante, humide, aux petites lèvres. - Pression vers le bas, dans la matrice, gênant la respiration. - Chute de la matrice. — Métrorrhagies. — Règles trop abondantes. — Induration du col de la matrice. — Règles supprimées, oou trop faibles, *ou trop hâtives. - Avant les règles coliques. - Pendant les règles, mélancolie, odontalgie, céphalalgie, *et courbature dans les membres, ou coliques spasmodiques et pression vers les parties. — Stérilité. — *Leucorrhée d'une eau jaune ou rouge verdâtre, -ou purulante, fétide, oquelquefois avec ballonnement du ventre, ou élancements dans le vagin. - *Leucorrhée pruriante, corrosive. — Elancements dans les mamelles. — Excoriation des mamelons. — *Écorchure des enfants.

Larynx. - Enrouement avec coryza. - Sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — Toux provoquée par un chatouillement dans le larynx ou la poitrine. — * Toux sèche, qui semble venir de l'estomac, surtout le soir, au lit, et souvent avec nausées et ro-missement amer. — Toux grasse, après un refroidissement. oToux des femmes enceintes. - *Toux, avec expectoration abondante de mucosités généralement putrides, ou de goût salé, souvent seulement le matin ou le soir, et fréquemment accompagnée de bruit, de faiblesse, et de douleur d'excoriation dans la poitrine, comme si elle était à vif. - *Toux nocturne, avec cris, suffocation et vomiturition. — oToux semblable à la coqueluche. — oToux provoquée par un chatouillement, et accompagnée de constipation. - *Expectoration qui se détache difficilement. - Expectoration jaune, verdatre, purulente, en toussant. - Expectoration en toussant, le matin et le soir, avec expectoration de mucosités le jour. — Pendant la toux, lancinations dans la poitrine ou le dos.

Poitrine. - *Dyspnée, oppression de poitrine, et haleine courte en marchant et en montant, ainsi qu'en étant couché au lit, le soir et la nuit. - *En respirant et en toussant, douleur dans les côtés de la poitrine. - *Oppression de poitrine, produite par accumulation de mucosités, ou par une expectoration trop abondante. - *Douleur de poitrine par le mouvement. - *Pression dans la poitrine, surtout le soir, au lit. - Pesanteur. plénitude



663


et tension dans la poitrine. — Douleur d'excoriation dans la poitrine. —Crampes de poitrine. —*Élancements et picotements dans la poitrine et les côtés de la poitrine, en respirant et en toussant, ainsi que par un travail de tête. — *Bouillonnement de sang dans la poitrine et battements de cœur violents. — Intermittence des battements du cœur. — *Taches brunâtres sur la poitrine.

Tronc. — *Douleurs aux reins et dans le dos, avec déchirement brûlant. — Battement aux reins. — Faiblesse aux reins, en marchant. — *Douleurs incisives, pression, fourmillement et déchirements crampoïdes dans le dos. — *Roideur du dos et de la nuque. — oFrissonnement dans le dos. — Taches brunâtres sur le dos. — Taches rougeâtres, dartreuses, au-dessus de la hanche et aux deux côtés du cou. — o'Eruption pruriante au dos. — "Dartres à la nuque et derrière les oreilles. — Taches vineuses au cou et sous le menton. — Furoncle au cou. — *Sueur sous les aisselles, d'une forte odeur. — Gonflement et suppuration des glandes axillaires.

- Dartre humide sous l'aisselle.

Bras. - *Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, surtout en soulevant ou en tenant un objet. - Lassitude dans le bras. - Sensation de roideur et de froid dans le bras, comme s'il était paralysé. - *Douleur de traction paralytique dans le bras et l'articulation de l'épaule, jusque dans les doigts.-Elancement dans les bras et l'articulation de la main, en fatigant ou en remuant ces parties. - *Tension douloureuse dans les bras, et les articulations du coude et des doigts, comme par raccourcissement. - Gonflement inflammatoire rouge foncé, dur, marbré, au milieu du bras. - Pustules aux bras, avec prurit violent. *Roideur des articulations du coude et des mains. - Taches brunatres, peau dartreuse et croûtes pruriantes au coude. -*Vésicules purulentes sur le dos de la main et au bout des doigts. - Dartres sur le dos des mains. - Gonflement de la main avec éruption de vésicules, semblable au pemphigus. - Elancements dans le poignet en remuant la main. - Chaleur ardente dans la paume des mains. - Sueur froide aux mains. - Gale maligne et croûtes aux mains. - Traction arthritique et élancements dans les articulations des doigts. - Distorsion des doigts. oUlcères indolores dans les articulations et au bout des doigts. -Verrues aux mains. - Envies aux doigts. - Ongles difformes. *Panaris avec douleurs pulsatives et lancinantes.

Jambes. — *Douleurs dans les hanches, avec élancements déchirants. — Douleur dans les fesses et les cuisses après avoir été
assis. — oFaiblesse paralytique des jambes, surtout après s'être
mis en colère. — Roideur des jambes, jusque dans l'articulation
coxo-fémorale, après avoir été assis un peu de temps. — *Froid
aux jambes et aux pieds. — Gonflement des jambes et des pieds.
— Crampes dans les cuisses, en marchant. — *Lancinations



SEPIA. - SILICEA.

664 •

déchirantes ou saccadées dans les cuisses et le tibia, au point de faire crier. — Furoncles à la cuisse et dans les jarrets. — Traction et élancements déchirants dans les genoux, les jambes et les talons. — Gonfiement douloureux du genou. — *Roideur des articulations du genou et du pied. — *Crampes aux mollets, quelquefois la nuit. — Inquiétudes dans les jambes, le soir. — Boutons pruriants sur les jambes et le cou-de-pied. — *Doulour tractive dans les jambes et les gros orteils. — *Élancements au tibia et au cou-de-pied. — Sensation dans les jambes, comme si une souris y courait. — *Tressaillement des pieds en dormant. — Ulcères sur le cou-de-pied. — Roideur dans les talons et les articulations du pied, comme par raccourcissement. — *Picotement et sensation brûlante dans les pieds. — Fourmillement et engourdissement de la plante des pieds. — *Courmillement et engourdissement de la plante des pieds. — *Ulcères au talon, provenant de vésicules rongeantes. — *Ulcères indolents, aux articulations et au bout des orteils. — *Cors aux pieds, avec douleur lancinante. — *Difformité des ongles des orteils.


SILICEA,

SIL. — Silice. — HAHNEMANN. Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homocop., p. 148. — Done usitée : 30. — Durée d'action : 7 à 8 semaines, dans des affections chroniques.

ANTIDOTES: Camph. hep. — On l'emploie comme antidote de : Merc. sulf. (psorinum.)

COMPARER AVEC: Alum. amm. bar-c. bell. calc. carb-an. carb-v. chin. cin. cycl. graph. hep. kal. lach. lyc. magn. merc. natr. petrol. phos. puls. ran. rhod. rhus. sass. sep. spig. sulf. veratr. — C'est suriout après: Calc. hep. lyc. sulf. que silic. est efficace, lor-qu'il est d'ailleurs indiqué. — Après silic. conviennent quelquefois: Hep. lach. lyc. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Suites fâcheuses de l'abus du mercure; Souffrances hystériques; Faiblesse physique chez les enfants, avec difficulté d'apprendre à marcher; Paralysies; Épilepsie; Surexcitation nerveuse avec insomnie; Affections rhumatismales et arthritiques, chroniques; Inflammations flegmoneuses; Tumeurs lymphatiques; Affections scrofuleuses et rachitiques, même avec tête grosse, et fontanelles tardives à s'ossifier; Engorgement, inflammation, induration et ulcération des glandes; Inflammation, ramollissement, ulcérations et autres maladies des os; Abcès; Indurations squirrheuses; Ulcères presque de toutes natures, surtout chez les personnes malpropres, cachectiques et adonnées aux boissons spiritueuses; Ulcères



SILICEA.

665

scrofuleux, mercuriels et scorbutiques; Ulcères carcinomateux; Hydrarthre?; Hystérie; Vertiges; Migraine; Teigne; Chute des cheveux à la suite de fortes maladies aiguës; Fongus hématode dans l'œil; Bleères de la cornée; Cataracte; Amblyopie amaurotique; Dureté de l'oule; Cancer aux lèvres; Fièvre de dentition; Boulimie, pituites de l'estomac, gastralgie, dyspepsie et autres affections gastriques; Abcès hépatiques; Affections vermineuses, surtout chez les sujets scrofuleux; Gonorrhée chronique; Hydrocèle, surtout chez les sujets scrofuleux; Excriation des mamelles; Coryza chronique et disposition opiniátre à des rhumes de cerceau; Soufirances phthisiques, surtout chez les sculpteurs; Gonflement inflammatoire du genou; Panaris; Paralysie des mains, aussi chez les lépreux, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - *Traction, déchirement et élancement dans les membres (bras et jambes). — Elancements nocturnes dans toutes les articulations. — *Disposition des membres à s'engourdir. - *Douleur de brisement et faiblesse paralytique dans les membres, surtout le soir. — *Disposition à se donner des tours de reins. — *Crampes dans les bras et les jambes. — *Gonflement et induration des glandes, généralement sans douleur, seulement quelquefois avec prurit pénible. — *Tressaillement des membres, jour et nuit. — Craquement douloureux ou pétillement des tendons ches les ouvriers agrupés de travaux lourds et fatigants. — *Attaques d'épilepsis. — Plusieum affections et douleurs s'aggravent ou se manifestent la nuit et le soir, comme aussi pendant le mouvement. - *Aggraration des symptômes à la nouvelle ou & la pleine lune. - Douleurs aux changements de temps. — Inquiétudes dans tout le corps, après avoir été longtemps assis. — Bouillonnement de sang et soif après avoir bu peu de vin. — Amaigrissement excessif. — Enfants tardifs à marcher. - Marche nonchalante, maladroite. - Faiblesse des articulations; elles fléchissent. — Lassitude et tremblement dans les membres, surtout le matin. — *Inertie générale et grande faiblesse nerveuse. — Evanouissement en se couchant sur le côté. — Grande fatigue, lassitude et envie de dormir, à l'approche d'un orage. - *Grande disposition à prendre des refroidissements, même seulement en se découvrant les pieds.

Peau. — Sensibilité douloureuse de la peau. — *Prurit sur tout le corps, souvent formicant ou lancinant. — Éruption comme des varicelles sur tout le corps. — oTaches tubéreuses, rosées, à la peau. — *Tumeurs et abcès lymphatiques, même avec ulcères fistuleux. — Engorgement et induration des glandes. — oInflammation, ramollissement et ulcération des os. — oIndurations squirrheuses. — oUlcères fistuleux, putrides, phagédéniques, fon-



SILECEA.

GGG

gueux, etc., avec végétations ou sanie fétide et rongeante. Suppurations hénignes et malignes, surtout dans les parties membraneuses.—Peau maladive; toute lésion tend à s'ulcérer.—*('ancer de la peau.—*Pression, pruvit, cuisson, et élancements térébrants dans les ulcères.—Furoncles.—•('harbons de nature maligne.—•('anglions.—- Verrues.—*Panaris.—• Loupes suppurantes.

Sommeil. — *Sommeil excessif, sans que l'on puisse s'endormir.

— *Bâillements fréquents. — Sommeil le soir, de bonne heure.

— *Sommeil tardif. — *Sommeil trop léger la nuit, comme si on n'était qu'assoupi. — *Insomnie, causée surtout par bouillonnement de sang, chaleur à la tête, - et grande affluence d'idées. — *Visions effrayantes, la nuit, et affluence de rêres anxieux et fantastiques, - avec pleurs, paroles, cris et *réveils fréquents en sursaut. — *Tressaillement du corps, pendant le sommeil. — Rêves lascifs. — *Ronflement en dormant. — Cauchemar. — Somnambulisme. — Rêves de brigands, d'assassins, de chiens, de voyages, de spectres, etc. — *La nuit, congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives et battement au cerveau, douleur d'estomac, nausées et vomissement ou élancements dans toutes les articulations, sécheresse du nez, et beaucoup d'autres souffrances.

Fièvre. — *Forte disposition frileuse et horripilation avec frissons fréquents, même au plus léger mouvement. — Chaleur fréquente, quelquefois fugace. — Fièrre avec forte chaleur, généralement sans frisson et avec sueur peu abondante, ordinairement depuis 10 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. — *Sueur pendant une marche modérée. — *Sueur abondante la nuit, *quelquefois d'odeur acide. — *Sueur débilitante le matin.

Moral. — Humeur mélancolique et envie de pleurer. — Nostalgic. — *Anxiété et agitation. — Humeur taciturne : on est concentré en soi-même. — *Inquiétude et mauvaise humeur pour la moindre chose, °provenant de grande faiblesse nerveuse. — Scrupules de conscience. — *Grande disposition à s'effrayer, surtout au bruit. — *Découragement. — *Morosité, mauvaise humeur, et désespoir avec dégoût profond de la vie. — *Pisposition à se fâcher. opiniâtreté et grande irritabilité. — °Répugnance pour le travail. — °Apathie et absence d'intérêt. — *Faiblesse de la mémoire. — *Incapacité de réfléchir. — Grande distraction. — Disposition à se tromper en parlant. — °Idées fixes; on ne songe qu'à des épingles, on les craint, les cherche, et les compte partout.

Tête. — *Obnubilation. — *Fatigue de la tête par un trarail intellectuel (lire, écrire ou réfléchir).—*Étourdissement, osurtout le soir, comme si on était ivre. — *Vertiges de diverses natures, surtout le matin, et principalement en levant les yeux, ou en étant en voiture, ainsi qu'en se baissant ou après des émotions morales. — Vertiges avec nausées et vomiturition, ou bien qui



667

montent du dos dans la nuque et à la tête. - *Vertige à tomber à la renverse. - *Douleur qui remonte depuis la nuque jusque dans le vertex, quelquefois empêchant de dormir la nuit. - °Céphalalgie en s'échauffant.—Céphalalgie avec frisson, lassitude et besoin de se coucher. — *Maux de tête tous les matins. — Pression dans la tête, avec mauvaise humeur, et pesanteur dans tous les membres, quelquefois le matin. — *Pesanteur de la tête; il semble que le front va éclater, quelquefois tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir. — *Tension et pression dans la tête, comme si elle allait éclater. — Tiraillements dans la tête, qui semblent sortir par le front. — *Douleurs déchirantes dans la tête, °souvent semi-latérales, avec élancements qui semblent sortir par les yeux et s'étendent jusque dans les os de la face, aux dents, ou qui se manifestent tous les matins avec *chaleur à la tête, principalement dans le front. - Lancinations dans la tête. surtout dans les tempes. - *Céphalalgie battante, généralement par congestion de sang à la tête. - Secousses douloureuses dans la tête. - Mouvements et tournoiement dans la tête, comme si tout y était vivant. - Ébranlement et résonnement dans le cerveau, à chaque pas que l'on fait. - Les maux de tête sont aggravés principalement par le travail intellectuel, par la parole et en se baissant. - Après les douleurs de tête, obscurcissement de la vue. Sensibilité douloureuse de l'extérieur de la tête au moindre contact. - Sueur à la tête le soir. - Elévations tubéreuses au cuir chevelu. - Fort prurit au cuir chevelu. - "Teigne humide, *pruriteuse. - Chute des cheveux.

Yeux. — Douleurs dans les yeux, le matin, comme provenant d'une trop grande sécheresse ou de sable qui s'y serait introduit. — Pression et cuisson dans les yeux et les paupières. — Élancements qui semblent sortir par les yeux. — *Prurit, cuisson et ardeur dans les yeux. — *Rougeur des yeux, avec douleur cuisante dans les angles. — *Inflammation des yeux. — Gonflement de la glande lacrymale. — oFistule lacrymale. — Larmoiement, surtout en plein air. —*Agglutination des paupières, la nuit. — oFongus, hématode et ulcères de la cornée. — oTaches et cicatrices sur la cornée. — Frémissement des yeux. — Occlusion spasmodique des paupières. — oPresbyopie. — *Les caractères se confondent, en lisant. — Les objets semblent être pâles, en lisant. — *Vue trouble comme à travers un voile grisâtre. — *Accès momentané de cécité subite. — oObscurcissement du cristallin. — oObscurcissement de la vue, comme par une amaurose. — oÉtincelles et *taches noires devant la vue. — *Photophobie et éblouisse-

ments à la clarté du jour.

Oreilles. — Otalgie, avec douleur tractive. — oTérébration et *battement dans les oreilles. — oÉlancements qui semblent sortir par les oreilles. — Prurit aux oreilles. — Inflammation et suintement du bord des oreilles. — Croûtes derrière les oreilles. — Gonfic-




668

ment de l'extérieur de l'oreille, avec écoulement par l'oreille, accompagné d'une sorte de sifflement. — Accumulation abondante d'un cérumen humide. — Sensibilité excessive de l'oreille, au bruit. — *Obturation des oreilles, oqui se dissipe quelquefois en se mouchant ou bien arec une détonation. — *Dureté de l'ouïe, quelquefois sans bruit dans les oreilles, ou bien exclusivement pour la voix humaine. — *Dureté de l'ouïe, augmentée à la pleine lune. — Tintement, gloussement et bruit, comme si un oiseau battait des ailes dans les oreilles. — Carie de l'apophyse mastoïde. — *Gonflement et induration des parotides.

Nes. — Os du nez, douloureux au toucher. — Douleurs rongeantes dans le haut du nez, avec pesanteur en se baissant et sensibilité excessive à la pression. — Douleur pulsative d'ulcération, dans le nez et jusque dans la tête. — *Inflammation dans les narines. — *Prurit et rougeur du nez (au bout), qui est couvert de vésicules croûteuses. — Furoncles au nez. — *Croûtes, boutons et ulcères dans le nez. — *Epistaxis. — °Absence d'odorat. — °Éternuments avortés, interrompus. — *Éternument par trop fréquent, immodéré. — *Obturation du nez, opiniâtre, °quelquefois par des mucosités. — °Sécheresse pénible du nez, quelquefois la nuit. — *Coryza sec. — *Coryza continuel. — *Coryza fluent, fréquemment, °ou qui enlève une obturation opiniâtre du nez. — Mucosités nasales, âcres et corrosives.

Face. — Face pâle, terreuse. — Taches blanches sur les joues, de temps à autre. — Taches rouges, brûlantes, sur les joues et le nez, surtout après le repas. — Chaleur à la face. — °Élancements dans les os de la face. — Prurit dans les favoris. — Furoncle sur la joue. — °Gerçures et rhagades à la peau du visage. — °Induration squirrheuse au visage et à la lèvre supérieure. — Gonflement des lèvres. — Ulcération des commissures des lèvres. — Éruptions croûteuses aux lèvres, avec douleur cuisante. — *Ucères sur la partie rouge de la lèvre inférieure. — *Cancer des lèvres. — Furoncles au menton. — *Dartres au menton. — °Crampe dans l'articulation de la mâchoire. — °Élancements et tractions nocturnes dans la mâchoire inférieure. — °Gonflement et carie des os de la mâchoire inférieure. — *Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur au toucher ou même avec induration.

Dents. — *Odontalgie par des aliments chauds ou l'introduction de l'air froid dans la bouche. — *Traction, tressaillement et déchirements dans les dents et la joue, aggravés la nuit, ou bien seulement en mangeant. — *Odontalgie généralement lancinante, la nuit, qui trouble le sommeil, aggravée par les choses froides ou chaudes. — •Maux de dents avec gonfiement de l'os ou du périoste de la mâchoire et chaleur nocturne, universelle, qui empêche de dormir, — •Fouillement et térébration dans les dents.



669

— Dents émoussées. — Inflammation douloureuse, gonflement, excoriation et *saignement facile des gencives.

Berache. — Sécheresse de la bouche. — Haleine fétide, surtout le matin. — Stomacace. — Mucosités continuelles dans la bouche. — Sensation comme s'il y avait un cheveu sur la langue. — *Excoriation de la langue. — Gonfiement d'un seul côté de la langue. — Ulcère au palais. — Langue chargée de mucosités brunâtres. Gerge. — Mal de gorge avec accumulation de mucosités dans lu

Gerge. — Mal de gorge avec accumulation de mucosités dans lu gorge. — Douleur d'excoriation et *picotement comme par des épingles, dans la gorge, pendant la déglutition. — Gonflement de la luette. — Déglutition difficile, comme par paralysie du gosier. — Tendance des aliments à remonter dans les fosses nasales,

pendant la déglutition.

Appétit. — Perte du goût. — *Amertume dans la bouche, même le matin. — Goût aigre, putride, ou comme si l'on avait du sang ou des mucosités dans la bouche. — *Forte soif, quelquefois avec absence d'appétit. — *Répugnance pour tous les aliments, surtout les aliments cuits et chauds, avec appétence seulement pour les choses froides. — *Dégoût pour la viande; elle est indigeste. — *Répugnance de l'enfant pour le sein de la mère, avec vomissement après avoir teté. — *Après le repas, forte envie de dornir, pyrosis, aigreurs dans la bouche, renvois aigres, plénitude dans l'estomac et le ventre, ou bien (souvent consécutivement), pression à Pestomac, écoulement d'eau par la bouche, comme des pituites, vomissement, frissons fébriles, congestion à la tête, chaleur aux joues.

chaque repas. — *Renrois avec goût des aliments, quelquefois après chaque repas. — *Renrois aigres. — Pyrosis. — Hoquet quelquefois le soir, au lit. — *Nausées tous les matins, avec douleur dans la tête et les yeux, en tournant les yeux, ou bien suivies de vomissement d'eau amère. — *Nausées continuelles, et apmissement, même la nuit. — *Écoulement d'eau par la bouché comme des pituites, quelquefois avec horripilation. — *Vomissement toutes les fois que l'on boit. — *Vomissement des aliments, même la nuit. — *Pression à l'estomac, quelquefois après chaque repas, ou en buvant vite. — *Sensibilité douloureuse du scrobicule, en pressant dessus. — Pesanteur dans l'estomac. — *Serrement dans le scrobicule, comme par une griffe, quelquefois après le reuss. — *Sensation brûlante dans le crèux de l'estomac.

repas. — *Sensation brûlante dans le creux de l'estomac.

Ventre. — •Gonflement et induration de la région hépatique. —
•Douleur d'ulcération à la région hépatique, avec battement; les douleurs s'aggravent au toucher et en marchant. — Élancements dans les hypocondres, surtout à gauche. — Coliques pendant lesquelles les mains jaunissent et les ongles deviennent bleus. —
Pression dans le ventre, surtout après le repas. — *Ventre dur, tendu, chaud (même chez les cnfants), et quelquefois douloureux au toucher. — *Grosseur du ventre. — *Coliques par constipu-



tion. - *Tranchées ou pincement dans le ventre, avec ou sans diarrhée. - *Sensation brûlante dans le ventre. - Les maux de ventre sont soulagés par l'application de linges chauds. - *Hernie inguinale, douloureuse. - Inflammation et gonflement des glandes de l'aine. - *Incarcération de flatuosités. - Gargouillement et borborygmes dans le ventre, surtout en remuant le corps. - *Expalsion difficile des flatuosités. - Flatuosités très fétides.

-*Expulsion difficile des flatuosités. — Flatuosités très-fétides. Selles. — *Constipation et selles lentes, dures, difficiles, noueuses. — *Dureté des selles, avec ténesme fréquent. — *Selles de la consistance de la bouillie, plusieurs fois par jour. — Diarrhée avec coliques. — Selles rougeâtres, ou avec mucosités sanguinolentes. — Ecoulement fréquent de sérosités fétides, d'une odeur cadavéreuse. — Élancements et *prurit à l'anus, -et au rectum, même

pendant la selle.

Urines. — Ténesme urinaire. — Besoin continuel d'uriner, avec écoulement peu abondant. — éÉmission fréquente d'urine, même la nuit. — éPissement au lit. — Sable rougeâtre et sédiment


jaune, sablonneux dans les urines.

Parties génitales. — Prurit et taches rouges sur le gland. —
*Excoriation, prurit et rougeur au prépuce. — Gonflement du
prépuce, qui est couvert de boutons pruriants et humides. —
*Gonflement hydropique du scrotum, surtout chez les individus
scrofuleux. — Sueur et prurit au scrotum. — *Tache pruriante et
humide au scrotum. — *Absence d'appétit vénérien, avec faiblesse des fonctions génitales, ou bien exaltation immodérée de
l'appétit vénérien, avec affluence d'idées lascives, et érections
fortes et fréquentes. — Écoulement de liqueur prostatique pendant les selles. — Après le coît, courbature dans les membres, ou

sensation de paralysie dans un côté de la tête.

Règles. — Règles trop hâtives et trop faibles, ou bien trop abondantes. — Suppression des règles. — Métrorrhagie. — Avant les règles, diarrhée. — Pendant les règles, douleurs dans le ventre, ou vue pâle, ou sensation brûlante et excoriation à la vulve. — *Prurit à la vulve. — •Écoulement de sang par la matrice pendant l'allaitement. — Avortement. — *Leucorrhée qui coule en urinant, ou après les règles. — *Leucorrhée comme du lait, coulant par intervalles, et précédée de tranchées dans la région ombilicale. — Leucorrhée âcre, corrosive. — •Înflammation des mamelons. — •Abcès au sein, même avec ulcères fistuleux. — Indurations au sein.

Larynx. — *Enrouement, avec apreté et excoriation dans le larynx. — Toux par les boissons froides, ou pour peu qu'on ait parlé. — Toux ébranlante provoquée par un chatouillement suffocant dans la fossette du cou. — *Toux fatigante, jour et nuit, aggravée par le mouvement, avec expectoration muqueuse peu abondante. — *Toux nocturne, suffocante. — Toux spasmodique. — Toux sèche, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Toux avec



671

vomissement de mucosités. — *Expectoration abondante de mucosités transparentes, en toussant. — *Expectoration de pus, en toussant. — Expectoration de sang, avec toux creuse, profonde. Poitrine. — *Étouffement de la respiration, en étant couché sur le dos, ou bien en se baissant, en courant ou en toussant. — Respiration profonde, suspirieuse. — *Haleine courte, pendant un travail manuel peu fatigant, ou bien en marchant vite, quelquefois avec dyspnée pendant le repos. — *Respiration haletante en marchant vite. — Gêne de la poitrine, comme par constriction de la gorge. — *Pression à la poitrine, quelquefois seulement en toussant ou en éternuant. — *Élancements et picotements duns la poitrine et le côté, quelquefois jusqu'au travers du dos. — Battement dans le sternum. — Douleur de brisement dans la

poitrine, en respirant et en toussant.

Tronc. — *Douleur aux reins, au toucher, et sans qu'on y touche.
— o'Traction crampoide aux reins, qui ne permet pas de se redresser, et force à rester couché. — o'Abcès inflammatoire dans la région lombaire. — *Faiblesse et roideur paralytique dans le dos, aux reins et à la nuque. — *Déchirements et clancements dans le dos. — o'Elancements dans les lombes, en étant assis ou couche. — o'Gonflement et déciation de la colonne vertébrale. — o'Douleur de brisement entre les omoplates. — Tractions tensives, déchirements et lancinations dans et entre les omoplates. — o'Ulcère purulent à la nuque. — Boutons et furoncles à la nuque. — *Gonflement des glandes à la nuque, au cou et sous les aisselles,

quelquefois avec induration. — Suppuration des glandes axillaires. - Carie de la clavicule. Bras. -*Tractions et déchirements dans les bras, les mains et les doigts. — *Pesanteur et lassitude paralytique des bras, qui tremblent au moindre travail. — *Engourdissement des bras lorsqu'on est couché dessus, ou en s'accoudant sur une table. -Battement et tressaillement des muscles du bras. - Peau gercee, aux bras et aux mains. — Furoncles et verrues aux bras. — *Faiblesse paralytique de l'avant-bras ; on laisse tout tomber des mains. — Induration du tissu cellulaire de l'avant-bras. — "Élancements nocturnes dans l'articulation de la main, jusqu'au baut du bras. — Douleur crampoïde dans les mains et les doigts. Engourdissement des mains la nuit. - Faiblesse paralytique des mains. - Ganglion sur le dos de la main. - *Ulcère sur le dos de la main. - Fourmillement dans les doigts. - Sensation brûlante dans le bout des doigts. - Douleur dans les articulations des doigts, en pressant dessus. - *Faiblesse, roideur et manque de flexibilité des doigts.—Vésicules rongeantes, purulentes, avec brûlement aux doigts. —*Panaris, surtout avec végétations, cris et douleurs insupportables jour et nuit.

Ambes. — Tractions, déchirements et tensions dans les jambes.
 Engourdissement facile des jambes, surtout en étant assis. ...



SILICEA. — SPIGELIA.

672

Faiblesse paralytique des jambes. — *Pression, déchirement et élancement dans les muscles des cuisses. — OUlcères pruriants aux cuisses et aux malléoles. — *Furoncles aux cuisses et aux mollets. - Pamollissement et ulcération du fémur. - *Déchirements dans le genou. — °Gonflement inflammatoire du genou. — °Fongus au genou. — Douleur tractive dans les jambes. — Froid aux jambes. — Gonflement des jambes jusqu'aux pieds.— "Ulcères aux jambes, souvent avec teint maladif.—Tache rouge. cuisante, sur le tibia. - Carie du tibia. - Tension des mollets, comme par raccourcissement. — *Crampes aux mollets, surtout le soir, après un travail corporel. — oTorpeur des mollets. — Miliaire pruriante aux mollets. -- Déchirement et élancements dans les mollets, les talons et les orteils. - Lancination dans la malléole, en appuyant le pied. — Engourdissement des pieds, le soir. -- *Froid aux pieds, oquelquefois après une suppression de la transpiration des pieds. — Sensation brûlante dans les pieds et la plante des pieds, surtout le soir et la nuit. - *Gonfiement des pieds, généralement le matin. - *Odeur fétide des pieds. --*Sueur aux pieds, avec excoriation entre les orteils. — Sueur aux pieds supprimée. — Durillons durs et douloureux à la plante des pieds. — Chatouillement voluptueux à la plante des pieds, au point de rendre fou après s'être gratté tant soit peu. -- Crampe à la plante des pieds. — Vésicules rongeantes au talon. — Roideur des orteils. -- *Ulcération du gros orteil, avec douleur lancinante. - *Cors aux pieds avec douleurs lancinantes.


SPIGELIA.

SPIG. — Spigélie anthelminthique. — Hahnemann. — Ilist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 288. — Dose usitée: 50. — Durée d'action: 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

Antidote : Camph. — On l'emploie comme antidote de : Merc.
Comparer avec : Acon. aur. chin. dig. euphr. laur. merc. natr-m. sil. spong.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Convulsions; Icrognerie; Fièvres muqueuses et vermineuses?; Fièvres intermittentes larvées?; Céphalalgies, prosopalgies et odontalgies intermittentes, nerveuses et rhumatismales, surtout chez les femmes d'une constitution nerveuse; Ophthalmies rhumatismales et arthritiques: Douleurs névralgiques aux yeux, surtout après s'être fatigue la vue; Affections vermineuses; Grippe; Fièvres catarrhales; Hydrothorax; Maladies du cour, etc., etc.

Voy. la note, page 15.



SPIGELIA.

673

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs arthritiques, lanci-nantes ou déchirantes dans les membres. — Déchirement autour des articulations, comme si on en ratissait les os. — Sensations de pesanteur et de brisement dans les membres. — • Convulsions. Lassitude, surtout après un léger exercice et au grand air. Accès d'évanouissement, surtout en faisant des efforts pour aller à la selle, ou dans un appartement chaud. — Grande sensibilité à l'air froid, avec souffrances par la marche au grand air.

*Grande facilité à prendre un refroidissement.

Peau. - Sensibilité douloureuse de toute la peau du corps, au toucher. — Boutons rouges, avec douleur d'excoriation au toucher.


Sommeil. — Forte envie de dormir, le jour, et même dès le matin, ou le soir; on ne s'endort, cependant, que long temps après qu'on s'est couché. — Sommeil de nuit non réparateur, agité, avec inquiétudes dans les membres. - Sommeil lourd, engourdissant.

Fievre. - Frissons fréquents, surtout le matin ou pendant un léger exercice. — Chaleur fréquente, quelquefois fugace. — Pendant la

chaleur, soif de bière. Moral. - Tristesse et découragement. - Agitation et anxiété, arec soucis inquiets sur l'arenir. — Caractère peureux. — Morosités jusqu'à la manie du suicide. — Faiblesse de la mémoire. — Absence d'idées. - Inaptitude aux travaux intellectuels.

Tête. - Tête embarrassée, comme par l'ivresse ou un étourdissement. — Vertiges, au point de tomber, en marchant, en étant debout, et en regardant en bas. — Vertige avec nausées. — Maux de tête, en branlant la tête, avec vertige et sensation de pesanteur. -*Douleurs de tête, aggravées par le plus léger mouvement, un bruit un peu fort, et en ouvrant la bouche.—Sensibilité douloureuse de l'occiput, avec sensation d'engourdissement et de roideur dans la nuque.—*Maux de tête périodiques.—Pression dans la tête, compressive et expansive, aggravée en se baissant. — *Douleur comme si la tête allait éclater, en toussant et en parlant fort .- Maux de tête déchirants, fouillants ou térébrants, surtout pendant le mouvement. - Lancinations pulsatives et étendues dans le front, avec bruit de coups de marteau devant les oreilles. Commotions et coups dans la tête, pendant la marche au grand air. — Ébranlement dans le cerveau, à chaque pas et à chaque mouvement de la tête. — Douleur brûlante à l'extérieur du front et des tempes, jusque dans les yeux. — Tension du cuir chevelu. — Sensibilité douloureuse du cuir chevelu, au toucher.

Youx.—*Douleurs dans les yeux, profondément dans les orbites. - *Pression sur le globe des yeux, surtout en les tournant. *Douleurs dans les yeux, pendant le mouvement comme si le globe des yeux était trop rolumineux. — *Fouillement, térébration et élancements dans les yeux, et jusque dans la tête. quelquefois avec douleurs qui portent au désespoir. — *Le mouvement des yeux et des muscles de la face aggrave les douleurs



SPIGELIA.

674

— Fourmillement dans les yeux. — Chaleur seche et sensation brûlante dans les yeux qui oblige à les fermer. — *Rougeur de la sclérotique, avec injection des vaisseaux sanguins. — *Inflammation des yeux et de la cornée. — *Inflammation et ulcération des paupières, avec douleur cuisante d'excoriation. — *Yeux troubles, ternes. — Larmoiement abondant. — Larmes âcres, cuisantes. — Grande sensibilité des yeux à la lumière. — *Chute des paupières, comme par paralysie. — °Tendance à clignoter. — Difficulté de soulever les paupières, avec sensation de roideur douloureuse. — Contraction et mouvements involontaires des yeux. — Pupilles dilatées. — Perte (suspension momentanée) de la vue. — Presbyopie. — *Rayons lumineux devant la vue.

Oreilles. — Otalgie, avec douleur pressive, pénible, comme s'il y avait une cheville dans l'oreille. — Déchirement tressaillant dans les oreilles. — Étreinte, prurit et sensation brûlante à l'oreille extérieure. — Obturation des oreilles, avec ou sans dureté de l'ouïe. — *Surdité périodique. — Mugissement, bourdonnement et pulsation dans les oreilles. — Bruit de coups de marteau devant

les oreilles.

Nez. — Prurit au nez, avec chatouillement. — Fourmillement, élancements, térébration, cuisson et démangeaison dans le nez. — Éruption dartreuse au nez, avec douleur d'excoriation. — Obturation et sécheresse du nez, avec écoulement abondant de mucosités blanchâtres et jaunâtres, par les fosses nasales. — «Coryza fluent, fréquemment, surtout après le plus léger refroidissement.

Visage. — *Visage pâle, défait, avec cercles jaunes autour des yeux. — Joues et lèvres tantôt rouge foncé, tantôt pâles. — *Bouffissure de la fuce, surtout après avoir dormi. — *Déchirements tressaillants, sensation brûlante et pression dans la région des os zygomatiques, ou douleurs violentes, qui ne supportent ni le plus léger contact, ni le moindre mouvement, avec gontlement luisant du côté affecté. — Douleurs semi-latérales à la face, avec angoisse de cœur et grande agitation. — Exostose au côté de l'orbite qui est près de la tempe. — Lèvres tendues et brûlantes. — Petits boutons noirâtres sur la lèvre supérieure. — Douleur pressive dans l'angle de la mâchoire inférieure, comme dans la mâchoire ou dans les dents, provenant de l'oreille.

Dents. — Odontalgie après avoir fumé. — Douleur de pression écartante aux dents, immédiatement après le repas, ou la nuit, ne permettant pas de rester couché. — *Maux de dents tressaillants, ou avec déchirements pulsatifs, surtout dans les dents cariées, aggrarés par l'eau froide, ou par le contact du grand air. — •Maux de dents, avec prosopalgie, face pâle et bouffie cercles jaunâtres autour des yeux, battement de cœur, frissonne-

ment et agitation.

Bouche - Gorge. - Exhalaison fétide par la bouche. - Séche-



SPIGELIA.

675

resse lancinante dans la bouche, le matin, au réveil. — Accumulation abondante de salive blanche, écumeuse, dans la bouche. — Mucosités blanches ou jaunes dans la bouche et le palais. — Langue fendillée. — Vésicules, avec douleur brûlante sur la langue et au palais. — Mal de gorge, avec lancinations et gonflement au palais.

Appétit. — Goût putride, fétide. — Absence d'appétit, avec forte soif. — Répugnance pour le tabac à fumer et à priser. — Répugnance pour le café. — Boulimie, quelquefois avec nausées et soif.

Estomac. — Renvois après tous les aliments. — Renvois aigres. — *Nausées à jeun, avec sensation comme si quelque chose remontait de l'estomac dans la gorge. — Accumulation de mucosités dans l'estomac. — Pression dans l'estomac et dans le scrobicule, comme par un corps pesant. — Lancinations dans le creux de l'estomac et le diaphragme, quelquefois avec étouffement de la respiration. — Impossibilité de supporter des vêtements serrés autour du scrobicule; le moindre contact donne des angoisses, avec rougeur et chaleur du visage, et sensation comme si quelque chose se déchirait dans la poitrine.

Ventre. — Ventre dur et douloureusement tendu. — Pression dans la région ombilicale, comme par un corps dur. — Colique, avec des douleurs pinçantes, tranchées dans la région ombilicale avec frisson, diarrhée et sécrétion abondante d'urine. — Lancinations dans le ventre. — Douleur tensive dans les aines, au toucher. — Grondement et borborygmes dans le ventre. — Expulsion de vents

fétides.

Selles. — Envie fréquente d'aller à la selle, sans résultat. — Selles molles, liquides. — Selles dures avec efforts et mucosités abondantes. — Écoulement de mucosités par l'anus, sans selles. — Diarrhées liquides, de matières fécales et de mucosités. — Diarrhée, avec pincements dans le ventre et froid au corps. — Lombrics et ascarides du rectum. — Prurit et sensation comme si quelque chose rampait dans le rectum et l'anus.

Urines. — Urine, avec sédiment blanchâtre. — Envie fréquente d'uriner, avec émission abondante, même la nuit. — Suintement involontaire des urines, avec sensation brûlante dans la partie.

antérieure de l'urèthre.

Parties génitales. — Fourmillement autour du gland. — Gonflement semi-latéral du gland. — Érections, avec idées lascives. sans excitation voluptueuse. — (Écoulement de liqueur prosta-

tique.)

Larynx. — Catarrhe, avec enrouement, écoulement continuel de mucosités nasales, chaleur sèche, sans soif, yeux proéminents, mal de tête pénible et envie de pleurer. — Catarrhe nocturne, avec toux. — Toux, au grand air, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Toux sèche, violente, creuse, avec confiement de la respiration jusqu'à suffoquer.



676 SPIGELIA.— SPONGIA MARITIMA TOSTA.

Poitrine. — Pression à la poitrine, avec oppression douloureuse. oHaleine courte, surtout en parlant, avec anxiété et rougeur des joues et des lèvres. - Péril de suffocation au moindre mouvement et surtout en levant les bras. - Forte gene de la respiration, en se remuant au lit, avec impossibilité de rester couché autrement que sur le côté droit et presque assis. - Accès subits de suffocation, avec battement de cœur et angoisse. — Contraction de la poitrine, avec angoisse et respiration gênée. — Bruit dans la poitrine, comme le ronron d'un chat, surtout dans la région du cœur. - Pression, sensation brûlante ou incisive, douleur d'ulcération et déchirement dans la poitrine, surtout en levant les bras. — Sensation d'un tremblement dans le thorax, aggravée par le mouvement des bras. — Sensation crampoïde dans la poitrine, partant du creux de l'estomac et produisant des étouffements. - Lancinations tensives dans la poitrine, surtout en respirant. — Battements de cœur violents, sensibles à la vue et à l'ouïe, souvent avec oppression anxieuse de la poitrine, aggravés en courbant la poitrine et en s'asseyant. - *Lancinations dans la région du cœur. - Sensation de tremblement au cœur. -Les battements du cœur ne répondent pas à ceux du pouls. —

Mouvement du cœur, comme une ondulation.

Tronc. — Douleur de brisement dans le dos, même pendant le mouvement. — Lancinations dans le dos, quelquefois en respirant. — Boutons rouges au cou, avec douleur d'excoriation au toucher. — Gonflement dur et douloureux des glandes du cou.

Bras. — Pesanteur et tremblement des bras. — Engourdissement facile des bras et des mains. — Tressaillement des muscles des bras et des avant-bras. — Lancinations violentes et saccadées, dans le pli du coude et les articulations des mains et des doigts.


Tractions et déchirements crampoides dans les os des mains.
 Nodosités dures dans la paume des mains, avec prurit brûlant.
 Mains jaune pâle.
 Contraction des doigts.
 Boutons puru-

lents aux doigts.

Jambes. — Douleur de brisement, tension et élancements dans les cuisses, presque exclusivement en marchant et pendant les mourements prompts. — Lancinations violentes dans le genou, en le pliant. — Roideur douloureuse de l'articulation du genou. — Secousses lancinantes dans les articulations des picds. — Excroissances, comme des verrues, aux orteils.

SPONGIA MARITIMA TOSTA.

SPONG. — Éponge maritime brùlée. — Hahnemann. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop. — Doses usitées: 2, 3, 30. — Durée d'action : 3 à 4 semaines, dans des affections chroniques.



SPONGIA MARITIMA TOSTA.

677

ANTIDOTE: Camph.

COMPARER AVEC: Acon. ars. cupr. dros. hep. iod. merc. phos. spig. — C'es' surtout après acon. que spong. est efficace 'dans le croup), lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après spong., convient souvent (dans le croup) hep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Affections des glandes et des vaisseaux lymphatiques; Croup (avant d'employer hep., ou alternant avec celui-ci); Laryngite chronique; (Phthisie laryngée); Bronchite; Souffrances asthmatiques; Maladies du cœur; Tubercules aux poumons; etc., etc., etc., voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — *Gonflement et induration des glandes. -- Courbature des bras et des jambes. -- Sensation de torpeur dans la partie inférieure du corps. — Lourdeur du corps. · Abattement excessif, moral et physique. - En étant couché tranquillement, on se trouve mieux que dans toute autre position. - Elancements pruriants à la peau, surtout en se réchauffant au lit. — Sensation de quelque chose qui ramperait sur la peau, avec rougeur et chaleur de la partie, après s'être gratté. — Tache rouge, pruriante à la peau. — Eruptions pruriantes. — Éruptions miliaires. — Dartres. — Insomnie, arec réveries fantastiques et délire en s'endormant. — Rêves tristes, anxieux, effrayants. Frissons fréquents par tout le corps, surtout au dos. — Accès de chaleur fugace. — Chaleur fébrile, avec peau sèche et chaude. soif continuelle, mal à la tête et délire. — Pouls dur, accéléré. --Sueurs nocturnes. - Accès d'angoisse, avec douleur dans la région du cœur. — Humeur inconsolable et pleurs. — Caractère eraintif et frayeur facile. — Humeur récalcitrante et bravades. Gaicté immodérée et malicieuse. — Grande envie de chanter. - Esprit obtus, avec incapacité complète de se livrer à un travail de tête.

Tôte. — Vertige, avec étourdissement au point de tomber, quelquesois le soir, ou bien avec sensation comme si la tête allait sechir de côté. — Vertige avec nausées, la nuit, en se réveillant. — Pesanteur et plénitude de la tête. — Mal de tête sourd, semilatéral, en entrant dans un appartement chaud, lorsqu'on vient du grand air. — Mal de tête avec larmoiement, en fixant les yeux sur un objet. — *Maux de tête pressifs, quelquesois avec compression. — Douleurs dans la tête, comme si elle allait éclater, surtout dans le front. — *Battement et pulsation dans la tête. — Congestion de sang à la tête. — Sensibilité désagréable de l'extérieur de la tête. — Prurit pénible au cuir chevelu.

Yeux. — Yeux ternes et troubles, avec bouffissure des paupières.



SPONGIA MARITIMA TOSTA.

678

- Pression et élancements dans les yeux. - *Yeux brûlants, rouges et larmoyants. - Agglutination des paupières. - Éruption de croûtes jaunes, dans les sourcils. - Pesanteur pressive des paupières. - Contraction des paupières le matin. - Myopie.

Oreilles et Nez. — Otalgie, avec douleur contractive. — Pression dans les oreilles. — Ulcération de l'oreille extérieure. — Dureté de l'ouïe. — Épistaxis, surtout après s'être mouché. — Éruption au bout du nez.

Visage. — Visage pâle, avec yeux abattus. — °Visage bouff, ronge ou bleuâtre, avec physionomie anxieuse. — Gonflement des joues. — Prurit et élancements dans les joues. — Éruptions aux lèrres. — Douleurs crampoides dans les articulations de la mâchoire. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur tensive.

Dents. — Sensation d'émoussement et de vacillement des dents, pendant la mastication. — Prurit et élancements aux dents. — Gonflement des gencives, avec douleurs pendant la mastication.

Bouche. — Bouche et langue couvertes de vésicules, avec douleur brûlante et lancinante. — Salivation. — Parole faible. — Langue sèche, brunâtre. — Sensation brûlante et élancements dans la gorge.


Appétit. — Diminution du sens du goût. — *Goût amer, quelquefois seulement dans la gorge. — Goût douceâtre dans la bouche.
— Appétit modéré et satiété prompte. — Faim violente, insatiable. — *Soif, oquelquefois inextinguible. — La fumée du tabac
ne convient pas. — Après le repas, plénitude et souffrance dans
l'abdomen, comme par difficulté de la digestion.

Estomac. — *Renvois, equelquefois avec tranchées et déchirements dans l'estomac. — Renvois amers. — Régurgitations aigres. — Hoquets fréquents. — Nausées, avec fortes aigreurs dans la bouche. — Vomissement après avoir pris du lait. — *Laxité de l'estomac, avec sensation comme s'il était ouvert. — l'ression dans l'estomac et le scrobicule. — Pression des vêtements sur l'estomac. — Douleurs contractives à l'estomac.

Ventre. — Ventre dur et tendu. — Crampes abdominales. — Fouillement et étranglement dans le ventre. — Tranchées dans le ventre, après le repas. — Grondement dans le ventre, surtout le soir, et le matin, en étant couché. — Douleur comme par une hernie dans l'anneau inguinal. — Gonflement des glandes de l'aine.

Selles. — *Selles dures et retardées. — Selles diarrhéiques, blanchâtres. — Avant la selle, élancements à l'anus et grondement dans le ventre. — Pendant la selle, ténesme à l'anus. — Prurit, corrosion, et douleur d'excoriation à l'anus. — Ascarides du rectum et fourmillement au rectum.

Urines. — Sécrétion d'urine plus abondante. — • Envie fréquente d'uriner, avec émission peu abondante. — Incontinence d'urine.



SPONGIA MARITIMA TOSTA.

679

— Jet d'urine mince. — Urine écumeuse. — Sédiment épais. blanchâtre, grisâtre ou jaune, dans les urines.

Parties génitales. — Étranglement crampoide dans les testicules.
 — Gonflement dur des testicules et du cordon spermatique, avec douleur pressive. — Appétit vénérien peu prononcé. — Absence d'érections. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Avant les règles, battement de cœur et douleur dans le dos. — Pendant les règles, traction dans les cuisses.


Isrynx. — *Enrouement, quelquefois avec toux et coryza. — Voix faible, peu nette, et qui manque pendant le chant et la conversation. — *Douleur dans le larynx, au toilcher et en tournant lu tête. — Pression dans le larynx, en chantant. — *Sensation d'obturation du larynx, avec respiration empêchée. — *Apreté et sécheresse dans la gorge. — *Douleur brûlante dans le larynx et la trachée-artère. — Toux venant du fond de la poitrine, avec douleur d'excoriation et sensation brûlante. — *Toux, avec expectoration jaunâtre et enrouement. — *Toux creuse. sèche, aboyante ou sibilante. jour et nuit, augmentée vers le soir, et quelquefois avec douleur dans le larynx. — *Toux avec expectoration de mucosités visqueuses. — Toux sèche, provoquée par un chatouillement brûlant dans le larynx.

Poitrine. — Respiration lente et profonde, comme par faiblesse. —

*Asthme et dyspnée par une gêne dans le larynx.—Inspiration sifflante. — Accès de râle muqueux, dans la trachée-artère. — Respiration accélérée, anxieuse et difficile, quelquefois avec excès de suffocation et râle muqueux dans la poitrine. — Douleur fixe, lancinante et pressive dans la région des bronches. — Douleur s crampoldes, constrictives, dans toute la poitrine. — Douleur de poitrine, avec dyspnée. — Plénitude et gène dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine. — Sensation brâlante qui remonte dans la poitrine. — Bouillonnement de sang dans la poitrine, après le plus léger effort et le moindre mouvement, avec étouffement de la respiration, angoisse, nausées, et faiblesse au point de s'évanouir. — Douleurs et anxiété dans la région du cœur.

Trono. — Sensation de torpeur aux reins et dans les fesses. —
«Maux de reins avec douleurs tractives, déchirantes et pressives,
— Tension douloureuse et roideur des muscles du cou et de la
nuque. — Gonflements goîtreux, volumineux et durs, avec pression, fourmillement et élancements. — Crampes dans les muscles
du cou.

Bras. — Tressaillement des muscles, dans les articulations scapulaires. — Pesanteur et tremblement des avant-bras et des mains. — Tiraillements dans les avant-bras et les articulations des mains. — Grosses ampoules sur l'avant-bras. — Gonfiement des mains. avec roideur des doigts. — Rougeur et gonfiement des articulations des doigts, avec tension en les faisant jouer. — Torpeur du bout des doigts.



680 - SPONGIA MARITIMA TOSTA. – SQILLA MARITIMA.

Jambes. — Tressaillement des muscles aux fesses. — Traction spasmodique des jambes en avant et en arrière. — Roideur des jambes. — Traction et déchirement dans les jambes et les pieds, quelquefois la nuit seulement.

SQUILLA MARITIMA.

SQUIL. — Scille maritime. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Vov. Pharmac. homosop., p. 289. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 2 à 4 semaines, dans des affections chroniques.

ANTIDOTE: Camph.

COMPARER AVEC: Bry. magn. mur-ac. n-vom. puls. rhab. rhus. seneg. spong.


CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections hydropiques?; Gastrite?; Entérite?; Ascite?; Affections catarrhales; Grippe; Pneumonie; Pleurésie, et souffrances à lasuite de ces maladies, lorsqu'elles ont été traitées par des évacuations sanguines; Hydrothorax?; etc., etc.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs sourdes, rhumatismales dans tout le corps, aggravées par le mouvement, et soulagées par le repos. — Palpitations musculaires. — Convulsions et accès de crampes. — Induration des glandes. — Pesanteur, fatigue et tiraillement dans les membres. — Inquiétudes dans les membres. — Explon brûlante et pruriante à la peau. — Éruption comme une gale pustuleuse, avec prurit brûlant. — Excoriation dans le pli des membres. — Sphacèle. — Sommeil inquiet, avec rêves fréquents et jactation. — Insomnie. — Disposition frileuse. — Froid glacial des pieds et des mains, avec chaleur du corps. — *Chaleur sèche, brûlante, oavec frissonnement et douleur pour peu qu'on se découvre. — oAprès la chaleur, pâleur du visage sans frisson. — Angoisse, avec peur de la mort. — Gémissements. — Irritabilité chagrine. — Éloignement pour le travail intellectuel ou corporel.

Tête. — Vertige avec nausées. — Vertige le matin, à faire tomber de côté. — Mal de tête, le matin, après le réveil, comme une pesanteur pressive et douloureuse. — Sensibilité douloureuse du vertex, tous les matins. — Douleur serrante dans les côtés de la tête. — Contraction dans les tempes. — Maux de tête tractifs.

lancinants. - Battement dans la tête, en se levant.



SQUILLA MARITIMA.

681

Yeux. — Douleur dans les yeux, avec sensation de contraction. -Dechirement dans les yeux, comme derrière les globes. — Sensation brûlante dans les angles extérieurs des yeux. - Gonflement des paupières supérieures. - Yeux grandement ouverts. -- Regard fixe. - Pupilles contractées, ou fortement dilatées. - Tour-

noiement et obscurcissement devant les yeux.

Oreilles et Nez. — Déchirement dans les oreilles. — Narines douloureuses, comme si elles étaient excoriées. — Éruption suin-

tante sous le nez, avec prurit lancinant. — Coryza fluent, avec narines ulcérées et éternument frequent. - Mucosités nasales, âcres, corrosives.

Visage. — Visage tantôt très-altéré, tantôt physionomie animée. Chaleur à la face, aisément excitée par le plus léger mouvement ou la parole. — Traits du visage tirés, contractés, surtout pendant la chaleur fébrile; après la chaleur, paleur. - Lèvres et dents noires. — Lèrres gercées, avec croûtes brunâtres. -*Face rouge foncé.

Bouche sèche et ouverte. — Vésicules sur la langue. — Apreté et grattement dans la gorge. — Sensation brûlante dans le palais

et la gorge. — Sécheresse dans la gorge. Appétit. — Insipidité des aliments. — Goût empyreumatique dans le gosier, en mangeant. - Goût douceatre, ou *amer des aliments, surtout de la viande et de la soupe. *Dégoût des aliments. — Désir des acides. — *Perte de l'appétit. - *Forte soif, surtout d'eau fraiche. - Malgré la soif, on ne peut boire que goutte à goutte, à cause d'une geno de la respiration. - Voracité et boulimie. - Faiblesse de la digestion.


Estomac. — Nausées, quelquefois avec envie de vomir. — Nausées continuelles le matin, pendant la toux. — Nausées avec envie de vomir, alternant constamment avec mouvements comme pour la diarrhée. — Vomiturition violente. — **Renvois amers. — *Pression**

sur l'estomac, comme par une pierre. Ventre. — *Sensibilité douloureuse du ventre, avec ballonnement sans dureté. - Traction et déchirement à travers le ventre. -Pincements, grondement et borborygmes dans le ventre. - Ex-

pulsion fréquente de vents. - Ascite.

Selles. — Constipation. — Selle dure, insuffisante. — Diarrhée de mucosités brunâtres, avec expulsion abondante de vents. — Selles diarrhéiques, noires. — Ascarides et filaments blancs, abondants avec la selle. - Selles fétides non digérées. - Selles sanguinolentes.

Urines. — Diminution de la sécrétion des urines. — Forte enrie d'uriner, avec émission abondante d'une urine aqueuse. -- Flux d'urine. -- *Émission fréquente d'urines, la nuit. -- *Pression continuelle sur la ressie, qui est très-sensible. - * Urines rouges.



SQUILLA MARITIMA. STANNUM.

chaudes, foncées, -avec sédiment rouge. — Pissement de sang-— Après l'émission des urines, ténesme.

Parties génitales. — Douleur dans les testicules, avec sensation

compressive. — Métrorrhagies.

682

Laryux. — Toux provoquée par un chatouillement au-dessous du cartilage xiphoïde, ou en respirant profondément. — Toux, jusqu'à provoquer des vomituritions. — Toux violente, arec lancinations dans les côtés de la poitrine. — Toux, avec ébranlement douloureux dans le ventre. — *Toux courte, sèche, chaque fois que l'on respire, osurtout le soir et la nuit. — *Toux après avoir bu froid. — Râle muqueux avant la toux. — *Toux, avec expectoration de mucosités et daleine courte. — oToux, avec crachement de sang. — *Expectoration de mucosités rougeâtres. — *Mal à la tête et suffocation en toussant, ou pression sur la vessie, et émission d'urine involontaire. — *Toux, avec courte haleine.

Poitrine. — Respiration accélérée et anxieuse, avec dyspnée et besoin d'être couché la tête et la poitrine hautes. — Respiration gémissante, avec bouche ouverte. — Pression des deux côtés de la poitrine, surtout en inspirant. — *Lancinations étendues, pressives ou tressaillantes, dans la poitrine et les côtés de la poitrine, en respirant et en toussant. — *Sensation de pesanteur dans la poitrine. — *Congestion de sang à la poitrine. — Douleurs de poitrine, aggravées le matin.

Trone et Membres. — Éruption pruriante au dos. — Roideur de la nuque et du cou. — Traction rhumatismale et serrement dans les muscles du cou. — Boutons au cou, douloureux seulement en les grattant. — Sueur sous les aisselles. — Tressaillement convulsif des bras. — Élancements dans les articulations des mains. — Tressaillement convulsif dans les jambes. — Tractions rhumatismales dans les cuisses et les jambes. — Sensation brûlante au gras du pied, comme s'il avait été gelé. — Sueur aux orteils.


Sueur froide aux pieds.

STANNUM.

STAN. — Étain. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 143.—Dose usitée: 30. --Durée d'action: 6 à 7 semaines, dans des affections chroniques. ANTIDOTES: Puls.

COMPARER AVEC: Ars. bell. cann. caus. cham. chin. hell. ign. puls seneg., stram. valer. verb. — C'est surtout après caus., que stann. est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptémes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : - -



STANNUM.

683

Paralysies; Épilepsie, surtout pendant la dentition; Fièvres lentes ?; Prosopalgie; Gastralgie et coliques spasmodiques, surtout chez des femmes hystériques ou chez des personnes hypocondriaques; Ténia ?: Flueurs blanches; Catarrhe des bronches; Grippe; Phthisie pituiteuse; Phthisie laryngee; Hydrothorax; etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs pressices et tractices sùrtout dans les membres, s'aggravant insensiblement jusqu'à ce qu'elles deviennent très-violentes, et décroissant de même. Attaques d'épilepsie, cavec rétraction des pouces et jactation, ou bien avec renversement de la tête, pâleur du visage, mouvements convulsifs des mains et des yeux, et perte de connaissance; les accès viennent quelquefois le soir. —*Amaigrissement excessif. - • Paralysies. — Grande lourdeur et paresse. — * Abattement excessif, et accablement physique et moral, avec tremblement, surtout en faisant un exercice doux, oet avec disposition à transpirer facilement. — Surexcitation nerveuse. — Inquiétudes insupportables dans le corps. -- Fatigue excessive par la parole. --Les souffrances semblent disparaître pendant la marche, à l'exception de l'abattement, qui est excessif alors; elles reparaissent des qu'on est tranquille.

Peau. — Elancements pruriants (brûlants) sur toute la peau du

corps. — Engelures. — Envies aux ongles.

Sommeil. — Envie de dormir, le jour. — Baillement fréquent avec oppression de la poitrine, comme si elle était entourée d'un cercle.—Sommeil turdif.—*Insomnie nerveuse, on continuelle. - Le matin, on n'a pas assez dormi. - Sommeil profond. -*Agitation nocturne et affluence de rêces vifs, anxieux ou lascifs. — Gémissements, pleurs et lamentations plaintives, en dormant.

Fièvre. - Frissons et horripilation, le matin, avec froid aux mains et torpeur du bout des doigts. - Frissonnement qui parcourt le dos, ou sculement à la tête, le soir avec soif. - Ochaleur brulante dans les membres, surtout aux mains. - Sensation de chaleur anxieuse au moindre mourement. - Pouls petit accéléré. *Sueurs nocturnes très-débilitantes. — *Sueurs matutinales, abondantes.

Moral. — Humeur sombre, hypocondriaque. —*Grande agitation et angoisse, mélancolie et disposition à pleurer. — On est trèsaffairé, sans venir à bout de rien faire. - *Découragement. -*Mauvaise humeur, avec taciturnité et éloignement pour la société et la conversation. - Emportement colérique subit. - «Surexcitation nerveuse.

Tête. - Vertige, comme si tous les objets étaient trop éloignés. -Vertige en s'asseyant, avec Perte des idées. - Mal de tête, avec



STANNUM.

684

nausées et vomiturition, quelquefois avec sensation brûlante dans le sinciput, les yeux et le nez, ou bien, le matin, avec manvaise humeur. — *Pesanteur et pression étourdissante dans la tête, parcourant surtout le front. — *Douleurs lancinantes dans la tête, surtout au front, et oprincipalement après une quinte de toux. — Douleurs crampoïdes dans la tête, comme par une tension ou un serrement. — Traction pressive et déchirement dans la tête. — Douleurs térébrantes dans la tête. —Douleurs battantes dans les tempes. — Seconsses douloureuses à travers la tête.

Yeux. — Yeux douloureux, et comme excoriés par le frottement. — Pression dans les paupières et dans leurs angles. — Lancinations brûlantes dans les paupières. — Prurit, cuisson et sensation brûlante dans les yeux. — Orgelets. — Agglutination nocturne des paupières. — Ulcère à l'angle interne de l'œil, comme une fistule lacrymale. — Yeux ternes, troubles. — Tressaillement et frémissement des yeux. — Yeux convulsés ou proé-

minents. - Auréole irisée de la lumière.

Oreilles et Nez. — Otalgie, avec déchirements tractifs. — Ulcération du trou percé pour les boucles d'oreilles. — Tintement d'oreilles. —Cris dans les oreilles, en se mouchant. — Pesanteur et sensation d'obturation dans la partie supérieure du nez. — Inflammation de l'intérieur du nez. — Sensation brûlante dans le nez. — Coryza sec d'un seul côté, avec gonflement et rougeur de la narine.

Visage. — *Visage pâle, hâce, avec yeux caves. — *Douleurs de la face, avec traction pressive, surtout aux pommettes et dans les orbites. — Douleur brûlante, lancinante dans les muscles de la face. — Gonflement des joues et de la mâchoire supérieure. — Crampe de la mâchoire. — Gonflement douloureux des glandes

sous-maxillaires.

Dents. — Odontalgie après le repas, avec douleur tressaillante et chaleur du visage. —*Sensation d'allongement et de vacillement des dents. — Ulcère aux gencives, avec gonflement des joues.

Bouche et Gorge. — Exhalaison fétide par la bouche. — Écoulement de salive acide. — Parole embarrassée, abattue, par faiblesse. — Langue rouge. — Mal de gorge, comme par gonflement intérieur, avec traction et tension. — Sensation de sécheresse dans la gorge, avec lancinations. — Apreté et grattement dans la gorge, surtout le soir. — Accumulation de mucosités dans la gorge et la bouche, avec besoin de renâcler, suivi de sensation d'excoriation.

Appétit. — Goût amer et aigre. — Goût amer de tous les aliments. — Goût amer, herbacé, de la bière. — Faim augmentée, avec impossibilité de se rassasier. — Soif augmentée. — Après le repas, nausées et vomissement. — **Paiblesse excessive de la di-

gestion



STANNUM.

11.55

Estomac. — Renvois, avec goût d'œufs pourris, ou amers. — "Renrois aigres, avec grattement dans la gorge. — Hoquet frequent.
— "Nausées, surtout après le repas, suivies de vomissement
amer et aqueux. — "Vomiturition violente, suivie de vomissement des aliments. — "Pression à l'estomac, quelquefois trésviolente. — Pression tensive au scrobicule, qui est douloureux au
toucher, comme par une ulcération sous-cutanée. — "Crampes
d'estomac, "quelquefois avec renvois amers, sensation de faim et
diarrhée, ou bien avec nausées et teint pâle et maladif. — Serrment, comme par une griffe dans l'estomac et la région ombilicale, avec nausées.

Ventre. — Coups obtus à travers les hypocondres. — Crampes dans la région du diaphragme. — *Pression et sensation brûlante dans la région hépatique. — *Pression, douleur crampoïde et élancement dans l'hypocondre gauche. — Ventre douloureusement ballonné et sensible au toucher. — Crampes abdominales, avec douleurs au-dessus et au-dessous de l'ombilie. — Fouillement, pincement et tranchees dans le ventre. — Sensation brûlante et élancements dans l'abdomen. — Sensation d'exceriation dans le ventre, aggravée au toucher. — Serrement comme par une griffe dans la région ombilicale, suivi de nausées. — Sensation de vacuité dans l'abdomen. — Incurcération de flutuosites


Selles. — Constipation. **Envie d'aller à la selle, inutile et frequente. — Selles dures, sèches, noueuses, ou peu abondantes et verdatres. — Selles muqueuses. -- *Forte diarrhée.

Urines. — Rétention d'urine. — Émission d'une urine rare.
*Envie fréquente d'uriner, quelquefois avec émission peu abondante. — Absence du besoin d'uriner, comme par insensibilité de la vessie.

Parties génitales. - Evaluation de l'appétit rénérien. - Exertation violente et voluptueuse à l'ejaculation. -- *Pollutions frequentes.

Règles. – Menstruation plus abondante. Avant les regles, anxiéte et mélancolie. – «Pendant les règles, coliques. Crampes de la matrice. – *Leucorrhée de mucusités transparentes ca jaunûtres, avec chate considérable des forces. — Le nourrissen quitte le sein de sa mère et ne veut plus teter.

Larynx. **Enronement et apreté dans les gorge, avec chatouillement qui provoque la toux. **eCatarrhe avec rolx ranque, sensation de fatigue dans la poitrine, gene de la respiration et tous avec expectoration. **Accumulation abondente de murgostes dans la trachée-artere, se détachant facilement par une toux légère. **Voix plus haute pour le chant, après avoir renacle des mucosités. **Toux proroquée par le roc, la parole et le chent, **ou par un chatouillement dans la poitrine.***Toux siehe, violente, ébranlante, au lit, le soir, jusqu'a minuit, ou plus violente le matin. **Toux cxcitée en se conchant du côté droit. ***Toux.**



STANNUM. STAPHYSAGRIA.

- "Toux aree avec vomiturition et vomissement des aliments. expectoration fréquente de mucosités. - *Expectoration. en toussant, rerdatre, douceatre, on jaune, salee, -on bien visqueuse et en morceaux, ou bien encore séreuse et de mucosités liquides, ou d'odeur putride. -- *Pendant et après la toux, don-

leur d'excoriation et élancements dans la poitrine.

1:50

Poitrine. - *Etouffement de la respiration, la nuit, surtout en étant couché, ou le jour au moindre mouvement. - *Dyspnéc. le soir surtout, avec sensation de vacuité dans le scrobicule et angoisse qui force à desserrer les vétements. - *Oppression de poitrine, en marchant et en montant. — *Râle muqueux et sifflement dans la poitrine. — En respirant profondément, sensation agréable de légèreté. — Douleur de brisement dans la poitrine. - **Pression profonde dans la poitrine comme par un furde u. *Tension de la poitrine. — *Constriction de poitrine. quelquefois le soir, avec angoisse. — *Lancinations du côté gauche de la poitrine, en respirant, et en étant couché du côté droit. - *Douleur d'excoriation dans la poitrine. - *Sensation de faiblesse dans la poitrine, comme si elle était ride, surtout après avoir parlé ou expectoré.

Tronc. -- Renversement du dos, en arrière. -- Lancinations dans les omoplates et la nuque. — Faiblesse des muscles de la nuque


et craquement des vertebres du cou, en secouant la tête.

Bras. - Douleur paralytique dans l'articulation de l'épaule. Pesanteur paralytique dans les bras. -- Déchirements pressifs dans les muscles et les articulations des bras, des mains et des doigts. -- Faiblesse et tremblement des mains. -- *Gonflement des mains, surtout le soir. - Tressaillement des mains. - Violente sensation brûlante dans les mains. - Petites taches rouges sur le dos des mains. - Engelures aux mains. - Contraction des doigts. - Rétraction des pouces. - Élancements dans le hout des doigts. - - Envies douloureuses aux ongles.

Jambes. -- Tractions et déchirements pressifs dans les hanches, jusqu'au-dessus du sacrum, comme aussi dans les jambes et les genoux. - Lassitude paralytique et pesanteur des jambes. -Fléchissement des genoux en marchant. - Roideur et tension dans le jarret. -- Sensation de chaleur et sensation brûlante dans les pieds. — Secousses déchirantes dans les malléoles. s'étendant jusqu'aux orteils. — *Gonstement des pieds, surtout le soir. — Gonstement rougeatre des pieds.

STAPHYSAGRIA.

STATH. — Staphysaigre. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœsp., p. 290. — Pose usitée : 30. — Durée d'action : 3 à 4 semaines dans des affections chroniques.



687


ANTIDOTES: Camph. — On l'emploie comme antidote de : Thui.
COMPARE AFEC: Amb. aru. colne. con. ign. l'rc. merc. mosch. magn-m.
phos-ne. puls. sabin. thai. — C'est sur.out après thai, que staph. fait du
bien, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Suites fâcheuses d'une contrariété, avec dépit et indignation, ou d'un chagrin avec inquiétude; Faiblesse nerveuse par suite d'onaisme; Souffrances par abus du mercure; Affections scrofuleuses et scorbutiques; Blessures par des instruments tranchants; Affections carcinomateuses?; Inflammation, ramollissement, ulcération et autres affections des os; Éruptions croûteuses; Fièvres intermittentes, avec affections scorbutiques; Hystérie; Hypocondrie; Teigne; Prosopalgie; Blépharophthalmie; Polypes au nez et aux oreilles; Stomacace et affections scorbutiques des gencives; Odontalgie; Affections gastriques et bilieuses; Gastralgie; Dyssenterie: Dysurie; Cancer de la matrice?; Goitre?: Sciatique?: Coxalgie, avec tendance à la suppuration?. etc., etc.

Voy. la note, page 15.

symptomes généraux. — *Traction paralytique dans les articulations, surtout pendant le mouvement ou une fausse position de la partie. — Déchirements tractifs dans les muscles. surtout en étant assis. — Lancinations aiguës, pénétrantes, profondes, à différentes parties. — Crampes dans les membres. — *Inflammations douloureuses des os. — *Gonflement des os. *Paralysie semi-latérale, après s'être mis en colère. — Accès d'évanouissement. — Sensibilité douloureuse de tous les muscles, au toucher, et des articulations en les faisant jouer. — Courleture et lassitude excessive, surtout pendant le mouvement améliorées en étant assis ou couché. — Besoin continuel de rester couché. — Grande fatigue le matin, de bonne heure, avec roideur de toutes les articulations. — Après la sieste, obnubilation. et pesanteur dans les membres.

Peau. — Fourmillement, comme par des insectes, par tout le corpssurtout le matin. — *Éruptions miliaires, chroniques, quelquefois avec tressaillements convulsifs la nuit. — Eruptions de nodosités pruriantes, suintantes, avec douleur brûlante. — Eruptions dartreuses, avec prurit, le soir, et sensation brûlante après s'être gratté. — *Dartres sèches, croûteuses, aux articulations. — *Engorgement et induration des glandes. — *Peau maladive. suppurant facilement. — *Furoncles fréquents. — Ulcères avec élancements déchirants ou cuisson pruriante. — Tressaille-



ment et déchirement autour des ulceres, surtout le soir et le matin.

Sommeil. - Forte encie de dormir le jour. — Pandiculations et bûillements violents, qui font venir les larmes aux yeux. — *Sommeil tardif pur affluence d'idées, ou à cause d'un prurit et d'une sensation brilante dans les dartres et les ulceres, ou de douleurs violentes dans les mollets. — Tressaillement des membres, en dormant. — Sommeil agité, avec rêves inquiets et réveil fréquent en sursaut. — *Rêves lascifs.

Pièrre. — Frissons fréquents et horripilation, meme la nuit.
°Fièrre le soir, consistant seulement en froid. — °Fièrre tierce avec goût amer, gencives saignantes, anorexie et constipation. —

Chaleur brûlante extérieure, avec bouillonnement de sang et soif. — La nuit, chaleur ardente dans les pieds et les mains, qui force à les découvir. — Forte disposition à transpirer le jour, même en étant tranquillement assis, ou bien impossibilité de transpirer, avec pâleur du visage et mal à la tête. — *Sueurs nocturnes abondantes, quelquefois avec odeur putride. — Sueur froide au front et aux pieds.


Moral. — Humeur hypocondriaque, avec indifférence pour toute chose. — Tristesse avec crainte sur l'avenir. — *Pleurs et chagrin sur son état. — *Caractère susceptible. — Désir de la mort.

Anxieti et aritotique qui pu propost de recter pulle port.

Anxiété, et agitation qui ne permet de rester nulle part. **Mawaise bumeur, irascibilité et dépit excessif, au point de jeter violemment tout ce qu'on a sous la main. — Éloignement pour la conversation, la méditation et pour tout travail intellectuel et sérieux. — Faiblesse de la mémoire. — Instabilité des idées. — Esprit excessivement obtus, avec impossibilité de se livrer à un travail quelconque. — Erreurs de l'imagination par des événements du passé. — Illusion, comme si tous les objets qui environnent étaient bas, et que l'on fût beaucoup plus grand.

Tête. — Tête confuse et embarrassée. — Vertiges tournoyants. quelquefois le soir, au lit, ou le jour en étant assis ou couche, soulagés en se promenant. - Maux de tête, le matin, au réveil. comme si le cerveau était meurtri. — Douleur étour dissante dans la tête, alternant quelquesois avec térébration. — Pesanteur de la tête, surtout dans le front au-dessus de la racine du nez. --Pression dans la tête, tractive, déchirante ou lancinante. - Maux de tête comme si le front allait éclater, en se baissant et en se remuant. - Douleurs de tête compressives ou expansives. Douleur de tête, semi-latérale, comme par un clou enfoncé dans le cerveau. Maux de tête lancinants. -- Sensation de vacillement du cerveau. -- Douleurs rhumatismales et tractives à l'exterieur de la tête. — Prurit fourmillant, quelquefois aussi rongeant, au cuir chevelu. avec douleur d'excoriation. - Production abondante de furfures avec prurit au cuir chevelu. - *Teignc humide, fétide, avec prurit violent. - *Chute des cheveux.

688



689

Yeux. — Yeux, comme quand on a sommeil. — Pression dans les yeux, les paupières et les angles. — Prurit aux bords des paupières. — Prurit et cuisson mordicante dans les angles internes des yeux. — Cuisson et sensation brulante dans les yeux, en écrivant. — Lancinations violentes dans les yeux, en les fatiguant. — *Inflammation des yeux, qui sont entourés de boutons. — — *Inflammation du bord des paupières. — *Nodosités dans le bord des paupières. — Grande sécheresse des yeux. — Mucosités abondantes, purulentes, sèches, dans les angles des yeux. — *Agglutination nocturne des yeux. — Occlusion spasmodique des paupières. — Diminution de la vue. — Vue trouble, comme si on avait de l'eau dans les yeux. — Reflets noirs comme des éclairs, et scintillement lumineux devant les yeux. — Étincelles devant les yeux, dans l'obscurité. — Auréole autour de la lumière, le soir.

Oreilles et Nez. — Élancements dans les oreilles. — Éruption derrière les oreilles. — "Dureté de l'onie par un développement plus grand des amygdales, principalement après avoir fait abus du mercure. — Tintement des oreilles. -- Nez ulcéré, avec croûtes profondément dans l'intérieur. — Fort coryza fluent avec obturation d'un côté du nez, éternument fréquent et larmoiement. -- *Coryza avec narines ulcérées. — Obturation des fosses nasales, avec voix nasillarde.

Visage. — *Visage hûre, pointu, arcc yeux cares, bordés d'un cercle bleu. — *Visage bleuâtre et brunâtre, en se mettant en colère. — *Douleur fuciule pénible, pressive et battante, depuis les dents jusque dans l'œil. — Inflammation des os de la face, avec élancements brûlants, ou tractions incisives et déchirements pressifs. — Éruption fuciule, avec prurit et élancements. — Lèrres couvertes d'ulcères et de croûtes, avec douleur brûlante.


Lèrres courertes d'ulcères et de croûtes, avec douleur brûlante.

*Gonflement des lèvres. — Luxation facile de l'articulation de la machoire. — *Gonflement douloureux et induration des

glandes sous-maxillaires.

Dents. — *Odontalgie, avec gonflement des joues et des glandes sous-maxillaires. — *Odontalgie, immédiatement après le repus et la mastication, comme aussi après les boissons froides et l'introduction de l'air froid dans la bouche, la nuit ou le matin. principalement. — *Déchirements et tractions pressives dans les dents cariées, ou dans les racines de celles qui sont saines ainsi que dans les geneives. — *Donleur rongeante dans les dents cariées. — Noirecur, ébréchement et carie des dents. — Sensibilité douloureuse, gonflement et saignement facile des geneives. — *Nodosités et exervoissances douloureuses aux geneires. — Geneives pâles, blanches, ulcérées.

Bouche. — Bouche et langue couvertes de vésicules. — Excroissances douloureuses à l'intérieur de la joue. — Ulcères dans la bouche. — Salivation. — Salive sanguinolente. — Gonflement



des glandes sous la langue.—Élancements sur la langue, comme par des échardes. — Parole abattue par faiblesse des organes de la parole.

Gorge.—Apreté dans la gorge et grattement, avec sensation d'excoriation, en avalant et en parlant. — Déglutition continuelle, en parlant. —Sécheresse et élancements dans le palais et la gorge. — Gonflement des amygdales. — Tiraillement douloureux de-

puis l'arceau hyoide jusque dans la gorge.

690

Appétit. — Goût fade et aqueux, avec goût normal des aliments. — Goût amer de tous les aliments. — Goût aigre du pain. — Appétit avec insipidité des aliments. — *Faim rorace. — *Boulimie, même après le repas, quelquefois avec pituites de l'estomac. — *Grand désir de lait. — Le tabac a un goût piquant, et donne des pyrosis. — *Appétence seulement pour les aliments

liquides. — *Désir excessif du vin et du tabac.

Estomac. — *Renvois, généralement à vide ou grattants. — *Renvois amers, après des aliments acides. — *Renvois salés et amers, après avoir mangé de la viande. — *Renvois sanglotants. — Écoulement d'eau par la bouche. comme des pituites. — Nausées avec envie de vomir, tous les matins. — *Nausées fréquentes. — *Pression à l'estomac, comme par un fardeau, le matin, au lit. — °Tension et pression dans l'estomac, aggravées ou soulagées en mangeant, surtout du pain. — Plenitude, pression et élancements dans le scrobicule. — Douleur fouillante à l'estomac. — Tension anxieuse à travers les hypocondres, le matin, avec gêne de la respiration.

Vontro. — Pression tensive dans le ventre. — Ventre gros, chez les enfants. — Traction au travers du ventre. — Sensation de faiblesse dans le ventre, comme s'il allait tomber — Tranchées après tous les aliments ou toutes les boissons. — Tranchées crampoïdes, avec envie d'aller à la selle. — Production abondante et incarcération de flatuosités. — Expulsion fréquente de vents chauds ou fétides. — *Gonstement des glandes inguinales. —

*Hernie inguinale, oaussi à la suite d'un effort.

Belles. — *Constipation. — Dureté des selles. — Envie fréquente d'aller à la selle, avec évacuations peu abondantes, dures, ou bien selles molles. — Selles tardives sans être dures. — Évacuation difficile. — *Selles dyssentériques, précédées, accompagnées et suivies de ténesme et de tranchées. — *Selles diarrhéiques, avec expulsion fréquente de vents fétides. — Évacuation involontaire d'une selle liquide. — Pendant la selle, tranchées brûlantes, pression et constriction à l'anus.

Urines. -- *Besoin très-fréquent d'uriner, avec émission goutte à goutte, ou en un jet mince, d'une urine foncée. — Émission d'urine excessivement douloureuse. -- Émission fréquente d'une urine claire, aqueuse. - Émission fréquente d'une urine rouge. Émission d'urine involontaire, en toussant. Après avoir



691

uriné, nouvelle envie comme si la vessie était encore pleine. Sensation brûlante dans l'urèthre, surtout en urinant.

Parties viriles. — Excroissances molles, humides sur et derriere le gland. — Inflammation des testicules, avec élancements bru-lants ou traction pressive et déchirements. — Exaltation pro-noncée de l'appétit rénérien, avec érections fréquentes surtout la nuit. — Prurit voluptueux au scrotum, qui provoque l'éjaculation. — Pollutions fréquentes, même pendant la sieste. — Après le coît, dyspnée. — Écoulement de liqueur prostatique, pendant un selle dure.


Bègles. — Sensibilité douloureuse des parties génitales. — Cuisson et prurit lancinant à la vulve. — Règles trop hâtives.

Laryax. — *Enrouement, — avec accumulation de mucosités adherentes dans le laryax et sur la poitrine. — *Sensation de pression et contraction dans la fossette du cou, après s'être mis en colère, aggravée par la déglutition. — *Apreté dans le laryax, après avoir beaucoup parlé. — *Toux sèche, creuse, proroquée par un chatouillement dans le laryax. —Toux violente, avec expectoration de mucosités visqueuses, le soir, après s'être couché. *Toux, avec expectoration purulente, jaune, surtout la nuit. Expectoration de sang, en toussant. — Pendant la toux, douleur dans la poitrine, comme par ulcération.

Poitrine. — *Pression à la poitrine, avec pesanteur dans cette partie, en étant assis, soulagée en marchant. — *Oppression contractive et grande agitation dans la poitrine. — Lancinations dans la poitrine. — Douleur d'executation et d'ulcération dans la poitrine. — Crampe dans le diaphragme, après s'être mis en colère. — Battement de cœur tremblotant, au plus léger mouvement, et à la moindre fatigue intellectuelle, comme aussi en écoutant de la musique, et après la sieste. — Éruption miliaire sur la poitrine, avec rougeur et prurit à la chaleur. — Éruption dartreuse sur les dernières côtes, avec prurit brûlant.

Tronc. — Douleur de brisement aux reins, au sensation comme si l'on s'était donné un tour de reins, surtout dans le repos, et principalement la nuit et le matin. — Douleurs aux reins en se levant de son siège, ou en se retournant dans son lit. — Lancinations violentes qui remontent le dos. — Albèes dans le muscle lombaire. — Pression tractive, rhumatismale, et tension dans la nuque, arec roideur. — Faiblesse des muscles de la nuque et du con. — Eruption de boutons pruriants à la nuque. — "Gonflement des glandes au cou, à la nuque, et sous les aisselles. — Lancination sous les aisselles.

Bras. — Pression sur les épaules. — Roideur de l'articulation de l'épaule, le matin. — Douleur ostéocope dans les bras, pendant le mouvement. — Traction pressive, paralytique, et déchirements lancinants dans les bras et les avant-bras, les épaules, les mainet les doigts. — Pression douloureuse dans l'os du bras. — Dartres



692 STICTA PULMONARIA. STRAMONIUM.

sur les mains. — Torpeur du bout des doigts. — Déchirement, tressaillement dans les doigts, surtout dans les bouts. - Nodosités arthritiques aux articulations des doigts. — Crampes dans les doigts. -- Mouvements convulsifs des doigts.

Jambes. - Roideur de l'articulation coxo-fémorale, le matin. Faiblesse douloureuse des cuisses et des jambes, et surtout de l'articulation du genou. - Douleur de brisement dans les cuisses, en marchant. — Dartres pruriantes aux cuisses et aux jambes. — Elancements tractifs dans les genoux et leurs articulations. -Tractions et déchirements pressifs sur le tibia et dans les os des pieds. — Crampes nocturnes dans les mollets et la plante des pieds. - Gonflement du cou-de-pied. - Gonflement des os du métatars:. - Prurit brûlant aux orteils, comme s'ils avaient été gelés.

STICTA PULMONARIA.

STICT. - Voy. HALE, Remedes américains.

Ce médicament, dont nous ne possédons également, jusqu'ici, que des pathogénésies par trop fragmentaires pour être rapportées, a été pourtant, quoique empiriquement, employé avec beaucoup de succès contre des Catarrhes bronchiques, des Grippes et des Toux catarrhales, surtout lorsque ces affections se distinguaient par les caractères suivants : sécheresse excessive des muqueuses du nez, de la gorge, du pharynx et de la poitrine, augmentant principalement le soir. - Chez les phthisiques, ce médicament paraît, mieux qu'aucun autre, apaiser la toux fatigante.

STRAMONIUM.


STRAM. — Pomme épineuse. — Паниемани. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 291. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 24 heures.

ANTIDOTES : Acetum. citr ac. n-vom. tabac acides végétaux. - On l'emploie

Comme antidote de : Merc. plumb.

COMPARER AVEC : Acon. asar. bell. bry. camph. canth. carb-v. cham. coc. hell. hep. hyos. merc. mosch. n-vom. op. plumb. puls. rut. stann. veratr. zinc.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes,



STRAMONIUM.

693

on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: Convulsions, accès d'épilepsie, danse de Saint-Guy, catalepsie et autres affections spasmodiques, surtout à la suite d'une frayeur, ou de la respiration de la vapeur du mercure; Affections à la suite des morbilles; Fièvres typhoïdes; Imbécillité; Delirium tremens, surtout par l'abus de la bière; Manie; Hydrophobie; Nymphomanie des femmes en couches; Encephalite; Hydrocéphale; Hoquet convulsif; Crampe de poitrine, etc. setc.


Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. - Douleurs crampoïdes, tractives. paralytiques dans les muscles et les articulations des muscles. - Sensation comme si les membres étaient séparés du corps. Crampes contractives dans les membres. - Fourmillement dans les membres. — Contraction et extension lente des membres. — *Accès de crampes de diverses natures. — Tétanos. — Renversement du corps. — Crampes et autres souffrances hystériques. — Roideur et contractions de quelques membres. — *Accès de roideur cataleptique du corps, avec perte de connaissance, précédées de maux de tête, avec vertige. - Mourements faciles des membres, ou grande pesanteur de ces parties. — *Convulsions qui ressemblent à la danse de Saint-Guy. - *Tressaillement convulsif des membres, avec pleurs. - *Mourements convulsifs et tressaillements, surtout au toucher ou en fixant les yeux sur des objets brillants (une lumière, un miroir ou de l'eau), ou bien apparaissant périodiquement. - º Conrulsions, comme dans l'épilepsie, mais sans perte de connaissance. — Accès d'évanouissement, avec ronflement. -- Tremblement des membres. -- Chancellement des membres en marchant et en se tenant debout. --Paralysies, quelquefois après une attaque d'apoplexie. - Faiblesse, avec besoin d'être couché. - Suppression de toutes les sécrétions et exerctions.

Sommeil. — Forte envie de dormir, le jour. — *Sommeil profond, arec ronflement, cris et hurlement. — Somnolence comateuse, avec physionomie ridiculement solennelle, au réveil. — Sommeil agité, avec rèves vifs. — *Position agenouillée dans le lit, et sursauts au moindre attouchement, avec cris et gestes d'un fou.

Pièvre. — Froid de tont le corps, surtout des membres, avec frisson grelottant et tressaillement général. Froid aux mains et aux pieds, avec rougeur de la face. Chaleur avec anciété et rougeur des joues, ou bien avec soif et vomissements. — Chaleur à la tête d'abord, puis froid général, suivi de chaleur et de soif. — Pouls petut, accéléré. — Sueurs fréquentes, abondantes, même la nuit.

Moral. — Meluncolie. — Tristesse, avec angoisse mortelle et pleurs abondants, surtout le soir, au lit. — Angoisse de conscience.



STRAMONIUM.


Humeur inconsolable et irritation facile pour des cétilles. -Grande activité et promptitude des mouvements. — Opiniatrete et entêtement. - *Rire aux éclats, alternant avec emportements colériques, ou avec gémissements. — Hurlements et gémissements. — Murmures ou cris continuels. — Fureur indomptable, envie le mordre, de donner des coups et de tuer. - Tantôt grande indifférence pour les affaires, tantôt crainte d'être inca-pable de s'en acquitter. — *Envie de s'enfuir. — º Désir de société, de lumière et de la clarté du soleil, parce que l'obscurité et la solitude aggravent l'état moral. — *Après l'équinoxe d'automne, l'état moral est aggravé. -- Perte de la mémoire. - *Émoussement de tous les sens, et insensibilité aux influences extérieures. - *Étourdissement, avec agitation intérieure. - *Délires, généralement effrayants, avec vision de fantômes qui font peur. Perte de connaissance, au point de ne plus reconnaître les siens. - Idée fixe; il semble que le corps soit coupé par moitié. -Erreurs de l'imagination, comme si tout ce qui entoure était très-petit, et que l'on fût très-grand et très-élevé. — *Divagations, avec idées extraordinaires. - *Aliénation mentale, avec prières et gestes pieux (prières, chants, air dévot, etc.).—*Manie, généralement avec fictions inépuisables de l'imagination, loquacité lascive, entretien avec les esprits, importance affectée. danses, rire, et coups ou bouffonneries ridicules, alternant constamment avec gestes tristes et sérieux. — Aliénation mentale et délire furibond à la suite d'un érysipèle à la face. Tête. - Ivresse et étourdissement. - Vertige, avec étourdissement et chancellement, ou avec obscurcissement des yeux et mal de tête. - Mal de tête, arec obscurcissement des yeux et dureté de l'ouïe. — Sensation pénible de légèreté et de faiblesse dans la tête. — *Douleurs de tête pulsatives, au vertex, avec accès d'évanouissement. — Congestion de sang à la tête, avec chaleur. — *Renversement et mouvements convulsifs de la tête. — On soulève souvent la tête en étant couché.

Yeux. — Yeux rouges et gonftés. — Pression et tension dans les yeux et les paupières. — Inflammation du bord des paupières. — Paupières ulcérées. — Yeux larmoyants. — Agglutination nocturne des yeux. — *Yeux fixes, étincelants. — Regard vague, triste. — Paralysie et occlusion spasmodique des paupières. — Yeux convulsés. — *Pupilles dilatées et insensibles. — Obscurcissement de la rue. — Cécité passagère. — Myopie. — Diplopie. — Vue indistincte, embrouillée. — Amblyopie. — Confusion des caractères en lisant. — Erreurs de la vue; les objets semblent être de travers ou colorés. — Illusions de la rue.

Oreilles et Nez. -- Il s'échappe du vent par les oreilles. -- Surdité. -- *Obturation du nez. -- oÉternument spasmodique.

Face et Dents. — Air d'hébétude et d'égarement, avec gestes craintifs. — Distorsion douloureuse des traits du risage. — Vi-

694



STRAMONIUM.

695

sage sillonné de rides profondes. — *Fuce boufie, yoryée de sang, quelquefois avec physionomie d'un niais. — *Rongeur circonscrité des joues. — *Face rouge foncée, -ou très-pâle. — Érysipèle d'un seul côté de la face et du nez. — Lèvres sèches et collant ensemble. — Raie jaune sur la partie rouge des lèvres. — Frémissement des lèvres. — Distorsion de la bouche. — Grincement des dents. — Odontalgie pulsative, commesi les dents allaient tomber.

Benche. — Sécheresse de la bouche. — Salivation abondante. Écume sanguinolente à la bouche. — Crachement de sang. — *Langue gonflée, paralysée. — *Bredouillement et bégayement. — Murmures continuels. — *Perte complète de la parole.

Garge. — *Constriction spasmodique de la gorge. — *Déglutition gênée, -avec élancements dans la gorge, ou avec pression dans les glandes sous-maxillaires. — *Déglutition empéchée, quelquefois par sécheresse dans la gorge.

fois par sécheresse dans la gorge.

Appétit. — Perte du sens du goût. — Les aliments n'ont qu'un goût de sable ou de paille. — Amertume continuelle dans la bouche, avec goût amer des aliments. — Soif ardente, généra-

lement avec horreur de l'eau et de tous les liquides.

Estemac. — Renvois avec goût aigre. — Vomissement aqueux, avec coliques et diarrhée. — Vomissement de mucosités verdâtres ou d'odeur aigre. — Vomissement de bile verte, après un léger exercice. — oHoquet convulsif. — Douleur d'estomac, avec sensation cuisante ou pressive. — Grande anxiété dans le creuc de l'estomac, avec gêne de la respiration. — (Inflammation de l'estomac.)


Ventre. — Ventre douloureux au toucher. — Ventre ballonné, dur. tendu. — Douleur de brisement dans le ventre pendant le mouvement. — Déchirements violents dans le ventre, comme si on arrachait l'ombilic. — Crampes abdominales, hystériques. — Gonfrement des glandes de l'aine. — Borborygmes et fermentation dans le ventre. — Expulsion abondante de flatuosités.

Selles et Urines. — *Constipation. — Ténesme. — Selles fétides. d'odeur cadavéreuse. — Diarrhée avec douleurs et borborygmedans le ventre. — Écoulement de sang coagulé par l'anus. - *Suppression de la sécrétion des urines. — Émission d'urine goutte à goutte, avec besoin fréquent. — Émission involontaire des urines. — (Flux d'urines.)

Parties génitales. — Lascivité. — Impuissance. — °Pollutions sanguinolentes. — Règles plus abondantes, avec écoulement d'un sang noir, en grosses masses coagulées. — Métrorrhagies. — Pendant les règles, fétidité lascive du corps, grande loquacité. tiraillements dans le ventre et les cuisses. — Après les règles. sanglots et gémissements.

sanglots et gémissements.

Petrine. — Voix haute, criarde. — Manque d'haleine. — Respiration difficile, suspirieuse. — Étouffement suffocant de la res



STRAMONIUM. STRONTIANA CARBONICA.

piration. -Oppression constrictive de la poitrine. - Pression dans la poitrine provoquée par la parole. - Sensation comme si quelque chose se retournait dans la poitrine.

Trons et Membres. — Douleur de brisement dans le dos, pendant le mouvement. — Traction et déchirement dans le dos et aux reins. — *Renversement du dos. — *Mouvements convulsifs des bras, par-dessus la tête. — Douleur contractive dans le bras, avec lancinations aiguês dans l'avant-bras. — *Distorsion des mains. — *Poings fermés. — Crampes dans les mains. — *Tremblement des mains. — Engourdissement des doigts. — Tressaillement dans les jambes, comme par une secousse, avec rétraction de ces parties. — Tractions dans les cuisses. — Fléchissement des jambes en marchant. — *Tremblement des pieds. — Crampes contractives dans les pieds.

STRONTIANA CARBONICA.

STRONT. — Carbonate de Strontiane. — HARTLAUB et TRINKS. — Hist. nat. et prep. Voy Pharmac. homœop., p. 444. — Dose uvitée: 30. — Inree d'action: 40 jours environ dans des affections chroniques. Antibote: Camph.


COMPARE

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre un cas de *Gastralgie*.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. Déchirement dans les membres et surtout dans les articulations, plus violent le soir et la nuit, au lit. — Immobilité des membres, d'un seul côté, comme par paralysic, le soir. — Amaigrissement excessif. — Tremblement des membres. — La plupart des douleurs, dont il est difficile de déterminer le siége, semblent être dans la moelle des os (?). — Les affections augmentent insensiblement jusqu'à une certaine intensité et diminuent de la même manière. — Prédominance des symptômes d'un seul côté du corps. — Au grand air, principalement à la chaleur du soleil, comme à la chaleur en général, on se trouve mieux. — Grande lassitude et abattement, le matin et le soir.

Peau. — Tension de la peau à diverses parties, le soir, en étant au lit. — Éruption de petits boutons à diverses parties, avec prurit brûlant, surtout après avoir gratté.

Sommeil. — Sommeil tardif. — Tressaillement dans le corps et sursauts en s'endormant. — Réreil fréquent la nuit. surtout à



STRONTIANA CARBONICA.

697

cause d'une toux sèche. — Sommeil avec affluence de rêves fantastiques.

Fièvre. — Frissons, le matin et le soir. — Chalcur qui vient du nez et de la bouche, avec soif. — Chalcur sèche, la nuit. — Sueur abondante la nuit, et en découvrant un membre, douleur immédiate à cette partie: — Sueur des parties affectées.

Moral. — Inquietude et angoisse. — Humeur chagrine, avec disposition à s'emporter et à se mettre en colère. — Oubli excessif.

Tête. — Mal de tête avec nausées et vertige. — Pression pénible dans le front. — Céphalalgie tensire, comme si la peau était tirée vers le vertex, ou comme si tout se poussait vers le dehors. — Mal de tête lancinant. — Résonnement dans les tempes, le soir. — Sensation de chaleur ardente dans la tête et à la face, l'aprèsmidi, en marchant, avec rougeur de la face, angoisse et envie de dormir.

Yeux. — Sensation brûlante dans les yeux. — Pression sur la partie supérieure du globe de l'œil. — Fort tressaillement et frémissement des paupières. — Cercles rouges et bleus devant les yeux. après les avoir frottés, avec pression comme par du sable. — Scintillement devant les yeux. — Taches vertes devant les yeux. dans l'obscurité.

Oreilles, Nez et Face. — Déchirements dans les oreilles. — Bourdonnement dans les oreilles. — Frémissement d'un seul côté du nez. — Mouchement de croûtes sanguinolentes. — Rougeur de la face, avec chaleur brûlante. — Prurit à la face. — Tressaillement, déchirement et térébration dans les pommettes.

Dents. — Odontalgie, avec douleur tressaillante. — Déchirement dans la racine des dents. — Arrachement dans les dents, précédé d'une accumulation abondante de salive. — Gencives gonflées. douloureuses au toucher.

Bonche et Garge. — Sensation de torpeur et sécheresse de la bouche, le matin, sans absence de salive. — Apreté et sécheresse de la gorge. — Inflammation du palais, avec douleur pendant la déglutition.

Appétit. — Goût de terre dans la bouche. — Forte soif surtout de bière. — Appètence seulement pour le pain bis. — Faim après le dîner.

Estomac. - Nausées, avec chaleur brûlante de la face. — Hoquet violent. - *Pression à l'estomac, avec sensation de plénitude dans le ventre, surtout après le repas.

Ventre. — Ventre tendu et douloureusement ballonné. — Colique dans la région ombilicale. — Tranchées, avec diarrhée et frissons. — Lancinations dans les flancs. — Grondement dans le ventre, avec expulsion abondante de vents très-fétides.

Selles. Selles tardives, dures, noueuses, s'évacuant seulement avec des efforts et de grandes douleurs. — Diarrhée d'une eau jaune, avec tranchées et pincements dans le ventre. — Sensation



STRONTIANA CARBONICA. - SULFUR.

brûlante à l'anus, pendant et après la selle. - Douleurs des boutons hémorrhoïdaux du rectum.

Urines - Règles. - Sécrétion d'urine diminuée. - Sécrétion plus abondante d'une urine jaune foncé. - Emission d'urine, la nuit. - Urine pâle, avec forte odeur d'ammoniaque. - Règles en

retard, d'abord séreuses, puis en caillots.

698


Poitrine. - Enrouement et âpreté dans la gorge, qui provoquent la toux. - Toux sèche provoquée par une irritation dans la trachée-artère, aggravée la nuit. - Dyspnée en marchant, avec ardeur au visage. - Pression à la poitrine. - Douleurs tractives

dans les muscles de la poitrine. — Battement de cœur. Tronc et Membres. — Douleur de brisement aux reins et dans le dos. — Douleur tractive dans le dos et la région lombaire. — Déchirements dans les bras, les mains et les doigts, surtout dans les articulations. — Torpeur presque paralytique des avant-bras et des mains. — Traction paralytique dans les jambes. — Tressaillement des jambes. - Tressaillements et déchirements dans les jambes, les pieds et les orteils, surtont dans les articulations. Gonflement des pieds.

SULFUR.

SULF. — Soufre. — HANNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., p. 443. — Doses uxitées: 0, 30. — Durée d'action: 38 à 40 jours (dans les maladies chroniques), et même plus longtemps.
ANTIDOTES: Acon. camph. cham chin. merc. n. vom. puls. sep. — On l'emploie comme antidote de: Chin. iod. merc. nitr-ac. rhus. sep.
COMPAREN AVEC: Acon. amm. ant. avs. bar. betl. bry cale. canth. caps. caus. chim. chin. coff. con. enpr. dule graph. ign. iod. ipec. lach. lgc. magn. magn.m. merc. natr. n. str.m. mir-ac. n-vom. phos-ac. puls. rhus. saxs. seneg. sep. stl. sulf-ac. verair. — C'est surtout a près: Aron. ars. capr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. et rhus. que le soufre est efficace, lo s-qu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le soufre conviennent quelquefois: Acon. bell. calc. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sep. sil.

CLINIQUE. - Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : -Affections principalement des personnes d'une constitution lymphatique, disposées à des éruptions, des dartres, des glandes engorgées, etc., etc., ou bien de constitution bilieuse, avec disposition aux hémorrhoïdes, à l'hypocondrie et à la mélancolie; ou bien encore de constitution faible et leucophlegmatique, ou épuisée, avec teint maladif, disposition aux blennorrhagies, à des refroidissements, des sueurs faciles et abondantes, des rhumes de cerveau et des diarrhées avec coliques: Souffrances par l'abus du



699

cin ou du mercure et d'autres poisons minéraux; Souffrances par suite d'un refroidissement au rent (courant d'air), ou dans l'eau : Souffrances périodiques et intermittentes: Arthrite et rhumatismes aigus et chroniques, avec ou sans gonflement; Arthrite vague; Arthrocace; Hydrarthre; Rhumatisme articulaire; Inflammations locales chroniques; Accès de spasmes et de convulsions, même pendant la dentition; Epilepsie; Faiblesse nerreuse par suite d'onanisme, ou d'autres pertes débilitantes, ainsi que par l'excès de l'étude et des reilles prolongées; Faiblesse musculaire, avec marche mal assurée, corps courbé, ou difficulté (pour les enfants) d'apprendre à marcher; Tremblement des membres, même chez les ivrognes; Paralysie, principalement par faiblesse; Atrophie des enfants scrofuleux et des personnes épuisées; Affections à la suite d'un tour de reins, ou d'autres lésions mécaniques; Ictère; Chlorose; Cachexie par l'abus du quinquina; Affections hydropiques: Suppurations; Inflammation, engorgement et suppuration des glandes, et autres souffrances scrofuleuses et rachitiques; Gonflement, inflammation et autres maladies des os; Dartres mi-liaires et croûteuses; Eruptions chroniques, éruptions après la vaccination; Gale, et suites fâcheuses d'une gale ou de dartres répercutées; Taches hépatiques; Sugillations et autres souffrances à la suite d'une contusion; Taches de naissance; Anévrismes; Verrues; Engelures; Morbilles et affections à la suite de cette maladie; Scarlatine (maligne) et affection provenant de la répercussion de l'éruption; Petite vérole (période d'éruption); Inflammations érysipélateuses; Excoriations; Rhagades; Ulcères (même ceux par l'abus du mercure); Ulcères fistuleux; Tumeurs enkystées; Abcès; Somnambulisme nocturne; Fièvres inflammatoires, avec affections gastriques et nerveuses; Fièvres typhoides; Fièvres intermittentes; Fièvres hectiques; Melancolie; Exaltation religieuse et philosophique; Manie; Fatigue de la tête, ou même alienation mentale, par excès d'étude; Hypocondrie; Hystérie; Imbécillité; Congestion cérébrale; Céphalalgies rhumatismales, catarrhales, nerveuses, etc.; Migraine; Céphalalgies des ouvriers en métaux; Encéphalite?; Teigne; Chute des chereux, même après de graves maladies aigues, chez les femmes en couche, par suite de fréquentes migraines, etc.; Ophthalmies scrofuleuses, traumatiques, catarrhales, etc.; Obscurcissement et ulcères de la cornée; Blépharophthalmie; Amblyopie amaurotique; Myopie; Presbyopie; Cataracte; Dureté de l'ouie; Otorrhée purulente; Inflammation flegmoneuse du nez; Coryza sec ou fluent, aigu ou chronique; Hémorrhagie nasale; Érysipèle à la face; Croûte de lait et autres dartres faciales: Éphélides?; Cancer des lèvres?; Inflammation des gencives; Odontalgies rhumatismales ou congestives; Dentition difficile, avec disposition aux convulsions: Aphthes dans la bouche; Salivation par suite de l'abus du mercure; Angines ca-tarrhales, chroniques; Souffrances gastriques; Dyspepsie avec




700

aigreurs, pyrosis et vomissement des aliments; Blennorrhée gastrique; Anorexie opiniatre; Gastrulgies; Penchant à l'irrognerie; Affections hépatiques chroniques; Gonflement et induration du foie; Ictère: Carreau; Coliques spasmodiques, flatulentes et hémorrhoïdales: Ascite; Entérite?; Péritonite?; Hernies qui sortent facilement; Hernies incurcérées (après l'usage de l'aconit); Bubons scrofuleux et mercuriels; Constipution opiniatre ou disposition à la diarrhée; Diarrhées muqueuses; Dyssenteries; Lientéries?; Chute du rectum; Affections vermineuses; Hémorrhoïdes arengles ou saignantes; Suites facheuses de la suppression du flux hémorrhoïdal; Ischurie; Dysurie; Diabète?; Hématurie?; Incontinence d'urine chez les enfants (pissement au lit); Uréthrite?; Gonorrhée secondaire; Blennorrhée de la vessie?; Fistule urinaire: Rétrécissement de l'urethre?; Inflammation et phimosis du prépuce; Gonorrhée bâtarde: Induration des testicules?; Hydrocèle?: Impuissance; Faiblesse des parties génitales par suite d'onanisme: Ménostase; Dysménorrhée; Coliques menstruelles; Métrorrhagie?; Stérilité?; Abortus?: Flueurs blanches; Chlorose; Excoriation, inflammation et ulceration des mamelles; Induration (et cancer?) des mamelles: Excoriation, constipation, aphthes, et ophthalmie des nouveau-nés; Catarrhe pulmonaire, avec enrouement, même à la suite des morbilles; Catarrhes invétérés; Blennorrhée des poumons chez les vicillards; Grippe: Aphonie; Toux catarrhale. spasmodique, nerveuse, etc.; Coqueluche?; Hémoptysie; Souffrances asthmatiques; Pneumonie chronique; Phthisie; Mal de poitrine à la suite d'efforts ou d'un tour de reins; Affections du cœur; Maux de reins; Distorsion rachitique de la colonne vertébrale; Tremblement des mains, même chez les ivrognes; Rhagades aux mains; Panaris; Coxarthrocace?; Coxalgie; Luxation spontanée; Gonite arthritique ou rhumatismale: Tumeur blanche?: tioutte aux mains et aux pieds; Ulcères aux jambes; Inflammation érysipélateuse des pieds on des jambes, etc., etc.

Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Douleurs vives ou tractives *ou élancements dans les membres, principalement aux articulations, et quelquefois avec manque de force, roideur et sensation de torpeur dans les parties affectées. — *Douleurs de luxation. tension comme par raccourcissement des tendons, crampes et contraction dans plusieurs parties. — *Craquement dans les articulations, principalement du coude et du genou. — Gonflement inflammatoire des articulations, avec chaleur et rougeur. — *Fourmillement dans les membres, principalement dans les mollets et les bras. — *Disposition des membres à s'endormir facilement. — *Palpitations musculaires. — *Tressaillements et secousses dans certaines parties ou dans tout le corps, principa-



701

lement étant assis, ou couché. -- * Arcès de spasmes. -- * Conrulsions épileptiques, "provoquées par quelque frayeur ou en courant. *et quelquefois avec cris, enroidissement des membres, serrement des dents et sensation comme si une souris parcourait le dos ou les bras. - *Acrès d'écanouissement, fou de malaise hystérique ou hypocondriaque, quelquefois avec vertiges, vomissement et sueur. - *Tremblement des membres, principalement des mains. - Sensation de tremblement dans l'interieur du corps. - Accès d'inquiétudes dans tout le corps, qui ne permettent pas de rester assis, avec besoin d'étendre et de contracter alternativement les membres. - Fort bouillonnement de song, quelquefois avec chaleur brulante aux mains. - Grand épuisement, avec *grande fatique après la moindre conversation et la promenade la plus courte, besoin de rester toujours assis, et sucurs abondantes, même en étant assis, en lisant, en mangeant, en étant couché et en se promenant. - La sensation de fatigue se dissipe quelquefois par la marche. - Faiblesse musculaire, principalement dans les genoux et les bras, ainsi que dans les jambes. avec marche mal assurée. - *Marche courbé. - Amaigrissement extraordinaire, quelquefois avec faiblesse, fatigue et sensation brulante aux mains et aux pieds. - *Grande sensibilité au grand air et au vent, -avec douleurs dans les membres aux changements de temps, disposition à se refroidir facilement, et beaucoup de souffrances par l'effet du grand air. - Ce sont principalement les affections de la tête et de l'estomac qui s'aggravent au grand air .- La plupart des affections s'aggracent ou apparaissent la muit ou le soir, ainsi que dans le repos, en restunt debout, et en s'exp sant un froid; elles disparaissent en marchant et en remuant la partie malade, ainsi qu'à la chaleur de la chambre; mais la chaleur du lit rend les douleurs nonturnes insupportables. - *Plusieurs souffrances apparaissent périodiquement, ou par intermittence.

Peau. — *Prurit à la peau, même de tout le corps, plus vielent la nuit, ou le matin, au lit, et souvent avec douleur d'excoriation, chaleur, démangeaison, ou saignement de la partie que l'on a grattée. — *Éruptions comme celles qui suivent quelquefois la vaccine. — *Éruptions et dartres croûteuses, de couleur jaune verdâtre, provenant de petites phlyctènes pruriteuses à auréole rouge. — *Taches dartreuses, rouges, irrégulières, furfuracées, ou couvertes de petites phlyctènes suintant une lymphe séreuse. — *Éruptions galcuses. — *Éruptions miliaires, principalement aux extrémités. — *Urticaire. — *Prurit brûlant des éruptions. — *Taches hépatiques, de conleur jaune ou brunâtre. — «Inflammations érysipélateuses, avec douleurs pulsatives et lancinante. — *Sugillations, même par la plus bigère contusion. — «Rougeur vive écarlate sur tout le corps. — *Engelures rouges, goulées et ulcérées, avec prurit à la chaleur de la chambre. — *Verrue.




calleuses, principalement autour des doigts. -- *La peau se gerce facilement, surtout au grand air; gerçures avec douleur d'exciriation. — *Desquamation et excoriation de la peau à plusieurs endroits. -- Peau maladive; les moindres lésions s'enflamment et s'ulcèrent. — * Ulcères avec bords élevés, boutons pruriteux aux environs, auréole rouge ou bleuâtre, douleurs vives, lancinantes et tensives, saignement facile et sécrétion d'un pus fétide et sanieux ou jaune et épais. - *Chairs luxuriantes dans les ulcères. - Ulcères fistuleux. — Furoncles. — Tumeurs enkystées; ou otumeurs pâles, tendues et chaudes; abces inflammatoires. *Inflammation, gonflement et induration ou suppuration des glandes. — Nodosités sur la peau de tout le corps, par gonflement des glandes sous-cutanées, principalement au sein. ... Inflammation, gonflement et sensibilité douloureuse des os. -- *Re-

pugnance pour les lotions.

Sommeil. -- *Envie de dormir insurmontable, principalement après midi et le soir, aux lumières .-- *Baillement fréquent. Sommeit nocturne tardif, *ou insomnie, quelquefois à cause d'une grande affluence d'idées, ou comme par surexcitation .-- Sommeil trop léger, ou agité, avec réveil fréquent, souvent en sursant et avec effroi. - Réveil de trop bonne heure et impossibilité de se rendormir. - *Sommeil du matin trop prolongé, quelquesois profond et comateux, avec difficulté de se lever le malin. -*Sommeil qui ne délasse point. — *La nuit, douleurs, inquiétudes et fourmillement dans les membres, anxiété et chaleur. coliques, -gastralgie, vertiges, mal à la tête, visions et illusions des sens, battement de cœur, souffrances asthmatiques, *soif et faim. -- Impossibilité de dormir autrement qu'étant couché sur le dos, la tête haute. — En dormant, agitation et jactation, secousses dans le corps et tressaillement des membres, sursants et effroi, paroles, cris, niurmures, divagations, delires, lamentations et gémissements, ronflements, yeux à demi ouverts, coucher sur le dos, les bras sur la tête, cauchemar et somnambulisme. -*En s'éveillant, illusion des sens. - visions effrayantes et peur des revenants. - *Rêves fréquents, fantastiques, anxieux. effrayants et horribles, fâcheux, dégoûtants et agités; rêves de feu, de chiens qui mordent, de beaux habits que l'on possède. de chutes, de périls, de morts; rêves avec pressentiment de ce qui aura lieu le lendemain.

Fièvre. — *Frissonnement, -froid, frisson et horripilations, principalement le soir, ou la nuit, au lit, ainsi qu'après midi, et en se promenant au grand air. - Frissons partiels, principalement au dos, à la poitrine, aux bras; *froid aux mains, aux pieds et au nez. — Pendant les frissons, pâleur ou chaleur de la face, mal a la tête, et quelquefois chaleur passagère. — *Accès fréquents de chaleur fugace. - *Chaleur, principalement la nuit ou le soir. ou le matin, ainsi qu'après midi, et souvent arec rougeur (circon-



702

scrite) des jones, soif ardente, sensation brûlante aux mains et aux pieds, "frissons partiels, *sueurs partielles, principalement à la tête, au visage et aux mains: fatique et courbuture dans les membres, enrouement et toux, anxiété, etc. — *Accès fébriles, tant avant qu'après midi, ou le soir, consistant en chaleur qui est précédée de frissons et suivie ou mèlée de sueurs, ou bien en chaleur au risage, suivie de frissons. — *Pendant la fièrre, battement de cœur, délires, faiblesse, obturation et croûtes au nez, et forte soif, même avant les frissons. — *Pouls dur, accèléré et plein. — *Sueurs fréquentes et abondantes, le jour et la nuit le soir et le matin au lit; *sueur facile en travaillant; sueurs partielles, principalement à la tête, à la nuque, aux mains, etc.: *sueurs acides.

Moral. — *Mélancolie et tristesse. -avec idées chagrines, inquiétude sur son sort et sur ses affaires, au point de se trouver excessivement malheureux, de se dégoûter de la vie et de désespérer même de son salut éternel. — *Grande disposition à pleurer, et pleurs fréquents, alternant quelquefois avec rires involontaires. *Humeur inconsolable et scrupules de conscience, même pour les actions les plus innocentes. -- * Accès d'angoisse, principalement le soir; *caractère peureux et grande disposition à s'effrayer. - Précipitation, inquietude et impatience. - *Mauvaise humeur, morosité, humeur querelleuse, envie de critiquer. et répugnance pour la conversation. - oIrritabilité, humeur colère, disposition à se fâcher et à s'emporter. -- Grande paresse et-répugnance pour tout travail de corps et d'esprit. -- Indécision. maladresse, inadvertance, anthropophobie et état d'étourdissement. — Stupidité et imbécillité, avec difficulté de comprendre et de répondre juste. - *Grande faiblesse de mémoire, principalement pour les noms propres. . . On oublie jusqu'à ce qu'on allait dire. - Grande affluence d'idées, pour la plupart tristes et pénibles; mais quelquefois aussi gaies et mélees d'airs de musique. - *Grande disposition à des réveries religieuses. et philosophiques, *avec idées fixes. — Divagations. — Manie. avec idée fixe d'avoir toutes choses en abondance, de posséder de beaux effets, etc. -- *Delires avec carphologie. - Erreurs sur les objets: on prend un chapeau pour un bonnet, un chiffou pour une belle robe, etc.


Tôte. — *Embarras de la tête acce méditation d'flicile, ou faiblesse et *étourdissement et stupeur, quelquefois avec besoin de se coucher, et principalement le matin, ou le soir, ou en se promenant au grand air, ou en montant. — *Vertiges et chancellment, principalement en étant assis, ou après le repas, ou en se promenant au grand air, en se baissant, en marchant, en montant, en se levant de son siège, en étant couché sur le dos, en passant au-dessus d'une eau courante, ainsi que le matin, le soir ou la nuit, et souvent arec nausées, évanouissement, faiblesse et



704

saignement du nez. - Mal à la tête comme par des flatuosités incarcérées, par enchifrenement, ou comme par suite de dé-bauches. — *Sensibilité douloureuse de la tête, et principalement du vertex, au moindre mouvement, avec douleur à chaque pas, en toussant, en se mouchant et en mâchant. - *Plénitude, pression et pesanteur à la tête, principalement au front ou à l'occiput. -Tension et contraction douloureuse dans le cerveau, quelquefois avec sensation comme si la tête était serrée par un bandeau. — *Pression expansive, comme si la tête allait éclater, principalement aux tempes. — Douleurs vives et tressaillantes, ou *tiraillements et élancements dans la tête. — Sensation douloureuse, comme si le cerveau était blessé ou meurtri. - En remuant la tête, le cerveau frappe contre le crâne. — *Congestion de sang à la tête, avec douleurs pulsatives, gloussantes et sensation de chaleur au cerveau. — *Fourmillement, bourdonnement, bruissement et résonnement dans la tête. - *Les maux de tête ne sont souvent que semi-latéraux, ou ils occupent le vertex, ou l'occiput, ou le front au-dessus des yeux, avec besoin de froncer les sourcils, ou de fermer les yeux, trouble de la vue, *inaptitude à lu méditation, bourdonnement des oreilles, et nausées avec envie de vomir. — *Maux de tête quotidiens, périodiques et intermittents, apparaissant principalement la nuit, ou le soir au lit, ou le matin, ou après le repas. — *Le mouvement, la marche. le grand air et la méditation provoquent ou aggravent souvent les maux de tête. - Prurit et boutons à la tête, principalement au front. OCroûtes au cuir cherelu, sèches, ou épaisses, jaunûtres. avec sécrétion d'un pus épais et fétide, mais toujours avec fort prurit. -- *Froid à la tête, quelquefois seulement à des parties circonscrites. — Sensibilité douloureuse de la racine des chereux et du cuir chevelu, au toucher. - Mobilité du cuir chevelu. -*Chute des chereux. — Tête penchée, en marchant. — Prurit à la tête, avec impatience.

Yeux. — Pesanteur *et pression dans les yeux et les paupières. avec sensation d'un frottement comme par du sable. — Prurit. *démangeaison et sensation brûlante dans les yeux. les angles et les paupières. — Douleurs de meurtrissure ou de plaie, et cuisson dans les yeux et les paupières. — *Les douleurs aux yeux répondent souvent jusque dans la tête, et s'aggravent par le mouvement des yeux, ainsi que par la lumière du soleil, qui les augmente quelquefois jusqu'à les rendre insupportables. — *Inflammation, rougeur et gonflement de la sclérotique, de la conjonctive et des paupières. — *Ulcération du bord des paupières. — Pustules et ulcères autour des orbites, jusqu'aux joues. — Rougeur inflammatoire de l'iris. — *('ornée trouble, comme couverte de poussière. oou obscurcie, avec dépôt d'une lymphe gristre entre les lamelles. — o'Taches, *vésicules et oulcères à la cornée. — Injection des vaisseaux de la conjonctive. — Pupille inégale.



SÜLFUR.

705

ou dilatée et immobile. — Obscurcissement du cristallin. — Nodosité à la paupière, comme un orgelet. —*Larmoiement abondant, surtout au grand air; ou grande sécheresse des yeux principalement dans l'appartement. — Larmes huileuses. —*Sécrétion abondante de mucosités aux yeux, le jour et la nuit. — Agglutination nocturne des paupières. — Palpitation et fremissement des paupières. — *Contraction matutinale des paupières. — Tremblement des veux. — *Trouble de la vue, comme par un brouillard, du duvet ou un voile devant les yeux. — *Presbyopie. — Myopie. — Obscurcissement de la vue en lisant. — Éblouissement des yeux, par la lumière du jour. — Scintillement et taches blanches, ou mouches volantes, points et taches noirs devant les yeux. — Couleur jaune des objets. — *Grande sensibilité des yeux à la lumière, principalement du soleil, et pendant un temps chaud et étouffant. — *Couleur jaunâtre de la sclérotique.

Oreilles. — Prurit aux oreilles. — *Douleurs vives ou tractives, ou élancements dans les oreilles, quelquefois jusque dans la tête ou dans la gorge. — Chaleur brûlante, qui sort par les oreilles. — Gargouillement dans les oreilles, comme s'il y avait de l'eau dedans. — •Écoulement de pus par les oreilles. — Furoncle au tragus. — Sensibilité excessive de l'ouïe; le moindre bruit est insupportable, et en touchant le piano, on éprouve même des nausées. — *Dureté de l'ouïe, principalement pour la roix humaine. — *Obturation et sensation d'occlusions des oreilles, d'un seul côté, et souvent en mangeant et en se mouchant. — Tintement, *bourdonnement et bruissement dans les oreilles. quelquefois avec congestion de sang à la tête. — Craquement dans l'oreille, comme si une vessie pleine d'eau éclatait. — •Écorchure derrière les oreilles.

Nez. — Térébration à la racine du nez. — Brûlement dans les narines. — *Gonflement inflammatoire du nez, principalement au bout, —ou aux ailes. — Inflammation, ulcération et croûtes aux narines. — Craquement dans le nez, comme si une vessie pleine d'air éclatait. — Ephélides et pores noirs sur le nez. — *Obturation du nez, quelquefois d'un seul côté. — *Grande sécheresse du nez. — *Coryza sec, ou *coryza fluent, acec sécrétion abondante de mucosités. — Écoulement de mucosités brûlantes, ou *sécrétion d'un mucus épais, jaunatre et pruriforme, par les narines. — *Mouchement de sang ou de mucosités sanguinolentes. — *Saignement de nez, principalement le matin, et quelque ois avec vertiges. — Éternument fréquent, même spasmodique, et précédé quelquefois de nausées. — Odorat exalté ou diminué, et même entièrement perdu. — Odeur d'un vieux coryza, de corne brûlée ou de fumée, dans le nez.

Visago. -- *Face pâle ou jaunâtre, avec teint muludif, -et yeux enfoncés, cernés de bleu. -- *Chaleur et sensation brûlante av




706

visage, avec rougeur foncée de toute la face, ou rougeur circonscrite des joues, ou bien taches rouges, même au cou. - *Enflure pale ou rouge du visage. - Gonflement des joues, avec douleur lancinante. - Tiraillement, douleur vive, sensation de meurtrissure, pression et sensation brûlante aux pommettes. Erysipèle flegmoneux à la face, principalement aux paupières, au nez et à l'oreille (gauche). - Rudesse et rougeur de la peau du visage. - *Eruptions boutonneuses au visage et au front. oDartre pruriante et humide sur tout le visage, principalement au-dessus du nez, autour des yeux et aux paupières; petites vési-cules blanches en groupes, et formant des croûtes. — *Éphélides et pores noirs au visage, principalement au nez, aux lèvres et au menton. - Lèvres sèches, rudes et gercées. - Sensation brûlante et chaleur continuelle des lècres. - Taches hépatiques à la lèvre supérieure. - Tremblement et tressaillement des lèvres. -*Gonflement des lèvres. - Ulcères croûteux sur la partie rouge de la lèvre. - Éruption dartreuse au coin de la bouche. Eruption douloureuse autour du menton. - Douleurs vives, lancinantes et tractives, et *gonflement douloureux aux machoires. Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur au toucher et élancements

Dents. — Grande sensibilité des dents. — Tressaillement, secousses, *douleurs vives ou tractives, -élancements, *douleurs pulsatives, térébration et sensation brûlante, tant dans les dents cariées -que dans celles qui sont saines. — *Les maux de dents s'étendent souvent jusqu'aux oreilles ou jusque dans la tête, et sont quelquefois accompagnés de congestion de sang à la tête avec frissons et envie de dormir, ou de gonflement de la joue. — *Apparition ou aggravation des maux de dents, principalement le soir, -la nuit, ou au grand air, ainsi que par un courant d'air, par Veau froide, en mangeant ou en mâchant, *et quelquefois aussi en prenant quelque chose de chaud. — Mucosités brunâtres aux dents. — *Vacillement douloureux, allongement, agacement et saignement facile des dents. — Saignement, *sensation de décollement et gonflement des gencives, quelquefois avec douleurs pulsatives. — "Tumeur dure, arrondie, aux gencives, avec éconlement de pus et de sang.

Bouche. — Sécheresse, chaleur et sensation brûlante dans la bouche, quelquefois le matin avec langue humide. — Accumulation de salive dans la bouche; salive sanguinolente, ou salée, ou acide, ou amère. — Odeur fétide, quelquefois acide, de la bouche, principalement le matin, ou le soir, ou après le repas. — Vésicules, ampoules et *aphthes dans la bouche et sur la langue, quelquefois avec brûlement ou avec douleur d'excoriation en mangeant. — Exfoliation de la peau dans la bouche. — Sensation brûlante et démangeaison sur la langue. — *Langue sèche, rude et gercée, *couleur rouge de cinabre; ou chargée d'un enduit blanc, ou



707


converte de mucosités brunâtres, épaisses et visqueuses. — Bredouillement en parlant. — Accumulation de mucosités d'un goût salé, dans la bouche.

Gerge. — Grattement, apreté et sécheresse dans la gorge. — *Pression comme par un tampon on par une tumeur dans la gorge. quelquesois avec difficulté d'avaler. — Sensation dans la gorge, comme si une boule y remontait. — *Contraction et sensation douloureuse de rétrécissement de la gorge, en avalant. — Douleur d'excoriation, sensation brûlante et élancements dans lu gorge, principalement en avalant à vide, comme si l'on avait un cheveu dans la gorge, avec goût empyreumatique. — Mal à la

gurge, avec gonfiement des glandes du cou.

Appétit. — * Mauvais goût de la bouche, le plus souvent acide, amer ou putride et douceatre, ou fade, principalement le matin, en s'e-veillant. — *Goût amer ou trop salé, ou insipidité des aliments. — *Absence complète d'appétit, et dégoût des aliments, principalement de la viande, du pain de seigle, de la graisse et du lait. --*Répugnance pour les choses sucrées ou acides, ou grand désir de res choses, avec manque d'appétit. — *Soif continuelle, même la nuit, souvent avec désir de bière. — "Désir (chez les ivrognes) de boire du vin. - *Appétit excessif et accès de boulimie, quelquefois avec mal à la tête, lassitude et besoin de se coucher. — Grande faiblesse de la digestion, principalement pour la viande, la graisse. le lait, les acides et les farineux, aliments qui quelquesois sont beaucoup souffrir. — Les aliments sucrés aggravent les douleurde l'estomac et du ventre. — Le lait produit des renvois aigres, un goût acide dans la bouche et même des vomissements. - La bière a un arrière-goût très-prolongé et fait bouillonner le sang. - *Après le repas, oppression de poitrine, nausées, pression et crampes dans l'estomac, coliques, ballonnement du ventre et flatuosités, romissement, grande fatigue, frissonnement, embarras et mal à la tête, chaleur du visage, sensation brûlante dans les mains, écoulement d'eau par la bouche et beaucoup d'autres **~ouffrances**.


Estomac. — *Rapports continuels. principalement à cide, ou avec goût des aliments, *ou acides et brûlants, ou amers, ou fetides, avec goût d'œufs pourris, *principalement après le repas, ou la nuit. — *Renvois avortés. — *Régurgitation des aliments et des boissons, souvent avec goût acide. — *Pyrosis, "souvent avec brûlement et fourmillement dans la poitrine. — o'Hoquet. — 'Nausées, "quelquefois jusqu'à la défaillance, avec tremblement, faiblesse et rapports fréquents, principalement *après le repas. "le matin, la nuit, ou cen allant en voiture. — *Econlement d'eau par la bouche, comme des pituites, principalement le matin ou après le rep 18, "quelquefois avec pression et fouillement dans le ventre. — *Vomiturition et romissements, tant des aliments que de matières acides ou amères, "ou noirâtres.



*ou sanguinolentes, etc., principalement le matin, le soir, *après le repas, ou la nuit, et quelquesois avec nausées, douleurs à l'estomac et sueur froide au visage. — Pesanteur et plénitude, ou pression et compression, ou bien douleurs contractives et crampoides, ou fouillement et élancements dans l'estomac et la région précordiale, *principalement après le repas, la nuit, ou le matin, *souvent avec nausées et vomissement, anxiété et ballonnement du ventre. — Sensation de froid, ou chaleur et sensation brûlante dans l'estomac. — Grande sensibilité de la région de l'estomac, au toucher. — Gonsiement de la région precordiale. — Pulsation dans le creux de l'estomac. — Gonsiement du creux de l'estomac.

Ventre. — Sensibilité douloureuse des hypocondres, comme s'il y avait une plaie intérieure. -- Tiraillement, *pression, tension et élancements dans la région du foie et de la rate, *gonflement et dureté de la région du foie vet de celle de la rate. - Plénitude, *pesanteur, tension et pression comme par une pierre dans le ventre, et principalement à l'épigastre et aux hypocondres.-Grosseur et dureté du ventre. - Tranchées, ou *sensation de déchirement, ou douleurs contractices et crampoides dans le centre. — *Élancements dans le centre, principalement du côté gauche, en marchant ou en respirant profondement. "Les maux de ventre affectent en genéral le côté gauche de preférence, où ils s'étendent jusqu'à l'estomac et jusqu'à la poitrine et le dos, avec gêne de la respiration, nausées, anxiété et humeur hypocondriaque. - *Maux de rentre, principalement la nuit. ou après avoir bu ou mangé, ou bien périodiques, aggravation par des aliments sucrés; "soulagement en se tenant courbé. -Mouvement et fouillement dans le ventre, ou sensation comme si quelque chose poussait en dehors. -- Douleurs de contusion et de meurtrissure dans les téguments du ventre. -- *Sensibilité douloureuse du ventre au toucher, comme si en dedans tout était à vif ou en une large plaie. — *Ballonnement du ventre avec douleurs pressires par des flatuosités incarcérées, principalement du côté gauche. - *Borborygmes et grondement dans le ventre. -- Sortie fréquente de vents d'une odeur trèsfétide. - *Gonflement douloureux et même suppuration des glandes inguinales. - *Sortie violente des hernies, "avec incarcération.

Selles. — Constipation et selles dures. – noueuses et insuffisantes. — *Envie fréquente et souvent inutile, d'aller à la selle, principalement la nuit, et quelquefois avec pression sur le rectum et la vessie, et douleur à l'anus. — Envie urgente d'aller à la selle. — *Diarrhées avec évacuations fréquentes, principalement la muit, souvent avec colique, ténesme, -ballonnement du ventre, dyspuée, frissonnement et faiblesse au point de s'évanouir. — *Évacuations muqueuses ou aqueuses, ou écumeuses, ou acides.



709

-on d'odeur putride, ou de matières non digérées. - *Selles blunchâtres, terdâtres, décolorées, ou d'un rouge brunatre. - Selles incolontaires. — *Selles avec mucosités, sang. oet matières puru-Jentes. — Sortie de mucosités, même avec des selles dures. --Sortie de lombrics, d'ascarides, et même de morceaux de ténia, du rectum.-*Chute du rectum, principalement pendant des selles. - Douleurs vives et pressives, prurit, élancement et brûlement i Panus et dans le rectum, même hors le temps des selles.—*He-morrholdes qui sortent, *suintent et saignent. — Écorchure et

gonfiement de l'anus.
Urines. — OUrines supprimées ou très-rares. — *Envie d'uriner fréquente et quelquesois très-argente. - Urines fréquentes. abondantes et aqueuses, partant quelquefois avec beaucoup de force, même la nuit. - Emission involontaire des urines, principalement en toussant ou en expulsant des vents. - *Pissement au lit.--•Urines rouges avec sediment. -ou bien blanchâtres, ou troubles, ou foncées. - Pellicule huileuse sur les urines. - Urines fetides. - Sédiment farineux, blanchâtre, ou épais, ou rougeatre. dans les urines. — • Éracuation douloureuse de quelques gouttes d'urine sanguinolente avec beaucoup d'efforts. - *Sortie de sang et de mucosités avec les urines.-- Prurit, douleurs vives, *élance ments et sensation brûlante dans l'urethre, principalement en urinant. - Rougeur et inflammation de l'orifice de l'urethre, et douleur comme au début d'une gonorrhée. - - *Écoulement de mucosités par l'urethre. - - Elancements dans la vessie. - Jet d'urine mince et intermittent. -- Douleurs crampoïdes aux reins et jusque dans les aines. - *Gonorrhée incétérée. u rec odeur comme du fromage fort.

Parties viriles. - Sucurs fétides aux parties. - Ecorcharentre les cuisses et aux aines, principalement en marchant. Élancements dans la verge et le gland. Prépuce roide dur comme du cuir, avec sécrétion abondante d'un smegma fétide. Inflammation, gonflement et phimosis du prépuce, avec crevasses profondes, brûlement et rougeur. - Uleere profond au gland et au prépuce avec bords élevés. Pression, tension et élancements dans les testicules et les cordons spermatiques. Gonflement et épaississement de l'épididyme. - "«Excoriation et suintement du scrotum. - Exaltation de l'appétit venérien. et irritation voluptueuse des parties, souvent sans érection. *Faiblesse des fonctions génitales, "souvent avec froid glacial. couleur bleuâtre du gland, du prépuce et de la verge, et retration du prépuce. -- *Impuissance. -- Testicules relachés et descendus. - Pollutions frequentes, même pendant la méridienne. Sperme aqueux. - *Sortie de liqueur prostatique, principalement en urinant et pendant les selles. - «Induration du testicule).

Rigies. -- *Pression sur les parties. - "Excoriation. prurit et


JAMR. - 8º édit., 100 part., t. 11.



sensation brûlante aux parties. — Inflammation des levres. —
*Règles trop hâtives — et trop abondantes ou *trop faibles, ou entièrement suppriviées, avec coliques, spasmes abdominaux, mal à la tête, maux de reins, pression à l'estomac, congestion à la tête et hémorrhagie nasale, agitation et même accès d'épilepsie. — *Avant les règles, mal à la tête, prurit aux parties. — coliques spasmodiques, inquiétude, toux, mal aux dents, pyrosis épistaxis, flueurs blanches et souffrances asthmatiques. — Après les règles, prurit au nez. — *Sang des règles trop pâle ou d'une odeur acide. — *Flueurs blanches, quelquefois corrosives, ¬rongeantes et jaunâtres, précédées de coliques. — *Excoriation et prurit aux mamelons. — Gerçures aux mamelons, avec sensation brûlante, saignement facile et ulcération. — o'Glandes mammaires engorgées et enflammées. — Inflammation érysipélateuse au sein.

Larynx. - Catarrhe, avec coryza fluent, toux, douleur dans la poitrine, comme si elle était à vif, et frissonnement. - *Enrouement, apreté et grattement dans la gorge, avec accumulation de mucosités dans la poitrine. - Douleur d'excoriation et *fourmillement ou chatouillement au larynx, avec besoin de tousser. -*Voix rauque et sourde, ou entièrement éteinte, principalement par un temps froid et humide. - *Sensation comme si le larynx était gonflé ou qu'il y eût quelque corps étranger. - *Toux sèche, quelquefois fatigante et ébranlante, avec vomiturition, vomisse-ment et constriction crampoide de la poitrine, généralement le soir, ou la nuit, dans la position couchée, ou le matin, ou après le repas. - *Toux humide, avec expectoration abondante de mucosités épaisses, blanchâtres ou jaunatres, comme celles d'un vieux coryza. — Crachats fétides, d'un jaune verdatre ou comme du pus, et d'un goût salé et douceâtre en toussant. ·Toux fébrile, avec *crachement de sang. — *En toussant, douleur d'excoriation ou élancements dans la poitrine, douleurs de meurtrissure ou élancements dans la tête, mal au ventre, obscurité devant les yeux, douleurs dans les hanches et aux reins. -

La respiration et la conversation provoquent quelquesois la toux. Poitrine. — *Haleine courte, -étoussements fréquents, *géne de la respiration, dyspnée et accès de sussion, principalement la nuit en étant couché et même pendant le sommeil, ainsi que, quelquesois, en parlant ou en se promenant au grand air. — Impossibilité de respirer prosondément, avec sensation comme si la poitrine était contractée. — Respiration fréquente, courte ou sibilante. — °Ronslement et râle muqueux dans la poitrine. — En respirant, élancements dans le dos et le sacrum. — °Sensation douloureuse dans la poitrine, comme si quelque chose tombait contre les parois antérieures en se retournant dans le lit. — °Gène douloureuse dans le côté gauche de la poitrine, avec angoisse et impossibilité de se coucher sur le côté affecté. — *Pesanteur, plénitude, et pression comme par une pierre, dans la poitrine



SULFUR-


711

et le sternum, principalement le matin. cainsi qu'en toussant, en éternuant et en baillant. — Douleur en toussant et en éternuant, comme si la poitrine allait éclater. — *Spasmes périodiques de la poitrine, avec sensation de constriction, douleurs crampoïdes, •haleine courte, couleur bleuâtre du visage et impossibilité de parler. — Pulsations dans la poitrine et le sternum. — *Faiblesse de la poitrine, sensible surtout en parlant, cavec grande fatigue des poumons après avoir parlé ou chanté. --- *Élancements dans la poitrine ou le sternum, ou jusque dans le dos, ou dans le côté gauche, principalement en toussant, en respirant profondément et en levant les bras. -- *Il semble que les douleurs de la poitrine affectent le côté gauche de préférence. - Sensation de froid, ou *brûlement dans la poitrine, quelquefois jusqu'au visage. — Élancements et coups dans la région du cœut. — Forte congestion de sang vers la poitrine et le cœur, quelquefois avec bouillonnement dans la poitrine, malaise. défaillance, tremblement des bras. - Sensation de vide, dans la région du cœur, ou pression et sensation comme si le cœur n'avait pas assez de place. - *Battement de cœur fréquent, quelquefois même risible, et avec anxiété, principalement en montant.

Tranc.—Douleur de meurtrissure au thorax, au toucher.—*Faiblesse et douleurs de luxation ou de meurtrissure aux reins et dans le dos, principalement en marchant et en se levant de son sége.—*Douleur dans le dos après un travail manuel. — Elancements aux reins, dans le dos et les omoplates, quelquefois avec gêne de la respiration.—*Douleurs vives et rhumatismales, tiraillement, tension et roideur dans les reins, le dos et la nuque. — Pincement et sensation brûlante entre les omoplates.— *Oistorsion de la colônne vertébrale.— Dartre à la nuque. Gonflement et inflammation des glandes de la nuque et de celles du cou. — Sueur fétide des aisselles. — Gonflement et suppura-

tion des glandes axillaires.

Bras. — Pression sur les épaules, comme par un poids. — *Tressaillement des épaules, des mains et des doigts. — *Treaillement, douleurs rives et élancements dans les articulations et les muscles des bras, des mains et des doigts, ainsi que dans les épaules, et principalement la nuit, au lit. — Crampes nocturnes aux bras. — *Fourmillement aux bras et aux doigts. — *Gonflement des bras, oquelquefois avec chaleur, dureté et douleur-lancinantes ou tensives. — Exostose au bras. — Verrues au bras. *ou miliaire pruriante, "ou taches rouges, brûlantes, apparaissant après les lotions. — Vésicules purulentes dans le pli du coude. — *Faiblesse paralytique des bras et des mains. — Craquement au coude. — *Gonflement des mains et des doigts. — *Tremblement des mains, principalement en *occupant de travaux fins.—Contraction involontaire des mains.



712

doigts. — Sueur aux mains, et entre les doigts. — Éruption de petits boutons rouges aux mains et aux doigts, avec prurit. «Verrues aux doigts. — Desquamation, sécheresse et gerçure de la peau des mains. — Cramp = et tressaillement dans les doigts. — Raccourcissement des tendons des mains et des doigts. —

*Gonflement volumineux et luisant des doigts. — *Doigts morts.

Nodosités aux doigts. — Envies aux ongles. — Engelures aux doigts, avec prurit à la chaleur. — Gonflement et inflammation du bout des doigts, avec ulcération sous-cutanée et douleurs noc-


turnes térébrantes et pulsatives.

Jambes. — Douleur d'ulcération sous-cutanée aux fesses et aux tubérosités sciatiques, principalement au toucher et en restant longtemps assis. — Tumeurs purulentes et douloureuses aux fesses. — Douleur de luxation et de meurtrissure à la hanche, au moindre mouvement, arec élancements à chaque pas. — Mal à la hanche, avec raccourcissement de la jambe. — Douleurs vires et tractives aux jambes, principalement la nuit, au lit. — *Pesanteur des jambes, quelquefois, avec tension dans les cuisses et les genoux, principalement la nuit. — Taches rouges, suintantes et douloureuses à la face interne des cuisses. — *Tension dans les jarrets, comme par raccourcissement des tendons. — Gonflement volumineux et luisant du genou, avec roideur et courbure. *Craquement, tiraillement, douleurs vives et élancements dans les genoux.— Dartres aux jarrets.—*Agitation dans

les jambes et les pieds.—Torpeur et engourdissement des jambes.
Fatigue douloureuse et *faiblesse paralytique des jambes.
principalement des genoux, qui fléchissent fréquemment.—
*Taches rouges et miliaire pruriante aux jambes.— Gonflement transparent des jambes.— Erysipèle à la jambe et au pied.—
*Taches bleuâtres et veines gonflées ou variqueuses aux jambes.

Douleur aux mollets en marchant. — Crampes aux mollets et is la plante des pieds, principalement la nuit. — Sensibilité douloureuse de la plante des pieds en marchant. — Luxation facile du pied en marchant. — Roideur et douleur de luxation au cou-de-pied. — *Fourmillement dans les jambes et les mollets.

ollicères brûlants et invétérés aux jambes ou aux pieds.—
Dartre à la malléole.— *Élancements dans les pieds.— *Froid aux pieds. principalement le soir au lit, ou sensation brûlante, principalement à la plante des pieds.— *Sucur des pieds, qui sont froids.— Gonflement des pieds, surtout aux malléoles.— *Engelures aux pieds et aux orteils.— Vésicules rongeantes à la plante des pieds.— Ulcère au cou-de-pied.— Crampes et contraction des orteils.— *Fourmillement au bout des orteils.— *Gonflement rolumineux et luisant des orteils.— Vésicules ulcérées et rongeantes aux orteils.— Cors avec douleurs pressives ou lancinantes.



SULFURIS ACIDUM.

713

SULFURIS ACIDUM.

SULF-AC. — Acide sulfurique. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy Pharmac. homospp., p. 146. — Dones usites: 5, 20, 30. — Durée d'uc tion: 4 à 5 semaines, dans des affections chroniques.
ANTIDOTE: Puls.

COMPARER AVEC: Ammon. arw. con. dig. mur-ac. nitr-ac. phos-ac. puls.
rut. sulf. — C'est surtout après arw., que sulf-ac. est efficace. lorsqu'il
est d'ailleurs indiqué. — Après l'acide sulfurique, convient quelquefois:
Puls.

CLIFIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Écorchures; Suites fâcheuses de lésions mécaniques, blessures, contusions, etc.; Fièvres typhoides; Ophthalmies chroniques: Aphthes des enfants; Hémoptysie, etc., etc.

Voy. la note, page 15.

symptomes generally. — Déchirement dans tout le corps, et même à la face. — Crampes dans les membres. — Douleurs sensibles pendant le sommeil. — Douleurs qui augmentent, puis disparaissent subitement, généralement comme par une pression sourde. — Souffrances ictériques. — Soubresauts des tendons. — Apparition ou exacerbation des symptômes, le maitin ou le soir. — On semble se trouver plus mal au grand air. - Le côté gauche semble être plus particulièrement affecté. Lassitude dans tout le corps, avec sensation de tremblement?

Peau. — Prurit sur tout le corps. — Taches rouges, pruriantes à la peau. *ou petites taches rouges, livides et bleuâtres, comme par ecchymose. — ** *Excoriation de la peau, même avec ulcération semblable à la gangrène. — Furoncles. — Rongement dans les ulcères. — Engelures. — Cors aux pieds, avec déchirements et élancements. — Verrues.

Sommeil. — Sommeil tardif et réveil de bonne heure. — Insomnie par surexcitation morale. — Tressaillements pendant le sommeil. — Rêves anxieux. — Tressaillement des doigts pendant le som-

meil.

Fièvre. — Prédominance de la sensation de chaleur. Pouls petit. faible. — Sueur au moindre mouvement. — Sueur matutinale, abondante.

Moral. — Abattement mélancolique. Besoin de pleurer. — Appréhensions anxieuses et méfiance. — Agitation, précipitation et impatience. — Humenr irritable, fatigue nerveuse, et disposition.



SULFURIS ACIDUM.

714

à s'effrayer. — Morosité chagrine et éloignement pour la conversation. — Dégoût de la vie. — Sérieux, alternant avec humeur par trop bouffonne. — Distraction excessive. — Esprit obtus.

Tête. — Tête entreprise d'un seul côté, comme si elle contenait de la fumée. — Vertige, en étant assis, se dissipant au grand air. — Maux de tête, qui augmentent d'abord, puis disparaissent subitement. — Sensation de faiblesse dans la tête. — Céphalalgie, comme si le cerveau était déchiré. — Maux de tête pressifs. — Sensation de pesanteur et de plénitude dans le cerveau, comme si la tête allait éclater. — Sensation de constriction dans la tête. — Secousses et coups dans la tête. — Maux de tête avec lancinations sourdes ou tractions et déchirements. — Sensation de vacillement du cerveau. — Sensation d'ulcération à l'extérieur de la tête. — Prurit et éruption au cuir chevelu. — Grisonnement et chute des cheveux.

Yeux. — Pression brûlante dans les yeux, au grand air, ou en fixant les yeux sur un objet, dans l'appartement. — Tension dans les paupières, le matin. — Cuisson, sensation brûlante dans les yeux, et larmoiement, surtout en lisant. — Yeux rouges, avec photophobie. — *Inflammations chroniques des yeux. — Diffi-

culté d'ouvrir les paupières. - Myopie.

Oreilles. — Déchirement dans les oreilles. — Dureté de l'ouie, comme s'il y avait un bandeau sur les oreilles. — Sonnerie devant les oreilles. — Bourdonnement d'oreilles, le soir.

Nez. — Epistaxis, le soir. — Coryza sec, avec perte de l'odorat. — Écoulement d'eau par le nez, avec obturation d'une narine.


Visage. — P\u00e4leur du visage. — Douleur de contusion dans les pommettes. — D\u00e9chirement dans les os de la face. — Sensation de gonflement du visage, et comme s'il \u00e9tait enduit de blanc d'\u00e4uf dess\u00e9ch\u00e9. — L\u00e4vres gerc\u00e9es et qui s'exfolient. — Douleur d'exceriation aux commissures des l\u00e4vres. — Inflammation et gonflement des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Odontalgie, plus violente le soir, au lit, aggravée par le froid, soulagée par la chaleur, généralement avec déchirement, creusement ou rongement. — Dents émoussées. — Gonflement et saignement facile des geneives. — Ulcères aux geneives.

Bouche et Gorge. - *Aphthes dans la bouche. - Sensation de sécheresse dans la bouche. - Langue sèche. - Salivation abondante. - Crachement de sang. - Mal de gorge, pendant la déglutition, avec douleur lancinante, surtout le soir. - Apreté

dans la gorge.

Appétit. — Goût putride. — Le pain a un goût amer, et pèse sur l'estomac. — Boulimie, avec grondement et borborygmes dans le ventre. — Appétence pour les fruits (les prunes). — Après le repas, agitation, tranchées et fouillement dans le ventre; ou fort ballonnement de l'estomac. — Immédiatement après des aliments.



SULFURIS ACIDUM.

715

chauds, sueur froide. — Lassitude et flatuosités, après avoir pris du lait. — Toutes les boissons refroidissent l'estomac, si l'on y

ajoute des spiritueux.

Batomac. — Renrois à vide ou amers. — Régurgitations acides. amères, ou salées, ou bien douceâtres. — Pyrosis. — Nausées dans l'estomac, avec frisson. — Vonissements d'eau d'abord, puis des aliments. — Sensibilité très-douloureuse de la région de l'estomac. — Plénitude et pression dans l'estomac. — Serrement dans l'estomac, le soir, comme par un refroidissement. — Contraction dans l'estomac et le scrobicule. — Tranchées autour de l'estomac. — Sensation de froid ou brûlement dans l'estomac.

Ventre. — Elancements à la rate. — Elancements dans la région hépatique. — Elancement dans les lombes. — Coliques abdominales comme les douleurs d'enfantement, jusque dans les hanches et les reins. — Mouvements, tranchées et pincements dans le rentre, quelquefois la nuit. — Sensation de chaleur dans la région ombilicale. — Tressaillement dans toute l'étendue du bas-ventre, surtout à la superficie. — Battement, déchirements et élancements dans les aines. — Cuisson dans la région de l'aine. — "Hernie inquinale très-saillante. — "Hernie incarcérées du côté gauche, surtout chez les individus d'un tempérament mélancolique et flegmatique. — Colique flatulente dans le bas-ventre, avec grondement et borborygmes, et sensation comme si une descente allait avoir lieu.

Selles. — Ténesme. — Selles retardées, dures, noueuses et noires. — Selles d'un moule très-volumineux. — *Relâchement chronique du rentre. — *Selles diarrhéiques de la consistance de la bouillie, ou verdâtres, aqueuses. — Diarrhée, seulement de mucosités écumeuses, avec sensation brûlante dans le rectum. — Évacuations de mucosités striées de sang. — Selles comme hachées (chez les enfants). — Selles d'odeur putride très-fétides. — Écoulement de sang pendant la selle. — Congestion sanguine au rectum. — Boutons hémorrhoïdaux de l'anus avec élancements. sensation brûlante, prurit et suintement.

Urines. — Diminution de la sécrétion des urines, avec sensation brûlante, en urinant. — Émission d'urine, la nuit. — Urine aqueuse, comme si elle contenait de la terre. — Sédiment muqueux, dans les urines. — Sédiment comme du sang dans les urines, qui sont recouvertes d'une pellicule fine. — Douleurs dans la vessie, quand le besoin d'uriner n'est pas immédiatement

satisfait.

Parties génitales. — Forte chaleur des parties génitales et des testicules. — Écoulement de sperme, sans sensation voluptueuse. — Forte disposition au coît, par irritation des parties génitales externes (chez la femme). — *Règles trop hâtives et trop abondantes. — •Règles de trop longue durée. — Métrorrhagie. — Avant les règles, cauchemar. — Pendant les règles, lancinations

dans le ventre et le vagin. — Stérilité, avec règles trop hâtives et trop abondantes. — Leucorrhée âcre ou brûlante, ou comme du lait. — Écoulement de mucosités sanguinolentes par le vagin.

Larynx. — Enrouement, avec sécheresse et *ápreté dans lu gorge et le larynx. — Douleur dans le larynx, avec parole embarrassée, comme si les parties étaient trop peu souples. — Toux provoquée par le grand air. — Toux sèche, courte, haletante, quelquefois le matin, après le lever. — Toux grasse, avec expectoration muqueuse. — *Toux arec crachement de sang. — Après la toux, renvois ou régurgitation des aliments.

Poitrine. — *Dyspnée. — Grande faiblesse de la poitrine, avec parole difficile. — Pression dans le côté gauche de la poitrine et dans le scrobicule. — Lancinations dans la poitrine. — Battement de cœur. — Lancinations à travers le cœur.

Tronc. — Sensation d'excoriation et de brisement dans le dos et les reins. — Traction dans le dos et les reins. — Furoncles au dos. — Roideur du dos, le matin. — Sensibilité douloureuse et gonfiement des glandes avillaires.


Bras. — Pesanteur des bras. — Contractions crampoides, paralytiques, dans les bras. — Élancements dans l'articulation de l'épaule, en levant le bras. — Douleur tensive dans l'articulation des coudes. — Taches bleuâtres sur les avant-bras, comme par ecchymose. — Crampes dans les mains. — Secousses et coupe dans les os de la main, en écrivant. — Éruptions sur les mains et entre les doigts. — Lancinations dans les articulations des doigts. — Engelures aux doigts.

Jambes. — Pesanteur des jambes. — Torpeur et engourdissement des jambes. — Besoin d'étendre et d'étirer les jambes. — Déchirement dans les varices des jambes. — Faiblesse douloureuse des genoux. avec lancinations sourdes, secousses et coups dans ces parties. — Taches rouges, pruriantes sur le tibia. — Roideur des malléoles. — Froid aux pieds. — Gonflement des pieds. — Déchirement et lancinations dans les cors aux pieds.

TABACUM.

TAB. Tabac. — HARTLAUB et TRINKS. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmic. homœop., p. 294. — Losis usitées: 30. — Direc d'action? ANTIDOTES: Camph. ipec. n-vom. — On l'emploie comme antidote de : Ciec. stram

COMPARER AVEC: Acon. ars. bell. cham. cin. cocc. con. hell, hyos. ipec. n-rom op. stram. veratr.



TABACUM.

dans tout le corps, et sueur anxieuse. — Crampes et fourmillement dans les membres. — Amaigrissement excessif. — Faiblesse paralytique et douloureuse des membres. — Tremblement des membres. — Grande lassitude générale. — Tressaillements dans tout le corps, avec pulsation et battement de cœur. — On se trouve mieux au grand air. — Conrulsions générales avec perte de connaissance.

Pean. — Prurit à la peau, comme par des piqures de puces. Eruption de boutons pruriants, ou de vésicules, avec sérosité jau-

nâtre et auréole rouge.

Sommeil. — Forte enrie de dormir, surtout après le repas et vers le soir, avec bâillements fréquents. — Sommeil tardif le soir, et difficulté de se réveiller, le matin. — Sommeil agité la nuit, avec frayeur. — Cauchemar, en dormant.

Pièvre.—Froid et frisson, quelquefois avec claquement de dents.

—Accès fréquent d'horripilation, quelquefois avec chaleur fugace.

— Horripilation permanente, depuis le matin jusqu'au soir.

Sueur nocturne.

Moral. — *Mélancolie sombre. — Angoisse et inquiétude, généralement après midi, soulagées par des pleurs. — Agitation qui pousse de côté et d'autre. — Éloignement pour le travail et la conversation. — Surexcitation et gaieté exaltée, avec chants, danse et grande loquacité. — Affluence d'idées confuses.

Têta. — Vacuité et embarras dans la tête. — Étourdissement. — Vertige, souvent au point de faire perdre connaissance, avec nausées et douleurs dans la tête et les yeux. — Céphalalgie avec nausées et vertiges. — Pesanteur excessive de la tête. — Maux de tête pressifs, surtout au-dessus des yeux, au vertex et dans les tempes. — Élancements dans la tête. — Congestion de sang à la tête, avec chaleur intérieure et battement dans les tempes. — Amélioration des maux de tête au grand air. — Sensation brûlante et fourmillement à l'extérieur de la tête. — Tremblement de la tête.

Youx.—Douleur dans les yeux, comme après avoir beaucoup pleuré.

— Pression dans les yeux, jusque dans le fond des orbites.

Sensation comme si on avait un cheveu dans l'œil. — Cuisson dans les yeux. — C'haleur et sensation brûlante dans les yeux. avec rougeur. — C'ontraction des paupières. — Perte de la vue en regardant fixement quelque chose de blanc. — Trouble de la rue, le soir, comme à tracers un coile. — Scintillement et points noirs devant les yeux. — Photophobie.

Oreilles et Mes.—Elancements dans les oreilles, surtout au grand air, et en entendant de la musique. — Chaleur brûlante et rougeur des oreilles. — Tumeur dure, rougeatre, derrière l'oreille. avec clancements. — Sensation brûlante et fourmillement dans le nes.—Diminution de l'odorat, qui cependant est très-sensible



TABACUM.

718

à l'odeur du vin. - Eternument fréquent. - Sécheresse et obturation du nez.

Visage. - *Páleur mortelle du visage (pendant les nausées). -Chaleur ardente de la face, avec rougeur, quelquefois d'une scule joue, et pâleur de l'autre. - Taches rouges à la face. - Déchirements dans les os du visage. - Tubérosités granulées sur les joues. — Amaigrissement du visage. — Lèvres sèches, brûlantes, apres et gercées. - Éruption aux commissures des lèvres. - Lancinations dans l'articulation de la machoire, en riant.

Dents. — Odontalgie, avec douleurs tractives et déchirantes. -Lancinations dans les dents cariées, en mâchant. — Douleur trac-

tive dans les gencives.


Bouche et Horge. — Sécheresse de la bouche et de la langue, avec forte soif. - Gonflement des glandes sous la langue. -Parole faible, entrecoupée. - Lecture trainante, monotone. -Apreté, sécheresse et grattement dans la gorge, comme par un corps étranger. - Accumulation de mucosités visqueuses dans la gorge.

Appetit. -- Goût fade et pâteux, ou amer et aigre. - Goût acide de tous les aliments. - Goût acidulé de l'eau, comme si elle contenait du vin. - Absence de soif et horreur de l'eau. - Absence de faim et d'appétit. - Faim continuelle, avec nausées, si on ne

la satisfait pas.

Estomac. — Renvois fréquents, à vide et bruyants. — Renvois aigres, brûlants. — Pyrosis. — Hoquet spasmodique. — Nausées fréquentes, surtout pendant le mouvement, souvent au point de s'évanouir, avec pâleur mortelle du visage, se dissipant généralement au grand air. - Nausées, avec envie de vomir, sensation de froid dans l'estomac, ou pincements dans le ventre. - Vomissement d'eau seulement, avec reflets jaunes et verdatres devant les yeux. - Vomissements de sérosités acides, souvent mélées de mucosités. — *Les vomissements sont renouvelés par le plus léger mouvement. - Choléra asiatique avec vomissement, diarrhée, accès de défaillance et convulsions générales. - Pression à l'estomae. - Crampes d'estomae, serrantes, contractives, quelquefois après le repas, accompagnées souvent de nausées et d'accumulation de salive dans la bouche. — Élancements dans le scrobicule, jusqu'au travers du dos.—Laxité et sensation de froid ou de brûlement dans l'estomac.

Ventre. — Douleur hépatique, en pressant sur la partie. — Pression dans la région hépatique, comme par un corps pesant. — Élancements dans la région hépatique. — Élancement dans l'hypocondre gauche. — Grande sensibilité du ventre au plus léger contact. - Ballonnement douloureux du ventre. Maux de ventre pressifs, surtout dans la région ombilicale, avecrétraction crampoïde de cette partie. — Déchirements nocturnes dans le ventre, - Pincements et borborggmes dans le rentre.



TABACUM. — TARAXACUM.

Selles. — Constipation. — Ténesme fréquent. — Selles molles de la consistance de la bouillie, même la nuit. — Diarrhées violentes, fétides, ou rert jaunâtre, même la nuit. accompagnées et suivies de ténesme violent et de sensation brûlante à l'anus. — • Selles cholériques, décolorées, avec vomissements de la même manière, défaillance dans les intervalles. — * Selles involontaires.

Urines. — Urines rouge jaunâtre et plus abondantes. — Inflammation de l'orifice de l'urèthre. — «Coliques néphrétiques, causées par la gravelle.

Parties génitales. -- Erections fréquentes. -- Écoulement de liqueur prostatique. -- Règles en retard et plus abondantes. --Leucorrhée comme de l'eau sanguinolente.

Laryax. — Toux sèche, procoquée par un chatouillement dans lu gorge, le matin et vers le soir. — Toux avec hoquet, au point de suffoquer.

Poitrine. -- Oppression de poitrine, avec angoisse. -- Constriction de poitrine. -- Pression sur la poitrine et le sternum. -- Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine, quelquefois en respirant. -- Douleur d'excoriation dans la poitrine pendant le repas. -- Battements de cœur, en étant couché du côté gauche. -- Boutons pruriants sur la poitrine.


Trono. — Douleurs contractives aux reins, surtout après la selle. — Amaigrissement du dos. — Éruption rouge, pruriante, au dos. Roideur du cou.

Bras. — Faiblesse douloureuse des mains et des bras, qui sont comme paralysés. — Besoin continuel de s'étirer les bras. — Élancements et tractions dans les épaules. — Taches rouges, brulantes au toucher, sur l'épaule. — Tension dans le bras, surtout dans le coude. — Douleur et élancements dans le bras, qui ne permettent ni de s'en servir, ni de l'étendre. — Tremblement des mains. — Sueur froide aux mains. — Crampes et fourmillement dans les doigts. — Gonflement des doigts. — Boutons pruriants aux doigts.

Jambes. — Douleur brûlante dans le genou et la plante des pieds. — Elancement dans le genou et le jarret. — Fléchissement des genoux, en marchant. — Crampe et fourmillement dans les yeux et jusque dans les orteils. — Tension dans la jambe, en marchant depuis le genou jusque dans le pied. — Tremblement et faiblesse paralytique des pieds.

TARAXACUM.

TAR. — Pissenlit, Dent-de-lion. — HANNEMANN. — Hist. nut. et prép. Voy. Pharmac. homoop., p. 258. — Doses usitees: 0, 30. — Iturée d'action: ANTIDOTE: Camph ?
COMPARED AVEC: Con. kal. n-vom. puls. spig. valer.



TARAXACUM.

clinique.—On a recommandé ce médicament contre les affrations gastriques et une sorte de Céphalalgie. Le médecin homopathe, en étudiant les symptômes suivants, verra dans quels cail pourra faire usage de ce médicament.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Sensibilité douloureuse de toules membres, surtout au toucher et dans une fausse position. —
Sensation de faiblesse et de malaise dans tout le corps, avec
besoin continuel d'être assis ou couché. — Presque tous les symptomes paraissent en étant assis et se dissipent par la marche.

Forte encie de dormir, le jour, avec baillements fréquents.

Sommeil avec affluence de rèves, la nuit, réveil fréquent et
jactation. — Frisson, avec maux de tête pressifs. — Chaleur
génerale, surtout à la face et aux mains, sans soif. — Sueur génerale la nuit, au commencement du sommeil. — Irrésolution et
répugnance pour le travail. — Loquacité et envie de rire.

Tôto. Vertige, avec étourdissement et chancellement, en marchant en plein air. - Mal de tête, comme par contraction on expansion du cerveau. - Pesanteur et pression dans la tête. Lancinations dans le front et les tempes. - Douleurs de tête violentes, sensibles seulement en se tenant debout et en marchant.

- Tension du cuir chevelu.

Youx et Oreilles. — Douleur dans les yeux, comme si un grain de sable s'était introduit dans l'angle interne. — Sensation brûlante et élancements brûlants dans les yeux. — Inflammation des yeux, avec larmoiement et photophobie. — Agglutination nocturne des paupières. — Élancements dans les oreilles. — Dureté de l'ouïe, le soir.

Visage et Dents. Boutons purulents à la face, aux joues, aux ailes du nez et aux commissures des lèvres. — Sensation de chaleur et rougeur de la face. — Elancements et pression dans les joues. Lèvre supérieure gercée. — Odontalgie, avec douleur tractive dans les dants cariées insone dans les sourcils — Comps pressifs.

dans les dents cariées, jusque dans les sourcils. — Coups pressifs dans les dents. — Il sort du sang acide par les dents cariées. Émoussement des dents.


Rouche et Gorge. — Accumulation de salive acidulée dans la bouche. Langue chargée d'un enduit blanc, arec exfoliation.

Langue seche, chargée d'un enduit brun, le matin, au réveil.

Mal de gorge, avec douleur pressive, comme par un gonflement intérieur. — Sécheresse, élancements et mucosités amères dans

la gorge. - Rendclement de mucosités acides.

Appétit. Goût amer dans la bouche, avec goût normal des aliments. Goût salé, ou acide, des aliments, principalement du beurre et de la viande. Le tabac à fumer est désagréable donne des pyrosis et coupe la respiration. — Forte disposition frileuse après avoir bu ou mangé.



TARAXACUM. — TARENTULA HISPANICA.

Estomac. — Renvois amers. — Renvois à vide, surtout après avoir bu. — Nausées comme après des aliments trop gras, avec anxiété et maux de tête pressifs, améliorées au grand air.

Ventre. — Pincements dans le ventre. — Elancements pressifs dans le ventre et les côtés du ventre, à gauche principalement. Grondements et mouvements dans le ventre, comme si des

vessies y éclataient.

Selles et Urines. — Selles, plusieurs fois par jour, et cependant ne s'évacuant qu'avec effort. — Selles de la consistance de la bouillie, suivie de ténèsmes. — Prurit voluptueux au périnée. — Envic fréquente d'uriner, avec émission abondante.

Parties génitales. -- Douleur dans les testicules. - Érections

permanentes. — Pollutions fréquentes

Peitrine. - Pression à la poitrine. - Élancements dans la poitrine et les côtés de la poitrine. - Tressaillement dans les niucles des côtes.

- Douleurs pressives aux reins. -- Élancements pressifs et tensifs dans le dos et les reins, en étant couché, avec étouffement de la respiration. — Gargouillement et gonflement dans les omoplates et les épaules, avec frisson général. -- Tiraillements pressifs, et élancements dans les muscles du cou et de la nuque.

Bras. — Battement pulsatif et tressaillement dans les épaules et le bras. — Tressaillement des muscles dans les bras. — Élancements dans les bras et les coudes. — Tractions et déchirements dans l'avant-bras et le poignet. — Éruption boutonneuse aux mains et aux doigts. - Froid glacial du bout des doigts.

Jambes. — Élancements dans les cuisses, les genoux, les mollets. la plante des pieds et les orteils. — Sensation brûlante dans les genoux, les jambes et les orteils. - Sueur abondante entre les


orteils.

TARENTULA HISPANICA.

TARENT. - Tarentule espagnole. - NUNEZ et PERRY, Etudes du remin de la Tarentule.

ANTIDOTES: 1) Phosph.—2, acon. bar-m. bovis. chel cupr. lyc. magn. mosch. natr. puls. rhus. spig. sulf. zinc.
Comparer avec: Bell. canth. lach. merc. puls. phos-ac. secal.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où ce médicament sera particulièrement efficace contre les affections suivantes : Affections à type intermittent : Hypocondrie; Hystérie; Chorée; Erotisme, chez l'homme et la femme; Diabete; Albuminurie; Rhumatisme goutteux; Nephrite



TARENTULA HISPANICA.

722

et cystite calculeuses et inflammatoires; Rhachitisme scrofuleux (et même syphilitique?); Tumeurs fibreuses de l'utérus et de ses annexes; Lésions organiques du cœur et des gros vaisseaux, par suite de rhumatismes; Paralysies rhumatismales et nerveuses.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Affections convulsives avec besoin de remuer continuellement; périodicité des accès, accompagnés d'épouvante, de terreur, crainte d'une mort prochaine, vertiges et anxiété précordiale. — Aggravation des souffrances par le repos et le lit, un temps sec et froid, par le bruit et la conversation, les causes morales déprimantes, et les changements de temps. — Les souffrances se produisent de préférence de midi à la nuit, et retournent périodiquement. — Nécessité de remuer continuellement tout le corps et de changer de position, à cause d'une inquiétude générale, avec oppression. — Attaques de nerfs; sensation d'un fourmillement général, avec douleur à l'occiput, suivi d'engourdissement du tronc et des membres jusqu'à la perte du mouvement; puis inquiétude générale, crainte de perdre la raison, envie de se mordre et de s'égratigner avec rage, soif, bàillements, horripilation et tremblement avec céphalalgie.

Peau. — Picotements et ardeur sur tout le corps. — Peau de couleur écarlate. — Éruption miliaire de petits boutons très-pruriants,


qui suppurent rarement.

Sommeil. — Propension irrésistible au sommeil. — Assoupissement, sommeil lourd et prolongé. — Sommeil léger, troublé par agitation nerveuse, inquiétude, et rêves de toutes sortes, mais surtout tristes.

Fièvre. — Ardeur brûlante par tout le corps, alternant avec un froid glacial qui fait trembler. — Alternatives de chaleur et de froid; au début du froid, douleur dans la région hépatique; puis, grande agitation et chaleur ardente; enfin, sueur copieuse avec grand besoin de dormir, sans pouvoir y arriver. — Augmentation de la chaleur à la surface du corps, avec rougeur de la peau. — Douleur de meurtrissure par tout le corps et à la tête, pendant une heure, avec soif extraordinaire; puis, sueur abondante d'une odeur très-aigre, avec amélioration de tous les symptômes. — Pendant la sueur, sommeil; pendant le froid, douleur pressive intense au cœur. — Fièvre quotidienne vespertine.

intense au cœur. — Fièvre quotidienne vespertine.

Moral et intellect. — Tristesse, affliction et mauvaise humeur. —
Délires où dominent les idées tristes, les menaces et les emportements; puis grand mal de tête suivi de signes de joie et de bonne humeur. — Bonne humeur extraordinaire. — La musique égaie et soulage, amène de la sueur et un brisement général. — La musique détermine du malaise, du dégoût et de l'agitation.





avec des contractions dans les doigts. -- La musique diminue les symptômes. -- Anxiété, partant du creux de l'estomac, avec tristesse et crainte d'un malhour. -- Faiblesse de mémoire. -- Peu

d'aptitude au travail intellectuel.

Tête. — Douleurs de tête de diverses natures, principalement gravitantes et lancinantes, se répétant aux mêmes heures de la journée et l'mitées ordinairement aux tempes, au front, à l'occiput.—
La douleur occipitale est profonde et accompagnée d'une forte chaleur brûlante s'étendant à toute la tête, avec soif ardente.—
Les douleurs de tête sont ordinairement précédées de beaucoup de chaleur et terminées par des sueurs. — Pendant les maux de tête, nombreux symptômes accessoires, surtout : inquiétude générale, grande tristesse, oppression, toux avec gêne de la respiration, nausées et vomissements, vertiges, prostration des forces et roideur des muscles de la tête et du cou.

Youx, Oreilles et Nes. — Élancements et douleurs par intervalles aux yeux, picotement et irritation aux paupières: larmoiements, vue trouble; illusions d'optique; taches lumineuses, étincelles et d'autres objets devant les yeux. —Douleurs d'oreilles; douleur à l'entrée du conduit auditif externe; douleur dans l'oreille interne et la trompe d'Eustache, s'étendant à toute la tête; bruits et sons éclatants dans les oreilles. — Excitation de la muqueuse nasale, avec odorat tantôt augmenté, tantôt diminué; épi-taxis.

Pace et Dents. — Nevralgies faciales du nerf maxillaire inférieur droit, avec symptômes gastriques, douleurs dans quelques articulations et se terminant par un sommoil prolongé. — Eruptions prolongées, souvent confluentes, de petites papules rouges, sur la face (et d'autres régions), avec beaucoup de chaleur, de picotement et als face, avec prurit qui s'aggrave la nuit. — Douleurs de dents, comme si on les arrachait.

Bouche, Gorge et Appétit. — Aphthes dans la bouche, mauvaise odeur de l'haleine. — Mal de gorge en avalant : gonflement des amygdales; élancements douloureux dans les amygdales, -- Manque d'appétit, avec soif intense ; grand appetit; boulimie : grand-

soif.

Estomac et Ventre. -- Douleurs vives à l'estomac, surtout après le repas et la nuit, avec vomissements, élancements au niveau de la rate, grande soif, douleurs dans les articulations et abattement moral. -- Douleur à la région du foie avec alternatives de chaleur et de froid, douleurs dans les hypecondres. -- Coliques plus ou moins vives; élancements dans diverses parties de l'abdomen et à l'anus; douleurs de ventre qui s'ét indent à la poitrine, où elles deviennent intenses, avec bruits produits par les gaz qui parcourent le ventre; borborygmes; sensibilité excessive de tout l'abdomen.

Selles et Urines. Evacuations alvines abondantes; diarrhess.



TARENTULA HISPANICA.

724

resserrement du ventre; selles difficiles avec ténesme et perte de sang. — Douleurs aux reins, à la vessie et dans l'urèthre, spasme de la vessie; difficulté d'uriner; l'urine sort goutte à goutte et est très-brûlante; urine épaisse et sédimenteuse; ardeur dans l'urèthre, pendant et après la miction; excrétion abondante d'urine.

Parties viriles. — Augmentation de l'appétit vénérien. — Testicules douleureux, engorgés. — Traction le long des cordons spermatiques. — Erections sans désir; érections qui cessent facilement. — Testicules flasques et douloureux au toucher. — Engorgement de la prostate. — Suites facheuses de pertes séminales.

Parties sexuelles de la femme. — Avance des règles qui deviennent plus abondantes, avec douleurs au sacrum. — Pendant les règles, grande agitation, avec spasmes érotiques. — Pertes utérines, avec douleurs dans les aînes. — Flueurs blanches, alternant avec un écoulement de sang. — Douleurs très-fortes, contusives, pressives et incisives dans la matrice, avec extension aux hanches et au sacrum. — Douleur brûlante dans le ventre et la matrice, avec sensation d'un grand poids qui gêne la marche et démangeaisons à la vulve. — Douleurs spasmodiques et insupportables dans la matrice, accompagnées de tremblement, au point de produire de véritables crises nerveuses, suivies de prostration complète. — Hystéricisme sous toutes formes. — Exaltation des désirs vénériens chez la femme.

Larynx et Toux. — Toux sèche par suite d'un chatouillement dans le larynx, avec grande fatigue et oppression. — Accès de toux avec ardeur générale et rougeur de tout le corps, se terminant par des sueurs, suivies de prostration des forces. — Toux, accompagnée de douleurs à la tête, à la poitrine et au bas-ventre, avec oppression et angoisse. — Toux sèche, fatigante, convulsive, avec nausées. — Expectoration difficile. — Aggravation de la toux

par là fumée du tabac et le coît.

Poitrine et Cœur. — Oppression de poitrine, gêne de la respiration, et anxiété, avec douleur comme si le cœur se retournait dans la poitrine, et sueur générale. — Oppression par le plus léger mouvement. — Oppression, avec prostration des forces. — Oppression, avec douleur au cœur, abattement moral et fatigue. — Douleur rhumatismales à la partie moyenne et antérieure de la poitrine. — Suffocation et besoin d'un air incessamment renouvelé. — Douleur au cœur comme si on le comprimait. — Palpitations de cœur, et anxiété précordiale. — Palpitations avec grande tristesse et oppression. — Battements du cœur tumultueux, et grande irrégularité de la circulation.

Tronc. — Tension et raideur des muscles du tronc; rétraction musculaire. — Douleurs à la région lombaire et le long de la colonne vertébrale. — Douleurs de reins, se répétant plusieurs jours de suite, pour la plupart compressives, contusives, parfois très-



TARENTULA. — TARTARUS EMETICUS.

725

aigues, et accompagnées de nombreux symptômes dans d'autres parties. — Convulsions et mouvements continuels du tronc, des bras et des jambes, avec impossibilité de conserver aucune partie en repos, et précédés d'oppression et de malaise général. - Rai-

deur de la nuque; rétraction musculaire.

Extrémités. — Douleurs vagues dans les os des bras et dans les poignets, avec enflure de ces derniers : douleurs dans les pouces ; éruptions pustuleuses et callosités douloureuses aux mains. Dans les membres inférieurs, inquiétude qui force à les agiter; Douleurs articulaires, comme chez les rhumatisants par les changements de temps; Pesanteur des jambes et difficulté de les mouvoir; Paralysie incomplète des membres inférieurs; Paralysie des membres inférieurs avec violente douleur de dos, que le moindre mouvement rend insupportable; Paralysie des jambes avec incontinence d'urine et selles involontaires.

TARTARUS EMETICUS.

TART. — Tartre émétique ou stiblé; Tartrate de potasse et d'antimoine. —
Archives de STAPF. — Hist. nat. et prep. Voy. Pharmac. homœop., p. 148.
— Doses usitees: 30. — Durée d'action: 3 à 5 semaines, dans quelques cas

de maladies chroniques.

ANTIDOTES: Cocc. ipec. puls. — On l'emploie comme antidote de : Sep.

COMPARER AVEC: Ant. asa. baryt cham. cocc. ign. ipec. nitr-ac. n-vom.

puls. sep. veratr. — C'est surtout après puls. on baryt., que le tartre
émétique est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après le tartre
émétique, conviennent quelquefois: Baryt. ipec. puls. sep.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : Fièvres rhumatismales; Varioloides; Affections gastriques et bilieuses; Asphyxie des nouveau-nés; Coqueluche; Croup, etc., etc. Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Déchirement et tractions arthritiques et rhumatismales dans les membres, avec sensation de brisement. — Contraction des membres. — Tressaillement des muscles. - Tressaillements convulsifs et crampes. - Attaques d'épilepsie. — Tremblement des membres. — Elancements dans les varices. — Exacerbation des symptômes en s'asseyant, ou bien en étant assis et en se levant de son siège. — Pesanteur générale de tous les membres et grande paresse. -- Pulsations violentes dans tout le corps. -- Grande débilité, faiblesse et lassitude excessive. - L'enfant veut constamment être porté. -



TARTARUS EMETICUS.

726 TARTAI

Accès d'évanouissement. — Sensibilité excessive de tout le corps. — Dès qu'on touche l'enfant, il pousse des cris perçants.

Peau. — Prurit à la peau. — Boutons pruriants et éruption miliaire. — Éruptions comme la gale. — *Éruption de pustules, semblables aux varioloïdes, avec auréole rouge, se recouvrant ensuite d'une croûte et laissant une cicatrice. — Prurit autour

d'anciens ulcères.

Sommeil. — *Forte envie de dormir, le jour, avec pandiculations et bâillements fréquents. — °Somnolence invincible avec sommeil profond et engourdissement. — Le matin, il semble qu'on n'a pas assez dormi. — Sommeil tardif et insomnie nocturne. — Sommeil léger avec affluence de rêves fantastiques. — Paroles fréquentes pendant le sommeil. — Cris pendant le sommeil, avec yeux fixes et tremblement des membres. — Secousses et coups pendant le sommeil, qui font tressaillir tantôt un seul membre, tantôt tout le corps. — On est couché sur le dos, en dormant, la main gauche passée sous la tête.

Frisson. — Prédominance de frisson et de froid. — Frisson avec pâleur excessive du visage, et tremblement de tout le corps. — Chaleur ardente de tout le corps, principalement dans la tête et le visage, augmentée par le moindre mouvement. — Pouls accéléré, faible ou plein. — Fièvre avec absence de soif et somnolence excessive. — Sueurs abondantes, fréquentes, et quelquefois froides. — Sueur des parties affectées. — Sueur nocturne,


abondante.

Moral. — Inquiétude et agitation, avec battement de cœur et tremblement. — Appréhensions anxieuses pour l'avenir (le soir). — Découragement et désespoir. — Manie du suicide. — Gaieté

douce, le jour seulement.

Tête. — Hébétude, confusion et embarras dans la tête, qui est comme engourdie, avec envie de dormir.—Accès de vertige, avec scintillement devant les yeux, et étourdissement en marchant.—Émoussement de tous les sens. — Maux de tête, avec battement de cœur et vertige. — Pesanteur de la tête, surtout dans l'occiput.—Douleur de tête semi-latérale. — Douleurs pressives dans la tête, avec tension compressive comme si le cerveau s'était contracté en masse dure, souvent avec étourdissement jusque dans la racine du nez, quelquefois le soir et la nuit. — Traction, déchirement et fouillement dans la tête, — Douleurs lancinantes dans la tête, quelquefois s'étendant jusque dans les yeux, avec besoin de les fermer. — Térébration dans le front. — Battement dans une moitié du front. — Tremblement chronique de la tête.

Yeux. — Yeux fatigués, et qui ont besoin de sommeil et d'être fermés fortement. — Douleur de meurtrissure dans le globe de l'œil, au toucher. — Pression sur les yeux. — Elancements, sensation brûlante et cuisson dans les angles internes des yeux, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux troubles, noyés. — Amaurose



TARTARUS EMETICUS.

commençante.—Vue trouble, avec scintillement decant les yeux, surtout en se levant de son siège.

727

Oreilles et nes. — Bourdonnement d'oreilles. — Violent coryzu fluent, avec éternument fréquent, narines ulcérées, frissons et

perte de l'odorat et du goût.

Pace et dents. — Visage pâle et hâce, ou rouge et bouffi, avec expression anxieuse. — Pression sourde, tractive, à la pommette. — Tressaillement convulsif des muscles de la face. — Lèvres arides et qui s'exfolient. — Lèvres gercées. — Odontalgie avec douleurs très-violentes, le matin.

Bouche. — Accumulation abondante de salive dans la bouche. — Langue humide, nette, ou chargée d'un enduit brun.

Aphonie.

Appetit. — Insipidité des aliments. — Goût salé dans la bouche. — *Goût amer dans la bouche. — Soif d'eau froide. — Appétit modéré, avec soif ardente. — Appétit prononcé, avec prompt dégoût dès qu'on a pris quelques aliments. — Boulimie, en se promenant au grand air. — Désir excessif d'acides, ou de fruits crus (des pommes). — Dégoût pour tous les aliments, surtout le lait. Chaque bouchée produit une sensation douloureuse, jusque dans l'estomac.

Estomac. — Renrois à ride. — Renvois sanglotants. — Renrois avec goût d'œufs pourris, la nuit. -- Régurgitations de sérosités acres, ou salées, ou bien acidulées. - Régurgitations du lait. après en avoir pris. - *Nausées, continuelles quelquefois, -avec enrie de romir, angoisse, pression dans le scrobicule et mal à la tête, soulagées en expulsant des flatuosités par le haut et le bas. - Vomiturition violente, avec écoulement abondant de salive. sueur au front et lassitude dans les jambes, ou bien *avec diarrhée et débilité excessive. - Vomissement abondant, avec efforts riolents, douleurs dans l'estomac et le ventre, tremblement du corps, besoin de se replier sur soi-même, frissons, et forte envie de dormir. -- Vomissement muqueux, avec diarrhée muqueuse. -- Vomissement aigre des aliments. -- *Vomissement de matières aigres et amères, surtout la nuit. - Sensibilité excessive de l'estomac; la plus petite bouchée cause une sensation douloureuse. - Mal à l'estomac, comme par surcharge. -- Malaise et vacuité dans l'estomac. - Pression dans l'estomac et le scrobicule, surtout après le repas. — Battements violents et palsations dans la région de l'estomac. — Élancements dans le cross de l'estomac. **Ventre.** — Douleurs abdominales, arec grande agitation morale et physique, et éloignement pour toute espèce de travail. --Malaise dans l'épigastre et l'hypogastre, qui oblige à se coucher et à s'étendre. - Plénitude et pression dans le ventre, comme

s'il contenait des pierres, surtout en se tenant courbé en étant assis.—Coliques crampoïdes, dans le ventre, avec contraction violente des paupières, et besoin invincible de dormir. — Doulour-



TARTARUS EMETICUS.

728

incisives dans le ventre, comme si les intestins étaient coupés. -Pulsations dans le ventre. - Production abondante de flatuosités. avec grondement, borborygmes et pincements dans le ventre.

Selles. - Constipation, alternant avec diarrhée. - Selles de la consistance de la bouillie. - Diarrhées muqueuses, ou jaunes, brun clair, ou bien aqueuses, précédées souvent de tranchées et de mouvements dans le ventre. - Selles sanguinolentes. - Evacuations involontaires. - Pendant la selle, battement de cœur. -Chatouillement excessivement brûlant, depuis le rectum jusque


dans le gland. — Lancinations dans le rectum. Urines, Règles. — Émission d'urine, très-abondante et pénible, avec tension dans le périnée, sensation brûlante dans l'urethre, et écoulement peu abondant, et sanguinolent vers la fin, avec douleurs violentes dans la vessie. - Besoin d'uriner, la nuit, avec soif ardente et émission peu abendante. - Émission involontaire des urines. — Urine rouge, enflammée, qui forme, en reposant, des filaments rouges de sang. — Urine brune foncée, âcre, trouble. - Pression et tension sur la vessie. - Elancements dans l'urèthre et la partie inférieure de la vessie. - Menstruction d'un sang aqueux. - Eruption boutonneuse aux parties

génitales.

Larynx. - Catarihe, avec irritation qui provoque la toux, accumulation abondante de mucosités, et râle muqueux dans la poitrine. - Enrouement. - Sensibilité douleureuse du larynx, au toucher. - Toux provoquée par un fort chatouillement dans la trachée-artère. — L'enfant tousse, lorsqu'il se fache. — Accès de toux, avec étouffement suffocant de la respiration (toux suffocante). — Toux, avec chaleur et moiteur des mains, et sueur à la tête, principalement au front. - Toux, avec vomissement des aliments, après le repas. — Toux creuse, avec râle muqueux dans la poitrine. — Toux avec expectoration de mucosités blanchâtres ou jaune-citron, quelquefois la nuit seulement.

principalement après minuit.

Poitrine. - *Étouffement de la respiration fréquemment, surtout le soir ou le matin, au lit, au point de suffoquer. - Haleine courte. - Respiration difficile. - Paralysic des poumons. -*Oppression de poitrine, anxieuse, avec sensation de chaleur qui remonte au cœur. — *Râle muqueux dans la poitrine, en respirant. - Douleur d'excoriation dans la poitrine, surtout au côté gauche, par accès. - Douleur rhumatismale dans le côté gauche de la poitrine. — Sensation brûlante dans la poitrine, qui remonte dans la gorge. - *Inflammation des poumons, avec symptômes bilieux et gastriques, signes d'hépatisation et expectoration jaunatre. - Battement de cœur, visible et anxieux, quelquefois pendant la selle. - Fouillement tournoyant et coups dans la région du cœur, la nuit, ne cédant que lorsque la sueur commence à s'établir. — Éruption miliaire sur la poitaine.



TARTARUS. - TEUCRIUM MARUM VERUM.

729

Trens. — Douleur au dos et aux reins, en étant assis, comme par fatigue. — Douleur rhumatismale dans le dos. — Faiblesse des muscles du cou, qui ne permet pas de tenir la tête droite. —

Eruption miliaire à la nuque.

Bras. — Craquement dans les articulations de l'épaule, avec dé-chirement dans les bras et jusque dans les mains. — Pesanteur excessive des bras. — Tressaillement des muscles dans les bras et les mains. — Eruption miliaire aux bras. — Boutons pruriants sur les bras et les poignets. — Taches rouges sur les mains, comme de piques de puces. — Tremblement des mains. — Mains froides. — Froid glacial du bout des doigts. — Bouts des doigts morts, sees et durs. — Taches jaune fonce, sur les doigts. Distorsion des doigts.

Jambes. — Peranteur et douleurs rhumatismales dans les hanches et les jambes. — Faibleme douloureuse dans l'articulation du genou, le matin, au lit. — Tension des tendons du jarret et du cou-de-pied, en marchant. — Crampe dans le mollet. — Froid aux pieds. — Engourdissement des pieds, chaque fois que l'on

s'assied.

TEUCRIUM MARUM VERUM.

TEUCR. — Germandrée maritime. — Archives de STAPF. — Hist. m. prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 298. — Doses unitées: 0, 30. — d'action: 2 à 3 semaines, dans quelques cas de maladies chroniques. – Hist. nat. et ANTIDOTES: Camphora.
COMPARER AVEC: Con. ign. magn-arct.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes. on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Polypes au nez et quelques affections par suite d'Ascarides.

SYMPTOMES GÉMÉRAUX. — Déchirement dans les membres. mais surtout dans les articulations. - Tressaillement des muscles. - Grande irritabilité et surexcitabilité nerveuse, avec tremblement et étourdissement. - Chancellement en marchant ; on met les pieds l'un sur l'autre. - Engourdissement et fourmillement dans les membres. — Besoin d'exercice en plein air. — Élancements pruriants à diverses parties.

Sommeil. — Sommeil tardif, le soir. — Sommeil non réparateur et difficulté de se réveiller, le matin. — Sommeil agité la nuit. par surexcitation excessive, avec reven vifs et sursauts fréquents.



730 TEUCRIUM MARUM VERUM.

Fièvre. — Frisson et grelottement, souvent avec froid glacial, aux mains, et bâillement fréquent. — Chaleur augmentée, le soir.

Moral. — Irritabilité et disposition à se fâcher, avec une telle impressionnabilité qu'on se sent beaucoup fatigué en ne faisant qu'entendre parler. — Morosité. — Paresse et éloignement excessif pour le travail. — Forte surexcitation morale et loquacité. — Envie irrésistible de chanter.

Tête. — Céphalalgie, avec douleur sourde, crampoïde. — Douleurs pressives dans la tête, principalement dans les yeux, dans le front et les tempes. — Déchirement par accès dans le côté droit

de la tête.

Yeux. — Douleur dans les yeux, avec pression comme si un grain de sable s'y était introduit. — Cuisson dans les yeux, surtout dans les angles internes, avec rougeur de la conjonctive. — Yeux rouges, enflammés. — Yeux larmoyants avec aspect comme si on avait pleuré.

Oreilles. — Otalgie, — Élancements et déchirements dans les oreilles. — Sifflement dans les oreilles en parlant, ou en produisant un son quelconque. — Eruption de dartres écailleuses au

lobe de l'oreille.

Nez. — Sensation d'obturation dans le nez. — Fourmillement dans le nez. — Éternument fréquent, avec fourmillement dans le nez.

Obturation du nez. - Coryza fluent au grand air.

Visage. — Teint maladif, pale, avec yeux caves.—Chaleur fugace au visage, sans rougeur. — Déchirement pressif dans les os des joues, jusque dans les dents.

Dents.—Odontalgie, avec douleur déchirante, dans les racines des dents et les geneives. — Douleur dans les dents et les geneives,

pendant la mastication.


Bouche et Gorge. — Bouche pâteuse. — Cuisson et grattement au fond du gosier et à la racine de la langue. — Mal de gorge, avec douleur lancinante et déglutition gênée. — Pression ou traction et déchirement dans la gorge. — Besoin fréquent de renâcler et renâclement abondant de mucosités d'un goût de moisi.

Appétit.—Goût amer dans le gosier, après le dîner.—Appétit plus prononcé. — Sensation de faim, comme si les aliments ne rassasiaient pas, empêchant de s'endormir. — Après avoir bu de l'eau,

tranchées et nausées avec envie de vomir.

Estomac. — Régurgitation des aliments, avec goût amer. — Hoquet pénible en mangeant, avec coups violents dans le scrobicule. — Mal d'estomac, comme par vacuité, avec gargouillement. — Fadeur dans le creux de l'estomac. — Pression et oppression anxieuse dans le scrobicule.

Ventre. — Coliques avec tractions déchirantes sous les hypocondres. — Incarcération de flatuosités, avec tiraillement, pincement et gargouillement dans le ventre. — Pression dans le ventre de la vent



TEUCR. MAR. VER.—THERIDION CURASSAVICUM. 731

sion vers l'annequ inguinal. — Expulsion abondante de flatuosités, avec edeur d'aufs pourris.

Selles. — Selle abondante, de la consistance de la bouillie, et fétide. — Repulsione d'accarides. — Prurit et fourmillement fréquent

à Panus, souvent après les selles.

Urines. — Sécrétion d'urine plus abondante et aqueuse. — Sensation pénible d'execriation et de cuisson à la partie supérieure de l'urêthre. — Sensation brûlante pendant et après l'émission des urines. — Diminution de l'appétit vénérien.

Poitrine. — Poitrine chargée, avec sensation de sécheresse dans la trachée-artère. — Toux sèche, provoquée par un chatouillement dans la trachée-artère, comme si on avait respiré de la poussière. — Pression serrante dans la partie inférieure de la poitrine, avec malaise anxioux.

Extranités. — Traction rhumatismale et tension dans le dos. —
Pesanteur douloureuse dans les bras et les avant-bras. — Tressuillement des muscles des bras. — Déchirement tractif dans les
os et les articulations des bras, des mains et des doigts. — Pulsations douloureuses et tiraillement dans l'index. — Tressaillement des muscles dans les jambes.— Déchirements dans les articulations et les os des jambes, des pieds et des orteils. —
Doulour dans le gros orteil, comme si l'ongle entrait dans les
chairs.

THERIDION CURASSAVICUM.

THER. — Théridion ou Araignée noire de Curação. — HÉRING. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharm. homosop., p. 348. — Dose usitée : 30. — Durée d'action :?

Antiportes : ?

CONFARER AVEC : Cale. lyc., médicaments après lesquels le théridion est principalement efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué.

CLIBIQUE. — So laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Mal de mer; Affections gastriques, etc., etc.

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande faiblesse générale, avec tremblement des membres. — Malaise excessif qui ne permet d'effectuer aucun travail. — Forts envie de dormir, et sommeil plein de rêves. — Sommeil profond, la nuit. — Frisson violent, avec pessanteur dans tous les membres. — Envie de dormir et



732 THERID. CURASSAV. - THUYA OCCIDENTALIS.

besoin de se coucher après le déjeuner. — Découragement et manque de confiance en soi-même. — Forte disposition à s'effrayer. — Le temps passe trop vite. — Crainte excessive du travail. — Difficulté de méditer, et surtout de faire des comparaisons.

Tête. — Embarras de la tête, qui empêche de travailler. — Vertige fréquent, surtout en se baissant. — Vertige avec nausées, au point de vomir. — Mal de tête dans le fond des orbites. — Sensation comme s'il y avait un corps étranger dans la tête. — Céphalalgie frontale, violente, avec pulsation jusque dans l'occiput. — Mal de tête à chaque mouvement que l'on fait. — Pression tensive autour de la tête, comme par un cercle de fer, à la racine du nez, et audessus des oreilles. — Maux de tête le soir, avec grand accablement.

Yeux — Face. — Scintillement devant les yeux, par accès fréquents. — Bourdonnement d'oreilles. — Bruissement dans les oreilles comme par une chute d'eau. — Sensibilité excessive de l'ouie, vertige et nausées à chaque son un peu fort. — Prurit violent derrière les oreilles. — Éternument fréquent et écoulement d'eau par le nez, sans coryza. — Mâchoire inférieure quel-

quefois immobile, surtout le matin, au réveil.

Bouche — Ventre. — Bouche pâteuse, et comme brûlée. —
Tous les sons et le froid produisent une sensation douloureuse,
au travers les dents. — Appétence pour les acides, le vin, l'eaude-vie et le tabac. — Désir continuel d'aliments ou de boissons,
sans savoir lesquels. — Nausées et vomissements, la nuit, précédés de vertiges et renouvelés par le plus léger mouvement ou
en fermant les yeux. — Nausées provoquées par tous les sons
un peu forts.

Selles — Parties génitales. — Constipation. — Selle peu abondante, de la consistance de la bouillie, avec besoin pressant. — Chute de l'anus, douloureux en étant assis. — Sécrétion d'urine plus abondante. — Exaltation immodérée de l'appétit vénérien.

- Racornissement du scrotum.

Poitrine et Tronc. — Lancinations violentes, dans la partie supérieure de la poitrine. — Besoin de respirer profondément et de soupirer. — Prurit et nodosités aux fesses.

THUYA OCCIDENTALIS.

THUI. — Thuya du Canada. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prep. Voy Pharmac. homœop., p. 301. — Doses usitées: 0,30. — Durée d'action: jusqu'à 5 semaines dans des affections chroniques. ANTIDOTES: Camph. puls? — On l'emploie comme antidote de: Thea et

merc.
COMPARER AVEC: Asa, bry.cann.chin.cic, fer.led.lyc.mang.merc.nitr-ac.



phes-ac. pu's. sabin. selen. staph. — C'est surtout après nitr-ac., que thuya est efficace, loraqu'il est d'ailleurs indiqué. — Après thuya, conviennent quelquefois : Nitr-ac. puls. staph.

CLIMIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, en verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre : — Affections rhumatismales et arthritiques; Dartres syphilitiques et chancres opiniatres; Affections sycotiques (Condylomes); Verrues; Prities vérole; Fièvres intermittentes; Ozène ?; Prosopalgie; Gremouilletts; Coliques par étranglement des intestins; Gonorrhée; Cancer de la matrice?; Verrues aux mains chez les onanistes, etc., etc., Voir la note, page 15.

SYMPTOMES GÉMÉRAUX. — Élancements dans les membres et les articulations. — Craquement dans les articulations, en étendant la partie. — Gonflement des veines de la peau. -- *Tressaillement de quelques membres et de quelques muscles. - Douleurs déchirantes et pulsatives, comme si les parties souffrantes étaient ulcérées. — Gonflements inflammatoires avec rougeur. - Souffrances après s'être échauffé, avoir bu du thé, ou mangé des aliments gras ou des oignons. — Tremblement de quelques membres. — Engourdissement facile des membres, surtout la muit, en se réveillant. — *Les symptômes s'aggravent généralement au réveil, ou après midi, ou la nuit vers trois heures du matin; ils empêchent de s'endormir, le soir. — *Beaucoup de symptômes s'aggravent dans le repos et par la chaleur, surtout celle du lit; ils s'améliorent par le mouvement, le froid et la transpiration. — *Beaucoup de symptômes semblent se mamisester principalement du côté gauche. — Roideur et pesanteur générale dans tout le corps, surtout dans les épaules et les cuisses. — Faiblesse physique, avec plénitude des facultés morales. — Tressaillement fréquent de la partie supérieure du corps. — Bouillonnement violent du sang, le soir, avec pulsation dans toutes les artères, aggravé par le mouvement, soulagé en étant assis. — Crainte du mouvement. — Les symptômes ont le plus souvent un caractère local, paraissant par attaques, se remplaçant par des souffrances dans d'autres parties, apparuissant et disparaissant subitement.

Pean. — Sensibilité douloureuse de la peau. — Élancements pruriants à la peau, surtout le soir et la nuit. — Boutons purulents.
comme dans la variole. — Condylomes. — Furoncles. — Engelures. — Taches brunes ou rouges, marbrées sur la peau. — Lu
plupart des souffrances cutanées sont soulagées par le toucher.

Semmeil. — Forte envie de dormir, le soir. — *Sommeil tardif.

à cause d'agitation et de chaleur sèche. — Insomnie nocturne.



THUYA OCCIDENTALIS.

avec agitation et froid du corps. - Sommeil non réparateur, la nuit. - Dès qu'on s'endort, *rêves pénibles, anxieux, de dangers et de mort, ou bien avec sursauts et cris, surtout en étant couché du côté gauche. - Rêves lascifs, sans émission de sperme, avec érections douloureuses au réveil.

Fièvre. — Frisson avec baillement, après minuit. — Frisson tous les matins, sans soif. - Frisson grelottant avec froid intérieur et extérieur (et soif), suivi immédiatement de sueur. - Frisson tous les soirs (à 6 heures), avec chaleur extérieure, sécheresse de la bouche et soif. - Chaleur *le soir, à la face surtout. - Sueur au commencement du sommeil.

Moral. - *Accablement moral. - Appréhensions anxieuses sur l'avenir. - Agitation qui rend toute chose pénible et répugnante. On est très-pensif, pour la moindre bagatelle. - Dégoût de la vie. - Humeur morose et maussade. - Lenteur de la parole et de la réflexion; on cherche les mots en parlant. - Incapacité

de réfléchir.

734

Tête. — Vacuité de la tête, comme dans l'ivresse, surtout le matin, avec nausées. - Faiblesse et embarras de la tête, comme par torpeur ou paralysie du cerveau. -- Vertige comme si on était balancé. - Vertige en se levant de son siège et en étant couché, ou bien en regardant en l'air. - Maux de tête le matin, comme après s'être baissé ou après un sommeil trop profond, avec rougeur de la face. — Céphalalgie sourde, étourdissante. — Céphalalgie aggravée en se baissant, soulagée en renversant la tête. -Pesanteur de la tête, surtout le matin, au réveil, dans l'occiput, avec mauvaise humeur et éloignement pour la conversation. -Céphalalgie comme si le front allait s'échapper, avec frisson intérieur, soulagée par la marche au grand air. - Maux de tête pressifs avec secousses dans le front et les tempes. - Maux de tête compressifs, surtout dans les tempes. - Douleur dans la tête, comme si un clou était enfoncé dans le vertex. - Déchirement semi-latéral, dans le sinciput et la face, jusque dans les pommettes, principalement le matin et le soir. - Tressaillement déchirant dans l'occiput. - Lancinations à travers le cerveau. -Congestion de sang à la tête. - Pulsation dans les tempes. -Sensibilité excessivement douloureuse du côté gauche de la tête, et même des cheveux, la nuit, en étant couché, et au toucher. -Traction pressive dans les muscles des tempes, surtout pendant la mastication. - Elancements dans les tempes. - Gonflement des veines, aux tempes. - Prurit et rongement au cuir chevelu.

Pression dans les yeux, et cuisson comme si un grain de sable s'y était introduit. - Déchirement dans les sourcils. -Élancements dans les yeux, à une vive clarté et à l'air vif. Sensation brûlante dans les yeux. - Sclérotique enflammée, rouge de sang. - Gonflement inflammatoire des paupières.



avec dureté. — Nodosités rouges et douloureuses sur les bords des paupières. — Boutons purulents et pruriants entre les sourcils. — **Condylomes dans les sourcils. — Sensation de chaleur et de sécheresse dans les angles externes des yeux. — Larmoiement, surtout de l'œil gauche, pendant la marche au grand air. — Agglutination nocturne des paupières. — Obscurcissement de la vue en lisant, avec sensation de sommeil. — Vue trouble, comme à travers un voile. — Myopie. — Points noirs, voltigeants, devant-les voux.

Orelles. — Otalgie, avec compression serrante et elancements violents, surtout le soir. — Douleur crampoide à l'oreille extérieure. — Martellement et déchirement dans l'oreille, le soir, au lit, avec émission fréquente d'urine, et froid aux jambes et aux

pieds. — Douleur pressive derrière les oreilles.


Nez. — Gonflement des ailes du nez. avec dureté et tension. —
Tension tractive dans les os du nez. — *Croûtes douloureuses
dans le nez. — Mouchement de sang. — Épistaxis fréquentes,
surtout après s'être échauffé. — Corysa sec, qui devient fluent,
en plein air, avec maux de tête continuels. — Coryza fluent, avec
toux et enrouement. — Écoulement verdâtre et fétide par le nez.

Visuge. — Chaiser de visage, quelquerois soulement fugace, ou bien avec rougeur ardente. — Sueur à la face. — Eruption faciale, croûteuse, pruriante. — Nodosités rouges et douloureuses aux tempes. — Douleur faciale térébrante et fouillante, dans les pommettes, soulagée par le toucher. — Tressaillement des lèvres. — Eruption boutonneuse aux lèvres et au menton. — Élancesseuts dans la mâchoire inférieure, qui semble ressortir par les oreilles. — Gonfiement des glandes sous-maxillaires.

Dents. — Odontalgie, après avoir bu du thé, avec douleur pressive jusque dans la machoire. — Odontalgie avec tiraillements aigus, surtout pendant la mastication. — Rongement dans les dents (cariées), avec sensibilité douloureuse de tout le côté de la tête, fortement aggravé par le contact des choses froides ou la mastication. — Gencives gonflées, avec douleur d'excoriation.

Beache.—Aphthes dans la bouche.— Fort gonflement des glandes salivaires, avec salive plus abondante dans la bouche.— Salire sanguinolente ou amère. — Douleur d'excoriation au bout de la langue, au toucher. — Gonflement de la langue, douloureux au toucher. — Grenouillette des deux côtés de la langue, transparente, rouge bleuâtre, grise et comme gélatineuse. — Parole lente.

Gerge. — Apreté et grattement dans la gorge. — Pression et douleur d'excoriation dans la gorge et le palais, pendant la déglutition. — Besoin d'avaler. — Élancements depuis le gosier jusque dans les creilles. — Gonfiement des amygdales et de la gorge. — «Ulebris dans la gorge et la bouche, comme des chancres. —Renàclement de mugosités couleur rouge de mag.



I

THUYA OCCIDENTALIS.

Appétit. — Goût fade et douceâtre dans la bouche, le soir et après le repas. — Goût amer du pain. — Les aliments ne semblent jamais assez salés. - Soif seulement la nuit et le matin. - Appétence pour les boissons et les aliments froids. — Satiété prompte en mangeant. — Incommodités après avoir mangé des aliments gras ou des oignons. - Après le repas, grande paresse, ou abattement avec angoisse et battement de cœur, ou fort ballonnement et souffrances par des flatuosités.

Estomac.—Renvois des aliments, après le repas.—Renvois amers, ou putrides. -- Renvois rances, surtout après les aliments gras. -Nausées et malaise dans la région de l'estomac. — Vomissement de sérosités acidulées et d'aliments. — Crampes d'estomac, avec exacerbation excessive vers le soir. — Pression dans le scrobicule après le repas, avec douleur au toucher. — Battement dans le scrobicule. - Angoisse dans le creux de l'estomac qui monte

jusque dans la tête.


786

Ventre. — Pression douloureuse dans la région hépatique. — Pression dans la région des reins. — Ballonnement du ventre, souvent avec douleurs contractives et crampoides. - Tension constrictive dans le ventre. — Douleurs pressives dans le bas-ventre, surtout vers le côté (avant la selle).—Sensation de quelque chose de vivant dans le bas-ventre. — Douleur dans le ventre comme par étranglement des intestins. — Grondement et borborygmes dans le ventre. — Induration dans le bas-ventre. — Douleur déprimante dans les aines. — Traction dans les aines en marchant et en étant debout, avec élancements le long des cuisses, en s'asseyant. - *Gonflement douloureux des glandes de l'aine, quelquefois avec traction jusque dans le genou.

- *Constipation qui dure plusieurs jours, quelquefois après des pollutions. — *Ténesme -avec roideur de la verge. *Evacuation difficile d'une selle dure, volumineuse et enduite de sang. — Écoulement de sang pendant la selle. — Contraction douloureuse de l'anus, pendant la selle. — Sensation brûlante à l'anus et entre les fesses. — Condylomes à l'anus. — Déchirements le long du rectum. — Fistule du rectum.

Urines. — Besoin fréquent d'uriner, avec émission abondante d'une urine aqueuse, même la nuit. — Sédiment nuageux dans l'urine. — Urine sanguinolente. — Suintement d'urine prolongé, après avoir uriné. — Sensation comme si une goutte coulait dans l'urèthre, après et hors le temps de l'émission des urines. Sensation brûlante dans l'urèthre, surtout le matin et dans la journée, comme aussi après et pendant l'émission des urines. - Élancements dans l'urèthre, pendant et hors le temps de l'émission des urines. - Cuisson dans les parties sexuelles de la femme, pendant l'emission des urines. - Prurit dans l'urèthre. *Ecoulement jaunâtre par l'urêthre, avec verge cordée.

Parties génitales. — Sueur abondante aux parties génitales, sur-



THUYA OCCIDENTALIS.

tout au scrotum. — Gonorrhée bâtarde. — *Condylomes sur le gland et le prépuce, hussides, pruriants, et suppurant surtout à la lune croissante. — *Ulcères comme des chancres au prépuce. — Gonflement du prépuce. — Élancements dans le scrotum, la verge et le long du cordon spermatique, jusqu'à l'ombilic. — Traction dans les testicules, avec rétraction de l'un d'eun (le gauche). — *Érections douloureuses, continuelles, surtout la sust et le matin, avec lancinations dans l'urèthre. — Écoulement de liqueur prostatique. — Écoulement abondant et aqueux par la verge.

Régies. — Prurit et cuisson brûlants, comme par excoriation, aux parties génitales. — Pression sur les parties génitales. — Douleur contractive et crampoide dans les parties génitales, jusque dans le bas-ventre. — Gonsiement et excoriation des lèvres. — °Verrues à Porifice de la matrice, avec élancements et sensation brûlante en urinant. — Menstruation trop peu abondante. —

Leucorrhée.

Larynx. — Eurouement, comme par contraction du larynx. —

«Catarrhes bronchiques opiniâtres. — Élancement et fourmillement dans la trachée-artère. — Toux, le matin, provoquée par un chatouillement dans la trachée-artère. — Toux provoquée par un échauffement. — *Expectoration de petits globules gris. jaumes ou verts, en toussant. — Toux, avec expectoration de unecosités jaumes, et douleurs dans le scrobicule, l'après-midi.

Patrine. — Gêne de la respiration, avec forte soif d'eau et grande anxiété. — Dyspnée, avec besoin de respirer profondément. — Oppression tantôt du côté gauche de la poitrine, tantôt de l'hypocondre gauche, avec irritation qui provoque la toux. — Douleur de poitrine, comme par quelque adhérence intérieure. — Pression sur la poitrine, quelquefois après le repas. — Agitation et sensation de gonflement dans la poitrine. — *Lancinations dans la poitrine, surtout après avoir bu froid. — Bouillonnement de sang dans la poitrine, et *battements de cœur violents et sensibles à Poule, surtout en montant un escalier. — *Battement de cœur, avec nausées. — *Sensibilité douloureuse de la région du cœur. — Couleur bleue de la peau, autour des clavicules.

Treme. — Douleur de brisement et roideur aux reins, dans le dos et la nuque, surtout le matin, après s'être levé. — Tractions dans le dos et aux reins, en étant assis. — Térébration dans le dos. — Pulsation dans l'épine dorsale. — Furoncles au dos. — Inquiétudes dans la nuque, le cou et la poitrine. — *Tension de la peau de la nuque en remuant la tête. — Gonflement des glandes du cou. — Gonflement des veines du cou. — Sueur abondante sous les aisselles. — Taches brunes sous les bras, comme des taches de naissance.



738 THUYA OCCIDENT. - VALERIANA OFFICINALIS.

Bras. — *Battement dans l'articulation de l'épaule. — *Douleur d'ulcération, déchirante, pulsative, depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. — Douleur de luxation dans l'épaule et le bras, avec craquement. — Traction fouillante dans les bras, comme dans l'os oule périoste. — Tresaillement involontaire des bras, le jour.—

La nuit, sensation de froid, au bras. — Lancinations dans les bras et les articulations. — Craquement dans l'articulation du coude, en étendant les bras. — Tache rouge marbré à l'avant-bras. —

Tremblement des bras et des mains, en écrivant. — Sensation de sécheresse de la peau des mains. — Sueur aux mains. — Veines gonflées aux mains. — o Verrues aux mains. — Froideur, torpeur et pâleur du bout des doigts ét des doigts, s'étendant quelquefois jusqu'à l'avant-bras. — Fourmillement et élancements dans le bout des doigts. — Gonflement rouge et douloureux du bout des doigts. — *Les douleurs dans les bras s'aggravent en les laissant pendre ou à la chaleur; elles s'améliorent par le mouvement, le froid et après la transpiration.

Jambes. — Traction dans les jambes. — Élancements dans les jambes et les articulations. — Grande faiblesse et lassitude dans les jambes, surtout en montant un escalier. — Pesanteur et roideur des jambes, en marchant. — Sueur abondante aux cuisses et aux parties génitales. — Prurit aux cuisses. — Éruption boutonneuse aux fesses, aux cuisses et aux genoux. — Ulcères aux cuisses. — Craquement dans les articulations des genoux et des pieds, en les étendant. — Pustules suppurantes aux genoux. — Nodosités blanches, avec prurit violent aux orteils. — Gonflement inflammatoire et rouge du bout des orteils, ou du cou-depied, avec douleur et tension en s'appuyant sur le pied et pendant le mouvement. — Taches rouge marbré sur le cou-de-pied. — Sueur aux pieds, principalement aux orteils. — Engelures aux

orteils.


VALERIANA OFFICINALIS.

VALER. — Valériane officinale. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy Pharmac. homœop., p. 306. — Doses usitées : 42,30. — Durée d'action : 3 à 10 jours dans quelques cas.

ANTIDOTES : Camph. coff.

COMPARER AVEC : Arn. bell. cham. cocc. coff. con. ign. merc. n-vom. plat. puls. stann.

CLINIQUE. — On a employé ce médicament contre quelques cas de Fièvre intermittente, ainsi que contre des Céphalalgies et des Coliques chez des personnes hystériques.



SYMPTOMES GENERAUX. - Déchirement rhumatismal dans les membres, généralement en dehors des articulations, principalement dans le repos, après le mouvement, et le plus souvent soulagé par le mouvement, ou transformé par la marche en d'autres sensations et à d'autres parties. - Douleurs tressaillantes et ébranlantes, apparaissant subitement et par accès. -Douleurs qui se manifestent lorsqu'on reste longtemps dans une position quelconque, et s'améliorent lorsqu'on en change. — Traction et tressaillement aux membres, comme si c'était dans les os. - Douleur de paralysie dans les membres, vers la fin d'une promunde. — Soulirances periodiques, réapparaissant après 2, 8 mois. — Attaques d'épilepsie. — Torpeur paralytique lans les membres. - La plupart des symptômes se manifestent le soir et après le diner. - Surexcitation et irritabilité maladives, générales, avec lassitude dans les membres, grande gaieté et apparence de vigueur. — Courbature, surtout dans les membres inférieure, le matin, après s'être levé. - Éruptions de petites modosités, d'abord rouges et confluentes, puis blanches et dures. Incommic. — Sommeil agité, avec jactation et rêves anxieux et confus.

Tièvre. — Frisson, avec chaleur continue, après un court frisson, accempagné d'embarras de la tête et de soif. — Pouls accéléré. — Sueur fráquente, surtout à la face et au front (souvent apparais-

sant subitement, et se dissipant promptement).

Meral. — Sensation anxieuse, hypocondriaque, comme si tout ce qui environne était désert, déplaisant ou inconpu. — Surexcitation joyeuse, tremblants. — Peur, le soir. — Désespoir. — Apparition alternative des publimes moraux les plus opposés. — Mobilité excessive de le la lucinations et erreurs du sentiment général.

Tôta. — Tête embarramée, comme par l'ivresse. — Ivresse et étourdissement, avec absence d'idées. — Tournoiement dans la tête
en se penchant en avant. — Céphalalgie apparaissant subitement ou par accès. — Céphalalgie pressire ou avec lancinations pressives surtout dans le front, vers les orbites, alternant
souvent avec embarras et étourdissement dans la tête. — Douleur
tractive d'un côté de la tête, par un courant d'air. — Contraction
étourdissante dans la tête, comme par un coup violent sur le
vertex. — Sensation de froid glacial, à la partie supérieure de la
tête, par la pression du chapeau.

Yeux. — Yeux abattus, comme après une débauche nocturne, surtout après le repas. — Pression, sensation brûlante et cuisson dans les yeux. — Bougeur et douleur d'excoriation au bord des paupières. — Gonfiement et sensibilité douloureuse des paupières. — Myopis. — Clarté et lueur devant les yeux, dans l'obscurité, de manière que les objets deviennent presque recon-

naissables. - Étincelles devant les yeur,



VALERIANA OFFICINALIS.

Oreilles — Dents. — Otalgie, avec traction crampoide. — Tressaillement dans les oreilles. — Tintement et sonneries dans les oreilles. — Douleur faciale, avec traction crampoide dans les os des joues. — Rougeur et chalcur des joues, au grand air. — Vésicules blanches sur la joue et la lèvre supérieure, douloureuses au toucher. — Odontalgie, avec douleur lancinante.

Appétit. — Goût dans la bouche (et odeur devant le nez), comme de suif fétide. — Goût amer sur le bout de la langue, en la passant sur les lèvres, après le repas. — Goût fade et muqueux de la bouche, le matin, après le réveil. — Boulimie, avec nausées.

Estomac.— Renvois avec goût d'œufs pourris, le matin au réveil.

— Renvois fréquents, à vide, ou rances et brûlants. — Nausées, avec envie de vomir, et sensation comme s'il y avait un fil depuis le gosier jusque dans le ventre, avec accumulation abondante de salive. — Nausées, avec évanouissement, lèvres blanches et froideur du corps. — Vomissement de bile et de mucosités, avec violent frisson grelottant. — Vomissement nocturne. — Faiblesse de l'estomac et de la digestion. — Pression dans le scrobicule, apparaissant subitement, et se dissipant promptement par un

gargouillement dans le ventre.

Ventre. — Douleurs dans la région hépatique et l'épigastre, au toucher. — Secousses douloureuses dans l'hypocondre drqit. — Lancinations dans la région des reins, en s'asseyant. — Ventre ballonné et dur. — Forte sensation d'expansion dans le ventre, comme s'il allait éclater. — Propension à rétracter le ventre. — Crampes abdominales, généralement le soir, au lit, on après le diner, ne se laissant soulager par aucune position. — Coliques par des hémorrhoïdes. — Tranchées et pincements douloureux dans le ventre, en le rétractant. — Maux de ventre, le soir, du côté gauche, comme par ulcération sous-cutanée. — Traction, pression et douleurs de meurtrissure dans le bas-ventre, les aines et les muscles abdominaux, comme après un refroidissement, ou un tour de reins. — Douleurs fouillantes dans le ventre.


Selles — Urines. — Selles diarrhéiques. — Selles verdâtres, de la consistance de la bouillie, mêlées de sang. — Térébrations douloureuses dans le rectum. — Écoulement de sang par l'anus. — Ascarides du rectum. — Émission d'urine, abondante et

fréquente.

Poitrine — Gêne de la respiration et angoisse sur la poitrine. —
Oppression de la respiration, avec pression sur la partie inférieure
de la poitrine, — Lancinations dans la poitrine, quelquefois
du côté gauche (dans la région du cœur), en inspirant. — Érup-

tion de petites nodosités dures sur la poitrine.

Tronc. — Douleur tractive aux reins et dans le dos. — Douleur dans la région des lombes, comme après avoir pris un refroidissement ou s'être donné un tour de reins. — Douleurs rhumatismales dans les omoplates.



VALERIANA OFFICINALIS. — VERATRUM ALBUM. 741

- Tractions crampoïdes et tressaillement, ou bien déchirement dans les bras. — Douleur paralytique dans les articulations de l'épaule et du coude, vers la fin d'une promenade. — Eruption de petites nodosités dures sur les bras. — Tremblement des mains, en écrivant. — Secousses douloureuses à travers la main. Jambes. — Douleur brûlante dans les hanches, le soir, au lit. Traction crampoide et tressaillement dans les cuisses. — Grande pesanteur et lassitude dans les jambes, mais surtout dans les mollets. — Douleur de brisement dans les cuisses et le tibia. Douleur paralytique dans les genoux, vers la fin d'une promenade. Douleur tensive dans les mollets. — Déchirements dans les mollets, surtout en croisant les jambes. — Traction dans les articulations des pieds, en s'asseyant. — Douleur de luxation dans les articulations du pied et les malléoles. — Douleurs et élancements dans les talons, surtout en étant assis. -- Déchirements dans la plante des pieds et sur les orteils.


VERATRUM ALBUM.

VERATR. — Hellébore blanc. — HAHNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmae homosop., p. 307. — Doses u itres: 12,30. — Durée d'action: 2 à 3 semaines dans quelques affections chroniques.

Antidotes: Acon. camph. chin. coff. — On l'emploie comme antidote de :
Ars. chin. fer.

COMPARKA AVEC: Acon. ars. arn. bry. camph. caps. caus. chin. cic. coff. coloc. cupr. dros. fer. hell. hyos. ign. ipec. laur. lyc. magn-m. merc. mez. op. phos. phos-ac. puls. rhus. rut. sabad. sec. sep. sil. spig. stram. sulf. tart. zinc. — C'est surtout après: Ars. chin. cupr. phos-ac., que veratrum est efficace, lorsqu'il est d'ailleurs indiqué. — A près veratrum, conviennent quelquefois: Ars. arn. chin. cupr. ipec.

CLINIQUE. — Se laissant guider par l'ensemble des symptômes, on verra les cas où l'on pourra consulter ce médicament contre: — Affections chroniques par l'abus du quinquina; Suites fâcheuses d'une peur, d'une frayeur ou d'une contrariété, avec colère; Souffrances rhumatismales; Spasmes hystériques; Faiblesse physique et nerveuse, par suite de fortes maladies aiguës; Éruptions galeus: s: Fièvres gastriques; Fièvres intermittentes; Manie: Migraine; Céphalalgie nerveuse, chez des jeunes filles hystériques et de jeunes femmes; Amblyopie amaurotique; Odontalgies rhumatismales et autres; Faim canine, même à la suite de maladies aiguës (dans la convalescence); Choléra sporadique ou asiatique; Dyspepsie avec vomissement des aliments; Hématémèse; Diarrhées de différentes natures, même celles produites par des boissons froides, lorsqu'on s'était échauffé; Constipation opiniatre; Dysménie des jeunes filles: Vo-



VERATRUM ALBUM.

de sur la tête. — Rêves anxieux. — Gémissement pendant le

Pièvre. — *Froid pénéral de tout le corps, et sueurs froides vis-queuses, surtout au front. — Horripilation et frisson, avec soif Ceau froide. — Horripilation et chair de poule, après avoir bu. -• Fièvre avec froid extérieur seulement. - • Violent frisson grelottant (suivi de chaleur et de soif peu forte), puis sueur, qui se transforme bientot en froid. — Frisson, d'abord avec forte seif, suivi de frisson alternant avec chaleur, puis chaleur permente avec soif.— Fièvre, avec chalcur intérieure seulement. etathe fonce; on eaver vomissement et diarrhée, ou avec con-stitution; ependant le frisson, vertige, nausées et douleurs aux reins et dans le dos. — *Pendant la chaleur, assoupissement continuel, ou délire avec rougeur de la face. — Fièrre avant mimusit et le matin, quotidienne, tierce ou quarte. — Pouls lent et presque éteint, ou petit, accéléré et intermittent. — Sueur facile

à provoquer le jour, par le moindre mouvement. Fal.— Abattement mélancolique, tristesse et besoin de pleurer. - Affliction inconsolable, avec hurlements et cris pour des malheurs imaginaires. — *Angoisse excessive et inquiétude, arec appréhensions et trouble de conscience, surtout la nuit ou le matin, souvent aussi chaque fois qu'on se lève de son siège ou du Ht. — Forte disposition à s'effrayer, et caractère peureux. — *Angolese mortelle.—*Découragement et désespoir.—Agitation rée; on se donne beaucoup de mouvement, avec grande disposition au travail. — Disposition à se fâcher, pour la moindre chose, souvent suivie d'anxiété et de battement de cœur. — Grande disposition au silence, avec injures à la moindre provosation. — Disposition à s'entretenir des fautes d'autrui. — Gaieté immodérée et loquacité. — Fureur, avec envie de mordre, de tout déchirer et de s'enfuir. — Perte de la mémoire. — Absence d'idées. — Perte de sens. — *Aliénation mentale et démence; avec chant, sifflement, rire, besoin de courir de côté et d'autre. idées et actions extravagantes et orgueilleuses, ou bien encor-avec disposition à se dire atteint d'affections qui n'ont pas la moindre vraisemblance et sont tout à fait fictives. — *Accès d'Miénation érotique ou religieuse. — *Délires violents.

Tota. — Embarras dans la tête, comme si, au dedans, tout était mouvant, surtout le matin. — Emoussement de tous les sens. — Vertige tournoyant. — Ivresse et étourdissement. — *Accès de maux de tête, avec pâleur du visage, nausées et romissements.

- *Maux de tête, avec roideur douloureuse de la nuque.

Mal de tête avec flux d'urine. — Maux de tête par accès, comme si le cerveau était meurtri ou déchiré. — *Céphalalgie pressire. souvent dans le vertex, ou bien semi-latérale, avec douleur d'estonne. — Douleur constrictive dans la tête (et le gouler). — Douleur incisive au vertex. — Ébranlement dans la tête, avec tres-



saillement dans les bras et pâleur des doigts. - Forte congestion de sang à la tête, en se baissant. - Maux de tête pulsatifs. *Douleur brûlante dans le cerveau. - Sensation de froid et de chaleur à l'extérieur de la tête, avec *sensibilité douloureuse des cheveux. — *Froid au vertex, comme s'il y avait là un morceau de glace. — *Sueur froide au front.

Yeux. - Douleur dans les yeux, comme si le globe était meurtri. - Déchirement douloureux, on compression dans les yeux.-Ardeur permanente dans les yeux. — Rougeur des yeux. — In-flammation douloureuse des yeux, surtout de l'œil droit, et parfois avec maux de tête violents, et insomnie nocturne. — Yeux ternes, troubles, jaunătres. — Couleur bleue des yeux. — Yeux noyés et comme recouverts de blanc d'œuf. - Sécheresse excessive des paupières. - Larmoiement abondant, souvent avec ardeur, douleurs incisives et sensation de sécheresse dans les yeux. — Agglutination des paupières, pendant le sommeil. — Paralysie des paupières. — Yeux convulsés, proéminents. — Pupilles fortement contractées ou dilatées d'une manière sensible. — Perte de la vue. — Diplopie. — *Cécité nocturne. -Étincelles et taches noires devant les yeux, surtout en se levant de son siége ou du lit.

Oreilles. — Elancements dans les oreilles. — Pression et étreintes dans les oreilles. — Sensation de froid alternant avec chaleur dans les oreilles. — Surdité, comme par obturation des oreilles. - Bruissement dans les oreilles, surtout en se levant de son


744

siége.

Nez. — *Froid glacial du nez. — Inflammation et douleur d'ulcération dans l'intérieur du nez. — Douleur contractive et déprimante dans l'os du nez. — Epistaxis nocturne, ou par une seule narine. - Odeur de fumier, devant le nez. - Sensation de sécheresse pénible dans le nez. — Eternument violent et fréquent. -

Coryza.

Visage. - *Face pâle, froide, hippocratique, hâve, avec nez effile, et cercle bleu autour des yeux. - Visage bleuatre. - Couleur jaunâtre de la face. - Rougeur de l'une des joues, avec pâleur de l'autre. - *Rougeur et pâleur alternatives de la face. - Rougeur de la face lorsqu'on est couché, pâleur en se redressant. -*Chaleur brûlante, rougeur foncée et sueur du visage. — Sueur froide à la face. - Douleurs faciales, tractives et tensives, d'un seul côté et s'étendant jusqu'à l'oreille. — Tressaillement et pin-cements dans les muscles de la face. — Pustules à la face, vers la fin avec douleur d'excoriation au toucher. - Couperose à la face. Éruption miliaire sur les joues. — Bouffissure de la face. —
 *Lèvres sèches, noirâtres et gercées. — Éruption aux commissures des lèvres. - Couperose autour de la bouche et du menton. *Crampe de la mâchoire. - Douleur et gonflement des glandes sous-maxillaires.



745

Dents. — Odontalgie, avec maux de tête et face rouge, boufie.

*Odontalgie (quelquefois pulsative) arec gonflement du risage.

sueur froide au front, nausées et romissements, courbature et
froid de tout le corps, prostration des forces jusqu'à la défaillance.

chaleur intérieure et soif inextinguible. — Pression et sensation
de pesanteur excessive dans les dents, avec tiraillement pendant
la mastication, même des aliments mous. — Grincement des
dents. — Vacillement des dents.

Bouche. — Bouche sèche et pâteuse. — Salication, avec nausées. ou avec goût âcre ou salé. — Écume à la bouche. — Sensation de froid ou brûlement dans la bouche et sur la langue. — Inflammation de l'intérieur de la bouche. — °Langue sèche, noirâtre, fendillée, ou rouge et enflée. — °Langue chargée d'un enduit jaune. — Bégayement. — Perte de la parole. — Sensation de torpeur et grande sécheresse au palais.

Gerge. — Mal de gorge, avec douleur constrictive d'étranglement. surtout pendant la déglutition. — Rétrécissement du gosier comme par un gonflement pressif. — Gonflement du gosier avec péril de suffocation. — Sensation de froid ou brûlement dans l'arrière-bouche et le gosier. — Sécheresse dans la gorge, qui ne peut être apaisée par aucune boisson. — Apreté et grattement

dans la gorge.

Appétit. — Însipidité de la salive dans la bouche. — Goût amer. bilieux, dans la bouche. — Goût putride dans la bouche. comme du fumier, herbacé. — Goût frais ou piquant dans la bouche et la gorge. — *Soif inextinguible, arec désir de boissons froides, principalement. — Appétit et désir d'aliments, même dans l'intervalle des vomissements et des évacuations alvines. — Faim ardente et voracité. — *Boulimie. — *Désir ardent et continuel d'acides et de choses fraîches (des fruits). — Répugnance pour les aliments chauds. — °Pour peu qu'on ait mangé, vomissement immédiat et diarrhée. — °En mangeant, nausées avec fuim et pression à l'estomac. — °Après le repas, hoquet, envie de vomir et régurgitation de sérosités amères.

Estomac. — Renvois avec goût des aliments. — Renvois riolents à vide, même après le repas. — Renvois amers ou aigres. — Hoquet fréquent et violent. — Nausées riolentes, avec envie de vomir, sourent au point de s'écanouir et généralement avec forte soif. —*Nausées fréquentes ou continuelles, même le matin. Écoulement d'eau par la bouche, comme par pituites. *Vomissement violent, arec nausées continuelles, grand épuisement et besoin de se coucher, précédé de mains froides avec horripilation sur tout le corps, accompagné de chaleur générale et suivi de bouillonnement de sang et de chaleur aux mains. — *Vomissement des aliments. — *Vomissement des aliments. — *Vomissement des aliments. — *Vomissement des aliments. — *Vomissement d'écume et de mucosités cert jaunâtre ou blanches. —



Vomissement de mucosités, la nuit. — Vomissement de bile noire et de sang. — *Vomissement continuel, avec diarrhée et pression dans le scrobicule. — *La moindre goutte de liquide et le plus léger mouvement provoquent les vomissements. — En vomissant, contraction douloureuse du ventre. — Douleur d'estomac, avec faim et soif ardente. — *Sensibilité excessive de la région de l'estomac et du scrobicule. — *Angoisse excessive au creux de l'estomac. — Vacuité et malaise dans l'estomac. — Crampe d'estomac. — Pression dans le scrobicule, s'étendant quelquefois jusque dans le sternum, les hypocondres et le bas-ventre, surtout après le repas. — *Sensation brûlante dans le creux de l'esto-

mac. — Infiammation de l'estomac.

Ventre. — Coliques dans la région ombilicale. — oGrande sensibilité douloureuse du ventre, au toucher. — Maux de ventre nocturnes, avec insomnie. —Gonflement du ventre. — oVentre dur et ballonné. — Tension dans les hypocondres et la région ombilicale. — *Crampes abdominales, et coliques. — Maux de ventre pressifs, tractifs, le soir, en marchant. — Tranchées comme par des couteaux, accompagnées de diarrhée et de soif avec diurèse. — *Sensation brûlante dans toute l'étendue du ventre, comme par des charbons ardents. — Douleur de meurtrissure dans les entrailles. — Infiammation des intestins. — Hernie inguinale. — *Colique flatulente, avec gargouillement bruyant et borborygmes dans le ventre. — Plus les flatuosités tardent à être expulsées, plus elles sortent difficilement. — Expulsion violente de

vents par le haut et le bas.

746

Selles.—*Constipation, quelquefois opiniâtre, le plus souvent par inactivité du rectum, et souvent accompagnée de chaleur et de maux de tête. — Resserrement du ventre. — Selles dures et d'un moule trop volumineux. —*Diarrhées violentes et douloureuses, ou tout à fait indolores, souvent avec tension du ventre, précédées et suivies de tranchées. — Diarrhée de matières acres, avec sensation brûlante à l'anus. — Diarrhées nocturnes. — *Selles diarrhéiques, noirâtres, verdâtres, brunâtres. — Selles diarrhéiques sanguinolentes. — Évacuation inaperçue d'une selle liquide, en expulsant un vent. —*Pendant la selle, grande lassitude, frisson avec horripilation, pâleur du visage, sucur froide au front et anxiété, avec crainte d'apoplexie. — Sensation brûlante à l'anus, pendant la selle. — Douleur d'excoriation à l'anus. — Pression vers l'anus, avec hémorrhoïdes aveugles. — Symptômes vermineux.

Urines. — Rétention d'urine. — Envie d'uriner, pendant que la vessie est vide, comme si l'urèthre était étranglé derrière le gland. — Urine plus rare, jaune et déjà trouble lorsqu'on l'émet. — Flux d'urine, avec faim et soif ardente, maux de tête, nausées avec envie de vomir, coliques, dureté des selles et coryza. — Écoulement involontaire des urines. — Urine âcre. — Urine





foncés ou verdâtre. — Douleur premive dans la vessie et sensation brélante en urinant.

Parties génitales. — Sensibilité excessive des parties génitales. — Exceriation du prépuce. — Tractions dans les testicules. — Bègles trop hâtices et trop abondantes. — Suppression des règles. — Avant les règles, manz de tête, vertige, épistaris et sucur noctarne. — Au début des règles, diarrhée, nausées et frissons. — Pendant les règles, inaux de tête, le matin, avec nausées et envie de vomir, bourdonnement d'oreilles, sois ardente et douleurs dans tous les membres. — Vers la fin des règles, grincement des deuts et visage bleuâtre. — • Règles supprimées, avec délire.

Laryux.— Spasmes du laryux. — Poitrine chargée de mucosités, avec àpreté et grattement dans la gorge. — Toux provoquée par un chatouillement, profondément dans les bronches, avec expectoration facile, ou bien sèche. — *Toux violente, avec rapports continuels, comme si on allait vomir. — Toux, le soir, avec malivation. — Toux sèche, ardente, généralement le soir et le matin. — Toux avec douleur dans le côté, faibleme et gêne de la respiration. — Toux creuse, profonde, comme venant du ventre, avec douleur incisives dans l'abdomen. — *En toussant, lancinations vers l'anneau inguinal. — *Toux, semblable à la coguent chaud, toux avec expectoration jaunatre, suivie de douleur de meurtrissure dans la poitrine. — Toux, avec expectoration abondante.

Politime. — Étouffement de la respiration, fréquemment, au point de suffoquer, produite généralement par une constriction spasmodique de la gorge ou de la poitrine. — Haleine courte, au moindre mouvement. — Dyspnée et géne de la respiration, même en étant assis. — Poitrine très-oppressée, avec douleur dans le côté, en respirant. — Pression à la poitrine, surtout dans la région du sternum, et principalement après avoir bu ou mangé. — Sensation de plénitude dans la poitrine, qui force à des renvois continuels. — Serrement dans la poitrine, surtout après avoir bu. — Crampa de poitrine, avec constriction douloureuse. — Contraction spasmodique des muscles de la poitrine. — Douleur incisive dans la poitrine. — Élancements par accès dans la poitrine, avec étouffement de la respiration. — Battement de cœur siolent, qui soulève les côtes, avec étouffement et accès d'angoisse de cœur excessive.

Trene. — *Douleur de brisement aux reins et dans le dos, "avec pression tractive, surtout en se baissant et en se redressant. — Serrement entre les omoplates. — Roideur rhumatismale de la nuque, avec vertige, lorsqu'on la bouge. — Faiblesse paralytique des muscles du cou; ils ne peuvent plus supporter la tête.



748 VERATRUM ALBUM. - VERATRUM LUTEUM.

Bras. — Douleur de brisement paralytique dans les bras, depuis l'articulation de l'épaule jusque dans le poignet. — Tressaillement dans les bras. — Froideur ou sensation de plénitude et gonflement dans les bras. — Sensation continuelle d'engourdissement des bras. — Tremblement des bras, en saisissant un objet. — Ébranlements dans le coude, comme par des étincelles électriques. — Dartre sèche à la main. — Fourmillement dans les mains et les doigts. — Engourdissement et pâlissement des doigts.—*Froid glacial des mains.—*Tiraillement et crampes


dans les doigts.

Jambes. — Paralysie dans l'articulation coxo-fémorale, avec gêne en marchant. — Douleur de brisement paralytique dans les jambes. — Déchirement arthritique, et traction dans les jambes et les pieds. — Sensation continuelle d'engourdissement des jambes. — Tension des tendons du jarret, comme s'ils étaient trop courts. — Douleur de brisement dans les genoux; en descendant les escaliers. — Ébranlements dans le genou, comme par des étincelles électriques.—Pesanteur excessive et doulourcuse dans les genoux, les jambes et les pieds, avec marche difficile. — *Crampes violentes dans les mollets et les pieds. — Gonflement rapide des pieds. — *Froid glacial des pieds. — Tremblement des pieds, avec froid, comme s'il y circulait de l'eau froide. — Élancements dans les (gros) orteils.—Goutte doulourcuse aux pieds — Lancinations et douleur d'excoriation dans les cors aux pieds.

VERATRUM LUTEUM.

VERATR-LUT. — Hélonias dioica, Hélonie, Ellébore jaune. — Voy. HALE, Remèdes américains.

Pour les homosopathes allopathisants qui ne choisissent leurs médicaments que selon les recommandations conjecturales de quelques auteurs, ils doivent être très-contents d'avoir, avec cette substance, un nom de plus à ajouter à leur formulaire empirique. Mais pour les vrais homosopathes, qui veulent agir d'après des indications sûres et positives, cette substance est aujourd'hui encore comme si elle n'existait point, attendu que les soi-disant pathogénésies qu'on en a données jusqu'ici, sont faites dans des termes tellement vagues que les renseignements que nous donnent les pharmacodynamies de l'ancienne école sur les effets, par exemple, de la bryone, de la pulsatille, de la noix vomique, etc.. peuvent encore être regardés comme des indications précieuses à côté de celles-là. — Cependant, puis-



VERATRUM VIRIDE. — VERBASCUM.

749

que des lecteurs qui sont dans l'ignorance la plus complète de ce que l'homosopathie transatlantique nous a réellement fourni ou non. nous demandent à grands cris d'insérer ce médicament dans notre manuel, nous leur dirons que, même selon Halz, on n'a fait, jusqu'ici, que le recommander contre les affections suivantes:

Distite sucrée (où en le dit diminuer le sucre dans l'espacé de peu de jours en l'associant au quinine et à l'huile de foie de morus); anémie et atenie générales; albuminurie; état torpide des parties sexuelles de la femme; aménorrhée, dysménorrhée, métrorrhagie, chute de la matrice, et autres faiblesses des parties génitales féminines.

VERATRUM VIRIDE.


VERATR-VIR. - Ellebore vert. - Voy. HALE, Remèdes américains.

Cette substance, qui ne paraît pas beaucoup différer du veratrum album, a été employée, jusqu'ici, avec assez de succès contre: Convulsions de diverses natures; Opisthotonos; Épilepsie; Éclampsies puerpérales, avec délifes furibonds et sueur froide, visqueuse; ou avec grande surexcitation du système vasculaire, alternant même avec manie; Rhumatismes, surtout de l'épaule gauche, de la hanchet du genou; Endocardite rhumatismale; Péricardite, avec défaillance, en se levant de la position couchée et en marchant; Pacumonie commençante avec pouls dur, plein et fréquent, ou bien avec pouls régulièrement intermittent, et sensation de faiblesse ou de défaillance dans le creux de l'estomac.

VERBASCUE.

VERB. — Bouillon-blane. — HARNEHANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 308. — Dose usitée : 30. — Durée d'action : 4 à 5 jours.
Antidote : Camph.
Comparer avec : Plat. stann.

CLINIQUE. — On verra les cas où ce médicament pourra être consulté contre des Toux caterrhales, surtout ches les enfants. seule affection dans laquelle on l'ait jusqu'ici employé.



VERBASCUM. - VIOLA ODORATA.

751

Ventre. — Ballonnement du ventre. — Pression forte et douloureuse, sur l'ombilic, comme par une pierre, soulagée en se courbant. — Constriction crampoide du bas-ventre, vers la région
ombilicale. — Maux de ventre qui s'étendent profondément vers
le bas, avec envie d'aller à la selle et contraction spasmodique
de l'anus. — Pincements et tranchées dans le ventre. — Élancements dans le ventre, principalement dans la région ombilicale,
quelquefois déchirants, et se dirigeant vers le bas. — Sensation
comme si les intestins étaient adhérents à la région ombilicale et
qu'on les arrachât.

Selles et Urines. — Selles supprimées. — Selles dures, comme des crottes de mouton, avec efforts. — Besoin fréquent d'uriner, arec

émission abondante. — Pollutions.

Inrynx. — Sensation d'obturation du larynx et du nez, avec *enrouement en lisant à haute voix. — Catarrhe, avec enrouement
et poitrine chargée. — Toux, surtout le soir et la nuit, en dormant, généralement âpre et sèche, ou creuse et sourde.

Poitrine et Trenc. — Élancements dans la poitrine, quelquesois avec oppression et étoussement de la respiration. — Tension dans la poitrine, avec lancinations dans la région du cœur, le soir. après s'être couché. — Lancinations dans le dos et les omoplates. — Nodosité rouge près du cartilage xyphoide, douloureuse en

pressant dessus.

Extrémités. — Déchirement à l'épaule, dans le dos de la main et le coude. — Pression crampoide dans l'avant-bras, la main et le pouce. — Élancements déchirants dans la main et les doigts. — Douleur tensive dans le poignet. — Douleur de luxation dans l'articulation de la main. — Douleur paralytique dans les articulations des doigts. — Pessanteur excessive et lassitude dans les jambes et les pieds, surtout en montant les escaliers. — Pression crampoide dans les cuisses, les jambes et la plante des pieds. — Tremblement des genoux. — Lancinations sourdes dans la rotule. les os du pied et les orteils. — Déchirement le long des jambes.

VIOLA ODORATA.

VIOL-OD. — Violette de mars. — Archives de STAPF. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homosop., p. 311. — Doses usitées : 9 à 30 ? — Durée d'action : 2 à 4 jours.
ANTIDOTE : Camph.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a encore employé ce médicament que contre des souffrances hystériques.



VIOLA ODORATA.

752

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Relâchement de tous les muscles. — Douleurs tractives dans les membres. — Douleur de brisement dans toutes les articulations, le matin, au réveil. — Tremblement des membres. — Brûlement et chaleur fugace à diverses parties. — Les souffrances sont douces, mais cependant très-distinctes et les mêmes dans toutes les positions. — Bâillement tous les matins, avec larmoiement. — On est couché sur le dos, la nuit pendant le sommeil, la main gauche passée sous la tête et les genoux pliés. — Horripilation fébrile. — Sueur nocturne. — Mélancolie sombre et tristesse. — Humeur hystérique, avec pleurs continuels, sans qu'on sache pourquoi. — Eloignement pour la conversation. — Faiblesse excessive de la mémoire, et oubli. — Grande affluence d'idées mobiles et incomplètes. — Perspicacité remarquable et forte activité du cerveau. — Prédominance de l'intelligence sur le sentiment et le cœur.

Tête, — Embarras sourd et douloureux dans la tête. — Vertige tournoyant, même en étant assis. — Céphalalgie, parfois avec crampes dans les yeux, et cercles lumineux devant la vue. — Pesanteur de la tête, avec sensation de faiblesse dans les muscles de la nuque. — Congestion de sang à la tête, avec picotements dans le sinciput. — Tension dans les téguments de la tête, s'étendans le sinciput. — Tension dans les téguments de la tête, s'étendans le sinciput.

dant jusque dans la face, le nez et les oreilles, forçant souvent à froncer les sourcils. — Ardeur dans le front.

Yeux. — Crampe des paupières. — Les yeux se ferment, comme par une sensation de sommeil dans les yeux et les paupières. — Pesanteur des paupières. — Sensation comme si le globe de l'œil était comprimé. — Ardeur et sensation brûlante dans les yeux. — Myopie. — Flammes devant les yeux.


Oreilles. — Élancements dans les oreilles. — Aversion pour toute espèce de musique, principalement pour le violon. — Bruissement

et tintement devant les oreilles.

Nez — Selles. — Torpeur au bout du nez, comme s'il avait reçu un coup. — Douleur faciale, avec pression tractive aux pommettes. — Tension dans les téguments de la face, surtout au-dessous des yeux. — Déchirements dans la mâchoire inférieure, se dirigeant vers l'oreille. — Odontalgie, avec douleur déchirante dans les dents inférieures. — Constipation avec envie inutile d'aller à la selle. — Pollutions, suivies de maux de tête.

Larynx — Extrémités. — Respiration difficile et à peine sensible, avec expiration douloureuse, angoisse excessive et battement de cœur violent. — Haleine courte. — Forte oppression de poitrine et dyspnée, avec pression sur la poitrine, comme par une pierre. — Tension dans les muscles du cou. — Douleur tractive dans l'articulation du coude et le dos de la main. — Douleur pressive dans

le poignet.



VIOLA TRICOLOR.

75::

VIOLA TRICOLOR.

VIOL-TR. - Pensée. - Archives de STAPF. - Hist. nat. et prép. Voy. Pharmachomocop., p. 311. - Doses usitées : 9, 30. - Durce d'action : 8 à 45 jours.
ANTIDUES : Camph.

CLINIQUE. — Jusqu'ici on n'a employé ce médicament que contre quelques cas de *Croûtes de lait*.


symptomes généraux. — Accablement, quelquefois comme si on n'avait pas assez dormi. — Douleurs lancinantes dans les membres. — Éruption miliaire sur tout le corps, avec sensation lancinante, rongeante. — Envie de dormir l'après-midi. — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — Sommeil tardif par affluence d'idées, avec difficulté de se réveiller, le matin. — Réves vifs et érotiques. — Tressaillement des mains et rétraction des pouces, en dormant, avec rougeur de la face et chaleur sèche générale. — Disposition frileuse et froid au grand air. — Sueurs nocturnes. Tristesse sur ses affaires domestiques. — Précipitation. comme par une angoisse interne, avec sensation de grande faiblesse. — Envie de pleurer, mauraise humeur, morosité, avec éloignement pour la conversation. — Forte susceptibilité, et humeur querelleuse. — Désobéissance. — Éloignement pour le travail.

Tôte. — Tête entreprise et embarrassée. — Vertige et étourdissement en marchant. — Céphalalgie, depuis la racine du nez jusque dans le cerveau, se dissipant en plein air. — Pesanteur de la tête, qui la tire en arrière, principalement en se redressant, soulagée en se baissant. — Céphalalgie pressire, surtout dans le front et les tempes. — Élancements dans l'occiput, jour et nuit. — Ébran-

lement du cerveau, en marchant.

Yeux. — Douleur dans les yeux, comme si un corps dur se trouvait entre la paupière supérieure et le globe de l'œil. — Cuisson et élancements incisifs et pruriants dans l'œil. — Contraction et occlusion des paupières, avec envie de dormir. — (Myopie.)

Pace. — Chalcur de la face, la nuit; au lit, quelquesois semi-latérale, à la joue sur laquelle on n'est pas couché. — Peau épaisse et dure à la face. — *Croûtes à la face, avec prurit brûlant, surtout la nuit, et suintement d'un pus jaune et visqueux. — Tension dans les téguments de la face et du front. — Mal de gorge, le soir. — Langue chargée de mucosités blanchâtres, avec goût



VIOLA TRICOLOR. — ZINCUM.

amer.—Accumulation de salive dans la bouche, avec sensation de sécheresse.

Estomac. — Perte de l'appétit et insipidité des aliments. — Après le repas, chaleur générale, surtout à la face (avec sueur), oppression de poitrine et forte angoisse qui ne permet pas de rester en

place. — Nausées et vomituritions. Ventre. — Maux de rentre, avec douleurs incisives, au point de pousser des cris, avec besoin d'aller à la selle et expulsion abondante de vents et de grosses masses de mucosités. - Élancements dans le ventre. — Elancements pressifs dans le diaphragme.

Selles. - Selles avec évacuation de mucosités et abondance de vents. - Selles molles, comme hachées. — Selle dure. — Besoin trèspressant d'aller à la selle.

Urines et Parties génitales. - Besoin d'uriner, avec émission abondante. - Ténesme de la vessie. - Urine brûlante. - Urine fétide; comme celle des chats. — Urine très-trouble. — Lancinations dans l'urèthre.— Élancements et pression dans la verge, se dirigeant vers le gland. - Sensation brûlante dans le gland. -Prurit et gonflement du prépuce. — Érections. — Pollutions. — Leucorrhée.

754

Poitrine — Extrémités. — Elancements dans la poitrine. — Oppression et lancinations dans la région du cœur, en se tenant courbé lorsqu'on est assis. - Angoisse au cœur, en étant couché, avec palpitations de cœur. - Douleur crampoïde et contraction, avec pincement dans les omoplates.—Gonflement des glandes du cou. — Lancinations dans les articulations de l'épaule, les coudes, les avant-bras et les doigts. — Douleur de brisement dans les cuisses, le matin, au réveil. - Fléchissement des genoux en marchant, avec traction dans les mollets et les cuisses. - Tressaillement des muscles dans les mollets. — Élancements dans les rotules, le tibia et les pieds.

ZINCUM.

iC. — Zinc. — Нанивнани. — Hist, nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop., . 149. — Dose usitée: 30. — Durée d'action: 30 à 40 jours dans les affec-


ANTIDOTES : (amph. hep. ign. - Le zinc est l'antidote de : bar-c. -

vin, ainsi que chum, et n-vom., aggrave les souffrances.

COMPARER AVEC: Ant. arn. bell. canth. carb veg. hep. ign. plumb. puls.

sep. stram. sulf.

CLINIQUE. — Étant indiqué par l'ensemble des symptômes, ce médicament pourra quelquefois être utile dans l'un ou l'autre cas



ZINCUM.

755

des affections suivantes: — Luxations spontanées; Paralysies; Dartres; Amblyopie amaurotique; Gonflement inflammatoire du nez; Coliques venteuses; Gravelle et calculs rénaux??; Orchite?; Disposition à l'avortement, avec nausées aux parties?; Nymphomanie des femmes en couche? Hydrocéphale des enfants; Scarlatine.

Voy. la note, page 15.

SYMPTOMES GENERAUX. - Déchirement dans les membres. aggravé toutes les fois que l'on s'échauffe ou qu'on se donne de l'exercice. - Déchirement tractif dans la cavité des os, avec douleur tellement forte que les membres n'ont aucun soutien. -Douleur d'excoriation. — Douleur crampoide et crampe dans lemembres. - Frémissement visible et tressaillement à diverses parties des muscles. — Fourmillement dans les membres. — Varices. - Douleurs qui semblent quelquefois être entre cuir et chair. — Les symptômes sont aggrarés extraordinairement par la camomille, la noix vomique et le vin, substances qui les provoquent aussi, particulièrement l'agitation nocturne et la constipation. - La plupart des symptômes se manifestent après le diner et vers le soir. - *Insensibilité générale du corps. - Sensation de froid dans les os. - Pulsation violente dans tout le corps. - Tremblement violent de toui le corps, particulièrement après toute émotion morale. - Pesanteur, lassitude et faiblesse excessire, principalement en marchant ou le matin au réveil. -•Répugnance pour le mourement.


Peau. — Prurit dans les articulations. — Prurit, avec lancinations violentes, surtout le soir au lit, se dissipant immédiatement au toncher. — Fourmillement entre cuir et chair. — Éruptions chroniques. — *Dartres et ulcères dartreux. — *Ganglions. engelures et disposition des parties externes à se geler. — *Rhagades. — Petits furoncles. — °Éruptions opiniatres. — °Affections hydropiques avec douleurs néphrétiques. — °Scarlatine

arec affections cérébrales.

Sommeil. — *Sommeil le jour et envie continuelle de dormie.
surtout le matin, ou après le repas, -avec besoin de bailler. —
Sommeil tardif. — Sommeil agité, avec réveil fréquent. — *Sommeil non réparateur. — *Rêres funtastiques, effrayants, agités,
ou dégoûtants et épouvantables, avec paroles et cris pendant le
sommeil. — Froid excessif aux pieds, la nuit. — Secousses dans
le corps, pendant le sommeil, et sursants fréquents.

Pièvre. — Horripilation fébrile le long du des. — Frissonnement continuel, avec accroissement de chaleur intérieure. — Horripilation fébrile, avec chaleur fugace: tremblement riolent des membres; haleine courte et chaude, et pulsation dans tout le corps. — *Disposition à transpirer le jour. — *Sueurs nocturnes.

Moral. - Humeur hypocondriaque. - *Pensée de mort, comme si



ZINCUM.

757

lèvres et des commissures des lèvres, avec ulceration interieure.

— Mucosités épaisses, visqueuses sur les lèvres. — Éruption peuriante et rougeur au menton.

Dents. -- Odontalgie pendant la mastication. - Odontalgie dichirante, lancinante ou tractive, surtout dans les dents molaires. -*Douleur d'execuiation aux dents. -- «Vacillement des dents.

— Saignement abondant des dents et *des geneives. - Geneives blanches, gonflées, avec douleur d'excoriation. - Ulcères aux geneives.

Bouche. — Ulcères dans la bouche, petits, jaunes, à la face interne des joues. — Fourmillement à la face interne des joues et sécrétion abondante de salire, avec goût métallique. — Vésicules sur la langue.


Gorge. — Déchirements tractifs dans le fond du gosier, plus souvent hors que pendant le temps de la déglutition à vide. — Sensation de rétrécissement et crampe dans l'osophage, à la région de la fossette du cou. — Sécheresse et âpreté dans le palais et la gorge, avec cuisson et grattement. — Douleur d'excoriation dans la gorge. — Accumulation abondante de mucosités dans la gorge. — Dartres blanchâtres dans la gorge, après des gonorrhées.

Appétit. — Goût de sang dans la bouche. — *Goût salé dans la bouche. — Forte soif. — Diminution de l'appétit. — Faim vive et roracité insatiable. — Répugnance pour la viande (le veau), les douceurs, le poisson, les aliments cuits et chauds. — Après avoir mangé du pain, pression de l'estomac, avec nausées. — Aprèle repas, humeur hypocondriaque, avec pression sous les fausses côtes, étouffement, griffement dans le ventre, et plénitude, pression, ou brûlement de l'estomac.

Estomac. — Renvois avec douleur pressive dans la poitrine.
Renrois aigres, après le repas, surtout après avoir pris du lait.

--Pyrosis, après des choses sucrées. -- Hoquet, surtout après le déjeuner. — Nausées, avec vomiturition et vonissements de mucosités amères, renouvelés par le plus léger mouvement. — Vomissement de sang. — Pression à l'estomac. — Sensation pénible au cardia et le long de l'œsophage. — Serrement et pression dans le scrobicule. — Déchirement et élancements dans le scrobicule. — Sensation brâlante dans l'estomac.

Ventre. — Douleurs crampoïdes dans les hypocondres, alternant avec oppression de poitrine. — Forte pression dans les hypocondres et les côtés du ventre, aggravée par le mouvement et la marche. — Serrement, pression et élancement dans la région hépatique. — Élancements dans la région de la rate. — Pression, élancements et douleurs d'excoriation dans la région des reins. — Maux de ventre, le soir, après s'être couché. — Forte pression et tension dans le ventre (et les côtés), avec ballonnement. — Sensation de malaise produite par une pression sur les



ZINCUM. -- MAGNES ARTIFICIALIS.

Poitrine. — Gêne de la respiration et appression avec douleur pressive dans la poitrine, surtout le s in. — Dyspinée si ismadique. — Haleine courte, par des flatu sites, après le repas. — Poitrine chargée de mucosités. — Pression à la poitrine. — Douleur tensive au sternum. — Dechirement à la poitrine. — Élancements dans la poitrine, surtout dons la relation du court. — Sensation brûlante dans la poitrine. — Tourement de court. — avec et sans angoisse. — Mouvements irreguliers du court. — Secousses au cœur et intermittence des battements arec étouffement.

Tronc. — *Douleur aux reins, surtout en marchant et en s'asseyant. — Sensation de faiblesse paralytique dans le dos et aux reins. — *Douleurs rhumatismales dans le dos. — Dartre pruriante au dos. — Tension et élancements dans et entre les omoplates. — Déchirements lancinants, roideur et tension dans la nuque et le cou.


Bras. — *Traction rhumatismale et déchirement lancinant dans les épaules, les bras, les coudes, les articulations de la main, les mains et les doigts. — «Sensation douloureuse de paralysie dans les bras. — Furoncle aux bras. — Palissement et paralysie des mains. — Faiblesse et tremblement des mains, en ecrivant «Taches dartreuses, râpeuses et pruriantes aux mains. — *Peau sèche, avec rhagades aux mains. — Gerçures entre les doigts. — «Engourdissement des doigts, le matin en se levant.

Jambes. — Tractions rhumatismales et déchirement dans les jambes, les genoux, les articulations du pied et les pieds. — Variees aux cuisses et aux jambes. — Deuleur tensive dans les genoux. — Douleurs nocturnes dans les genoux. — Sensation comme si le sang ne circulait pas dans les jambes. — Traction et roldeur tensive dans les mollets, en marchant. — Fourmillement dans les mollets. — Inflammation érysipelateuse et gouffement du tendon d'Achille. — Roldeur de l'articulation du pied, après avoir eté assis. — Douleur de l'uxation dans les articulations du pied et des orteils. — Sensation brûlante dans les pieds. — Comfement inflammatoire des pieds. — Faiblesse et tremblement des pieds. — Paralysie des pieds. — *Engelures douloureuses aux pieds. — Prurit, chaleur, rougeur et gonflement des orteils, comme s'ils étaient gelés. — Lancinations pulsatives dans les orteils.

MAGNES ARTIFICIALIS.

MGS. — Aimant artificiel. — HABNEMANN. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop. Emploi: Le malade touche le pôle Nord ou le pôle Sud pendant une minute, du bout du doigt. — Durce d'action: 40 à 14 jours dans quelques cas de maladies chroniques.

ARTIDOTES: Ign. zinc, et le pôle oppose.



MAGNETIS POLI AMBO.

761

Bourdonnement d'oreilles. — Diminution de l'ouïe. — Aberration de l'odorat; on sent une odeur de fumée ou de moisi.

Face. — Sueur à la face, sans chaleur, le matin. — Déchirement tressaillant dans la mâchoire supérieure. — Forte lancination brûlante dans les muscles de la face, le soir. — Gonfiement des lèvres, le soir, avec salivation. — Petits boutons, avec douleur de plaie sur les lèvres.

Dents. — Odontalgie, après avoir bu froid, ou par le contact de l'air froid. — Odontalgie pressive, tressaillante, par secousses isolées. — Odontalgie dans les dents cariées, avec gonflement des gencives.

Appétit. — Haleine fétide. — Goût métallique dans la bouche. — Insipidité du tabac et de la bière. — Goût de moisi de diverses choses. — Satiété prompte. — Faim prononcée le soir.

choses. — Satiété prompte. — Faim prononcée le soir.

Estomas. — Renvois avortés. — Renvois avec odeur et goût de râclure de corne. — Régurgitation d'aigreurs, en se baissant. — Pression à l'estomac, avec crampes se dirigeant vers les parties supérieures, agitation qui ne permet de rester nulle part, pesanteur de la langue, pâleur du visage et froid du corps.


Ventre. — Pression et plénitude anxieuse dans le ventre, surtout pendant une tension d'esprit. — Grondements bruyants et borborygmes dans le ventre. — Production abondante de flatuosités. — Colique flatulente. — Expulsion de flatuosités, avec pression douloureuse.

Selles. — Constipation, comme par rétrécissement du rectum. — Diarrhée sans douleur, avec flatuosités. — Douleur hémorrhoidale, cuisante à l'anus, après la selle, aveç constriction dans le rectum. — Hémorrhoides aveugles. — *Chute du rectum.

Parties génitales. — Sensation brûlante dans la région des vésicules spermatiques, qui excite au coît. — Défaut d'intensité de l'appétit vénérien et répugnance pour le coît. — Erection, sans pensées érotiques. — Rétraction du prépuce derrière le gland. — Gonflement de l'épididyme, avec douleur pendant le mouvement et au toucher. — Règles trop hâtives, trop abondantes et de trop longue durée.

Poitrine. — Quintes de toux sèche, la nuit. — Toux crampoïde, surtout après minuit, en veillant ou en réfléchissant. — Dyspnée nocturne provoquée par des mucosités dans la trachée-artère, qui, le matin, se détachent facilement.—Lancinations brûlantes, insupportables, dans les muscles de la poitrine.

Trone et Extrémités. — Tressaillement dans l'épine dorsale, comme par quelque chose de vivant. — Sensibilité douloureuse de l'articulation du sacrum, le matin, au lit, en étant couché sur le côté, ou le jour, en se courbant. — Douleur de luxation dans l'articulation de l'épaule, ou comme le soubresaut d'un tendon, au poignet. — Douleurs tractives dans les articulations et les muscles des bras, souvent depuis la tête jusque dans les doigts.



762 MAGNETIS POLI AMBO. - MAGNETIS POLUS ARCT.

--Tressaillement déchirant dans les muscles du bras, après avoir séjourné au froid. -- Taches rouges dans la paume des mains, comme des vésicules. -- Accès de crampes dans les mollets et les orteils, le matin, après le réveil. -- Lancinations brûlantes dans les talons et les cors aux pieds.

B. - MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

MGS-ARC. — Pôle Nord de l'aimant. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homeop., p. 331.


Antibotes: Mgs-aus. ign. zinc.

CLINIQUE. — On a jusqu'ici employé ce remède contre: — Surcxcitation nerveuse; Odontalgie nerveuse, et Prodromes d'une hernie inguinale.

BYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Grande lassitude et courbature dans tout le corps, avec abattement, surtout le matin et en plein air, comme quand il fait un temps étouffant. — Sensation tractive dans le périoste de tous les os, comme au début d'une fièvre intermittente. — Lancinations fouillantes qui sont d'autant plus douloureuses qu'elles sont plus profondes, à diverses parties du corps. — Secousses lancinantes, battement, tremblement, froid et sensation comme si le sang se portait vers les parties touchées par l'aimant. — Surexcitation, acec tremblement, agitation inquiète dans les membres, et grande faiblesse nerveuse. — Fourmillement et prurit lancinant à la peau. — Sensation brûlante ou déchirement brûlant dans les dartres. — Punaris.

Sommeil. — Baillements violents, spasmodiques, avec douleur dans l'afticulation maxillaire, comme si elle allait se luxer. — *Forte envic de dormir, le jour. — Somnolence. — Sommeil profond, la nuit, pendant lequel on est généralement couché sur le dos. — Affluence de rèves vifs (quelquefois lascifs) et chants, pendant le sommeil. — Réveil, le soir, après qu'on s'est endormi, par une secousse violente dans la tête et les muscles du cou. — Jactation pendant le sommeil, avec chaleur pénible et besoin de se decouvrir, sans soif. — Le matin, réveil incomplet, avec pleine conscience de soi-même, mémoire vive, grande affluence d'idées et réflexions sur un sujet important.

Pièvro. — Sensation de froid ou fraîcheur sur tout le corps. —
 Disposition frileuse. — Fraicheur dans les mains, avec sueur fraîche à ces parties et sur tout le corps. — Horripilation suivie



MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

763

de chaleur de courte durée et de gonflement des veines des mains. — Sensation de chaleur sur tout le corps avec mains froides et froid aux extrémités inférieures.

Moral. — Maussaderie et envie de pleurer, avec frisson. — Caractère doux, soumis. — Paresse, comme si on avait perdu la faculté de se mouvoir, en étant assis. — Irrésolution, suivie d'une prompte exécution de ce qu'on a enfin résolu. — On parle haut, tout seul, pendant ses occupations. — Humeur changeante. — Hésitation anxieuse et caractère inquiet. — Perte des sens. — Perte des idées. — Faiblesse de la mémoire. — On se trompe facilement en écrivant.

Tête. — Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en se promenant en plein air et manque de solidité en se tenant debout. — Tiraillement semi-latéral avec vertige, depuis le milieu de la tête jusque vers les oreilles, comme le balancier d'une pendule. — Céphalalgie en levant et en remuant les yeux. — Céphalalgie déprimante, comme par un fardeau. — Céphalalgie comme si le cerveau allait éclater. — Tension des téguments de la tête, comme s'il étaient trop adhérents au crâne.

Yeux. — Yeux proéminents et fixes. — Froid glacial des yeux (faibles). — Mouvements inquiets des yeux. — Lancinations, prurit et traction tressaillante dans les paupières, avec larmoiement. — Sensation de sécheresse douloureuse des paupières, le

matin, au réveil.

Oreilles et Nez. — Bruissement dans les oreilles, et chaleur intérieure, comme par de l'eau bouillante. — Surdité comme si on avait un bandeau sur l'oreille. — Aberration de l'odorat, comme si l'on sentait des œufs pourris, ou du plâtre frais et de la poussière. — Épistaxis, précédée de céphalalgie pressive dans le front. — Rougeur et chaleur du bout du nez, suivie de taches rouges, chaudes et fortement circonscrites sur les joues.

Pace. — Paleur du visage. — Tension à la face. — Serrement douloureux dans l'articulation des mâchoires, avec sensation pendant le mouvement, comme si elles étaient luxées. — *Gonflement

d'une seule joue. - Trismus.

Dents. —*Odontalgie dans les dents cariées, par intervalle, comme si on les arrachait. — *Douleurs dans les dents cariées avec gencives gonflées et douloureuses au toucher. — *Douleurs dans les dents (cariées), augmentées après le repas, et à la chaleur, soulagées au grand air et en marchant. — *Odontalgie, avec joues rouges, chaudes, gonflées. — *Odontalgie avec secousses qui traversent le périoste de la mâchoise, ou avec douleurs tractives, pressives, ou bien déchirantes, fouillantes, ou brûlantes, lancinantes. — Dents incisives agacées, en respirant par la bouche. — Torpeur et insensibilité des gencives après la cessation des maux de dents.

Estomac. - Perte du goût. - Goût acidulé dans la bouche.



764 MAGN, POLUS ARCT. - MAGN, POLUS AUSTRALIS.

Goût amer du tabac. — Renvois à vide, fréquents. — Pyrosis continuelle, surtout après le souper. — Voracité le soir.

Ventre. — Production abondante et incarcération de flatuosités. — Colique flatulente, pressive. — Secousses dans l'abdomen, comme si quelque chose y tombait, ou coups partant du ventre et remontant dans la poitrine et jusque dans la gorge. — Ballonnement du ventre. — *Pression et térébration vers l'anneau inguinal, comme pour une descente, avec relâchement de l'anneau inguinal.

Selles — Règles. — Resserrement opiniâtre du ventre et constipation. — Selle dure, d'un moule volumineux, difficile à évacuer, souvent précédée de douleurs tractives, dyssentériques, dans le bas-ventre. — Sécrétion plus abondante d'urine. — Urine forcée. — Érections immodérées, avec pollutions fréquentes. — Excitation au coît. — Règles trop faibles. — Suppression des règles.

Larynx. — Toux suffocante, sèche, asthmatique, aggravée par la marche en plein air. — Toux spasmodique, ébranlante, le soir, en s'endormant, empêchant de dormir. — Toux spasmodique, suffocante, vers minuit, produite par une irritation dans les bronches, ébranlant la tête et tout le corps, et provoquant la chaleur jusqu'à ce qu'il s'ensuive une sueur générale, avec cessation de la toux. — Besoin continuel de tousser, le soir, qui he se peut


dissiper qu'en retenant la toux.

Tronc. — Extrémités. — Douleurs de brisement dans le dos, en se renversant. — Craquement dans les vertèbres cervicales pendant le mouvement. — Inflammation du dos de la main, avec douleur pulsative. — Pesanteur dans les bras, les mains et les doigts. — Douleur de brisement dans l'articulation coxo-fémorale et les membres inférieurs. — Grande lassitude dans les membres inférieurs; on dirait qu'ils vont se briser en marchant. — Douleur d'excoriation dans les orteils et les cors aux pieds.

C. - MAGNÉTIS POLUS AUSTRALIS.

MGS-AUS. — Pôle Sud de l'aimant. — Hist. nat. et prép. Voy. Pharmac. homœop. ANTIDOTES: Mgs-arc. ign. zinc.

CLINIQUE. — On a jusqu'ici employé ce remède contre: — État paralytique du col de la vessie; Impuissance; Varice des femmes enceintes et Panaris.



MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

765

SYMPTOMES GÉNÉRAUX. — Tractions dans les doigts, les articulations des doigts et des pieds et les malléoles. -- Douleurs lancinantes, pulsatives dans les racines des ongles, comme si elles allaient entrer en suppuration. — Douleurs avec pincements ou lancinations brûlantes, à diverses parties du corps. — Douleur de brisement dans les membres et leurs articulations, comme si on était couché sur des cailloux. — Disposition à prendre des refroidissements. — Disposition du nez, des orteils, des mains et des pieds à se geler par un froid peu intense. — Lassitude subite en se promenant, avec anxiété et chaleur, ou besoin subit de dormir.

Sommeil. — Forte envie de dormir, le soir et le matin; on ferme les yeux, sans pouvoir s'endormir. — Insomnie, avec surexcitation avant minuit. — Rêves confus, effrayants. — Rêves prolongés sur un même sujet, avec fatigue de la méditation. — Expiration lente, bruyante, ronflante, avant minuit; après minuit, il en est de même de l'inspiration. — On est couché sur le dos pendant la nuit. — Le matin, congestion sanguine à la tête, qui force à être couché la tête haute.

Fièvre. — Horreur excessive du grand air, lequel pénètre jusqu'à la moelle des os, lors même qu'il fait chaud, avec mauvaise humeur et envie de pleurer. — Horripilation, avec obscurcissement devant les yeux, tremblement et jactation des membres, sans frisson, suivi de chaleur à la tête et à la face.

Moral. — *Morosité et mauvaise humeur, avec éloignement pour la conversation. — Éloignement pour la société et les visages riants.

- Emportement et colère. — Instabilité des idées.

Tête et Gorge. - Vertige, comme par ivresse, avec chancellement en marchant. — Pesanteur, fourmillement et fouillement dans la tête. — Secousses dans la tête, quelquefois avec déchirement. -Sécheresse et cuisson aux paupières, surtout en les remuant, et -principalement le soir et le matin. — Larmoiement. — Amblyo- Odontalgie déchirante, tressaillante, aggravée par les choses chaudes. — Accumulation de salive aqueuse dans la bouche. - Parole embarrassée, comme par gonflement de la langue. --Sensation brûlante dans le gosier.

Estomac. — Goût métallique, tantôt douceatre, tantôt acidulé, sur et sous la langue. — Goût trop peu prononcé de tous les aliments. - Indifférence excessive pour les aliments, les boissons et le tabac à fumer. - Boulimie à midi et le soir, quelquefois pendant les frissons fébriles. - Pression dans le scrobicule pendant

une tension d'esprit.

Ventre. — Pincement dans le ventre par un courant d'air. — Borborygmes bruyants et grondement dans le ventre. - Colique flatulente, pressive, avec pincements et ballonnement du ventre. - Sensation de dilatation de l'anneau inguinal, comme pour une descente, avec sensibilité douloureuse de cette partie, chaque fois que l'on tousse.



MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

Selles. – Selles molles, diarrhéiques, précédées de tranchées. — Évacuation d'une selle liquide, avec sensation comme si on allait expulser un vent. — Rétrécissement et constriction douloureuse du rectum et de l'anus, qui ne permettent pas d'expulser un vent.

Urines. - *Emission involontaire des urines par paralysie du sphineter de la ressie, surtout la nuit. - Emission d'urine goutte à goutte, avec torpeur de l'urêthre. - Jet d'urine très-

faible. - *Émission fréquente d'urine, la nuit.

766

Parties génitales. Forte disposition des parties génitales à l'éjaculation. - *Impuissance, arec disparition subite de toute jouissance au moment de la plus forte exaltation. — Douleur dans la verge, comme si quelques fibres se déchiraient ou étaient, arrachées. - Rétraction douloureuse des testicules, la nuit. — Gonflement des testicules, avec secousses déchirantes et sensation d'étranglement dans ces parties. — Règles trop hâtives et trop abondantes. - Métrorrhagie.

Poitrine. — Toux et coryza, avec expectoration de mucosités verdâtres et haleine courte. — Quintes de toux fétide, la nuit, en dormant. — Besoin de respirer profondément, comme des soupirs, avec déglutition involontaire. — Oppression de poitrine, comme si la respiration était tremblante et qu'elle produisit une impression de fraicheur. — Pression tractive des deux côtés du sternum, avec angoisse de conscience qui ne permet de rester nulle part. — Buttement de cœur violent. — Battements au œur; il semble que ce ne soit pas le cœur même qui batte.

Tronc. - Douleur pressive, brulante dans les reins, pendant le repos et le mouvement. -- Douleur de brisement et de luxation

dans les jointures du sacrum et des vertèbres lombaires.

Bras. - Fourmillement le long du bras, comme de légères secousses, - Tressaillement douloureux et prompt le long du bras. - Pesanteur et lassitude dans les bras. - Gargouillement le long des bras et des veines du bras. - Fourmillement et battement dans le bout des doigts. - *Panaris.

Jambes. Battement tressaillant dans les tendons du jarret, avec contraction des jambes, surtout pendant le mouvement. — Déchirement pressif dans les rotules. — Battement dans les muscles des pieds, après avoir marché. — Fléchissement des genoux pendant le mouvement. — Luxation facile de l'articulation du pied, en faisant un faux pas. — Sensibilité et douleur de plaie, à l'ongle du gros orteil. — *Les ongles des orteils entrent dans les chairs. — «Varices.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES INDICATIONS CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Abcès, hep. lach. merc. phos. sulf. sil. chauds ou inflammatoires. merc.

bell. cham. puls. phosph. Adipsie. roy. Soif nulle.
-froids ou chroniques, hep. sil. sulf. Aérophobie camph. caus. cocc. coff. calc.

Abstinence sexuelle (mal par l'). con. Accès nerveux n-vom, sep. carb-vg. natr-m. sil. plat sulf. Accouchement laborieux. puls. sec.

cham. coff. n-vom. op.

· adhérence du placenta (avec). puls. sec. plat.
- douleurs absentes (avec). puls. sec.

op. - douleurs vaines, coff. n-vom

douleurs consécutives trop fortes.

métrorrhagie. croc. plat. chin. sabin.

convulsions. hyosc. ign. - spasmes, c bell. cham.

Acide hydrocyanique (mal par l'). coff. ipec. n-vom. - nitrique hep.

nitrique neb.
 phosphorique coff. lach.
 sébacique bry phos-ac.ars. kreos.
 sulfurique, puls.

Acides mal par l'usage des). acon. lach. n-vom sep. staph. — diarrhée staph. bry. n-vom. ant. — exanthèmes. bell. rhus.

- fièvre lach bell.

Acné. bell. carb-vg. hep. sulf. led. — indurée. bell. carb-vg.

phos-ac. sulf.

Acné ponctuée. sulf. dros. selen. rosacée, carb-an. rhus. reta.

verat. vermiforme. natr. selen. nit-ac.

sulf.

n-vom. sulf Affliction (s tites d'une'. ign. phos-ac.

Agés (maux des sujets). amb. aur. baryt. con. op sec Agilité du corps augmentée. coff.

stram. Agitation nerveuse. acon. coff. n-yom. cham. ars.

Aigreurs. puls. n-vom. calc. chin.

sulf phosph. phos ac. ir chaud (mal par l'), carb-veg. ant. bry puls. sulf. lyc.

courant (par l'). acon. bell. chin. sulf.

froid (par l'). ars. veratr. merc. dulc. rhus

· libre 'par l'). camph. n-vom. cocc. sulf. caus. coff.

du soir par l'). merc. sulf. carb-vg nitr-ac.

Aisselles affectées calc. hep. sil. sulf.

carb-an. lyc. sep - dartres. sep. lyc. carb-an.

 excoriation, mez. ars. carb-vg_zinc. glandes engorgées, sulf, calc, sil, hep, staph, carb an.

prurit, phosph. spig. anac. carb-an. sep. nitr-ac.


cné. bell. carb-vg. hep. sulf. led. - indurée. bell. carb-vg. - ivrognes (chez les). carb-vg. led. Alcalis mal par l'usage des, nitr-ac.

unes gens (chez les), bell. carb-Alcooliques (mal par les boissons sulf. vg sulf.

- libertins (chez les), carb-vg, calc.

Aliénation mentale, bell, hyos, op. stram, veratr. ars. cupr. n-vom.





Amygdales.suppuration.bell.hep.lach.; Anus: fistule. calc. sil. sulf. caus. merc. sulf. ulcération. merc. bell. lach. lvc. thui Amygdalite. roy. Amygdales. Anasarque. ars. hell. kal.chin.lyc. sulf.

Anémie. chin. fer. sulf. n-vom. ars. con. calc.

Anévrismes. carb-vg. lach. lyc. puls. guai. sulf. gine. acon. bell. merc. lach. sulf.

dulc. coff. aiguē, acon, merc, bell, dulc, coff, puls, ign, cham.

catarrhale, cham, merc, puls, dulc, hep. bell. sulf.

carb-vg. baryt. alum. amm.

couenneuse, bell. ars. baryt. sulfac. lyc. chin.

 flegmoneuse, bell, merc, lach, hep. dulc.

gangréneuse. ars. lach. amm. sulfac. carb-vg

- membraneuse, brom, merc, bell. sulf-ac. lyc. chin.

- mercurielle. bell. lach. hep. lyc.

sulf, nitr-ac - muqueuse. bell. puls. sulf. merc.

chin. palatine. acon. coff. merc. bell.

lach. pharyngée, merc. bell. canth. lach.

hep.

refroidissement (à la suite d'un). acon. merc. dulc. bell. – rougeole (à la suite de la). carb-vg.

puls. merc. ars. scarlatineuse, bell. sulf. ars. merc

syphilitique, merc. lyc. aur. nitr-ac. thui.

tonsillaire. bell. merc. hep. lach. kal, ign. traumatique. arn. acon. merc. cic.

bell. ulcération avec, merc. lach. bell.

lvc. nitr-ac. uvulaire. coff. acon. merc. bell. lach.

variolique, merc. bel. sulf. Anthrax, ars. lach. sil. bell. chin.

Anorexie. voy. Appétit perdu. Anus affecté, n-vom, sulf, calc, igu, acon, merc

– dartres, natr-m. pefr.

— douleur, ign. n-vom.

— écoulement muqueux. phosph.

merc, sep. graph.

- eruption, calc, kal, lyc, - exceriation, sulf, hep, merc, carb an, sep. carb-vg.

gonflement. hep. n-vom. sulf.

graph. paralysie, hyos, bell, acon, laur, - rhagades.agn, graph. ign. sulf.cham. prurit. acon. sulf. merc. calc. nitr-

ac. thui. zinc. baryt. suintement. carb-an. nitr-ac. carb-

veg. baryt.

tenesme, merc. sulf. n-vom. caps. ars. rhab. Anxiété, angoisse ars. bell. n-vom. acon. cham. merc.

Anthropophobie, ambr. hyos, puls,

baryt.

hep. bell. sulf.

Aphonic. voy. Voix perdue.
chronique. sulf. hep. lach. lyc. Apoplexie. bell. acon. arn. op. n-vom. lach, puls.
- agés chez les sujets), op. con. arn.

merc.

congestive. bell. lach. arn. op. n-

vom. acon.
- gastrique. ipcc. n-vom. puls.
- ivrogues (chez les'. n-vom. op. lach. puls. coff.
- nerveus. bell. hyos. camph. laur. semi-latérale (hémiplégie), coce.

lach, bell, n-vom, séreuse, arn. ipec. chin. dig. merc.

sulf. Appétit altéré, sulf. n-vom. ant. chin. sil. rhus. sep. cycl.

perdu, nul. sulf. n-vom. chin. sep. cycl. sil. puls. rhus.

perdu, avec faim, op. natr-m. rhus, bry, hell.

perdu, avec soif, natr-m, n-vom, nitr, phosph, sil.

variable, capricieux. natr-m. bry.

chin, ign. vorace, chin, veratr. cin, merc. sep.

mur-ac. Appréhensions, calc. acon. coff. bry. rhus, hvos.

Appuyant (mal en s'), sulf, nitr-ac, coloc. arn. cycl. hep. - un membre (mal en . con. arn. sil.

kal, bell, rhus, cin. Arraché douleur comme și quelque

close fut), rhus, plumb, n-vom. coloc, hep.
Arsenic mal par l'usage de l'), ipec,
n-vom, chin, veratr, hep.
Arthrite, acon, sulf, lye, arn, bell,
sass, n-vom, bry,

- aigue, acon, puls, ant, n-vom, bell,

ferr. bry. bons vivants (chez les', ant. calc, iod, puls, sulf, lye,



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

sthme (accès même pendant l'). camph. ipec. op. mosch. - agés (chez les sujets). op. lach. Arthrite chronique. lyc. sulf. sass. Asthme

770

caus. ant. puls.

- eau 'chez les ouvriers travaillant
dans l'i calc. puls. sass. sulf.

- estomac (dans l'). n-vom. ant. lyc.

puls. intestinale. bell. n-vom. ant. sulf.

puls. lyc.

noueuse calc. lyc. graph, ant. spiritueuses (par l'abus des bois-sons), n-vom, calc. sulf, acon.

tête (dans la), sep. puls. coloc. nvom. bell.

- vague, erratique. puls. n-vom. arn. mang. sulf. ac. - yeux /dans les). acon. bell. merc.

coloc. spig.

Arthrocace, coloc. phos-ac, calc, sil, sulf, merc. bry, rhus. Articulations affectées, acon, sulf, arn.

rhus, bry, merc, caus, cham, chin. eraquement. cocc. sulf. ant. petr.

- craquenten-caps, nitr-ac. - debottement facile, rhus, agn. sulf. carb-veg, ruta, lyc, n-vom, nitr-ac. - debutes, acon. arn. sulf. rhus.

bry, mere, caus, chin.

excoriation, sulf, cham, ign, mang, calc, puls, mere, lyc.

gonflement, acon, bry, sulf, lyc. sass, rhus, n-vom, bell,

inflammation, acon, sulf, arn, rhus, bry, mere, chin, cans, cham,

bry, merc, chin, caus, cham, rhagades, mang. roideur, rhus, l graph, sulf, rhod. lach, sep. cham.

graph. Sant. Float.

— sécheresse, puls. n-vom. canth. lyc,
phos-ac, croc.
Ascarides, voy. Vers intestinaux.
Ascite,aps.ars, sulf.chin.kal.bell.merc.

Aspirant (mal en . acon. squill. bry. sabin. rhus. kal. merc.

Asseyant (mal en s'). coff, valer. spong agn. hell. samb. ipec.

aga. nell, samb. spec. Asphyxie. chin. op. arn, bell. lach. — congélation (par suite de). bry. acon. carb-vg. ars. — coups sur la tête (à la suite de). arn.

chin. lach. - foudroyés (chez les). n-vom.

gaz (par l'inspiration des). op. acon. bell.

nouveaux-nés (chez les). tart. op. chin.

- noyés (chez les). lach.

- pendus (chez les). op. arn.

Assis (mal en étant). puls. asa. rhus. sep. plat. dulc. lyc. con.

Asthme, acon. sulf. ars. cupr. puls.

ipec.

camph, aur. con.
- arsenic (par la vapeur de l'), ipec.
n-vom. cupr. merc.

catarrhal, tart. camph. ars. ipec. nvom. puls.

chronique, sulf. calc. nitr-ac. kal. ars, n-vom.

congestif. acon. bell. n-vom. sulf.

merc. aur. phosph. convulsif. cupr. kal. n-vom. sulf.

lach. stram. cuivre (par la vapeur du), hep. ipec. ars. merc.

émotion (à la suite d'une). ign. n-vom. cham. acon. staph. enfants (chez les), acon, bell, ipec.

mosch. n-vom. samb. femmes (chez les), puls, cocc, cupr.

bell. merc. n-vom. flatulent, carb-vg. n-vom. sulf. chin.

cham, op. hystérique. ign. n-vom. mosch. coff. bell

Millar (de), samb, acon, ipec. muqueux, chin, puls, ars, dulc, sep, stram, sulf.

nerveux. cupr. kal. n-vom. sulf.

lach. stram.

refroidissement (après un), dulc, ipec, acon, bell, bry, puls, sculpteurs (des), calc, sil, sulf, hep, ars, ipec,

soufre (par la vapeur du), puls, spasmodique.voy, Asthme convulsif, thymique, acon, ipec, spoug, bell.

merc, tart. Wigand (de). acon. samb. bell.

ipec. ars. Atrophie, ars. calc. sulf. chin. iod. nvom. phosph. enfants (des). u-vom. sulf. calc. ars.

chin, cin.

parties malades (des), bry, phosph, plumb

Attouchement (mal par l'). hep. chin. bell, bry, n-vom. utomne 'souffrances d'), rhus, dule,

Autonne (souffrances d'), rhus, dule, veratr, merc, chin. Avidité, puls, ars, bry, lyc, calc, Avortement, sabin, plat, sec, bell.

cham, ipec.

B

Baillements, hep. rhus. n-vom, lyc. ign. bry. – avortés. lyc. lach.

acon.

entr'ouverte, spasmodiquement bell.

seche, avec toux seche, n-vom, bry, cham, bell, ign, sulf, acon.

spasmodique, avec toux convulsive.

n-voin.

cin.

ipec. carb-vg. bell.

dros

- cerclée de bleu, veratr. cin. cupr. - suffocante, avec accès de suffocation. - de jaune, n-vom, sep. | ars, ipec, op, carb-vg, chin, lach, - écumeuse, bell, hyos, ign, camph. Bruit mal par le), arn, n-vom, bry, stram, veratr. | bell, cham, ign, coff, spig, veratr.




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

Băillements crampoides. hep. ign. Bouche enflammée en dedans. a rhus. plat. | merc. lach. bell. n-vom. canth

pendiculations (avec). n-vom. plat.

- aphtes en dedans, bor, sulf-ac.

convulsée, contractée, tirée, bell.

merc. n-vom. sulf.

hvosc. caus.cham. op.

bry. puls. op. puls. ars. hyosc. acon. violents. hep. rhus. ign. n-vom. plat. excoriée en dédans. merc. n-vom. Bains, comme cause. rhus. ant. carblach, phos. carb-veg. sil. - fétide, merc. arn. ars. bell. rhus. sass. sulf. - froids. ars. dule. puls. sass. sulf. sil. sulf. ant. calc. fermée par la crampe, bell, camph. lach. merc. op. verat. gonflée en dedans. merc. n-vom. mer (de), ars, rhus, sep. – pieds (de). rhus. puls. sil. cupr. bell. lach. amm. sep. nitr-ac. merc. Baissant (mal en se). n-vom. bell. sèche en dedans. acon. bell. ars. acon. bry. hep. puls. Balanite ou inflammation du gland. hvosc. merc. n-vom. ulcérée en dedans. merc. nitr-ac. op. bell. iod. n-vom. Bouillonnement de sang. acon. merc. nitr-ac. thui. sulf. sep. Balbutiement et Bégayement. euphr. caus.stram. aur.sulf.acon.op merc. fer. hep. phos. sep. sulf. Battement dans le corps. carb-vg. Boulimie. chin. cin. hyos. iod. sabad. phos. sil. puls. sep.
douloureux:douleur pulsative.acon. Bourdonnement d'oreille. £0y. Oreilles phos. sil. puls. sep. bell. ferr. ign. cham. sep. bourdonnantes Bouton (éruptions de). bell. merc. acon. ant. nitr-ac. sep. Bras affectés. lach. lyc. ign. phos. puls. Brisure (douleur de). arn. bry. chin. hep. n-vom. rhus. veratr. Bronchite. acon. merc. bell. bry. Bégayement. voy. Balbutiement. Beurre (mal par l'usage du). carb-vg. puls. ars. chin. hep. Biere (mal par l'usage de la). n-vom. sulf. bell. puls. Bronchite. acon. merc. bell. bry. spong phos. n-vom. puls. cham.

— agées chez les personnes). carb-vg. Bile, affections bilieuses. acon. cham. n-vom. merc. bry. Blennorrhagie. voy. Gonorrhée. Blépharite. bell. acon. ars. cham. hep. con. baryt. hyosc. sulf. n-vom. puls. sulf. ign. sep.
- aiguë. acon. bell. merc. cham. hep.
puls. n-vom. catarrhale ou Catarrhe bronchique. merc. n-vom. puls. cham. rhus. sulf.-coryza 'avec'. merc. puls. sulf. dulc. ars. lach. bell. hep. bord des paupières au). bell. puls enfants (chez les), acon, cham, tart, ipec, sulf. hep. merc. cham.
- chronique. ant. ars. calc. chin. sulf enrouement (avec dulc, carb-vg. merc. cham. sulf. conjonctive (a la), acon, ars. bell. épidémique ou grippe, merc. bell. merc. puls. - extérieure, acon, bell. hep. sulf. n-vom. bry. acon. caus. rhus. hep. - orgelets (avec . puls.staph.calc.ferr. ars. phosph. chez les sujets calc. ipec Blondes (affections des personnes). bell caps. cocc. hyos. lyc. merc. sil. sulf. inflammatoire. acon. bell. bry.phos. spong. muqueuse, avec expectoration, puls. Boissons, comme cause. ars. chin. merc. sulf. tart. dulc. carb-veg rougeole (à la suite de la), dros, carb-vg, bry, cham, - scrofuleux (chez les sujets), bell. ferr. natr. sil. veratr. Borborygmes, veratr. chin. carb-vg. ign. natr. puls. sep. sulf. Bouche affectée. merc. n-vom. carb-vg. ars. bor. sulf-ac. sulf. calc, hep. sulf.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Brûlement, douleurs brûlantes, ars. Caucer de l'estomac, de l'utérus, etc. carb-reg, canth. caus. merc. phos. roy. Estomac, Utérus, etc. Brûlures, canth. ars. caus. kreos. Cantharides (suite de l'abus des).camph. Brunes, cann. ars. caus. kress cantinarides sune de l'abustes, campil-carb-veg. phos.

Brunes (affections des personnes), bry. Cardialgie. voy. Castralgie.
acon. nitr-ac. n-vom. ars.

Bu (nal après avoir), ars. fer. chin. Carie des os. sil. calc. lyc. merc. phos-

772

natr. sil. veratr.

an. aur. carb-vg. Bulles éruptions de canth. graph. rhus dulc. caus.

Buvant mal en). aur. bell. lach. merc. sil. cupr

- vite mal en), sil, ars, n-vom, nitr ac. sulf. Buyeurs (maladies des), voy, Ivrognes,

Café (mai par l'abus du). n-vom. cham. ign. merc. canth.

agitation nerveuse. n-vom, cham. acon.

céphalalgie, n-vom, cham.

– coliques, cham, n-vom, ign, bell coloc

gastralgie, cham. n-vom. cocc.
 hernie (douleur de), n-vom. cham.

— insomnie. n-vom. acon

— (mal par le). odontalgie. cham. n-vom. ign. bell. cocc. merc.

Calculs, sil. sass. lyc. sulf, calc – biliaires, calc, hep, lach, sil, sulf.

— rénaux. lyc. sass. calc. phos. sil. zinc. cann. – vésicaux, sas, cann, lyc, calc, ant,

phos. rut. Callosités de la peau. ant. sep. dulc.

sulf. graph. Camomille mal par l'abus de la', puls. ign. n-vom. coc. acon. coff.

agitation nerveuse, acon, n-vom. coff.

- coliques, n-vom, coloc, borax,

-- convulsions, ign, cocc,

— diarrhée, puls. — douleurs, acon, coff.

excoriations, puls, ign.

-- fievre, acon, coff.

- gastralgie, n-vom, ign,

- métralgie, cocc.

– nausées, puls, n-vom,

- surexcitation nerveuse, acon. coff. n-vom.

Camphre (mal par l'abus du', coff. op. Cancer, ars, kreos, graph, bell, cann. sil. sulf.

ac. sulf. asa.

natr. sil. veratr.

Bubons scrofulcux, sil, hep. aur.mcrc.
sulf. nitr-ac.
- syphilitiques, merc. nitr-ac. carban. aur. carb-vg.

ac. sun. asa.
ac. sun. asa.
Carottes indigestion par les), calc. lyc.
Carothelogic, rhus. hyose, bell. op.
phos. phos-ac.
Carreau des enfants, n-vom, sulf. calc.

cin. ars.

Carus. roy. Sommeil comateux. Catalepsie. plat. cham. ipec. stram. acon. bell. hyosc. mosch. veratr. cic.

Catàracte, puls, sil. amm, con. sulf. phos, magn. Catarrhe bronchique, roy. Bronchite

catarrhale.

- nasal, voy, Coryza, - fébrile, roy, Fièvre catarrhale.

pulmonaire. voy. Bronchite catar-

rhale. suffocant. voy. Orthopnée paraly-

tique. vésical. roy. Cystite catarrhale.

Cauchemar. acon. n-vom. op. sulf. puls. sil.

Cephalalgic, n-vom, bell, acon, bry. coff. puls. merc. sulf. arthritique, coloc. bell, n-vom. bry.

ipec. sep. bain à la suite d'un ant. calc. puls. boissons froides (par les), acon.

bell, ars. natr. puls. café par l'abus du), n-vom. cham.

ign. bell. catarrhale. sulf. n-vom.

chin, ciu, merc, chin, ciu, merc, chour (nar l'effet de la) acon. chaleur (par l'effet carb-vg. bell. bry. sil.

- chagrin par un, ign. staph. phos-ac. colere par une, cham, n-vom.

bry. congestive. acon. bell. bry. lach.

op. sulf. n-vom. arn. contrariété (par une), cham. bry. n-vom. ign.


coups sur la tête (par des , arn. cic. con. bry.

courant d'air (par un). acon. chin. bell. n-vom. coloc.

commotion du cerveau (par une .

commotion du cerveau (par une cic. con. hry. bell. hyosc. débauche (par une). carb-vg. n-voin. puls. cocc. bry. efforts corporels (par des). rhus.

arn. calc.



Céphalaigie : par une émotion morale. Charbon mal par la vapeur du bell. ign. n-vom. cham. coff. bry. op. op. amm. arn.

— enfants (chez les). bell. cham. Chaude pisse. roy. Gonorrhée.

enfants 'chez les', bell. acon. coff. ign.

- excès d'étude (par des', n-vom, sulf.

calc. lach. – femmes femmes (chez les', puls, chamacon, bell, plat, chin.

- hystérique. ígn. acon. sep. plat.

mosch. gastrique. puls. n-vom. ipec. ant.

arn. bry.
- indigestion par une . puls. rhus.
n-vom. ipec. sulf.

· mercurielle. hep. nitr-ac. aur. carb vg. chin. sulf.

métallique (par un poison), sulf. hep. carb-vg. chin. puls.

- migraine. seneg. spig. sep. n-vom. puls. coloc.

nerveuse, coff. n-vom. ign. cham. acon.

- refroidissement (par un), dulc, bell.

acon. merc. puls. coff. n-vom. - rhumatismale. puls. merc. acon.

sulf, chin. - sensibles (chez les sujets'. coff

acon. ign. n-vom. cham.
- spiritueuses (par l'abus de bois-sons, carb-vg. n-vom. calc. puls.

sulf. - tabac à fumer (par le), puls, n-vom.

acon. ant. ign.

temps (par le mauvais', dulc. carbveg. bry. rhus. rhod.

tour de reins (par un). rhus. arn. calc. sil. natt. bry.

veilles prolongées (par des\. n-vom. cocc. puls. bry. calc. chin. sulf.
 Cerycau affecté. bell. hyosc. acon. bry.

zinc. camph.

— congestion, voy. Apoplexic.
— hydropisie, voy. Hydrocéphale.
— inflammation, voy. Méningite.
Chagrin suites d'un . ign. staph, phos-

ac. caus. lach. Chaleur (mal par la), acon, carb-vg.

ars. aur. rhus - de l'air. car carb-veg. ant. bry. lyc.

puls. sulf. de la chambre, acon. arn. natr-m.

phos. puls. sulf. du feu, merc, ant, bry.

— du lit. ars. merc. sulf.- bell. carbvg. cham.

Champignons (mal par les, carb-vg.

coff, puls. acon. n-vom.
Chancre. roy. Syphilis.
Chant mal par le. carb-vg. phosph.
amm. dros. hep. stann. sulf.

Chaude pisse. voy. Gonorrhée. Chenilles venimeuses mal par les

rhus, acon, bell. Cheveux affectés. bell. borax. graph.

hep. kal. lyc. natr-m. sulf. céphalalgies (après de fréquentes , hep. nitr-ac. calc. sil. sulf.

chagrin par suite d'un . ign. phosac. staph

chute des hep. kal. sulf. calc. graph. natr-m.

– aux côtés, graph, phos, kal, zinc. – sar le devant, ars. natr-m. phos

- a l'occiput. carb-vg. phos. sil. petr.

— derrière les orcilles. phos. — par plaques. canth. iod. phos. — aux tempes. calc. kal. lyc. natrm.

- au vertex, baryt, lyc, graph, sep. zinc

endolorissement. ars. chin. carbvg. n-vom. ferr. - entortillement. lyc. phos-ac. bor.

natr-m.

faiblesse (par cause de). ars. chin. ferr. carb-vg. veratr.
- flaccidité. phos-ac.
- gras (cheveux). bry. plumb.

grisonnants. phos-ac. staph. lyc. ars (hérissement des), arn, canth, zinc.

maladies graves (à la suite de). lyc. hep. sil.

mercure (par l'abus du), hep, nitr

ac. carb-vg. kal. iod. - (sécheresse des', kal. calc. phos-ac. sueurs après de fréquentes : merc

chin. ferr. visqueux (cheveux), chin.

Chlore (mal par l'usage du), puls. Chlorose, sulf. calc. ferr. puls. con.

crotal, sep.

Choléra, veratr. ars. ipec. camph. sec. phos-ac.

- asiatique, roy, ci-dessus, - asphyctique, ars, veratr, camph,


carb-vg. - céphalalgie (avec), camph. bell. veratr.

crampes prédominantes, camph, cupr, sec, veratr.

 crampes des mollets, camph cupr. veratr

 cvanose, camph, veratr, kal. iod. carh-vg

diarrhée prédominante, veratr, ars sec. inec.



Coliques: indigestion (par une: puls. Constipation. purgations fi bell. n-vom. carb-veg. bry. sulf. par des. op. n-vom. lach. bell. n-vom. carb-veg. bry. sulf. - indignation (à la suite d'une). cham sédentaires chez les sujets sulf. bry. plat. lyc. - vicillards (chez les). op. a coloc. sulf. inflammations. acon. bell. hyosc. merc. ars. puls. bry. sulf. lach. mensuelles ou pendant les règles champ, bell. cocc. puls. sec. n-vom - voyage (en). plat. alum. o_l - hémorrhoïdes (par des). sulf. miséréré (de), op. n-vom, plumb. Contact (mal par le). voy. A thui - néphrétiques, puls, lyc, sass, bell ment. Contractions crampoldes. c zinc refroidissement par suite d'un cham, n-vom, merc, puls, coloc. sulf. caus. coloc. rhus. Constrictions spasmodiques. alum. plumb. n.-vom. rhus Contractives (douleurs). voy. i chin. -saburrales. puls. n-vom. bell. bry. sulf. contractives saturnines (par le plomb). op. bell. Contrariété (suite d'une). ig cham. plat. alum. cham. bry. coloc. staph. n spasmodiques. cham. coloc. bell. Contusions. arn. euphr. co cocc. puls. n-vom. - tour de reins (à la suite d'un). rhus. sulf-ac Conversation (mal par la). 1 bry. arn. carb-vg. lach. cocc. ign. n-vom. sulf. - utérines, cham. cocc. ign. n-vom des autres (mal par la), ar: vermineuses. merc. con. sulf. cic. Convulsions. bell. op. hyosc. (Coma. toy. Sommeil comateux. ign. ipec. stram. veratr. Coqueluche. cin. dros. ipec. c Commotion du cerveau. cic. arn. brv. n-vom. puls. veratr. acon. - période catarrhale. aco ipec. plus. n-vom. merc. sulf. Condylomes. nitr-ac. thui. lyc. phosac. sass spasmodique, cin. droveg, kal. veratr.
 de décroissance, puls. a - fendillés, choux-fleurs. thui. nitrac. lvc. - plates. thui. nitr-ac. sass. — à queue. lyc. Congélation (suites d'une). veg. dulc. hep. Cordon spermatique affects n-vom. spong. ars. bry. carb-vg. acon. hvos. lach. p Congestion. acon. arn. n-von Cornée affectée, nitr-ac, cant bry, op. merc. sulf.
- à la tête, acon, arn. bell. bry, op. hep. merc. obscurcissement.euphr.car n-vom. merc. puls. sulf. - à la poitrine. acon. bell. n-vom. phos. sulf. pellicule dessus. lach. euph calc. au ventre, n-vom, sulf, puls, carbpustules, merc. kal. bry. taies, cann, euphr, hep, ni ulceres, ars, calc, bell, ar ars. caps. Constipation, n-vom. veratr. bry. op. Corrosifs mal par l'abus des lyc. lach. alum. accidentelle, n-vom, veratr, op puls. kal. sulf. bry plumb. Cors aux pieds. nitr-ac. sep. s arn. - chronique ou habituelle. n-vom. sulf. bry. calc. lyc. sep. - enfants à la mamelle (chez les). n-vom. op. bry. lyc. nitr-ac. sep. sil. sulf. Coryza. bell. cham. merc. pi hep. n-vom. ars. amm. du euphr. femmes enceintes chez les . n-vom - aigu. merc. bell. hep. pul - commençant. n-vom. her sep. bry. op. lyc femmes en couche chez les . n-vom

calc.

vom.

graph. natr.

op. bry. plat. ant.

op. calc. sulf.

alum.


ivrognes chez les . n-vom. lach.

plomb (par l'abus du . op. plat.

chronique, hep. sil. sulf. ca

épidémique, merc. bell. he fébrile, merc. spig. acon.





Croûtes (éruption de). sulf. calc. ars. Dartres : sèches. bry. calc. ars. veratr. rhus, graph, dulc.

Croute de lait, rhus, ars, carb-an, sulf. calc

Cuir chevelu affecté, carb-an, hep. ars

chin. rhus. calc. - croutes sulf. rhus. hep.ars. calc. lyc – écailles, alum, phosph, staph, mez.

oleand.

condolorissement, chin, hep. merc. n-vom. staph, sulf. - froid sensation de; sulf. calc. ve-

ratr. sep. gonflement. rhus. ars. bell. mere

graph. - prurit. alum. sulf. sep. staph. calc.

- sensibilité douloureuse, chin. r vom. spig. ars. merc. sulf - sueur. cham. chin. bry. merc. puls. bell. calc. kal. sil.

tension, merc. nitr-ac. ars. caus

lach, spig.
Cyanose, hydr-ac, dig. laur, veratr, camph, lach, cupr, acon.

Cuivre (mal par l'usage du). hep. n-vom. bell. ipec. Cystite. con. canth. puls. n-vom. acon

dig. catarrhale catarrhe vésical. ou

dulc. puls. sulf. n-vom. ant.
- du col de la vessie. cann. canth.

n-vom. puls. - hémorrhoïdale. puls. n-vom. sulf.

borax. Cystoplégie. ars. bell. laur. dulc. hyosc.

D

Danses, bell, stram. cic, hvosc. acon plat.

Dartres, sulf. calc. clem. con. dulc. graph. lyc. merc. rhus. sep. oleand. annulaires, sep. natr. natr-m.

hlanches, ars, graph, lye, zine.
brunes, lye, natr.
furfuracées, ars, bry, cale, sulf. kreos.

gercées, sep. sulf. calc. puls. rhus. cycl. graph. hep. lach. lyc. – grises, ambr. sulf. – jaunátres, cic. sulf. dulc. lyc.cupr.

merc. sep.

pruriantes, clem. calc. ars. merc. sulf. rhus. sep.

– rongeantes, ars. lyc. sep. calc. graph. sulf.

rouges. graph. rhus. puls. sulf.

staph. rhus. sep. sil.

suintantes, merc. sulf. calc. clem. dulc. graph. sep suppurantes, sulf. merc. sic. clem.

rhus, sep. squammeuses, dulc, calc, ars, phos, sulf.

Débilité. roy. Faiblesse.

Déchirement, 10y. Douleur déchirante. Debout (souffrance en étant). bry. aur. cocc. caps. phos-ac. plat. puls

Découvrant (mal en se). acon. merc. ars. cocc. hep. n-vom. Découvrant la tête (mal en). iod. lyc.

acon. calc. ferr. puls. spig. veratr.

Découvrant un membre (en). hep. sil. rhus. squill. stront.

Défaillance, evanouissement, acon. ign. n-vom. op. camph. carb-veg. cham. chute à la suite d'une'. arn.

douleur (à la moindre). liep, nmosch.

– (par la violence de la . acon. cham.

émotions morales après des), ign. acon. coff. op. cham. veratr. - efforts intellectuels (après des n-

vom. lach. frayeur après une). ign. op. veratr.

coff. ivrognes (chez les', carb-veg. op.

acon. joie (après un excès de), coff. op mercure (après l'abus du), hep. lach.

op. mouvement au moindre). arn. acon.

veratr.

pertes débilitantes à la suite de . carb-veg. chin. veratr. n-vom. -vertiges avec). acon. bell. n-vom.

bry. ars. Déglutition douloureuse, bell, merc.

lach, hep. puls, sulf. des aliments, merc. bell, cham, hep.

sulf. des boissons, bell, merc, lach,

canth. phos. de la salive. merc. bell. bry. cocc.

hep. merc. églutition gênée, empêchée, be hyose, merc. lach, canth, stram, Déglutition genée,

des aliments, alum, baryt, cham. hep. n-vom. sulf. sil.

des hoissons, bell, lach, merc, aur. sil.

Déglutition involontaire, besoin d'avaler. bell. cham. ign. lach. merc. n-. rom.



778 CLINIOUES LES PLUS IMPORTANTES.

Déjeuner (mal après le). cham. n-vom. Dents cariées (mal aux). cham. ant. phosph. bry. calc. caus. natr. natr-m. staph. merc. n-vom. phosph. bry. calc. caus. natr. natr-m. égoùt. voy. Répugnance. Dégoût. voy. Répugnance. Délires. bell. acon. bry. hyosc. op strani. n-vom. lach. sulf. incisives (mal aux), sulf, sep, rhus. natr-m. m-arc inférieures affectées, cham, bell. anxieux. op. stram. bell. hyosc. sil. staph. m-arc molaires id. staph. cham. chin. puls. fantastiques, bell, stram, sulf, hyosc bry, natr. op. - furibo<mark>nds. bell. bry. op. acon</mark>. supérieures, id. acon. bell. chin. sep. aur. carb-vg. coloc.
- gais. acon. bell. op. sulf. veratr.
- loquaces. bell. stram. rhus. veratr.
lach. op.
lach. op.
bry. petr. sulf.
Desespoir. acon. calc. veratr. ign.
lach. puls. sulf, valer.
Deshabillant (mal en se). ars. dros. Descendant (mal en). acon. ars. aur. vom. op. n-vom. rhus. oleand. puls. cocc. - tristes, puls, acon. bell. spong. spong. - nocturnes, acon. bell. bry. rhab. Desir d'acides, acon. sulf. arn. ars. chin. puls. veratr.
- air libre (d'). stram. rhus. croc. puls. arn. sulf. Démangeaison. roy. Prurit. Dentition laborieuse. cham. merc. n-vom. magn. plat.
- aliments gras (d'), n-vom. nitr-ac.
- amers (d'aliments). dig. natr-m. sulf. acon. calc. agitation nerveuse, acon, coff, cham. hell. sulf. - constipation. n-vom. bry. magn-m. biere (de). sulf. acon. cocc. merc. - diarrhée, merc, sulf, cham, ipec, n-vom. puls. - café (de), ang. ars. bry. carb-veg. calc. ars. - Gevre. acon. cham. n-vom. coff. con. aur. chaux, craie (de). nitr-ac. n-vom. - insomnie. coff. acon. cham. bor. calc. hep. ign. - charbons (de). cic. con. spasmes et convulsions, bell, ein. ign. cham. calc. toux, cham, cin, n-vom.
 Dents affectées, cham, merc, n-vom. eau de vie (d'). lach. sulf. hep. ars. chin. farineux (de). sabad. staph. bell. acon. agacement. merc. dulc. phos-ac.
 sulf. sulf-ac. mez, nitr-ac. staph. friandises (de). chin. ipec. calc. natr. petc. rhus. fritures (de), plumb. - allongement. cham. bry. arn. bell. sulf. hyosc. froids (d'aliments), sulf-ac, veratr. - carie, staph, croc, sep. phos, plumb puls. ign. tart. fromage (de), arg. mez. – douleurs. roy. Odontalgie. – ébrèchement. staph. lach. euphorb. grasses (de choses). n-vom. nitr-ac. lait (de). sabad. merc. sil. staph. bell. plumb. borax.
- exfoliation. staph. arg-n. lach ars. rhus. légumes (de . alum. magn. fétidité. calc. graph. kal. plumb. liquides (d'aliments). bry. merc. staph, sulf. ferr. rhus. - rincement. ars. bell. hyosc. lyc. pain (de). puls. ars. bell. natr. stram, veratr. natr-m. plumb. jaunissement. phos-ac. nitr-ac. lyc. rafratchissantes (de choses). puls. rhab. cocc. caus. noircissement. staph. merc. sep. succulents (d'aliments). phos-ac. plumb. squill. - viande (de), sulf. hell. magn. saignement. carb-vg. merc. sulf. - viande fumée (de). caus. ant. phos. phos-ac vin (de). calc. staph. acon. bry. hep.

lach. sulf.

sec.

Diabèle sucré, phos-ac, merc, nitr-ac, phosph, sulf, natr-m, aur, baryt. Diarrhée, veratr, cham, puls, merc, chin, ars, dulc, ferr, ipec, rhab.


suppuration, fistules, calc. sil. sulf.

- vacillement, chain, merc, staph, puls. amm. bry. caus.
- canines (mal aux. calc. n-vom.

staph. natr-m.

sep. sulf-ac. rhus.

Caus



Diarrhée : après l'usage des acides. Diarrhée nocturne, cham. ars. merc. staph. bry. n-vom. ant. chin. puls. ferr. sulf. opiniatre. sulf. graph. phos. calc affaibles (chez les personnes). chin. ferr. phos-ac. phos.

- 4gées (chez les personnes . ars. bry. phos. sec. aut.

- alternant avec constipation. ant. phos. bry. lach. n-vom. kreos. nitr-ac. phthisiques chez les sujets), phos. calc. chin. ferr

automnale, merc. ars. sulf. carb-

vg. chin. bilieuse. ars. cham. merc. puls.

bu froid (pour avoir), ars, carb-vg. puls. n-mosch.

chagrin (à la suite d'un), staph,

phos-ac. ign. - colère (à la suite d'une). cham. n.

vom. coloc. coliques (avec'. cham. coloc. merc.

ars. rhus. bry. sulf. chin. rhab. débauche après une . carb-vg. n

vom débilitante, chin, ipec, veratr, phos,

phos-ac. dentition (pendant la). merc. sulf.

cham. ars. calc. cocc. ferr. · émotion (à la suite d'une). cham.

coloc. acon. coff.

- enfants (chez les). cham. merc. ipec. sulf. rhab. - été (en.. ars. dulc. bry. merc. carb-

exanthème (à la suite d'un). ipec. ars. merc. puls. sulf.

femmes enceintes (chez les). sep.

ant. dulc. hyosc. - frayeur (à la suite d'une). veratr. op. ant, acon, coff.

frissons avec), plus merc, sulf.
fruits (par l'usage des), puls. ars.
chin. lach.

 indulore, are phos-ac, ferr. ars. chin. puls. veratr.

indigestion (par suite d'une). coloc. staph.

joie excessive (après une). coff.

acon. op. veratr. puls. - lait (par l'usage du). sulf. lyc. bry. patr

- lientérique. chin. ferr. bry. ars. phos. phos-ac.
- matutinale. bry. ars. n-vom

 mercurielle, hep. nitr-ac, carb-vg. chin, sulf.

· muqueuse. puls. merc. sulf. chin. caps.

- nausées (avec). ipec. veratr. ars. cham. puls. merc.

printaniere. dulc. merc. carb-vg. sulf. ars. bry.

refroidissement (à la suite d'un).

dulc. merc. bry. cham. repas (après chaque). chin. ferr. coloc. ars. lach.

scrofuleuse, sulf. calc. sil. lvc. ars. sep.

- sereuse, aqueuse, merc. ferr. phos-ac. phos. ars. chin. ipec. puls. sec. - soil (avec), ars. cham. chin. ferr.

dulc. soir (chaque). puls. merc. sulf.

dulc. veratr stercorale, ars. puls. cham. rhab.

sulf. tabac (après l'usage du), puls, cham.

- temps humide par un lach, rhod. - vomissement (avec). ipec.

ars. cupr. puls. camph. bell. rhab. Digestion faible, laborieuse. roy. byspepsie. Diplopie. bell. cic. hyosc. natr-m.

puls. sulf. Distension (sensation de). ign. bell.

n-vom. spig. bry. merc. Dos affecté. calc. puls. sulf. sep. lach.

peir, sil. - courbé, puls, sulf, n-vom, calc, sil.

sulf. ant. phos.
- femmes en couche chez les). rhab. Douleurs arthritiques. acon. sulf.colch.

puls. n-vom. ant. arn. hep. chin. - battantes. voy. Pulsation.

- brisure (de), hep. bry. arn. chin. n.-vom. rhus. veratr.

brûlantes, ars. carb-vg, caus, merc. n-vom.

changeant de place 'en . puls. mang. sulf. chin. arn. rhod.

contusives. arn. con. ruta.cic.cin.

déchirantes, chin. merc. puls. bry. carb-vg. calc. sulf.


distensives. roy. Distension.

écartelantes. bell. merc. brv. ign. n.vom. sulf. sil.

étourdissantes.cham.n-vom.oleand. cocc. plat.

excoriation (d'). hep. ign. canth.

arg.
- fouillantes. cocc. puls. colch.
- griffe (de). caic. lyc. graph. caus. carb-vg. ign. n-vom. phos. puls. sil



Eau de vie (mal par l'usage de l'). n- Emotion (suite d'une) gastricisme, vom. op. ign. ars. lach. sulf. cham. coloc. puls. bry. n-vom. ign. vom. op. ign. ars. lach. sulf. Ecchymoses. sulf-ac. bry. n-vom. arn

con. puls. sulf. clampsie. bell. cham. ign. caus

Eclampsie. n-vom. plat. - enfants (des). cham. bell. n-vom

cic. cin. femmes enceintes (des). plat. bell.

hyosc. cham. cic. - femmes en couche (des). plat.

cham. bell. n-vom. sulf. Ecorchures. arn. sulf-ac. puls

malades alités (des). arn. sulf ac. Echauffement (mal par un). acon. carb

vg. ant. bry. bell. Ecrivant (mal en). sil. aur. calc. sep. ign. kal. natr-m.

Ecthyma. sil.sep.sulf. merc. ars. kreos rhus, tart

Eczéma, bell. dulc. merc. acon. phos ars. sulf. graph. mez.

- agées (des personnes). aur. phos

staph. sulf. aigu. acon bell dulc. petr. phos

- chronique. clem. dulc. merc. phos. sulf. graph. mez. – fébrile. acon. bell. dulc.

- cufants (des). acon. bell. dulc. phos sulf. - impétigineux. bell. merc. rhus.

carb-vg.dulc. sulf. - rouge, ars, aur, dulc, merc, sulf,

simple, dulc, ars, petr. sulf, phos. fort (suite facheuse d'un), rhus, Effort arn. cocc. sulf. calc. ruta. sil. acon. lvc.

Efforts intellectuels. roy. Études forcées Effronterie. op. ign. acon. merc. sulf.

alum. Elancement. voy. Douleurs lanci-

nantes. Embarras gastrique, voy. Gastricisme.

Echardes (douleurs comme par des) nitr-ac. hep. carb-vg. cic.

Émotions morales suites fácheuse des), ign. acon. cham. staph. coff. coloc. n-vom.

aliénation, plat. bell. hyose. op. stram. lach.

angoisse, bell, acon, cham, merc

congestion à la tête, bell, acon, coff. n-vom. op convulsions, bell. ign. cham. hyosc.

op. samb. défaillance, veratr, coff, op., cham.

– diarrhée, veratr. cham, puls.

insomnie, coff, acon, staph, merc.

- moral affecté, bell, aur. ign. phosac. plat. staph.
- vertiges. bell. merc. n-vom. op

v. missements. n-vom. .op. puls. igu.

Encéphalite. voy. Méningite.

Enfants (affections des), acon. bell. cham. merc. sulf. calc. hep. ipec. roy. aussi Nourrissons.

Enfantement. voy. Accouchement. Enflure. voy. Gonflement.

Engelures, bell, puls, sulf. ars, n-vom. carb.-an. nitr-ac. phos. lyc. petr. bleues. arn. bell. kal. puls.

- douloureuses, bell, sulf, puls, nvom. nitr-ac. petr.

enflammées, cham, puls, sulf, aris, nitr-ac

Engourdissement des membres, puls, croc. rhus. chin.

Enrouement.carb-vg. dulc.dros.mang. phos. spong.

Entéralgie. roy. Coliques.

Entérite, acon. merc. hyosc. ars. bell. lach. bry arthritique. bell. n-vom. sulf.

merc. Entorses, rhus, arn, amm, bry, calc.

ruta. lyc. Envies des femmes enceintes, sep. ign.

ipec. con. puls. aux ongles, rhus, calc, sulf, lye

Epaississement de la peau, ant. dulc graph. rhus, sep. sil. Ephélides, con. sep. sulf. hyose, lyc.

nitr-ac. ant. hépatiques. ant. lyc. sulf. laur.

merc. sep. solaires, lyc. sulf. puls. ant. natr.

Epigastre affecté, n vom, bry, cham.

cocc. sulf. Epilepsie, bell, calc. sulf, cupr. n

vom. ign. op. caus. sil. Epistaxis, acon, chin, bry, arn, croc. bell.


Erections, canth. graph. n-vom. phos. natr-m. puls. sil.

absentes, con, lvc. kal. graph. caus. hep.
- courtes (trop), con. calc.

doulourcuses. con. n-vom. canth. thui, merc. puls. faibles (trop), baryt, hep. lyc.

selen. sulf. (trop), zinc, puls, canth. · fortes phos. sabin.





Expectoration facile. arg. kreos. sang. Face couperosée. carb-an. calc. rhus. ruta. ars. veratr. veratr. crouteuse. rhus. dulc. ars. graph.

- fétide. puls. 📢e. sil. natr. sulf. caps. graph.

 floconneuse. sulf. stann. agar. phos. fréquente, puls, sulf, dulc, sep. squill, stann.

gélatineuse. laur. dig. arg. baryt. ferr. chin.

grisatre ambr. ars. lvc. sep. ars. dros.

- herbacé (d'un goût . phos-ac - impossible.caus. arn. sep.ambr.kal.

- jaunatre. puls. sulf. dros. lyc. bry. carb-vg.

– moisi (d'un goût de), borax. – muqueuse, puls, sulf, chin, dulc. ars, seneg.

avec du sang. bry. chin. ferr.

acon. ars. bell.

noiratre, chin. lyc. n-vom. rhus. putride, puls. stann. graph. carb-vg. arn. cham

- purulente. calc. sulf. kal. sil. lyc. nitr-ac.

rhume 'comme d'un vieux). puls. - rhume comme d'un vieux, pars. bell. sulf. ign. n-vom. - roussâtre, bry. squill. - salé (d'un goùt). lyc. puls. ars.

phos. natr

sanguinolente. acon. ipec. sulf-ac. arn. bry. lyc. phos. puls.

- transparente, sil. ars. ferr. seneg

- verdåtre, magn. puls. ars. carb-vg. lyc. sulf.

visqueuse. sil. kal. chin.

Extension d'un membre (mal par l') hell. n-vom. spig.

Extase. agar. stram. acon.

Face affectée. bell. acon. cham. phos. plat. puls. rhus. - amaigrie. calc. ferr. selen. mez.

- bleuatre, acon, bell, op, veratr

ars. cham.

bouffie. hyos. n-vom. acon. ars. chin, op. phosph.
- boutonneuse, bell. carb-vg. ars.

calc. veratr. brulante.cham. acon. ars. bell. bry.

plat. veratr. brunatre, bell. op. daph. hvos. nitrac. sep. sulf.

- chaude. acon. merc. sulf. chin. coce, arn.

 convulsée, ars. bell, cham, sec. stram. n-vom.

calc. merc.
- dartres à la), dulc. natr-m. rhus. carb-vg. sep. merc. bry.

- décomposée, ars. camph. chin. op.

phos-ac. rhus. spig. stram. veratr.

douloureuse. voy. Prosopalgie. ephélidée. ant. lyc. sulf. calc. dulc.

graph. érysipèle à la bell. crotal. lach.

rhus, puls, sep

froide, camph. hyos. veratr. gonflée, bell, arn. merc. lach. lyc. sulf. phosph.
grisatre, ars. ferr. chin. lyc. merc.

-vom.

have, creuse, ars. chin. veratr. nvom. stann. sec.

hippocratique. ars. phosph. chin. phos-ac. veratr. sec. carb-vg. n-vom. jaune. acon. chin. ferr. spig. sep. ars. n-vom. bell. bry.

– autour du nez. sep. – autour de la bouche. n-vom.

sep. autour des yeux. nitr-ac. spig.

n-vom luisante, graisseuse. magn. natr-m. selen.

noiratre. chin. ars.

noirs (avec pores) sulf. natr. nitrac. dros. dig.

pale. puls. merc. ars. carb-vg. chin.

sep. sulf.
- alternant avec rougeur, acon. ign.

croc. cham. bell. n-vom. - paralysée. caus. graph. op. - pruriteuse. calc. con. lyc. natr m.

alum. chel.

réseaux veineux à lat. plat. ridée, calc. op. sulf. lyc. sep. rouge, acon. bell. n-vom. hyos-

mere, bry, op. rugueuse, graph, sulf, ars, rhus,

sep.

sale d'un teint, lach, sec. ars. chin. ferr.


suante, carb-vg, ign, merc, n-vom; puls, rhus, veratr.

tachetée, ars. ferr. rhus, sulf. cale. merc. sil. natr. – de bleu, ferr, <mark>ars, ver</mark>atr,

– — de jaune, sep. ferr. natr. colch. n-vom.

- de rouge, sulf, samb, ferr, bell.

bry, lyc. sabad. - — de sales 'taches', plumb, lach. Sec.



caus. lach. squill. zinc. sortant. cham. acon. -chaudes en

staph, phoph, zinc. - fétides (très-), chin, carb-vg, sulf.

puls. arn. fréquentes, carb-vg. chin. phosph.

graph.

froides en sortant, con. incarcérées, carb-vg, chin. graph. lach, n-vom, sulf.

inodores, bell, carb-vg, lvc, ambr.

coff. plat. Fléchissant la partie malade (mal en).

calc. ign. arn. chin. brv. bell.n-vom. - la tete en . calc. spong. cic. rhus. arn.

Flueurs blanches, puls, sulf, merc, sep, calc, alum, con, cocc.

acres. cham. puls. sulf. sep.phosph. kreos. ars. merc. mez.

aqueuses, puls, graph, carb-vg, sulf, alum, anim.

blanches. cale. puls. sil. merc. kreos, ferr. sep.
- blanc d'œuf (comme du). borax.

plat. amm-m. petr. bovis. mez. bleuátres. ambr.

- brûlantes, carb-an, calc. puls, sulfac. alum. kreos. amm. con. fluor-ac. - brunâtres, cocc, nitr-ac, amm m.

- corrosives, sulf. sep. ars. phosph. con. cham. puls. sulf. merc. mez.

- épaisses, puls, sep, carb-vg, con ars. borax. natr-m. magn-m. natr.

fétides. n-vom. kreos. natr. sep. nitr-ac. - jaunes. sep. n-vom. stann. sulf.

ars kreos. laiteuses. puls. calc. sil. con. sep.

lvc.

- muqueuses. puls. lach. con. stann.

natr. sass. sep. carb-vg. merc. cocc. nocturnes, ambr. caus, natr-m.
 pruriteuses, calc, sulf. sep. merc.

chin, cham. puriformes, calc. merc. ign. sep.

cocc. con.

putrides, natr. sep. nitr-ac. kreos. regles avant les calc lach carb-vg. chin. phosph. puls. graph. sulf.

- après les alum puls sabin. ruta cocc sil. graph sulf. merc - pendant les alum puls chin. cocc lach, graph

cocc. lach. graph. - roidissant le linge, sabin. alum

 rongeantes, kreos, ars, sulf, cham. sep. puls. phosph. ruta.

Flatuosités bruyantes en sortant, merc. Flueurs blanches roussatres, cocc. sep. sabin, calc alum, lyc.

sanguin lentes. chin. cocc. sep. calc. carb-vg. con. séreuses, puls, graph, alum, carb-vg, amm, sulf.

transparentes. stann. sulf-ac. alum.

natr-in - sortant en urinant, carb-vg. sil. amm-m. calc.

verdåtres. sep. carb-vg. merc. lach. natr-m.

-- visqueuses. acon. phosph. tart Foie affecté. n-vom. laon. lyc. aur. natr. sulf. magn-m. calc. caps. chin. merc.

douloureux. n-vom. merc. chin. bry. bell. lach. acon. aur. lyc.

dur, induration. calc. n-vom. sulf chin. lyc. merc. ars

enflammé, acon. n-vom. bell. sulf.

merc, lach. lyc. aur. magn-m.

— engorgé. calc. n-vom, chin. sulf.
merc. ars. magn-m. caps. n-mosch.
Fongus, fongosités.ant. sulf. sil. staph. ars, kreos

articulaire ant, bry. sil. sulf. iod staph. con.

hematode ars carb-vg carb-an, phosph. sep. sil

médullaire, carb-an, phosph, thui. bell. sil. sulf.

Foulures, arn. rhus. ruta. bry. calc. lyc. amm. puls.

Fractures des os. calc. sulf. sil. lyc. ruta. nitr-ac. Frayeur suites d'une . ign. op. acou.

coff. bell. veratr. lach.

Frissons, merc puls, caps, chin, yeratr. ars. n-vom. ipec. bry. lyc. nitr-ac-accompagnés de chaleur, acon acon.

n-vom. bell. puls. ars. rhus. merc. cham. ign. alternant avec chaleur, chin. n-voni.

merc, ars. bry. calc, sulf. bell. précédés de chaleur, bell caps bry

puls, n-vom, sep. lyc. staph. suivis de chaleur, acou, n-vom, bell puls, arn, sulf, spig rhus.

partiels, bell, puls, cham, n-vom, acon, lach. soif avec. brv. natr-m. ein. cale.

veratr. acon. chin. arn.

- sans . puls. ars. n-vom. chin. daph. rhus. spig. sabad avec sueur, puls, lyc, sulf, sabad,

n vom. ars. calc. suivis de sueur, bry, rhus, caus, lyc, carb-an, caps, sabad, veratr, natr-m.



786

natr-m.

CLINIOUES LES PLUS IMPORTANTES.

Froid (mal par le). ars. dulc. camph. Gastralgie. indigestion (par une). puls. n-vom. rhod. hep. sil. cham. n-vom. bry. ant. Fromage (mal par l'usage du). coloc. — irrognes (chez les). n-vom. carb-- gaté (par le). bry. ars. rhus. phos-Frottement (mal par le). puls. con. sil. sep. caps. caus. merc. ars. - soulagement par le). calc. phosph. natr. sulf. arn. ant. merc. puls.
Fruits (mal par l'usage des), culs. ars.
bry. chin. veratr. sep. magn-m.
Fureur. bell. stram. hyos. veratr.
canth. op. ars.
Furoucles arn. ball. ben. sil lyc. Furoncles. arn. bell. hep. sil. lyc. phosph. sulf. lach. grands, n-vom, sil, lyc, hep, nitrac. hvos. bell.

petits, arn. bell. sulf. lvc. magn.

Gaicté folle. coff. croc. op. stram. veratr. bell. natr-m. lach. plat. Gale, sulf. merc. caus. carb-vg. sep. selen. hep. lyc.

grosse, pustuleuse, sulf. lyc. caus. clem. rhus. kreos. merc. sep.

- miliaire. sulf. carb-vg. merc. caus. sep. lach. natr.

- répercutée, sulf. merc. caus. ambr. sep.

- saignante. merc. sulf. calc. dulc. arg-n. - sèche.

sulf. merc. carb-vg. hep.

caus. lach. sep. veratr. - suintante. sulf. merc. caus. kreos. carb vg. scp.

Ganglions. aru. sil. phosph. plumb. phos-ac. zinc. Gangrène. ars. sil. sec. squill. sulf.

chin. acon. bell. - humide. chin. bell

inflammatoire, sabin, sec. ars. bell.

acon. mur-ac.
- sphacèle. ars. sec. plumb. lach.
sil. asa. cuphorb. squill. sulf-ac. sulf.

Gastralgie, n-vom. cocc. carb vg. ign. puls. bell. sulf. - café : par l'usage du). cham. n-vom.

ign. cocc

- camomille (par l'usage de la . puls. n-vom. ign. bell. émotion (après une), cham. coloc. n-vom. staph. cocc.

- hypocondriaques (chez les sujets).

n-vom. cocc. calc. magn.

vg. sulf. calc. lach. pertes débilitantes à la suite de . chin. carb-veg. n-vom. cocc. sulf.

règles dérangées (par suite des). puls. cocc. lyc. calc. cham. n vom. — trop faibles (par suite des). puls. cocc.

- trop fortes (par suite des). calc.

sel de cuisine (par l'abus du). carbvg. nitr-sp.

Gastricisme, gastrose, puls. n-vom. ipec ant bry cham.

— acides (par l'usage des), acon. hep.

ars. carb-vg. lach. sulf. - café (par l'abus du). n-vom. chain.

ign. cocc. merc. - chagrin (à la suite d'un). ign. staph. phos-ac. lach.

ocumentile (par l'usage de la).puls. n-vom. ign. bell. - colère (à la suite d'une). cham. n-vom. bry. coloc. - coup sur l'estomac (à la suite d'un).

arn, bry, rhus.
- échauffement (à la suite d'un), bry.

sil effort corporel (après un). arn.

rhus. bry. puls. enfants (chez les). cham. bry. ipec. merc. puls. n-vom.

-émotion (après une), cham, ign. coloc. acon. bry. -étude forcée (à la suite d'une). n-vom, sulf. arn. puls. -fruits (par l'usage des), ars, puls.

carb-veg.

glaces (par l'usage des). ars. puls. indigestion (à la suite d'une). puls. ipec. ant. n-vom. arn.

npec, ant. n-von. arn.
- mercure (par l'abus du), carb-vg,
aur. chin. sulf. hep.
- pertes débilitantes (à la suite de),
chin. carb-vg, ruta. calc.
- refroidissement (à la suite d'un).

cocc. ipec. puls. cham. ars.
- spiritueuses (par l'abus des boissons). n-vom. ars. carb-vg. lach.

op. - tabac (par l'usage du). puls. n-vom.

ipec. ign. staph. tour de reins (à la rhus. bry. arn. puls. la suite d'un.

- hypocondriaques (chez les sujets).

n-vom. sulf. grat. cocc.
- hystériques (chez les femmes). ign.

Gargouillement dans le ventre. chin.

veratr. carb-vg. puls. sulf.





Gastrite, acon, ars. bry. puls. n-vom. Glandes dures, cham. con. iod. spong. ipec. bell. hyos. - aiguē, acon, bry, arn, puls, ipec.

n-vom. bell. - chronique. n-vom. sulf. hep. lach.

calc. lyo

- rhumatismale. acon. bell. n-vom. bry.

Gastro-entérite.voy.ci-dessus Gastrite. Gastrose. voy. Gastricisme. Gaz délétères (mal par les), bell. op.

sulf-ac, amm.

Gencives affectées, merc, sulf, staph. Glaucome, phosph.
n-vom, bell, cham, carb-vg, caps.
blanches, merc, staph, carb-an, Glossoflegie, caus, bell, hyos, dulc, graph, lach.

- décollées. carb-vg. merc. natr.

phosph. rhus. sep.

enflammées. n-v natr-m. sep. amm. n-vom. sulf. hep.

- excoriées, carb-vg. sep. sil. chin. nitr-ac.

fétides, graph, calc, rhus,
 fistuleuses, calc, caus, sulf, sil,

staph. natr-m.

fongueuses, staph, sulf, carb-vg, merc. nitr ac. gonflées, acon, n. vom, merc, staph,

sulf. phos-ac. - (nodosités aux), staph, calc. caus.

phos-ac. thui. natr. páles, merc, staph, carb-an, nitr-ac,

aur. plumb. zinc. - rouges. hep. n-vom. sulf. amm.

natr-m. sep - saignant facilement. carb-vg. sulf.

merc, cale, nitr-ac, sil. scorbutiques. merc. n-vom. carb-

vg. sulf. staph. caps.

suppurantes, merc. sulf. carb-vg. s'aph. caus. natr-m.

ulcérées, merc. staph, calc. carb-

vg. sulf-ac. natr-m. lyc. vésicules (couvertes de). bell. mez.
 Genou affecté. bry. sulf. rhus. sil. sep.

puls. n-vom. enflammé, sulf. bry, n-vom, arn

calc. lyc.

— gonflé iod. calc. lyc. sulf. sil.n-vom.

— hydropique. sulf. calc. iod. sil.

merc. con. dig.

Genoux (mal en étant à), sulf. bry.

phos-ac.

Gercures, rhus, cham, sulf, merc, calc. lvc. hep.

lyc, hep.
Glandes affectées, hell, merc, sulf, iod. Gorge affectée, bell, merc, acon, dulc, con, lyc, hep. sil, amm, calc, hep. lach, baryt, brom, con. lyc. hep. sil. amm. calc. douloureuses, cham. merc. phosph.

bell, chin, sulf, calc.

sil. sulf. enflammées, merc. bell. phosph.

sil. cham. hep. engorgées, merc. bell. sulf. hep. iod. con. dulc.

squirrheuses, cham, bell, iod, lyc. clem. con. sil. phosph.
- suppurantes. sil. hep. merc. bell.

sulf. duic. lyc. nitr-ac. ulcérées. sil. phosph. ars. hell.

lach, hep. con. sulf. canth.

Goitre, iod. spong. calc. lyc. amm. natr.

Gonflement. cham. bell. merc. bry. sulf. hep. puls.
- blanc, tumeur blanche. bry. lyc.

puls, ars, rhus, ant, sulf, sabin, sil, bleuåtre, cham, bell, lach, ars, arn,

sil. puls. con.
- dur. bry. rhus. phosph. puls. sulf.
carb-an. cham. calc.
- froid, tumeur froide. con. merc. ars. sulf. cocc. squill. rhod.

inflammatoire, acon, merc, bell, bry, hep, puls, ars, sulf, sil, luisant, bry, sulf, rhus, arn, merc,

ars. sabin. mélanotique, hématode.

phosph. carb-veg. sulf. ars. sil. nitr-ac.

-œdémateux, ars. sulf. puls. bry. squill, ant. chin. hell. lyc. kal. -pale. bry. lyc. rhus. arn. iod. puls.

lach. ars. merc. calc. purulent. bell he purulent, bell hep, merc, sil, phosph, lach, sulf, calc, lyc,

rouge, acon, merc, bell, bry, hep-puls, ars, sulf, sil.

spongieux, lach, sil, ars, sulf, carban. phosph. ant.

bell, iod, lye, squirrheux. con.

clem. cham. sil. phosph. - variqueux.carb-an. ars.sil. phosph.

carb-vg, sulf, nitr-ac, lach, Gonorrhée, cann, merc, sulf, canth, caps. nitr-ac.

aigue. cann. canth.

batarde, sep. merc. nitr-ac. thui. sulf. n-vom.

chronique, merc. sulf. cann. caps.

douloureuse, acon, bell, ign, merc. dulc. n-vom, hep, lach.



788 CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Gorge convulsée, spasmes du gosier, Grossesse avec convulsions, cham. bell, stram, lach, n-vom, ign, veratr. — enflammée, acon, bell, merc, dulc. — diarrhée (avec), sulf, ant, sep. phosph. enflammée, acon, bell, merc, dule, brom, hep, lach, baryt,

excoriée, alum, merc, lach, nitrac, arg. graph. caps. brom. carb-vg.-gonflee. bell. lach. merc. hep. sulf. cham. coff. n-vom. igu.

paralysée, caus, cupr. sil. laur.

rétrécie par des spasmes, bell.stram.

n-vom. caps. veratr. ign. - sèche. merc. bell. acon. sulf. n-

- sèche, mere, vom, ign. cham, Goût altéré, puls, rhus, chin, sulf, con veratr, bell, n-vom, bry.

acide. puls. bell. sulf. n vom. chin. cale, tarax. phosph. merc, cham.
- amer. puls. bry. n-vom. cham, sep.
merc. sulf, acon. lyc. arn.

douceatre, puls, phosph, sabad, plumb, squill, acon, stann, alum. -émoussé, puls, ant, n-vom, canth, bell, phosph, lye, sil, cale, caus, -empyreumatique, puls, sulf, squill. Helminthiase, acon, sulf, cin, merc.

chin

fade, aqueux, chin, ign, bry, staph

ant. puls. bell. caps. natr-m.
- graisseux. puls. caus. valer, asa.
lyc. alum. mang. rhus. sil. sang.
- herbacé. n-vom. phos-ac. sass. puls. veratr. stann.

métallique, rhus, eupr, n-vom, cale, coce, lach, merc.

cocc. Jach. merc.
- nauséabond. puls. merc. sabad.
sep. bry. n-vom. ars. calc. iod.
- putride. arn. puls. merc. n-vom.
sulf. bell. acon. arn. coff. cham.
- salé. puls. merc. sep. ars. phosph.
carb-vg. sulf. con. rhus. n-vom.
terreux. puls. phosph. cann. n-

terreux, puls, phosph, cann, n-mosch, chin, ign, hep, ipec.

Goutte. voy. Arthrite.

Gravelle. puls. sass. lye. zinc. cale. cann. n-vom. sil.

Grenouillette, thui, staph, merc, ambr. Hematemese, ipec, arn, phosph, ferr. Grippe.

camph.

veratr. acon. bry.

bry. n-vom. sep. lyc. n-vom. alum.

dulc. petr. hyos. - dyspepsie (avec), n-vom. puls. ipec.

on. sulf. ferr. natr-m.

dysurie (avec), puls. cocc. phos-ac. n-vom. sulf. con.

gastricisme (avec). ipec. n-vom. sulf. con. puls. petr. sep. - moral affecté (avec). puls. bell. plat. acon. stram. veratr.

nausées (avec). ipec. n-vom. sulf. con. puls. petr. sep. odontalgie (avec. sep. cham. bell.

puls. magn. staph. taches sales à la face (avec). sep.

con. ferr. nitr-ac.

toux (avec), sep. puls. bell, n-vom. varices (avec), puls. carb-vg. lyc. vomissements (avec). ipec. n-vom.

sulf. con. sep. ferr. puls.

spig. cic. sabad. ferr.hyos.sil.n-vom. amaigrissement (avec), cin. sulf.

spig, graph. lye. cale.

ascarides [par des]. acon. sulf. merc. ferr. ign. n-vom. calc. phosph.graph. boulimie (avec). spig. cin. sulf. sabad, chin, lye, graph.

coliques (avec), spig. cic. merc. cin.

acon. sulf.

convulsions (avec) cic, hyos,

- diarrhée (avec). merc.cin.spig.acon. fièvre (avec), acon, merc. cin. bell. sil, lach, spig, ferr, igu, lombries (par des), ein, merc, acon, eic, sabad, spig, sulf,

- lune (à la pleine), sil, - scrofuleux (chez les sujets.) sil, - ver solitaire (par le), sulf, merc, sabad, graph, sil, cale, puls, carb-VØ.

sulf. acon. sep. chin. puls.

merc, n-vom. bell. bry, ars. Hématurie, cann, canth. puls. arn. iper. merc. sulf. Grossesse laborieuse, sep. n-vom. puls. Héméralopie, bell. merc. veratr. stram.

veratr. acon. bry. boulimie (avec). sep. n-vom. petr. Hémiopie. lyc. sep. aur. cale. caus.


nair-m magn-m. cin.

- céphalalgie (avec). bell. n-vom. Hémiplégie, cocc caus. bell lach.

puls cocc. verair. plat. bry.
coliques (avec), cham. n-vom. puls.
bell. sep. bry. arn.
constipation (avec), bry. n-vom.

graph. plumb. rhus. n-vom.
ferr. ipec. sulf-ac.
ferr. ipec. sulf-ac.
fermes en couches (chez les), aren.

puls, ipec arn, chin hyos, sulf.



789

supprimées.cham.acon.phosph.sulf. masturbation à la suite de la . sulf. annulaire, sep. clem. natr. natr-m.

carb-vg. phosph. chin. n-vom. - phthisiques (chez les personnes). acon. sulf-ac. sulf. arn. phosph.

cham. règles dérangées (à la suite de).

puls. bry. acon. sulf. sep. con. ferr. Hémorrhagies. chin. croc. acon. ipec. phosph. bell. arn. sulf-ac. lach. — actives. bell. acon. ferr. hyos. croc.

puls. cham. passives. chin. carb-vg. phos-ac.

sec. ferr. puls. ipec. arn. Hémorrhoides. n-vom. sulf.

carb-veg. calc. ars. mur-ac. phosph.

- bleuåtres, carb-vg, mur-ac,

- coliques (avec). sulf. n-vom. puls. carb-vg.

douloureuses. ars. carb-vg. n-vom cham. natr-m.

enflammées. puls. n-vom. ars. sulf. mur-ac. acon

- gercées. cham. caus.

calc. carb-an, sulf.

veg. caps. merc.

- opinatres. n-v calc. caus. lach.

- pruriantes, acon, sulf. n vom. – rectum dans le . n-vom. calc. caus.

coloc. lach. lyc.

- saignantes, acon, bell, phosph, ipec, sulf, puls,

sortantes. calc. sep. caus. puls. sulf. hep. phosph.

- suintantes, sulf. sulf-ac. sep. caus

natr-m. supprimées, n-vom, sulf, puls, carbvg. calc.

ulcérées, puls, cham, n-vom

Hépatite. n-vom. acon. cham. bry. bell. merc. puls. aigue. acon. merc. bell. n-vom. sulf.

- chronique. n-vom. sulf. lvc. aur. magn-m. lach. Hernies. n vom. sulf. sulf-ac. veratr.

cocc. sil. 'chez les . - enfants

veratr. cocc. nitr-ac. - incarcérées sulf-ac. op. lach.

inguinales. n-vom. cocc. aur. sil. Incontinence d'urine, puls, sulf bell. chain. amm-m

– ombilicales, n-vom,

- scrotales, n-vom, magn-m.

Hémoptysie, à la suite d'hémorrhoïdes Herpes. merc. bell. rhus. acon. dulc. hep. sulf.

> face de la , des levres. bell. rhus. merc. hep.

furfuracé, bry, ars, sulf, calc. kreos.

- phlycténoïde. acon. bell. merc. ars. cleid.

prépuce (du'. sep merc. nitr-ac. hep. dulc. caus.
 Hiver affections d'. rhus. dulc. n-vom.

camph. ars. carb vg. petr. veratr. Hoquet. ign. puls. n-vom. acon. hvos. stram. bell.

Horreur de 'air. bell. n-vom. camph. coff. sulf. cocc. de se laver, sulf. calc. sass. nitr-ac.

- du mouvement. n-vom. caps. natrm. sulf. lach.

Humeur (mauvaise). phosph. sulf. staph. merc. n vom.

variable.crocc. ign. acon. plat. bell. stram.

Hydrargyrose, nitr-ac, hep, chin, carb-veg, sulf, aur, sil, lach, lyc. kal-hdr.

Hydrarthre, sulf. calc. iod. sil. merc. muqueuses, borax, sulf. puls. carb-Hydrocele. iod puls. sulf. sil. graph. iod. n-vom. sulf. carb-vg Hydrocéphale. acon. bell. bry. hell.

arn. ars. aiguē. bell. bry. hell sulf arn.

lach mere zine phosph chronique sulf hell a dig, lach stram. hell, ars, mere

Hydrophobie. bell. canth. hyos. lach

weratr, stram.

Hydropisic, aps. chin beil, ars. k.l.
sulf, dig, dulc, lyc,
Hydrothorax, carb-vg, kal, bry, lach.

ars, merc Hypochondres sensibles, n-vom, kal

lvc. calc. sulf. brv. hep. caus. carb. vg. Hypochondrie. n-vom. sulf. natr. dulc.

lach, calc. con, ign, caus, chain Hystérie. ign. n-vom. puls. cin. aur. calc plat.

n-vom. aur. Ichthyose, coloc, hep. plumb.

nitr-ac. Impétigo, roy. Dartres croûteuses. acon. sulf. n-vom. Impuissance. ign. lyc. calad. con. ch. cann. sep. sulf.

hyos. cin. sep. sil.

— enfants chez les. puls. cin ball.

sulf, sep. sil.



Langue chargée de gris. ambr. puls. Lèvres bleues, ars. lvc. dig. cupr. argtart. cupr. arg.

— de jaune. chin. bry. ipec. n-vom. cham. n. phosph. brunatres. phosph. chin. de mucosités, chin. merc. puls. cancéreuses ars. sulf. con. bell. sulf. bell. sil. clem. - uoutoureuses. phos-ac. ign. ipec. plat. sabad. bell. — de noir. chin. merc. phosph. — de vert. magn. magn-m. rhod. plumb excoriées. ars. bell. canth. cham. convulsée, cham. ign. lyc lyc. natr-m. enflammée, acon, merc, lach, arn,
 exceriée, merc, sil, n-vom, lach. exfoliées, cham, n-vom, puls, sep. carb-vg. - fendillée, bell, sulf, puls, cham, ngercées. carb-vg. ign. merc. natr-m. vom. chin. – froide, veratr. bell. laur. gonflées. bell. merc. ars. sulf. hep. gonflée. ars. bell. lach. bell. kal. - inférieure (l'). lach. sep. puls. hell. lyc. mur-ac. lourde, bell, mur-ac, colch, plumb. merc. natr. arg.
- noires. ars. chin. rhus. veratr. acon. carb-vg. noire.ars. chin lach. n-vom. veratr. squill. paralysée. caus. lach. bell. hyos. dulc. graph. op. n-mosc. euphr. - roide. lach. bell. lyc. calc. merc.

- rouge, hyos, cham, rhus, bell, sulf.

- seche, bell, rhus, sulf, hyos, cham. ars.

ulcérée, merc. natr-m. lyc. n-vom. borax. sulf-ac. op.

vésicules couverte de). hell. suif. carb-an. merc. natr. Larynx affecté, acon, spong, hep. dros.

carb-vg. caus. phosph, iod. - enflammé. acon. dros. phosph.

spong. carb-vg. caus. hep.

ulcéré. carb-vg. phosph. arg. iod.
sulf. caus. lach. hep. Larmoiement. acon. euphr. bell. puls.

sil. phosph. ars. Lascivité. carb-vg. phosph. chin. calc. canth. puls. sep. sıram. Lassitude. puls. veratr. chin. ars. rhus.

bry, arn.

Légumes (mal par les). bry. natr. hell.

veratr. ars. cupr. Lepre. sulf. sil. ars. hep. alum. graph. natr. phosph.

Lésions mécaniques, arn. rhus. puls. lach. sul-ac. ruta. con. bry. sil. cic. Léthargie. op. bell. camph. lach. puls.

tart. hyos. Leucorrhée, roy, Flueurs blanches. Levant du lit (mal en se), carh-vg, cocc, con, ign, ars, acon, bry, bell.

Levant de son siège (en se). puls. caps. rhus. con. spig. phosph. Levres affectées. bell. sulf. sep. rhus.

natr-m. bry. staph. n.-vom. igu.

ars. brv. op. staph.

- supérieure (la). sulf. natr-m.

ales. caus lyc. ferr. spig. calc. · p sulf. con.

renversées, bell. merc. saignantes ign. merc. ars. carb-an. bry

seches. bell. merc. bry. rhus. chin. veratr. sulph. phosph. acon. - ulcerées. bell. sil. sulf. merc. ars.

sep. natr-m.

- vésicules (couvertes de . sulf. ars. bell. rhus. bry. sep.
Lichen. acon. lyc. sulf. cic. bry. natr-m.
Lientérie. chin. ferr. phosph. bry. ars. phos ac. calc.
Lippitude. acon. euph. merc. puls.
rhus. stram.

isant (mal en). sil. calc. sulf. bell. natr-m. cin. lvc. chin. ruta. nvom.

 a haute voix (en', phosph, carb-vg, mang, par, nitr-ac, verb, cocc, ochies derangées, sec, puls, plat, rhus, bell. carb-an.

arrètées, puls, n-vom, bell, coloc, sec. plat.

- fétides, carb-an, sec, bell. de trop longue durée, sec. plat. calc.

rhus. puls Lombes (mal aux). puls. bry. n-vom.


sulf. calc. acon. Lombrics, acon. cin. merc. sabad, sulf.

cic. spig. Loupes, calc. nitr-ac sulf, hep. graph. sabin.

Luette affectée, coff. bell. merc. n-vom. puls, carb-vg. - allongée, coff, calc, croc, dulc, lyc.

iod





793

Méningite, bell, bry, acon, hell, sulf, camph, hyos,
— soleil (par l'action du, camph, acon, voral affecté, n. vom, bell, stram, vo-

bell. hyos.

Mentagre, cic. sil. sulf. ars. hep. graph. ant.

mercure mal par l'abus du', hep, nitr ne, bell, sulf, chin, aur, lye, lach, — angine, lye, bell, hep, lach, sulf, carb-vg. staph.

bouche affectée, nitr-ac, sulf. dulc.
 op. carb-vg. staph. hep. aur.
 faiblesse, chin. carb-vg. hep. nitr-

ac. lach. aur. glandes affectées, aur. nitr-ac.

arb-vg. sil. dulc. hydropisie. chin. hell. sulf. dulc.

mul par le . impressionnabilité au Muqueuses affections . puls . merc. emps. carb-vg. chin.

os affectés. sil. sulf. lyc. phos-ac. aur. nitr-ac.

chin, hep. carb-vg. - - rhumatisme. sulf. puls. lach. bell. aur.

salivation, nitr-ac. op. dulc. sulf. iod. hep. chin. carb-vg.

od. hep. cnin. carb-vg.
- ulcères. nitr-ac. hep. thui. lyc.
sulf. aur. carb-vg. sil.
Métralgie. Voy. Matrice douloureuse.
Métrie. Voy. Matrice enflammée.
Métro-périonite. merc. bell. cham.
Tarinas affactées cale cham.

n-vom. plat. bry. acon. rhus.
Metrorrhagie. bell. chin. sabin. plat.
croc. ferr. hyos.
Miel veneneux [mal par le]. coff.

camph.

Migraine, sang. bell. coloc. sep. puls. n-vom. spig. bry. Miliaire. acon. ipec. bry. merc. rhus. cham. ars. sulf.

enfants des acon. bry. ipec. bell. cham.

pourprée, acon, coff, bell, sulf.

- scarlatineuse, sulf. dulc. acon. bry. coff.

Moelle épiniere affectée, dulc, n-vom. cocc. rhus. sulf. – atrophice, n-vom, sulf, cocc, caus.

s'aph. phosph. -- cutlammée, dulc, caus, n-vom, lach.

bry. cocc

Moles, canth, merc.
Mollets crampes dans les chum.
camph, veratr, sep, nitr-ac, sil, sec.

Montant malen , calc, spong, bry, ars. cupt. spig. sep. merc. amm. nitr.

- escalier petr. aur. acon.

ratr. aur. sulf. hyos. hell. staph. ign. puls. acon. Morsures, sulf-ac, arn

- venimeuses, seneg, lach, bell, amm. ars. arn.

Morve du cheval. ars. merc. sulf. sil. bell. bry. hep.

Mouillé mal après avoir été, puls. calc. rhus. sep. sass. bell. n-mosch. bry.

Mouvement mal par le , bry, chin, n-vom, arn, bell, lach, Mouvement horreur du , caps, n-vom,

natr-m. sulf. lach.

calc.

Musique mal par la', phos-ac, calc, sep. natr. coff. n-vom, kal, Myélite, dulc, lach, n-vom, caus, bell, ars. bry.

Myopie, carb-vg, con, phosph, phos-ac, lyc, nitr-ac, suif-ac, ruta, sulf, puls.

Narcotisme, coff. amm. carb-veg. puls. lach. bell. ars. calc. hell.

Narines affectées, calc. cham. lach. lyc. sulf. n-vom. bell. puls. sil. caus.

1ye, sun, n-vom, beil, puls, sil, caus, bouchées, sil, cale, bry, n-vom, sulf, caus, con, amm, alum, -croûteuses, merc, lye, sulf, aur, cham, lach, graph, cale, staph, douloureuses, hep, merc, cham, bell, n-vom, bry, phosph, -excoriées, phosph, n-vom, fluorac, spig, ign, alum, graph aut

ac. spig. ign. alum. graph. ant. - ulcérècs. merc. sulf. aur. st calc. alum. puls. lyc. sil. aur. staph.

Nausees, ipec. n-vom. carb-veg. ant. tart. hep. natr-m. puls. bry. — bu a; res avoir, n-vom. puls. bry.

natr-m. rhus. mangeant en . puls cocc. veratr.

kal, carb vg. -mangé dprès avoir , n-vom, sulf, puls, sil, natr-m.


matin le . n-vom. sil. graph. carb. veg. amm. veratr.

- voiture en allaut en . petr. cocc.

sulf. Navets mal par l'usage des puls. bry.

un . mere. n-vom. rhus. Nephralgie. puls. lyc. sass. canth. acon.





Odeurs diverses devant le nez. bell. Od cale. sulf. puls. n-vom. aur. veratr. nitr-ac. - acides. bell. alum.

- aromatiques. ign. puls. - douceatres. nitr-ac.aur. sil. n-vom. n-vom. anac.

empyreumatiques.
sulf. aur. graph. cale.
poix (de). ars. con.
pus (de). sulf. seneg.

- putrides. bell. phospn. aur. mis-ac. s-p. cale. n-vom. graph. veratr. - rhume (d'un vieux. puls. sulf.

graph. merc.

sang (de), n-vom, amm, sil.
 soufre (de), n-vom, ars, graph, calc.

plumb. anac.

- terreuses. veratr. calc. sulf. anac. Odontalgie. cham. merc. puls. sulf. acon. staph.

- arthritique. acon. puls. n-vom. sulf. chin

-- café (par l'abus du', cham, n-vom,

ign. bell. merc. - cariées (dans les dents'. cham.merc.

staph. puls. sep. n-rom. congestive. acon. cale. bell. aur. hyos. chin. cham.

eau qu'on boit (par l'. cham. rhus. Odorat affecté, bell. sulf. n vom. lyc.

amm. sil. spig. enfants (chez les), cham. merc. acon. bell. sulf. calc.

- face 'jusqu'à la', merc, n-vom, hyos, rhus. spig.

femmes (chez les . puls. bell. sep. OEdème. chin. bell. ars. sulf. kal. lyc.

gencives enflées avec), merc. bell n-vom. suif. staph

glandes sous-maxillaires engorgées 'avec', cham, staph, merc, sep. nvom.

grossesse (pendant la), sep. bcil.

puls.

joue enflée (avec), bell, merc, cham,

n-vom. staph. puls. arn. sulf. -mangeant (en). bell. merc. bry. staph. sulf. - mangeant chaud (en). bell. puls. bry. sulf.

cham - froid (en). calc. merc. carb-veg. cham.

 matin (le). ign. n-vom. merc. staph. phosph.

mercure par l'abus du carb-veg. nitr ac. staph.

ontalgie nerveuse, coff. acon, hyos bell. spig. n. vom.

nocturne, cham. bell. merc. coff. sulf puls.

nourrices (chez les) carb-veg. chin. oreilles (jusqu'aux). puls. merc. bell. staph. cham. sulf. rangée de dents (dans toute une).

merc. staph. cham. rhus.

refroidissement (causée par un'. duic. bell acon. merc. puls. n-vom. ign.

regles (à l'époque des . carb-veg. cham, amm sep. graph. calc. - rhumatismale. chin. puls. merc.

acon. sulf. n-vom.

semî-latérale. puls. cham. n-vom. merc. rhus.

sensibles (chez les sujets'. coff.

acon. cham. n-vom. ign soir (le). puls. merc. sulf. bell. rhus. ign. bry.

tabac (par la fumée du', ign. bry. spig. chin.

tête (jusque dans la'. merc. puls. bell. suif. n-vom.

- yeux (jusqu'aux), spig. puls. calc.

puls. natr-m. sil. sep. hep. émoussé. bell. puls. n-vom. sil.

sulf. sep.
- sensible 'trop', bell, sulf, n-vom, acon, lyc, hep.

hyos. acon. cham.
froid humide (par un'. n-mosch.
borax. puls. rhus. rhod. sulf.

OEil. Voy. Yeux.
OEsophagite. cocc. carb-veg. lach. ars.

canth. asa

OEufs (mai par l'usage des . colch. ferr.

Oignons (mal par l'usage des), thui. Ongles malades, sil. graph, hep. ant. merc. sulf. rhus.

bleus. chin. n-vom. natr-m. dig. aur. sil.

cassants, sil. alum, sulf, graph, sep. merc.

côtelés, sabad. - croissant lentement. ant.

décolorés, graph, nitr-ac, sil, ant, ars. sulf.

difformes, graph, sulf, sil, sep, ant. alum.

douloureux.º graph. caus. m-aus. merc. ant

entrant dans la chair, sulf. m-aus graph sil. teuer. colch. - envies (affectés d'). sulf. natr-m.

rhus, stann, merc, calc.



796

CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Ongles épaissis, graph. sil. sulf. calc. Orage (mal par un temps d'), sil. sep. natr-m. bry.
— exfoliés, graph. sulf. sil. alum. Orbite des yeux douloureux, spig. hell.

jaunes. sep. sil. con. nitr-ac. merc.

sensibles. ant. graph. caus. sulf

tombants. graph. merc. ars. sep. sec. bell.

sec. hell.

— ulcérés, hep. sil. merc. sulf. lach.
Oophorite, thui. plat. nitr-ac. merc. orciles affectées, puls. merc. bell. sep.
Oohtbalmie, hell. acon. merc. puls.
— bouchées, caic. puls. merc. sil.

cuphr. ars. cham, calc. phosph.

aigue. acon. bell. merc. puls. cham. arthritique. acon. puls. sulf. bell.

spig, calc

acon. bell. ars, cuphr. sulf. hep. cale

chronique. ars. phosph. euphr. nitr-ac. conjonctive affectée (avec). bell. ars.

merc. sulf. puls.

cornée affectée (avec), cann. nitr-a:, merc. hep. ars. lach. extérieure. hep. acon. sulf. bell.

fatigué les yeux pour avoir bell.

ruta glandes de Meibomius affectées (avec), puls, bell, merc, sulf, ars.

gonorrhéique. acon. puls. nilr-ac. merc. sulf

iris affecté (avec l') mere clem. seneg. mercurielle. nitr-ac. hep. sulf. lach.

merc. acon. puls. bell. palpébrale. acon. be acon. bell. sulf. puls.

n-vom. hep refroidissement refroidissement (par suite d'un). dulc, cham, acon, ars.

- rhumatismale. acon. merc. sulf.

puls. bry. ars scrofuleuse, bell. merc. sulf. calc. n-vom

syphilitique. thui. phosph. acon. sulf.

traumatique, arn. con. ac sil. calc. sulf-ac. hep. lach sil. calc. travaux fins (causée par des). ruta. bell. carb-vg.

Opisthotonos. op. n-vom. bell. ipec. coff.

Opium (mal par l'usage de l'), camph, ant, ipec, merc, belt,

Orbite des yeux donloureux, spig. hell. chin. hyos, plat. calc. Orchite, mere, arn, aur, puls, spong,

acon. merc. aur. puls.

gonorrhéique, merc. aur. puls. cham, nitr-ac, ign. oreillon (à la suite d'un), merc. carb-veg. puls.

nitr-ac. sulf. s. puls. acon. cans. bourdonnantes.

bell. Iye. cariées en dedans, nitr-ac, sil, aur.

staph. asa. coulantes, puls, sulf, merc, caus,

cale, earb-vg. douloureuses. Voy. Otalgie

dartreuses, graph, sep. oleand, calc. lyc. sulf. enflammées. Voy. Otite.

excoriées, graph, merc. petr. sulf. calc. kal.

fétides, graph, carb-veg, hep, aur. oleand. gonflées. puls. merc. sep. lyc. rhus

rouges, puls, alum, ant, chin

seches en dedans, graph, phosph. petr. lach, nitr-ac.

suintantes, derrière. oleand. calc lye, graph. tintantes. chin. bell. puls. n-vom.

calc. ulcérées, merc. puls. ruta. spong.

kal, calc. nouveaux-nés (chez les), sulf, euphr. Orgueil, plat, lye, stram, cupr, veratr, merc, acon, puls, bell. Orteils affectés, arn, caus, graph, sulf.

sabin. asa. douloureuses, acon, sulf, arn, cale,

douloureuses. de lye, bry, ars, sabin, lye, bry, ars, sabin, matr. carb-an.

nitr-ac. mang. suantes. cycl. tarax. arn. clem. Orthopnée paralytique tart, ars carb-veg. op. lach.


merc. nitr-ac. aur. Os affectés. merc. cale. sulf. sil. asa.

lye, phosph. aur. cariés, sulf. calc, merc. sil. phoslye

déviés, calc. sulf. sil. puls. rhus. lyc douloureux, chin, merc, sulf, nitr-

ac. aur. phosph. enflammés, merc. chin, aur. sil.

nitr-ac.



Us formant lentement le calus. calc. sulf. sil. lyc.

gonflés (exostose). merc. phos. aur. calc. asa. phos-ac. sil. sulf. staph. Pain (mal par l'usage du). chin. sulf. nécrosés, sil. sulf. calc. sec. phosph.

- ramollis. sulf. calc. sil. merc.

ulcérés. sulf. calc. merc. sil. asa. lyc. phosph. aur.

Otalgie, puls. bell. merc. cham, sulf. n-vom

inflammatoire. bell. merc. puls. · sulf.

refroidissement (à la suite d'un).

cham. puls. dulc. chin. rhumatismale. puls. bell. merc.

chin. n-vom. nerveuse. bell. cham.n-vom.sulf.

puls. sulf. n-vom. Otite. puls. merc. bell.

externe, puls. merc. bell. sulf.
interne, puls. bell, sulf. merc. n-

Otorrhée. puls. sulf. merc. calc. men.

carb-vg. - catarrhale. puls. sulf. merc. calc.

hep. bell. exanthème (après un), men, merc,

puls. bell.

muqueuse, puls, merc, sulf, calc,

- purulente. merc. sulf. hep. puls. ass. calc. sil.

sanguinolente, puls, merc, graph. rhus. bry

scrofuleuse. merc. sulf. lyc. puls

hep. supprimée. puls. merc. bell. hep. bry. lach. n-vom.

- — suivie de céphalalgie. bell. bry. - — suivie de glandes enflées. merc.

puls. bell. suivie d'orchite. merc. puls. aur.

zinc. n-vom. Oule affectée, puls. bell. merc. phosph.

caus. sulf. aiguë (plus). phos-ac. bell. lyc.

natr. bry. - émoussee. faible. bell. caus. sil.

puls. phosph. sulf.
sensible (trop., acon. coff. cham.

bell. n-voin.

Ovaires affectés, merc. lach. plat. thui. nitr-ac. canth. bell. sep. chin. Ozène, aur. merc. asa. calc. sulf. puls. lyc.

P

sep. merc. bry.
- de seigle, sep. bell. sulf. puls. chin.

rhus.

Palais affecté, merc. aur. n-vom. bell. calc. lach.

carié, aur. merc. lach. sil. calc. enflammé. n-vom. calc. merc. lach. aur. chin.

carb-vg. merc. nitr-ac. excorié. lach. sulf.

gonflé. n-vom. calc. chin. baryt.

Palpitations de cœur. acon. spig. puls. sep. lyc. chin. natr-m. iod. phosph. congestives. acon. kal. phosph. chin. sulf.

contrariété (après une), ign. acon.

bry. spig.
joie subite (après une). coff. acon. veratr.

nerveuses. coff. cocc. cham. n-vom. puls. veratr pertes débititantes (après des), chin.

n-vom. sulf. phos-ac peur (après une), coff. veratr. op

ulcères répercutés (à la suite d'ars. sulf. caus. lach. lyc.

Panaris, hep. sil. lach. sulf.

Paralysies, cocc. caus. rhus. n-vom. bell. hyos. apoplectiques. bell. arn. n-vom.

zinc. stram.

faiblesse (par suite de), chin, sulf, ferr, cocc, rhus, n-vom. partielles. caus. sulf. cupr. sec.

bell. cocc. rhumatismales, ruta, ferr, baryt,

semi-latérales, hémiplégies. caps. lach. plumb. graph. bell. spasmes (à la suite de), cupr. sec.

caus. bell. n-vom. - ulcères répercutés (après des), sulf. caus. lach. rhus. bell. sil.

Parlant -mal en). ars. arn. sulf. u-vom.


cocc. ign. Parlé (mal après avoir), sulf. arg. ign.

bell. cocc Parole affectée. bell. stram. euphr.caus. merc. lach.

bégayante, bell, stram, caus, euphr.

difficile. euphr. stram, n-vom. dulc. lach.

embrouillée, indistincte, caus, lyc. bry, lach calc. sec. - lente. ars. thui. sec.



chin.

795 CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES.

Parole nasillarde, bell, lye, phos-ac, Peau froide, veratr. ipec, sulf, rhus, lach, sil, sep, camph, phos, carb-vg, samb.

- perdue, bell, hyos, caus, laur, lve, stram.

 précipitée, bell.lach. hep. mere Parotite, rhus, mere, carb vg, kal.

aur, cale. scarlatineus), cale, kal, nitr ac.

lve.

Patisseries mal par l'usage des', puls ipec, ant, kal. Paupières affectées, acon, hep bell.

cuphr. ars. cham.

– agglutinées, merc. puls, n-vom sulf, ars. carb-vg. – chute (affectées de), spig-sep.vcrat nitr ac. bell. stram

nitr-ac. pent, stram.
- crampes affectées de', hyos, cham.
sil, bell, hep. croc.
- dartreuses, bry, sep. rhus, ars.
- enflammées, foy, Blépharite,
hell.

fermées, occlusion, cham, hyos, croc. hep. stram,

gonflées, acon, merc, sulf, bell, puls, hep, nitr ac, ars, cham, nodosités (affectées de , staph, calc,

rhus, bry, aur.
paralysées, veratr. sep. spig. nitrae, bell. stram, hyos.

 pesantes, cham, sep_n-vom, spong. bell.

- rétrécies (les fentes), aut. canth.

arn, croc - roides, rhus, veratr, spig.

 rouges, acon, lyc, cham, bell, nvom. hep. merc. sulf.

vom hep. merc. sulf.

- seches, veratr. acon. rhus. m-aus.
Peau ardente, brulante ars. acon
bry, bell. sill. phosph. lach. lyc.

- atonie de la), con. phos-ac, kal.
auac. lyc. bry, sil. dulc. ipec.

- bleue. dig. veratr. lach. op. cupr.
bell. ars. carb-veg. phos-ac. sec.

- calleuse. sep. graph. ant. sil. ran.
borax. rhus. lach. sulf. annu.

- chaude, acon, bry, ars, bell, sil.

lyc, phosph. lach. douloureuse. pu douloureuse. puls. rhus. graph. amm-m. phosph. kal. mang. hep.

dure, sep. rhus, graph, ant. sil. dulc. lyc. chin. ars. thui, lach, kal.

— parchemin comme du ars, sil. lyc. chin. squill kal. phosph. élasticité manque d', yeratr. cupr. élasticité manque d'éveratr, cupr. rhus, bovis, ars. lach, dulc.

flasque, calc. veratr. iod. cocc. lvc.

chin. caps. sec. sulf. con. - flétrie. sec. chin. veratr. phos-ac. ars, sil. ferr. sass, iod.

selen, cale, magn-m. asar. - insensible, sec. anac, oleand, ambr. phos-ac. lyc. sulf. plat. conc. phosph.

graisseuse, natr-m. chin. merc. brv.

jaune, acon merc, chin, sep. con. n vom. sulf. aur. spig. bry. op. bell. noiratre. sec. nitr-ac. spig. acon.

rut, asa. - ordemateuse, hell, ars. chin. ferr. ant. cupr. calc. caps. graph. bry, ass. - pale, sulf. calc. nitr-ac. ferr. puls.

- pare, sait, care, intrace, terr, purs-hell, coce, plat, lyc, sep, kal, phosph, - ridée, veratr, cupr, sec, ant, sep, lyc, stram, ambr, rhus, phos-ac, spig

roide, phosph. nitr-ac. plat. acon. caus, natr-m. stront, sep. n-vom. rouge, rhus, bell, mere, graph, puls, acon, n von, 2rn, phos-ac, lyc.

rude, sep. cale, sulf. bell. rhus, iod, sass, graph, oleand, laur, sale, iod, ferr, phosph, merc, sec.

bry. seche, acon, sulf, bell, phosph, lyc. bry, kal, cale, dulc, chin, cham.

suintante, rhus, carb-vg, lye, graph, sep, kal, staph, petr, selen, lach, squammeuse, de-quamation, mez, hell, amm, veratr, acon, staph, coloc, visqueuse, phosph, lye, veratr,

visqueuse, phosph. lyc. veratr. acon. phos-ac. bry. merc. cham. iod. ars. vulnérable, sil, cham, petr. nitr-ac.

sulf. baryt. puls. borax. hep. asa. Pemphigus. dulc. rhus. canth. ars. ran, hep. caus. Péritonite, merc. acon. n-vom. brv.

bell. hyos. puerpérale, n.-vom, acon, merc, bell, chain, bry,
 Pétéchies, bry, ars, rhus, phosph.hyos,

n-vom. Petite vérole, mere, sulf. ars. rhus,


thui, bell. avant l'éruption, acon, coff, bell,

thus, bry, sulf, -éruption (pendant l'), sulf, merc.

bell. stram. thui. pustules confluentes (avec . sulf. mere.

pustules noires avec . ars. chin. sulf carb-vg, lach, rhus, - suppuration pendant la sulf, mere,

than, puls, rhus. temps de la dessiccation pendant le . bell, cham, puls, acon, sulf, Peur suites d'une, veratr, op. ign.



799

Pharyny affecté, bell, acon, hyos, lach, Plaies par morsure, sulf-ac, arn,

mere, coff, cocc, sulf, dulc, - crampes pris de, bell, stram, ign n-vom, sulf, cocc,

- enflammé, acon, bell. merc. coff. sulf. dulc.

 paralysé, caus, cupr sil, lach, laur.
 Phimosis, mere, sulf, cann, thui, nitrac. sep. Phosphore mal par l'usage du coff.

n-vom. sulf. bell. alum. Photophobie. bell. acon. con. hep. phosph. merc. sulf. cin

Phthisie. sulf. calc. sil. lyc. phosph. kal. nitr-ac. hep.

– abdominale, calc. phosph, sulf. sec.

nitr-ac. - laryngée, carb-vg, lach, **arg, spon**g,

hep mang. ars. io l. sulf. sil. kal

- pulmonaire calc. sulf. sil. kal. nitr-ac. lyc. hep. lach, puls. Piano mal par le jeu du . kal. natr. calc. sep. zinc.

cale, sep. zinc.

Pieds affectés, puls. bry, sulf, caus
sep. lyc, sil, hep, graph.

— crampes pris de, carb-vg, amm,
cale, sep. coff, sil, n-vom, phosph.

— érysipèle affectés d', puls. dulc.

— froids, sulf, caus, sil, con, verair,
graph, plat, kal, phosph, lyc,

— gonfiés, hal fort, sulf, ars, uhosph.

gonflés, kal. ferr. sulf. ars. phosph. bry. sil. chin. phos-ac. led. sep.

- paralyses, oleand, chin, ars plumb, phosph.

su nts. sil. carb-vg. sulf. calc. sep.

lyc. hep. graph.
Pierre de la vessie. sass. lyc. cann. calc. phosph. ant.

Piqures d'insectes, arn. bell. acon ant. merc. sep. Pissement au liv. cin. bell. puls. sulf.

sep. sil. Pituites de l'estomac.

ituites de l'estomac, bry, carb-vg sep, n vom, sulf, sil, lyc, staph mez. Pitvriasis. bry, ars sulf, cale, sil.

kros, phosph. dule. Placenta adherent, plat, sec. puls, bell.

Plaies, arn. sulf ac. daph. puls cham. sil, sulf.

- contusion par arn. con. sulf-ac.

- échardes par des hep. nitr-ac. - enflammées, cham, hep. sil. puls. sulf. petr.

gangrenées, chin. ars. sil. bell.

- ouvrant de nouveau s' lach phosph.

carb-veg. sil.

piqure par arn. lach, sil, carb vg. nitr-ac. saignant facilement, kreos, arn.

phosph. chin. sulf-ac. suppurant beaucoup, merc. bell. sulf. hep. puls.

suit. nep. puis. Pléthore acon. sulf. bell. phosph. puls. n-vom. hyos. sabin. cale. hep. Pleurésie. acon. hry. kal. squill. sulf.

nitr. lach. merc. - épanchement avec . kal. merc. sulf. squill.

Pleurodynie, arn. n-vom. bry. acon.

sulf. puls. chin. Pleurs faciles. puls. cham. sulf. acon. p at. caus. nitr-m. sep. mal en versant des . arn. hep. bell.

stann. Plique polonaise lyc. fluor-ac natr-m.

borax. Plomb mal par l'usage du , alum, plat. op. cham

Pneumonie, acon. bry. sulf. mere, chin. tart. squill. ars sulf. phosph

- adynamique. acon. merc. cham. n-vom, veratr, ars.

bilieux avec symptomes, tartr. cann.

debut au . acon. bry. sulf phosph. lvc.

hépatisation dans la période d'. sulf. phos. lach. lyc. splénisation période de . acon. hrv. phosph. sulf. chin. lach. sil.

suppuration avec sulf phosph.lyc. lach.

typhot le putride, rhus, bry, veratr. ars. op. arn. bell. - vieillards chez les , tart, chin. cann.

op. veratr. ars.
Podagre. arn. acon. sulf. lyc. sass.
puls. sabiu.
Poils chute des. sulf. kal. graph.


phosph, natr-m, cans, cale, sil, rhus, -favoris aux', graph, natr-m, cale, ambr, sil, nitr-ac, plumb, -moustaches aux kal, plumb b tryt.

baryt.

 narines aux graph, caus, sil cale. pubis au . rhus. natr-m. natr. selen. hell, nitr-ac, hell.

sourcils aux . kal. bell. selen caus. par, plumb, hell. — tout le corps

- gauge eners. chin. ars. sil. bell. par pulmo, net.
lach. carb-vg. — tout le corps par cale, nation.
graph. sec. carb-vg. sabin.
sil. petr. sulf. lach. — incision par), staph. arn. sulf. nat.
borax. bry.



801

Prurit: chalenr du lit (à la' earb-vg. staph. cocc. sulf. thui. mere.

- déshabillant (en se), cocc. puls. con. sil. n-vom.

- nuit (la), acs. veratr. cham. puls. Com soir (le) rhus, amm-m, staph, n-

vom puls. – sueur' pendant la . op. rhus. cham.

ipec, con. Psoite, puls, rhus, sulf, bry, merc, Pustules,

arn, acon bell, hep. Psoriasis, sep. dule, sulf, ars, phosph. calc.

Piyalisme. Voy. Salivation. Pupille affectée, bell. merc. calc. hyos. nitr-ac. spig. hyos, stram, hep.

adherente, nitr-ac, calc, sulf, graph. sil. - contractée, veratr. cocc. sulf. arn.

sil, cham, sep. chel, - dilatée, stram, bell, spig, calc, op.

hvos, nitr-ac, cin

immobile, op. bell. nitr-ac. capr.

stram, hyos, laur, baryt, - inégale, merc, sulf, bary inégale, merc, sulf, haryt.

Pus des ulcères altéré, sil, asa ars, merc, rhus, sulf, chin, bell.

pule

abondant, hep, sulf, merc, puls,

asa, sep, chin, sil. Rage, canth, bell, hyos, lach, - acide [d'odeur], hep, sulf, merc, Rapports, bry, sulf, ant, n-vom, arn.

. calc. graph. - albumineux, puls, lyc. calc. sulf. ars. sil. amm. sep.

- aqueux, sil. merc, rhus, caus, sulf. -. staph. asa.

- blanchare, laiteux, puls, lye, cale. graph.
sulf, ars, sil, amm. — ail odeur d', asa,
- brunatre, sil, bry, carb-yg, ars, — air d', n-yom, bry, sulf, carb-ye.

brunatre, sil. bry. carb-vg. ars. puls. rhu-

mere, sep. nitr-ac. ant. sil. carb vg. ph sph. - fétide, sulf, hep. phos-ac. ars. sil. - amers, bry. ara. puls. ars. con.

gris, caus, sil, merc, ambr, lvc. - douceatre

sep. ars. chin. thui. carb-an.

having sentant le , graph. - douloureux, n-vom, co e, phosph, - jaunaire, puls, merc, sil, sep, ars, - petr, sep, carb-an, carb-yg, staph, cale, phosph, cans, — fetides, silf, coce, bism, - liquide, clair, merc, caus, sil, asa. — putride d'un goût , puls, arn, coff. - jaunaire, puls, merc, sil, sep. ars.

sulf, nitr-ac, thus,

 noir teignant en , sulf, chin, bry. lye.

rare, manquant, sil. calc. merc. — répugnants, lach, hep, bell, veratr, cupr. — natr-m. cin.

n-vom. Pus sanguinolent, merc. ars. asa, sil, carb-vg, puls, caus, nitr-alye.

sanieux, sil. ars. rhus. carb-vg. nitrac. merc. chin asa. staph. vermineux, avec insectes, sil. sabad.

sulf, ars, merc, calc.

- vert teignant en . sil. asa. puls. caus, sep. merc. rhus, aur. n-vom. visqueux, sil. asa. con, ars. sep. merc.

tart, ars. thui, merc, sult ant. bell. hep. – noires. chin. ars.

Pyrosis, puls, n-vom, sulf, calc, sulf ac. caps.

Q

Quinquina ,mal par l'abus du . ipee. veratr. sulf. n-vom. puls. ars. merc.

R

Raccourcissement des muscles, çaus. arn. sep. a:nm-m. sulf. coloc. lach. natr-m. Rachitisme cale, bell, sulf, lye, sli,

merc, puls, nitr-ac. Rage, canth, bell, hyos, lach.

natr-m, verair, cocc, sep, rhus, con.

 acres, merc, alum, asa, sulf, hep. phos-ac. bell.

aigres, puls, n-vom, sulf-ac, carb-vg, sulf, phosph, calc, lyc, natr-m,


puls, rhus. lach, caus, hep, con, arn, verair, corrosif, acre, sil, ars, rhus, caus. — aliments—avec le goût des , puls.

ant, sil, earb vg. ph sph.

douceatre d'un gont , ac m. sulf-ac, merc, alum, dule.

ant, mere, n-vom.

rances, thui, mere, asa, sulf, hep. bell, puls. - répugnants, nauséabonds, sep.



CLINIQUES LES PLUS IMPORTANTES. 802

Rapports d'un gout salé. staph. arn. Règles acres. sulf. carb-vg. sil. amm. tart, sulf-ac. Rasant (mal en se), carb-an, puls calad.

Rate affectée. caps. arn. sulf. ars. sec. chin. rhus. ign. asa. natr. douloureuse, natr-m, arn.
 con, amm-m, chin, sulf.

dure, induration. sulf. caps. chin. ars. n-mosch.

- enflammée, chin, bry, sulf, acon, n-vom.

- engorgée. caps. ars. sulf. chin. nmosch. ign. n-vom.

Rechauffant au grand air (mal en se). puls. bry. lyc. iod. spig. sabad. - au lit (en se). cham. merc. d merc. dros.

sulf. sabin. veratr. thui. lyc.
Redressant (mal en se'. acon. sulf.
bell. rhus. bry. op. n-vom.
Rectum douloureux. ign. caus. acon.

m-vom. con. merc. ars. sulf.

sortant, chute. ign. sep. n-vom sulf. merc. ars.

Refroidissement (mal par un), dulc. acon. n-vom. cham. puls. merc. - céphalalgie acon. n-vom. bell. dulc.

- coliques. cham. merc. bell. - diarrhée, merc. veratr. dulc. puls. sulf.

- dysurie. puls. calc. dulc. - fièvre. acon. coff. bell. merc. dulc. gastricisme, ipec, acon, n-vom, puls, bry,

- odontalgie. cham. dulc. acon. coff. merc

- ophthalmie. acon. bell. merc.

rhume de cerveau. merc. n-vom.

dulc. acon. puls. bell. hep.
- de poitrine. acon. bry. n-vom. puls. bell.

sueurs abondantes, merc, cham. vue affectée. bell. dulc. merc.

Refroidissement des pieds (mal par un). sil. puls. cham.

Refroidissement de la tête (mal par un)

sep. bell. puls. ed. Refroidissements faciles. dulc. baryt sulf. calc. sep. carb-vg. sil. graph. Regard fixe. op. stram. bell. phos-ac. hyos. ars.

Règles dérangées. puls. sep. sulf. cocc. graph. calc. bry. acon. phosph. n-Repugnance pour les aliments, puls. vom.

puls. kal. avançantes. n-vom. ipec. sep. calc. phosph. carb-vg. - brunes. chin. bry.

- brunes, chin, bry. - caillots en forme de , cham, ipec. chin. bell. sabin.

courte durée (de trop), puls, dulc,

lach, baryt, amm.
- faibles 'trop , puls, con, natr-m, graph, baryt, lach, - fétides, bell, sil, carb-vg, bry, sabin.

cham. foncées (trop'. chain. puls. cocc.

-fonces (trop), chain, pure, cocc, sulf, bell, n-vom,
- fortes (trop), calc, plat, ign, sec, lyc, sil, phosph, bell,
- longue durée (de trop), n-vom, lyc,

- longue durse de trop. a suff-ac. plat. phosph.
- pales trop. carb-rg. sulf. puls. graph. nitr-ac. ferr. calc. con.
- retardant. sulf. puls. sep. caus.

natr-m. dulc.

retardées chez les jeunes filles, puls, sulf. caus, sep. kal, - supprimées, puls, bry, lyc, sulf. sep. con. acon. kal.

sep. con. acon. kar. avec souffrances, puls. bry. sulf.
calc. sep. crcc. n-vom. graph.
-— avant l'époque, puls. calc. sulf.
cupr. sep. lyc. verat. sec.
-— au début de l'époque, hyos. sep.
acon. puls. cham. plat. caus. phosph.

lyc.

— pendant les règles puls graph. kal. hyos. cham. sulf sep. n-vom.

— ophthalmie, acon. Dell. merc.

- otalgie, puls. merc. bell.

- oure affectée, dulc, puls. acon. bell.

- prosopalgie, acon. merc. dulc. bell.

n-vom.

- burnatisme, nuls. acon. merc.

- all a suite des règies, n-voin. Doi. acon. bell.

graph. kreos. stram. lyc. phosph.

Règurgitations, sulf. carb-vg, phosph.
lach. n-vom. bry. cham. puls. con.

- aliments (des), phosph. bry. sulf.

cham. puls. con. - sanguinolentes. n-voin. sep.

Reins maux de , n-vom, calc, sulf, rhus, puls, sep. caus, — tour de reins (suite d'un), rhus, bry, puls, n-vom, calc, sulf, puls,


Bry, puis, n-voin, cane, sun, puis, Reins, rognons affectés, puls, lyc, sass, canth, n-vom, cann, zinc, Repas (mal pendant le), carb-vg, phosph, sep, graph, puls, hep, natr-m, lyc.

(mal à la suite du'. sulf. ars. n-vom.

sabad.

Ľ.





803

Répugnance pour les acides. sulf. Rétrécissements. bell. ferr. cocc. ign. vom. puls. bel

cham, cocc. bouillon pour le). rhus. cham. arn

graph. ars. bell. - caté 'pour le). n-vom. bry. phosph.

calc. coff. cham. sulf-ac. lyc. natr-m. douceurs pour les sulf. caus.

eare. con. cnam. suri-ac. 1yc. nar-ac.
- douceurs pour les. sulf. caus.
phosph. ars. merc. graph. nitr-ac.
- eau :pour l'. bell. stram. n-vom.
bry. natr-m. lyc. chin. caus.
- eau-de vie :pour l'. ign. merc.
- farineux 'pour les). sabad. phosph.

fromage (pour le), chin, oleand,
 graisse (pour la), petr. bry, puls, carb-vg, natr-m, ang, sulf, ars.

hep.

nep.

- lait (pour le), sep. calc. puls. guai. bry. sil, cin. sulf. bell. ign. carb-vg.

- liqueurs (pour les), bell. magn.

- pain (pour le . natr-m. con. sep. lyc. puls. n-vom. sulf. nitr-ac. phosph.

- pain de seigle (pour le, . lyc. sulf. ksil nuls. n-vom.

kal. puls. n-vom poissons (pour les', zinc, graph,
 salaisons (pour les), selen, carb-vg,
 solides (pour les aliments), staph,

ang. merc. ferr.
- viande pour la'. sulf. mur-ac. sil.

petr. sep. calc. rhus. carb-vg. vin (pour le) merc. sabad. rhus

ign. sulf. lach. Respirant (mal en), bry, acor kal, ars, merc, nitr, bell, arn acon. chin

Respiration affectée. acon. sulf. puls. ars phosph. bry. ipec. bell. — accélérée. acon sulf. bell. sep. carb-

vg. phosph. cupr. lyc. ipec.

bruyante. cham. spong. chin. samb.
ars. sulf. cin. stram. hep. phosph.
courte. acon. ipec. sep. bell. carb-

vg. arn. bry. phosph. difficile. sulf. ars. phosph. bell. lach. iod. kreos.

haletante, pec. bry. stram.

cham. carb-an. phosph. arn. sil.
inégale. bell. op. ang. cupr. puls.
cham. ign. cin. laur. iod.

lente. bell. op. cupr. ign. ipec. hep. bry. n-vom.

– profonde. op. bry. ipec. lach. sil. cupr. caps.

ralante. hep. tart. lyc. cupr. hyos. cham. ipec. chin. bell. stram.

sibilante. samb. hep. spong. cupr. lach.
- suspirieuse, sil, acon, stram, cocc. Rides à la face, lyc, calc, sep, stram.

op. bry. sec. ipec.

épugnance pour les acides. sulf. Rétrécissements. merc. cic. rhus. n-bell. ferr. cocc. ign. vom. puls. bell. phosph. bry. petr. - bière (pour la, chin. bell. n-vom. Rèves. chin. sil. n-vom. puls. sulf.

phosph. lyc. - agréables. n-vom. op. puls. acon. ma:n-m. staph.

animaux (d'), puls, sulf, arn, phosph, bell, veratr, hyos. anxieux. chin. sil. bell. n-vom. sulf.

calc. acon.

argent d'). zinc. alum. magn. cycl. chutes (de). chin. thui. confus. chin. puls. croc. stann. natr.

continuant après le réveil. ign. chin. calc. natr-m.

- contrariants, cham, nitr-ac, chin, natr-m, staph, caus, bry, n-vom, - danses (de), ant, natr, alum, magn, - eau (d'), sil, ars, merc, ferr, magn,

érotiques. op. chin. staph. ign. n-

vom. šil.

-événements du jour d'i. n-vom. bry. sil. rhus. puls. -fantastiques. sil. carb-vg. sulf.

con. petr. n-vom. feu (de). suif. ars. hep. calc. spong. natr. spig.

fréquents. chin. sil. lyc. carb-vg. puls. n-vom.

guerre et soldats (de), hep. bry. amm-m. ferr. spong. merc.

maladies (de . n-vom. kal. calc. con. amm. sep.

malheur (de). puls. arn. phosph. ars. n-vom. chin. ars. n-vom.

morts, cadavres (de). phosph. anac.

phos-ac. thui. kal. - orage (d`. spig. ars. arn. - querelles (de). n-vom. bry. staph.

arn. phosph. cham.

- revenants, spectres de). sil. carb-vg. puls. ign. alum. kal. - vermine (de'. n-vom. alum. sil.

amm. phosph. kal.

voleurs de merc. aur. sil. natr. veratr. bell.

voyages (de), op. lach. sil, sang. magn-m. natr.

Rhagades, puls, calc, sulf, cham, merc, lyc, hep, petr. Rhubarbe mal par l'usage de la cham, merc, bell, n-vom.

Rhumatisme. acon. puls. merc. rhus. bry. colch. arn. n-vom. sulf.

Rhume de cerveau. Voy. Coryza de poitrine. Voy. Catarrhe bronchi-

rhab, hell.



Rides au front, cale, lye, hell, stram. Sang corrosif, acre, nitr. ars. sil. kal sep, rhus, sulf. Rire (envie de), croc. phosph, scon

804

hyos, bell, stram, con, plat, veratr, convulsif, con, aur. ign, cale, phosph, alum, cupr, bell, croc, caus, -mal par lef, bell, ars, stram, carb-

vg. phosph. Roideur des muscles, sulf, cupr. sep. caus, coloc.

Rougeole, puls. acon. sulf. bell. phosph. ars, rhus

avant l'éruption puls, acon, bry, sulf, rhus, phosph, pendant l'éruption, puls, coff, acon,

suif. bry. phosph.
suite de l'éruption à la puls. ars. coff. rhus. bry. phosph. dros. suppression, répercussion.

bry, rhus, phosph, sulf. Rupia, merc. ars. sulf. petr. sep.

S

Safran (mal par l'usage du), puls, bell.

op. acon. Salivation. merc. op. chin. nitr-ac

sulf. hep. Salive altérée. merc, sulf. hyos. puls. dig. bism. magn-m. sabin.

- aqueuse, puls. kreos. magn-m. - augmentée, merc. bell. rhus. puls.

phosph. sulf. n-vom. ant. sep. arg. blanche, spig, sabin, ran, brunâtre, bism.

diminuée, bell. verair, stram, n-mosch, sulf, phosph. sep, ars. écumeuse, sulf. bry, spig. eanth.

sahin.

épaisse, n-mosch, bell, bism.
 fetide, merc, dig.

graph.

filante, arg. veratr. bell. camph. nitr-ac

rougeatre, sabin,

- sanguinolente, sulf. hyos, merc, nvom. arn. nitr-ac -visqueuse, camph, arg. bry, bell.

cann. Salsepareille (mal par l'usage de la).

merc. bell. sulf, Sang des hémorrhagies altéré, puls.

carb-veg, graph, croc. cham, bry, brunatre, carb-veg, bry, rhus, cale puls. con

coagulé, rhus, cham, bell, plat, ferr. Brn.

- chaud, dule,

dale, see, arn. rhus, bry, phosph.

sulf. arn. bep. amm. carb-veg. - épais. sulf. croc. plat. cupr. puls.

arn. fétide, sabin, bell, plat, carb-an,

phosph. bry. fonce, noir.

fonce, noir, cham, n-vom, croc, sep, amm, puls, sulf, pale, puls, carb-veg, graph, sulf, plat.

visqueux, eroc, cupr, magn, sec,
 Sarcocele, Foy, Testicules gonfles,
 Satyriasis, chin, plat, merc, sulf, natr-

m. majoran. Saucisses gatées (mal par les), bry, phos-ac, ars, kreos, Scarlatine, bell, suif, amm, phosph.

acon. merc.

gangréneuse, ars. carb-veg, amm. sulf, lach. lisse, bell, sulf, phosph, merc.

amm. acon.

miliaire, sulf. acon. dulc. bell. bry. coff. répercutée. phosph, bry, sulf, bell.

phos-ac. Sciatique, rhus, puls, bry, calc. sulf.

color.

Scorbut, amm. staph. n-vom. sulf.
merc. carb-veg. lach. natr-m.

Scrofules, sulf. calc. merc. hep. haryt.
iod. hell. sil. amm. ars.

Scrotum affecté, sulf. petr. thui. rhus.
clem. calc. natr-m. carb-veg. sil.

dartres (de). petr. calc. natr-m.
prurit (de). petr. carb-vg. sil. graph.
sclen.

scien.

- sueur (de), sil. anim, sep. baryt, thui, ign, rhod, magn-in.

Seigle ergotó (mal par l'usage du), stram, bell, hyos, colch, solan-nigr.

Seins affectés, Voy, Mamelles.

Sel de cuisine (mai par l'abus du), carb-veg, nitr-sp, calc. lyc, ars. dros. Selles altérées, merc, sulf, puls. n-

vom acides. rhab. calc. sulf. graph. natr.

merc. acres, merc. ars. puls. sulf. cham. veratr.

aqueuses, sec. ars, puls, ferr, chin, phos-ac, cham, calc, dule, - bilieuses, puls, ars, mere, cham, veratr, chin, bry, sulf, - blanchâtres, merc, acon, sulf, chiu,

puls, hep, phosph, ars, veratr, ipec, bouillie (en forme de), sulf, bell. puls. phosph. chin.

brulantes, ars. mere, lach, sulf.




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICA

```
Selles brunatres. veratr. ars. sulf. Soir (mal le). puls
                                                              sep. calc. merc.
- au lit (mal le).
     chin. sec. arn.
     - changeant de couleur. puls.
- crottes de mouton (en forme de).
- magn-m. sep. sulf. lach.
- difficiles. n-vom. alum. sil, chin.
                                                              bry.
                                                                       sep.
                                                                               car
                                                              phosob.
                                                           Soleil (mal au). 1
     natr-m. sep. sulf. plumb. op.
- dures. n-vom. calc. sep. ant. op.
baryt. lach. alum. sil. sulf.
                                                              ant. acon. bry
                                                           Solitude (mal dan
                                                              lyc. sil. ars. dr
      écumeuses. sulf. calc. merc. chin.
                                                           Sommeil altéré.
                                                              rhus. bell. puls.
     rhus. coloc.
     - fétides (très-), ars. sulf. carb-vg. sil.
puls. calc. merc. chin. n-vom.
fréquentes. Voy. Diarrhée.
                                                               agité. sulf. ars.
                                                              cham. rhab. pu
                                                               anxieux. acon.
     grisatres, merc. phos-ac, aur. rhab.
dig. chin.
                                                              op. lyc. dulc.
                                                              leger (trop). me
     hachées (comme). cham. rhus. puls.
merc. lach.
                                                              n-vom. ign.
                                                               non réparateu
     - inaperçues. sulf. colch. veratr. ars.
puls. phos-ac.
- insuffisantes. n-vom. calc. sulf. natr.
                                                             sep. con. sil. pl
profond. op. 1
                                                             siram.
     alum. chin.
                                                               soporeux, com
                                                          bell. n-vom. cri
— tardif, le soir
chin. phosph. c
Sommeil avec soi
      involontaires. rhus. arn. sec. bell.
   hyos. chin. phosph. ars.

- jaunâtres. ipec. ars. merc. dulc.
ehin. puls. cham.

- liquides. Voy. Diarrhée.

- mince (d'un moule trop uur-ac.
graph. staph. caus. sep. merc.
                                                             stram. bell. sil.
                                                             hep.
                                                              endormant (en
     muqueuses. puls. chin. sulf. bell.
                                                             bry. puls. calc.
merc.
     phosph. merc
     muqueuses et sanguinolentes. merc
                                                              pendant le som
    sulf. ars. hep. rhus. puls. n-vom.
noires. veratr. ars. merc. chin.
                                                             stram. bry. si
                                                             cham.
    squill. cupr.
- non digérées (de matières), chin.
arn. sulf. bry. ferr. phosph.
                                                             suite du somme
                                                             vg. sulf. calc. st:
                                                           Somnambulisme.
    - pales (trop), carb-veg, lyc, hep,
- purulentes, merc, arn, lach, canth.
                                                             bry. sulf. op.
                                                          Somnolence, sulf. c
    nitr-ac. sil. sulf.
                                                             phos-ac. natr-m
    putrides, sulf. ars. chin. carb-veg
                                                             matin (le). n-vo
      -vom. rhus. nitr-ac.
                                                             phos-ac. natr-m.
                                                            jour (pendant l
chin, puls, hep.
   - rares. Voy. Constipation.
- sanguinolentes. merc. sulf. puls.
   ars. rhus. ipec.
                                                             repas (après le
                                                            sil. phosph. lach
soir (le), sulf. h
    verdatres. merc. ars. puls. cham.
    veratr. ipec.
     volumineuses (trop).
                                                            n-vom.
                                                         Soubresauts des n
Selles avec souffrances. merc. sulf.
                                                            ars. sep. kal. sul
   caps. ars. n-vom. rhab.
    avant l'évacuation, veratr.
                                               merc
                                                            - des tendons. rhu
   tart. cham. puls. caps. rhus. dulc.
- pendant l'évacuation. veratr. ars.
                                                            sulf-ac. hyos.
                                                          Soufre(mal par l'us
   sulf. cham. merc. puls. caps. rhab.
suite de l'évacuation à lai. caus.
                                                            sil. n-vom. sep.
                                                         Spasmes, bell, stra
   - suite de l'évacuation : à lai, caus.
phosph. n-vom, veratr, ars, sulf, calc.
                                                            cupr. op. byos. c
Sevrage (mal par le). puls. bell. calc.
                                                            · cloniques.
bry.
Société (mal en). sep. baryt. puls. natr.
                                                            veratr. hyos.
                                                            - internes. ign. c
cupr. bell. n-von
   hyes. ambr.
```

JAHR. - 8º édit., Ire part., t. II.



Spasmes toniques. op. camph. veratr. Sueur huileuse. Voy. Sueur grasse.
bell. sec. cupr. stram. ang.

—jaunatre. merc. ars. rhab. bell. magn bell. sec. cupr. stram. ang. Spermatorrhée. ferr. phos-ac. mangeant (en). carb-veg. nitr-ac. carb-an. natr-m. matutinale. chin. bry. sep. n-vom. Sperme altéré, sulf, caus, sep, mur-ac phosph. rhus. bry. puls. calc. stram. moisi (d'odeur de). stann. n-vom. merc. selen. Sphacèle, sec. chin. squill. lach. ars. Splénalgie, arn. sulf. acon. chin. ars nocturne. sulf. calc. sil. kal. stann. hep. phosph. puls. ars. sep. chin. -parties affectées (aux). merc. ambr. ign Splenite. bry. sulf. chin. acon. ars. caps. n-vom. tart. stront. - parties couvertes (aux). bell. - putride (d'odeur). stram. n-vom. Squirrhe. con. sil. sulf. clem. sep. bel. pet. Staphylome. aps. calc. lyc. puls. sulf. Steatome. baryt. calc. iod. sabin. ant. staph. carb-veg. roidissant le linge, merc. seleu. sang (d'odeur de). lyc. sult. hep. sanguinolente. lach. n-mosch. cro-Stérilité. merc. borax. phosph. cann. sulf. caus. natr-m. tal. - semi-latérale. puls. cocc. n-vom. bry. rhus. sulf. Stomacace. n-vom. sulf-ac. carb-veg. merc. borax. ars mercurielle. carb-veg. nitr-ac. hep. sommeil (pendant le). puls. cham. sulf. aur. staph. ferr. chin. ars. - refroidissement (après un). dulc. ntravail de tête (pendant un). sulf. graph. sep. borax.
- urine (d'odeur d'). coloc. nitr-ac. vom. merc. carb-veg. Strabisme. alum. hyos. bell. puls. men. canth. visqueuse. phosph. cham. veratr. Stramonium (mal par l'usage du). n-vom. coff. hyos. bell. acon. lyc. ars. phos-ac. Suintement de la peau. sulf. calc. petr. Strangurie. n-vom. puls. dulc. cann. sulf. merc. canth. merc. graph. lyc.
Suppurations. hep. lach. puls. merc.
sil. sulf. asa. cham. phosph. ars.
— benignes. hep. sil. sulf. puls. merc. Strofulus. sult. acon. bell. calc. Sucre (mal par l'abus du). ign. merc. cham. selen. acon. zinc. natr. calc. · (désir de). kal. amm. lyc. ipec. bell. phosph. calc. lach. - (répugnance pour le). caus. sulf. copieuses (trop). sulf. graph. phosph. merc. sep. sil. hep. chin. phosph. Sueur. merc. hep. chin. cham. op. samb. acon. sulf. natr. kal. nitr.
— acide (d'odeur). sulf. lyc. sep. nitrcalc. ars. malignes. sil. asa. merc. phosph. hep. sulf. kreos. nitr-ac. carb-vg. supprimées, arrêtées. hep. lach. ac. ars. sil. - acre. cham. ipec. con. sil. merc. calc – affaiblissante. chin. merc. samb. bry. Surdité. *Voyez* Dysécie carb-an. nitr. phosph. Sursauts du corps. suif. ars. kal. bell. – amère (d'odeur). dig. sil. hep. sep. carb-vg. puls. cupr. -anxiété (avec). ars. natr. n-vom.cham. caus. sulf. phosph. staph. op. Sycose. thui. nitr-ac. lyc. phos-ac. chaude. op. cham. stram. phosph. sabin. sass.
Syncope. Voyez Défaillance.
Syphilis. merc. nitr-ac. aur. carb-vg.
carb-an. iod. lyc. bell, lach. bell. lacn.

- colorant le linge, merc. ars. magn.
bell. rhab. carb-an. graph. selen.

-facilement provoquée. sulf. hep. calc.
sep. chin. natr. kal. lyc. sil.

- fétide. staph. baryi. puls. dulc.

phosph. graph.
-froide. verair. ars. sec. camph. ipec.
chin. puls. bry. n-vom. hep. carb-vg.
- grasse. merc. bry. stram. chin.

gluante, phosph. cham. veratr. acon lyc. ars. phos-ac.

Tabac (mal par l'abus du). puls. n-vom. cocc. verair. Taches sur la peau. sep. con. sulf. bry. phosph. hyos. nitr-ac. ant. hep.

blanches. sulf. sil. sep. ars. merc. alum. natr.




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

807

phosph. bell. plat.

- brunes. sep. con. sulf. carb-vg. Teint. Voyer Face. Taches brunes. sep. nitr-ac. hyos.

cuivrées. nitr-ac. merc. phosph con.

écarlates. bell. merc. amm. phosph.

ipec. euphorb. -furfuracées. bry. sulf. ars. sil. calc. kreos. lyc.

hépatiques. sulf. ant. lyc. laur. sep. merc. nitr-ac. jaunes. sep. con. sulf. arn. phosph.

ferr. petr.

- lépreuses, natr. sil. ars. sep.

 livides. ars. plumb. sec.
 marbrées. thui. carb-vg. natr-m. caus. lyc. plat.

naissance (de), carb-vg, sulf, calc. thui. sulf-ac.

noires. ars. chin. euphorb. bell. pourpres. bry. ars. con. rhus. sulf-

ac. arn. - rosées. natr

rouges, sulf, arn. sulf-ac. bell. sabad. ars. sep.

rousseur (de). lyc. suif. ant. puls calc. natr.

- sang (de). bry. sulf-ac. arn. rhus. n-vom.

- verdatres. con. ars. sep. arn. - vin (couleur de). sep.

violettes, con. phosph.
 Taies de la cornée, cann. cin. nitr-achep. bell. sil. euphr.

Tailleurs de pierre (maux des). sil. calc. lyc. puls. natr. ipec. sulf. nitr-ac lyc. puls. natr. ipec. sulf. nitr-ac. Talons ulcérés. sep. natr. ars. caus.

Tannes. carb-vg. bell. sulf. hep. n-vom. calc. carb-ai Teigne. sulf. calc. baryt. lyc. ars. hep.

rhus. merc.

amiantacée. ars. staph. rhus. carban. merc.

faveuse. ars. sulf. phosph. hep. merc. baryt. calc. brom.

furfuracée. ars. bry. alum. oleand. mez. calc. sulf. kal. graph. rhus.

humide, sulf. rhus. calc. ars. lyc. hep. sep. staph. graph. merc. impétigineuse, sulf. calc, rhus. ars.

hep. phosph. merc.
-porrigineuse. sulf. calc. rhus.
ars. lyc. hep. staph. sep. graph. merc

- seche. sulf. baryt. calc. aur. ars.

graph. thui. lach. merc.
- serpigineuse. sulf. ars. calc. sep. clem. sess. graph. dulc.

Télangiectasies. puls. carb-vg. sep. ars. nitr-ac.

Tempête (mai par un temps de). sep. con. sulf. sil. rhus.

Temps changeant (mal par le), calc. sulf. carb-vg. sil. rhus. — humide (par un). puls. veratr.

humide (par un). puls. veratr. dulc. rhus. carb-vg. - nébuleux (par un). rhus. mang. cham. n-mosch. chin. sep. rhod. merc. bry.

- sec (par un). caus. n-vom. heb. asar.

spong. acon. ipec. bry. sabad. Ténesme de l'anus. merc. sulf. n-vom. ars. rhab. caps. rhus. puls. - de la vessie. puls. cann.

de la vessie. puls. cann. n-vom. merc. canth. dig. 'esticules affectés. puls. aur. nitr-ac. merc. clem. arn. zinc. rhod.

atrophiés. spong. iod. douloureux. sep. rhod. spong. phos-

ac. arn, phosph. induration. clem. mcrc.

durs, indurati rhod. agn. spong. enflammés. merc. puls. aur. nitr-ac.

clem gonfiés. puls. aur. iod. clem. rhod.

Tétanos. op. camph. ipec. bell. sec. cic.

ign. veratr. Tête affectée. bell. verb. sil. n-vom. ign. phosph. acon. sabin. natr-m. sabad.

chaleur (de), arn. acon. sulf. bell. sep. bry. sil.
- congestion (de). bell. acon. n-vom.

arn. sulf. bry. op. lach.
- croûtes. (de). Voy. Teigne.
- douleurs (de). Voy. Céphalalgie.
- fatigue (de). Voy. Meditation diffi-

cile.

- volumineuse (trop) chez les enfants.

calc. sulf. sil.` Thé de Chine (mal par l'usage du). chin. thui. ferr. veratr. coff selen. lach. Tic douloureux. Voy. Prosopalgie. Tintement des oreilles, chin. n-vom. bell, puls, calc, caus, sulf, con, petr.

Tour de reins (suites d'un). rhus. bry. puls. n-vom. calc.

Toussant (mal en). n-vom. bry. phosph. acon. dros. sulf. puls. caus.
- hypocondres douloureux. n-vom.

bry. dros. phosph. lach. lyc. sulf. op. hep.
-poltrine douloureuse, acon. phosph.
bry. puls.bell. sulf. carb-vg. kal.uitr.




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

809

puls. carb-vg. caus fongueux. merc. sil. clem. petr.

lach ars. staph. froid (avec sensation de), sil. ars

rhus. bry. merc. gangréneux, ars. sil. bell. sulf.

gonflés. sil. merc. sep. rhus. sulf.

ars. puls. bell.
grishres. sil. ars. merc. caus.
herpétiques. sulf. calc. c'em. lach.
graph. sil. merc. lyc. sep. rhus.

indolents. phos-ac. ars. sep. carb vg. lach. cupr. puls. phosph. insensibles. op. carb-vg. sulf. phos-

ac. lyc. ars. jaunes, cic. merc. sil. bell. puls. lardacés, merc. hep. sabin. sulf.

thui. nitr-ac. - luxuriants. petr. cham. sulf. merc

sil. ars. graph. - mercuriels. sulf. hep. nitr-ac. sil. asa. lyc. thui. bell. aur. lach. carb-

noirs (qui deviennent). sil. lach. ars. mur-ac. sulf.

plats, superficiels. nitr-ac. lach merc. thui. ars.

 profonds. merc. bell. asa. lach. pruriteux. lyc. sil. ars. hep. puls.

rhus. phos-ac. - putrides. sulf-ac. ars. sil. cycl ell. hep. mur-ac. merc

- rongeants, phagédéniques, merc. carb-vg, sil. ars. caus. sulf. nitr-

rouges autour. acon. sil. phosph. cham, ars. hep. lyc. asa. merc. bell.

- saignant facilement. phosph. ars graph, hep. phos-ac. carb-vg. puls. - sales au fond. merc. lach. nitr-ac.

thui. sabin. scorbutiques. sulf-ac. ars. sil. mur-ac. amm. staph. sulf. merc. hep.

scrofuleux. sil. ars. sulf. calc. merc. lyc. carb-vg. asa. hep. - suppurant. beaucoup. sil.

hep. merc. chin. puls. cham. bell. asa. sulf.

peu. ars. hep. lach. sil. merc calc

 syphilitiques. merc. nitr-ac. thui.
 aur. lyc. carb-vg. sil. carb-an. tachetés. sulf-ac. arn. ipec. ars lach, con.

Ulcères fétides, ars. sil. merc. carb-vg. Ulcères variqueux. carb-vg. suif. puls. sec. chin. sep. asa.

— fistuleux. calc. sil. phosph. ant. sulf. — vermineux. sil. merc. sabad. ars.

calc.

— verruqueux, ars, sil. petr. Urèthre affecté, cann. canth. puls, sulf.

merc. caps. n-vom.

douloureux, cann, sulf, calc, merc, arg-n. puls. cann. merc. n-vom.

n-vom. Urinant (mal en). cann. merc. puls. n-

vom. sulf. cale. coloc. voin. suil. carc. coloc. - avant l'émission. puls. n-vom. bo-rax. coloc. tart. arn. sulf. bry. - début de l'émission (au). merc.

canth. clem. caus.

- durant l'émission. puls. cann. phos-ac. canth. merc. lyc. thui. hep. - fin de l'émission (à la). canth. sulf.

phosph. bry. petr. suite de l'emission (à la). - suite de l'émission (à la). thui, canth. natr-m. coloc. hep. sulf. bell. staph.

Uriner (besoin d'). n-vom. acon. puls. bry. sulf. caus. staph. n-vom. squill.

- besoin sans résultat. dig. canth. sass. n-vom. puls. sulf. sep. caus.

Urines altérées. puls. sulf. acon. n-vom. phos-ac. carb-vg. sass. lyc. merc.

- abondantes (trop). puls. carb-vg. phos-ac. merc. sulf. aur. spig. natr-

acide (d'odeur). merc. ambr. petr. calc. graph. nitr-ac.

ácres. borax. merc. hep. caus. phosph. calc. veratr.

brùlantes. merc. acon. phosph. ars. lyc. cann. dulc.

chaudes. n-vom. acon. merc. ars. hep. bry. dépôt (avec). sep. arn. puls. chin.

phos-ac. dulc. merc. lyc. - argileux. zinc. sulf. anac. sep.

sass. kal. ign. amm-m. canth - blanchåtre, rhus, phosph, sulf.

sep. con. spig. hep. petr.
— farineux. cal. natr-m. graph.
phos ac. chin. tart. merc.

– filandre ux, floconneux. mez.zinc.

- grisatre. con, spong.hyos.mang. tart. led.

- — jaunatre. zinc. cham. sulf-ac. phosph. spong. sil. chin. cupr.



Urines area dépôt muqueux, puls. dulc. Urines vardêtres, camph. veratr. rhab.
valér. natr-m. sulf. ant. sulf-ae. aur.
nuageux. phos-ac, bry. thui.
nitr. seneg. merc. ambr. pert. sous.
— puraient. olem. canth. puls.
lyc. sop. oon. kal. cana. sulf.
— rougeâtre. nuls. canth. senell can liferus Vou Matrice.

- rougeatre, puls. canth. sep. natr-m. valer. nitr-ac. chin. lyc acon

- sablonneux. sass. lyc. zinc. ant sil. calc. ruta. phosph.

- sanguinolent. canth. sep. puls.

phos-ac. zinc. lyc. dulc. sulf. écumantes, spong, chin, lach, seneg laur.

· émises trop fréquemment, merc arg, staph. caus. rhus. nitr. squill.

arg, suph. caus. rius. ntr. squin— gouttes (par). sulf. calc. m-aus.
canth. petr. dulc. camph. arn.
— interrompu (en jet). con. clem.
zinc. sulf. m-aus. dulc. op. caus.
— inv. lontairement. puls. caus.
rhus. sulf. bell. sil. dulc. sep. lyc.
— nuit an lit (la). bell. sulf. rhus

, cin. sil. puls. sep. caus. rarement (trop). canth. puls. arn stram. acon. n-vom. arn.

- fetides, dulc. puls, ars, phos ac carb-vg, nitr-ac, natr, viol-tr, - filandreuses, mez, zinc, canth

seneg. sass. merc. cham. cann. nitr foncées. acon. veratr. bell. tart bry. sep. colch. merc. carb-vg. sulf.
froides. nitr-ac. agar.
laiteuses. phos-ac. aur. merc. cin.
mur-ac. dulc. iod. carb-vg. hep.

· muqueuses. puls. dulc. valer. natr

m. sulf. ant. sulf-ac. aur. nuageuses. phos-ac. bry. carb-vg. thui. nitr. seneg. merc. ambr. petr. pales. phos-ac. con. nitr. rhus. arn.

pales, pnos-ac, con, nur, rnus, arn, puls, bell, stram, ign, coloc, puls, phosph, calc, hep. iod, par, sulf, purulentes, clem, canth, puls, lyc, con, sep, kal, cann, sulf, rares, peu copieuses, op, canth, staph, colch, bell, ruta, graph, dia

dig.

retenues, rétention d'urines.stram.
arn. lyc. canth. ruta. acon. puls.
sanguiuolentes. puls. canth. sulf.
ars. sep. calc. sec. caps. phosph.

troubles en soriant, cin. sabad. con. merc. sep. cann. rhus, chin. puls.

troubles (qui deviennent). phos-ac. cham. rhus. caus. valer, merc.

Utérus. Voy. Matrice.

Vagin affecté, sep. mere, con. sulf. bell. ferr. lyc.

chute du . sep. merc. n-vom. enflammé. merc. puls. sep. sulf.

lyc. n-vom. sec (trop). lyc. bell. merc.

Vaisseaux sanguins affecte's, phosph. arn. sulf. ars. sep. carb-vg. puls. caus

enflammés, acon, cham, boll, puls,

sulf. sep.

— froid intérieur (de), lyc.
Valériane (mal par l'usage de la), cham. .
u-vom. coff, sulf. Varicelles, puls, tart, ant, merc, sulf,

bell. acon.

Varices. carb-vg. puls. arn. sulf. calc.
n.vom. ars. lyc

enflammées, puls, arn, sulf, ars, spig, calc, sil, kreos, zinc, n-vom, ulcérées, lyc, sil, puls, ars, lach. sulf. tart. kreos.

Variole. Voy. Petite vérole.

Varioloides. rhus. sulf. bell. merc. are. Veau (mal par la viande de). nitr. calc

veau (mar par la viante de), intr. care sep. caus. ipec.
Veilles prolongées (mal par les), cocc. n-vom. selen. colch. puls. ambr.
Vent (mal par le). con. sulf. bry. sil. carb-veg. lyc. lach. sep.
— est (d'). sil. acon. hep. caus. bry.

n-vom. carb-veg. · nord (du). sep. caus. sil. hep. n-vom. acon.

Ventre affecté. sulf. chin. sep. coloc. puls. n-vom. plumb. cham. rhus.

ballonné. chin. carb-veg. sulf. coloc. phosph. lyc. veratr. arn. puls. sulf. graph.

douloureux. Voy. Coliques

chaleur intérieure (de), sil. bell. n-vom, ars. phosph. acon. congestion (de). sulf. n-vom. carb-

veg ars. caps. puls - enflammé. Voy. Entérite et Périto-

nite

froid intérieur (sensation de). sep. veratr. ars. petr. calc. phosph. sec. gonffé. Voy. Flatuosités et Ascite.




TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS

·811

Ventro gros, chez les femmes. sep. Vessie affectés de catarrhe dulc. puis. hell. n-vom. calc. coloc. chin.

— sensible au toucher. n-vom. merc. acon. puls. hyos. sulf. cham. bell.

— taches sur la peau. phesph. sep. cpuississement (d'.. dulc. sulf. cham.bell. — chaississement (d'.. caun. puls. canth. canth.

Verge enflammée, cann. merc, canth sulf. sep. n-rom. zinc.

Verrues, calc. natr. caus. rhus, sulf. dulc. thui. sep.

anciennes, caus. rhus. sulf. nitr-ac kal.

- hras (aux). calc. nitr-ac. caus, sulf.

- calleuses. ant. thui. dulc. sulf. graph. - cretiformes, thui, nitr-ac, phos-ac

natr. rhus.

- doigts (aux), thui, sep. sulf, lach, - douloureuses, caus, thui, natr, sulf, nitr-ac. natr-m.

enflammées, natr. caus, sulf. sil

thui, nitr-ac. - face à la', caus, sep, kal, dulc. grosses. caus. sep. natr. nitr-ac

dulc. - mains 'aux', thui, cale, sep. rhus.

phosph. duic. lyc. lach. nez au caus.

– paupières (aux). caus, thui, nitr-ac pediculees, sabin, thui, lyc. dulc.

petites, rhus, calc. thui, sep. sulf. sass, mitr-ac. dulc. plates, lach, dulc, calc.

– pruriteuses, thui, phosph, nitr-ac. calc. eupborb.

nitr-ac - sourcils (aux), caus. - ulcérées, natr. caus, sil, calc, thui,

ars. phosph.

ars. pnospa.

- yeux sous les), caus. sulf.

Vers intestinaux. Voy. Helminthiase.

Vert-de-gris (mal par l'usage du), hep.
n-vom. bell. ipec. chin.

Vertiges, acon. sulf. bell. n-vom. arn.
puls. con. sil. phosph. caus. lach.

- congestifs, acon. n-vom. bell. op.
arn. sulf. puls.

arn, sulf. puls.
- estomac surcharge (par l'). puls.

n-vom. ant. bell. - nerfs fatigués (par les). n-vom. puls.

arn. rhus. chin.

- ulcares répercutés (à la suite d'); suif. calc. phosph. bell lach. cans. - voiture (en allant en;. ferr. cocc. sulf. hep.

Vessie affectée, dulc. puls, canth. su!f. pho- ac. merc. graph. n-vom.

inflainmation (d'). cann. puls. canth.

n-voin, acon.

du col. cann. canth. dig. puls. n-voni. acon. paralysie (de). ars. bell. laur. dulc.

hyos.

— du col. ars. hyos. dulc. lach. bell. acon. m-aus. cic.

polypo /de: cale. staph. puls. con. thui. merc. sil.

vial. merc. sil.
Vètements (gène par les), n-vom. bry.
sulf. calc. lyc. hep. caus. spig.
Viande (mal par l'usage de la,. colch.
calc. puls. sil. sep. ferr.
- trépugnance pour lv. sulf. puls.
sil. lyc. sep. ign. rhus. merc. nitr-

Vin (désir de). calc. acon. staph. bry.

sulf. sep. sil. - (mal par l'usage du', n-vom. coff. op. lach. zinc. calc. sil. lyc. puls. an: répugnance pour le). lach, ign. rhus. merc. huor-ac.

Vin: igre (mal par l'usage du), ant. ars. sulf. ferr. sep. — saturné (par le). op. sulf. bell. plat.

n vom. ars. alum. sulf-ac.

soufré (par le;, puis, merc, sep, ars, chin.

Violon (mai par le jeu du), kal. cala. viol-od.

saignant facilement, natr. thai. Visaga. Foy. Face.
nitr-ac.
sourcils (aux). caus.

visaga. Foy. Face.
Visions fantastiques. bell. stram. veralr. hyos. op. merc. anac. sulf. sil. ars.

visions physiologiques, bell. phosph. aur. sulf. cale. sil. sep. — aurrole autour de la flamme, puls

bell, sulf, ruta, pho-ph, cocc, sep.-couleurs blanches, kal, amm, sulf. alum, phos-ac, bell, dig. cann. can-

 bleues, lyc. bell. stront, stram. zinc. sulf.

claires, bell, stront. camph. n-vom. aur. valer. hyos. kal. borax.

— diverses, phosph. bell. phos-ac. cic. stram. dig. nitr. kal. — foucces, stram. bell. sil. calc, sep. chin. pho-ph. con. nitr-re.

merc. cocc.

- grises, phos. sil. stram. sep. - irises, phos-ac, hell, phosph. con. stram cic. nitr. kal. dig. sulf.



Visions physiologiques. couleurs jau-nes. sep. bell. dig. canth. stront. sil. kal. alum. sulf. ars.

I

- noires. phosph. sil. bell. stram sep. magn.

- rouges. sulf. bell. hyos. con hep. stront. croc. sabad. cann. spig. dig.

- — striées. sep. amm. natr-m. con puls. bell. phosph. amm-m.

- — vertes. phosph. dig. ruta. zinc. sep. stront. sulf. merc.

- éclairs. spig. n-vom. natr. sec. kal. croc. staph. bell. zinc.

feu, flammes. spig. bell. kal. zinc. aur. puls. n-vom. caus. natr-m. hyos. - mouches volantes, stram, agar, sil. bell. sep. calc. rhus. chin. phosph. - objets doubles. hyos. veratr. sulf. bell. sec. cic. puls. dig. natr-m.

- éclairés (trop). hyos. valer. con

n-vom. camph.
— éloignés (trop).
phosph. carb-an. s stann. sulf. n-mosch. natr-m.

- grands (trop), phosph, hyos.
natr-m. euphorb. laur.
- petits (trop), plat. stram. hyos.
- rapprochés (trop), bovis. stram.

cic.

— voilés, phosph, calc, croc, caus, sulf, bell, ruta, lyc, phos-ac, natr-m.

— taches, phosph, sil, kal, amm-m. calc, sep, caus, merc, bell, aur.

Voile du palais affecté, acon, merc, coff, lach, bell, sulf, phosph.

Voix altérée, dros, phosph, havyt, sulf,

con. lach. ben. suit. phosph.

Voix altérée. dros. phosph. baryt. sulf.

chin. caus. iod. carb-vg.

abolie, aphonie. phosph. carb-vg.

veratr. ant. spong. bell. puls. caus.

- aiguë. stram. cupr. stann. - basse-taille (de). dros. chin. iod

par. baryt. cham. arn. laur.
- creuse. veratr. spong. ipec. stann.
samb. led. dros. caus. tart. stram.

- criarde, stram, cupr.

enrouée. spong. carb-vg. phosph. mang. veratr. dros. puls. calc. caus. - enrouée. spong. carb-vg. - faible. veratr. hep. canth.ang.staph. ant. spong. chain. sec. chin.

fausse. graph. spong. merc. caus. dros. hyos. chin. nitr-ac. croc.

nasillarde, staph. lach. merc. bell phos-ac. aur. bry. alum. rauque. phosph. sulf. caus. stann.

seneg. men. puls. n-vom. – sibilante. phosph. hell.

- timbre (sans), dros. spong. hcp./ phosph.phos-ac. eec.

calad. ambr. chin. carb-an. samb. cin.

Voix tremblante. merc. acon. ign. ars. anth.

voilée. merc. camph. stann. caus. spong.chin.selen. dros.mang. graph.

spong.chin.selen.dros.mang.graph.
Vomir envie de). Voyez Nausées.
Vomissements.ipec.n.vom.ars.veratr.
puls.tart.ant.sulf.bry.sil.cham.
— acides, aigres.sulf.cale.phosph.
chin.n-vom.puls.cham.ferr.bell.
— aliments ingérés (des).n-vom.ars.
sil.phosph.bry.ferr.lye.ipec.puls.
— amers, bilieux.ars.veratr.puls.
ipec.n-vom.cham.merc.
— boissons ingérées (des).ars.sil.
veratr.ipec.hyos.spong.cin.arn.
— fécales (de matières).op.sulf.bell.
bry.plumb.

bry. plumb.
- fétides. sep. ars. sulf. cupr. stann.
n-vom. op. phosph. veratr.
- muqueux. puls. dros. veratr. acon.
n-vom. ars. ipec. bell. ign. cham. hyos.

hyos.

— noirs. n-vom. ars. veratr. phosph.
lyc. ipec. plumb. petr. sulf-ac.

— sang (de). arn. phosph. ipec. ferr.
sulf. acon. sep. chin. puls.

— vers (de). cin. acon. sabad. ferr.
sec. hyos. veratr. spig. sil.
Vomiturition. ipec. bell. veratr. arn.
n-vom. chin. tart. merc. asar.

Vue affectée. bell. ruta. sulf. phosph. sil. con. amm. sep. calc. hyos. - abolie. Voyez Amaurose.

- confuse des lettres (en lisant). natr-m. sil. graph. dros. chin. bell. lyc. hyos.

- — des objets. plat. con. stram. graph. sil. lyc. iod. led. faible. chin. cin. bell. ruta. sulf.

phosph. sil. calc.

obscurcissement frequent.

pâle, des objets. sil. dros.

- paic, ues oujes, sii, uros,
- trouble, caus, phosph, sil, calc, sep,
cann, ruta, bell, puls, merc, stram,
'ulnérabilité de la peau, cham, petr,
sil, hep, sulf, staph, nitr-ac, alum, calc.

Y

Yeux affectés. bell. euphr. acon. puls. merc. sulf. phosph. ars. hep. nitr-ac. — agglutination (des). sulf. ars. puls. caus. phosph. n-vom. cham. merc. caves, chin. veratr. ars. sec. staph. phosph. ferr. phos-ac. cernés. chin. ars. veratr. staph.






TABLE ALPHABÉTIQUE DES INDICATIONS. -- 813

Yeux cernés, de bleu, veratr. ars. Yeux injectés, metre, acon. ign. bell. chin. lac. cham. n-vom. phos-ac. ars. ambr. sulf. lach. spig. phossulf.

de jaune nitr-ac. spig. nvom.

- — de vert. veratr. - chassieux. ant. sulf. graph. aur. euphr. sil.

convulsés, cham bell, op. hyos. atram. acon. cic.

- croùteux autour. merc. spong. sep.

- enflammés. Voyez Ophthalmie et

Blépharite.

étincelants. bell. stram. hyos. acon. op. bry.
fermes, occlusion.bell.stram.cham

sep. croc. hep. ars. hyos. phosph.
fixes, regard fixe. hyos. ars. stram.
bell. phos-ac. cic. op. sulf.
froid (sensation de). plat. amm. lyc.

con. kal. cale.
-gonfiés, bell. sulf. acon. puls. bry.
Zona. rhus. graph. sulf. ars. puls.
rhus. cale. merc. euphr:
caus. merc. bry.

âc.

jaunes. merc. chin. bell. ars. dig. cham. sulf. con.

larmoyants, puls, euphr. sulf. acon. phosph. ars. hep. ant. bry. staph. calc.

pr éminents, hyos, acon, spong, bell, hep, arn, veratr, ars, - rouges, acon, bell, merc, cham.

ant. sop. phosph. euphr. bry. puls. hep.


suppurants, euphr. caus. nitr-ac. bell. merc. kreos. puls hep. sulf. ternes. opr. bell. veratr. chin. merc. hyos. stram.

FIN DU TOME SECOND ET DE LA MATIÈRE MÉDICALE.



814 LIBRAIRIE J.-B. BAELLIÈRE ET FILS.

Archives de la médecine homoopathique, publiées par une Société. — de médecins de Paris, collection de 1834-1857; 6 vol. in-8. 30 fr. 4
BEAUVAIS (DE SAINT-GRATIEN). Clinique homosopathique, ou Recueil de toutes les observations pratiques recueillies jusqu'à nos jours. Paris, 1830-1839. Ouvrage complet. 9 forts vol. in-8
- Effets toxiques et pathogénétiques de plusieurs médica- ments sur l'économie animale dans l'état de santé. Paris, 1845; in-8, xui-120 pages avec 8 tableaux in-felio 5 fr.
BENNINGHAUSEN (C. DE). Manuel de thérapeutique homœo- pathique, pour servir de guide au lit des malades et à l'étude de la matière médicale pure, traduit de l'allemand par le D. Roth. Paris, 1846; 1 vol. grand in-12, Lvi-570 pages 7 fr.
Les Côtés du corps ainsi que les affinités des médicaments. Études homosopathiques; traduit de l'allemand par Ph. de Moli- nari. Bruxelles, 1857; in-8 de vin-24 pages 1 fr. 50
BOURGEOIS. Les Passions dans leurs rapports avec la santé et les maladies, par le docteur L. X. Bourgeois. — L'Amour et le Libertinage, 3° édition, augmentée. Paris, 1871; in-12, 208 pages
Bulletin de la Société médicale homosopathique de France, paraissant le ler de chaque mois, depuis le ler mai 1860, par cahiers d'au moins 4 feuilles in-8. Abonnement d'un an pour Paris
CHAUVET (N. M.). L'Avenir de l'homosopathie. Paris, 1860; in-8, 408 pages 6 fr.
DAVASSE. La Syphilis, ses formes et son unité, par J. Davasse, ancien interne des hôpitaux de Paris. Paris, 1865; 1 vol. in-8 de 570 pages 8 fr.
ESPANET (ALEXIS). Traité méthodique et pratique de matière médicale et thérapeutique basé sur la loi des semblables. Paris, 1861. 1 vol. in-9, xxxii-808 pages 9 fr.
FRÉDAULT (F.). Physiologie générale. Traité d'Anthropologie physiologique et philosophique. l'aris, 1863; in-8 de xvi-854 pages
— Histoire de la Médecine. Étude sur nos traditions, tome Ier; grand in-8 de 299 pages 5 fr.
GRANIER (MICHEL). Conférences sur l'Homœopathie. Paris, 1858; in-8, VIII-524 pages
- Des Homosopathes et de leurs droits. Paris, 1860; in-8 de 170 pages 2 fr. 50



LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS.

815

ARTMANN. Thérapeutique homosopathique des maladies des cufants. Traduit de l'allemand avec des notes, par le docteur Lison Smox fils, membre de la Société gallicane de médecine homocopathique. Paris, 1853; 1 vol. in-8 de 700 pages. . 8 fr. IRSCHEL (B.). Guide du Médecin homoopathe au lit du malade et répertoire de thérapeutique homosopathique. Traduit de l'allemand par le docteur Léon Simon fils. Paris, 1858; 1 vol. DFFMANN (Ach.) L'Homosopathie et la vicille médecine. Paris, 50 c. - L'Homoopathie exposée aux gens du monde. Paris, 1870; ERING. Médecine homosopathique domestique, par C. Hering. Traduction nouvelle sur la 12º édition allemande, augmentée d'indications nombreuses et précédée de conseils d'hygiène et de thérapeutique générale, par Léon Smon fils. Paris, 1867; in-18 jésus, 738 pages avec 168 figures, cartonné 7 fr. IBERT-GOURBEYRE. Lectures publiques sur l'homosopathie. 2 vol. in-8 ARCHANT (Léon). Étude sur les maladies épidémiques, avec une réponse aux quelques réflexions sur le mémoire de l'angine épidémique. Seconde édition, corrigée et augmentée. Paris, 1861; de ses adversaires et des exagérations de ses partisans. Paris, 1861; 1 vol. in-18 jesus, 72 pages 1 fr. DLINARI (Ph. de). Guide de l'homosopathiste, indiquant les moyens de se traiter soi-même dans les maladies les plus communes en attendant la visite du médecin. Seconde édition. Bruxelles, 1861; in-18 de 238 pages URE (B.). Doctrine de l'école de Rio-Janeiro et Pathogénésie brésilienne, contenant une exposition méthodique de l'Homœopathie, la loi fondamentale du dynamisme vital, la théorie des doses et des maladies chroniques, les machines pharmaceutiques, l'algèbre symptomatologique, etc. Paris, 1840; in-12 de 400 pages, avec 57 figures intercalées dans le texte . . . DNEZ. Étude médicale sur le venin de la tarentule, d'après la méthode de Hahnemann, suivie de quelques indications thé-rapeutiques et de notes cliniques, traduite par le docteur J. Perry. Paris, 1869; 1 vol. in-8, 268 pages, 2 figures. 4 fr. RIARD. L'Homosopathie mise à la portée de tout le monde 8º édition. Paris, 1863; in-18 jésus



216 LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS.

```
PARSEVAL (Lud. de). Observations pratiques de Samuel Hahne-
  mann, et classifications de ses recherches sur les propriétés
  caractéristiques des médicaments. Paris, 1860; in-8, 398 pa-
Guide homosopathique pour traiter soi-même les maladies.
  Troisième édition, corrigée et augmentée, avec figures. Paris,
1872; in-18 jésus de 584 pages. . . . . . . . . . . . . . . 6 fr. PROST-LACUZON et BERGER. Dictionnaire vétérinaire ho-
  moopathique ou Guide homocopathique pour traiter soi-même
  les maladies des animaux domestiques. Paris, 1865; in-18,
  486 pages. . .
                                                       4 fr. 50
RAPOU. Histoire de la doctrine médicale homospathique, son
  état actuel dans les principales contrées de l'Europe. Applica-
  tion pratique des principes et des moyens de cette doctrine au
  traitement des maladies. Paris, 1847; 2 forts vol. in-8.
                                                         15 fr.
RUOFF (A. J. F.). Guide de l'Homœopathe, ou traitement de plus
  de mille maladies, divisé en deux parties: la première contient
  l'indication des maladies sous les dénominations nosologiques
  de l'ancienne école, les symptômes de ces maladies et les re-
  mèdes qui leur ont été opposés avec succès; la liste des médica-
  ments par ordre alphabetique, et à la suite du nom de chaque
substance les affections guéries par son emploi, etc. Traduit de
l'allemand par Q. L. Strauss. Deuxième édition. Paris, 1851:
1836; 1 fort vol. in-8, 536 pages . . . . . . . . . . . .
SIMON (Léon) fils. Des Maladies vénériennes et de leur traite-
  ment homœopathique. Paris, 1860; 1 vol. in-18 jesus de 745 pa-
triompher
  · Cours de médecine homœopathique, 1867-1868. De l'Unité de la
  doctrine de Hahnemann. Paris, 1869; in-8.
                                                          3 fr.
 -- Conférences sur l'Homœopathie. Paris, 1809; in-8, 320 pa-
                                                          5 fr.
TESTE. Systématisation pratique de la Matière médicale homœo-
  pathique. Paris, 1853; 1 vol. in-8 de 600 pages . . . .
  . Traitement homœopathique des maladies aiguës et des mala
  dies chroniques des enfants. Deuxième édition, revue et aug-
  mentée. Paris, 1856; in-12 de 416 pages . . . . . . 4 fr. 50
WEBER (Georges P. F.). Codex des médicaments homosopathiques,
  ou Pharmacopée pratique et raisonnée à l'usage des médecins
  et des pharmaciens. Paris, 1854; iu-12, xii-440 pages . . 6 fr.
```

